QK91
.S9
1767
t.2



CAROLI A LINNÉ,

EQVIT. AVRAT. DE STELLA POLARI,

ACAD. PARIS. MEMBR. etc.

SYSTEMA NATVRAE,

PER

REGNA TRIA NATVRAE,

SECVNDVM

CLASSES, ORDINES, GENERA,

SPECIES

CVM

CHARACTERIBVS, ET DIFFERENTIIS.

TOMVS II.

Editio decima tertia,
ad Editionem duodecimam reformatam Holmiensem.

VINDOBONAE,

TYPIS IOANNIS THOMÆ NOB. DE TRATTNERN,

CÆS. REG. AULÆ. TYPOGRAPHI ET BIBLIOP.

MDCCLXX.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

S9
1767
t. 2

Opera IEHOVAE *magna!*
expoſita omnibus, qui delectantur illis,
glorioſum et decorum opus Eius!

DAVID.

REGNVM VEGETABILE.

FLOS *eſt Plantarum gaudium,*
tum ſe nouas, aliasque quam ſunt, oſtendunt,
tum variis colorum picturis in certamen vsque luxuriant.
PLIN. XVI. 25.

1. NATVRA creata, continuato Semine, ope elementorum, modificat Terras in *Vegetabilia;* vegetabilia in *Animalia*, vix contra; vtraque reſoluit iterum in *Terras*, circulo perenni aucto.

2. VEGETABILE eſt vita compoſita, absque motu voluntario.

3. TRIBVS Vegetabilium tres vulgo numerantur:
MONOCOTYLEDONES: Fruges: 1, 2, 3.
DICOTYLEDONES: Plantae: 4, 5.
ACOTYLEDONES: Cryptogama: 6, 7, 8, 9.

4. GENTES, e quibus incolae confluxerunt, potiſſimum ſunt:
1. PALMAE. PRINCIPES, Indici, Spathacei ſpadiciferi, fluxi, eminentes celſitudine eximia, ſpectabiles caudice inuariato ſimpliciſſimo perennante, coronati coma frondoſa ſemperuirente, opulentes gazis fructuum opimis. *Hi Tributarii ſunt animalium Primatibus, imprimis eorum Principi cohabitanti.*

2. GRAMINA. PLEBEII, Campeſtres, Culmiferi glumacei, Ruſtici vulgatiſſimi ſimpliciſſimi viuaciſſimi, conſtituentes vim roburque regni, quoque magis mulctati et calcati, magis multiplicatiui. *Hi Tributarii ſunt e vili penu, animalibus plerisque phytiphagis, horumque Cerealia imprimis eorum Principi hoſpitanti.*

3. LILIA. PATRITII, Lucares, Bulboſi triarii, ſuperbientes veſtimentis fulgentibus feſtiuis. *Hi paſcunt oculos condecorantque regnum venuſtate aulaeorum ſplendidiſſimorum.*

4. HERBAE. NOBILES, Pratenſes, Annotini, Polymorphi. *Hi ornant regnum Structura admiranda, Sapore multifario, Odore fragrante, Colore florido.*

5. ARBORES. PROCERES, Syluatici, e Nobilium ordine perennantes caudice, ſtipati pediſſequis *Seruis*, ſuſtentantes inauſpicato clientes *Paraſiticos*. *Hi attollunt capita, arcent Ventos, inumbrant Aeſtuantes, humectant inconſpicuo imbre, alliciunt Vocales, perficiunt Fructus; tamquam totidem Naturae Horti.*
MILITES armati Spinis Aculeisue, e Plantis vtrisque adſcriptiui. *Hi arcent Mammalium hoſtium iniurias.*

6. FILICES. NOVACCOLAE, Latebroſi, Stipitati, Dorſiferi, macres. *Hi praeparant poſteris Terram.*

7. MVSCI. SERVI, Hyemales, Imbricati Calyptrati, Reuiuiſcentes, impaſti, loca omnia a prioribus relicta occupant numeroſiſſimi. *Hi Radices incolarum fouent: ne adurantur a Bruma Hyberna; ne exſiccentur a Sirio Aeſtiuo; ne euellantur a viciſſitudine Vernali; ne corrumpantur a Putramine Autumnali; colligunt etiam pro dominorum peculio Humum daedaleam.*

8. ALGAE. VERNACVLI, Aquigeni, Squalentes, rediuiui, abſtemii, nudiuſculi. *Hi inchoant culturam primam Vegetationis.*

9. FVNGI. NOMADES, Autumnales, Barbari, Denudati, putidi, furaces, voraces. *Hi flora reducente Plantas hyematum, legunt relictas earum quisquilias ſordesque.*

5. TEXTVRA vegetabilium e *Vaſis* ſuccoſis.
Tracheis Aëreis.
Vtriculis ſecretoriis.

6. SVB-

6. SVBSTANTIAE vegetabilium ex *Epidermide* externe obducente *Corticem*, deponentem interiore latere *Librum*, ſecedentem in *Lignum* annotinum rigidum, obducentes *Medullam*.

7. PARTES Vegetabilium primariae tres ſunt:
RADIX deſcendens, aquoſa ſorbens, *nutriens*.
HERBA adſcendens, aërea ſpirans, *mouens*.
FRVCTIFICATIO pandens, aetherea halans, *generans*.

8. RADIX terrenis humentibus inſerta exſerit *Radiculas* capillares, ſaepe ſuperne concurrentes in ſolidum, *Caudicem deſcendentem* ſub terra, aut etiam *adſcendentem* ſupra terram.

9. HERBA annua, aëreis commiſſa, conſtat *Hybernaculo*, *Trunco*, *Folio*, *Fulcro*:
HYBERNACVLVM compendium Herbae totius, ſquamoſum:
BVLBVS e baſibus Foliorum praeteritorum.
GEMMA e rudimentis Foliorum futurorum.

10. TRVNCVS attollens Herbam Fructificationemque eſt vel:
(RAMI Partes Trunci ſunt).
CAVLIS *Herbae* folioſus.
CVLMVS *Graminis*: ſaepius geniculatus articulis inanibus.
SCAPVS *Radicis* aphyllus floriferus.
PEDVNCVLVS ramus *Caulis* floriferus.
PETIOLVS ramus Foliiferus, folio proprius.
STIPES a Folio non diſtinctus: *Palmis*, *Filicibus*.

11. FOLIVM expandens per aëra ſuperficiem, volatile, ſaepe petiolatum.
FOLIOLVM partiale eſt Folii *compoſiti*.
FRONS Folium e ſtipite factum: *in Palmis et Filicibus*.

12. FVLCRVM adminiſtrans pro Vitae neceſſitate:
STIPVLA Foliorum, ad eorum baſin, foliacea.
BRACTEA Florum, ad florum pedunculorumue baſin foliacea.
PVBES veſtiens villoſitate.
GLANDVLA ſecernens liquorem.
SPINA terminans *cornu* lignoſo.
ACVLEVS ſparſus *vngue* cortici tantum inſerto.
CIRRHVS ſcandens *filo*.

13. FRVCTIFICATIO temporaria, terminans, lege naturae ſpontanea dehiſcens metamorphoſi, vt ſubſtantia *Interna* pateat Flore et Fructu.
FLOS fit e *Calyce*, *Corolla*, *Staminibus*, *Piſtillis*.
FRVCTVS e *Pericarpio* praegnante *Seminibus*, affixis *Receptaculo*.

14. CALYX Tegmentum exterius Floris e *Cortice*, cuius ſpecies 7.
VOLVA *Fungi*, lacera.
CALYPTRA *Muſci*, cucullata.
SPATHA *Palmae*, vaginata.
GLVMA *Graminis*, ſaepius biualuis.
PERIANTHIVM *Plantae*, corollae approximatum.
INVOLVCRVM *Plantae*, a flore remotum, ſaepius vmbellae.
INVOLVCELLVM partiale inuolucrum.
AMENTVM *Gemmaceum* imbricatum, commune.

15. COROLLA Tegmentum interius Floris e *Libro*.
PETALVM membranaceum: *Limbo* aut *Laminis*.
Tubo aut *Vnguibus*.
NECTARIVM nectariferum proprium, mel promens.

16. STAMEN Viſcus exterius e *Ligno; Genitale Maſculum*.
FILAMENTVM ſuſtinens *Antheram*.
ANTHERA foeta granulato *Polline*, et hoc *Fouilla*.

17. PISTILLVM Viſcus interius e *Medulla; Genitale Femineum*.
GERMEN Fructus rudimentum, inferius.
STYLVS a germine eleuans Stigma, intermedius.
STIGMA roridum, pubeſcens, ſupremum.

18. PERICARPIVM *Germen* defloratum ſeminiferum.
CAPSVLA membranacea, *valuis* dehiſcens varie in variis.
SILIQVA membranacea, *biualuis*, ſutura vtraque ſeminifera.
LEGVMEN membranaceum, *biualue*, ſutura altera ſeminifera.
FOLLICVLVS membranaceus, *vniualuis*, latere dehiſcens, a ſeminibus diſtinctus.
BACCA pulpoſa, *Seminibus* diſtinctis.
DRVPA pulpoſa, *Nucleo* oſſeo.
POMVM pulpoſum, *Capſula* includente ſemina.
STROBILVS imbricatus *Amenti* coarctati.

19. SEMEN *Ouum*, noua planta praegnans, deciduum, tunicatum.
HILVM cicatrix vmbilicalis.
COTYLEDONES bibulae placentam vterinam conſtituentes.
CORCVLVM nouae plantae compendium, connectens cotyledones:
e *Roſtello* acuminato, deorſum germinante.
e *Plumula* imbricata, ſurſum excreſcente.
PAPPVS interdum coronat ſemen.
ARILLVS interdum includit partialiter ſemen.

20. RECEPTACVLVM : *baſis* partes fructificationes connectens.

PROPRIVM vnius floris.

COMMVNE pluribus *floſculis* ſeſſilibus.

VMBELLA inter calycem et florem, elongatum in pedunculos aequatos.

VMBELLVLA partialis vmbella.

CYMA vmbella compoſita ramulis alternis.

SPADIX intra Spatham, praeprimis Palmae.

RACHIS Spicae Graminis, cui flores inſculpti.

21. MACHINAE Vegetabilis ſubſtantia conſtat duplici contraria:

CORPOREA externa, includens, nutritiua, deſcendens, terrenis adhaerens, ſtudioſe medullam incarcerans, duriuſcula, apice tenerrimo accreſcens.

MEDVLLA interna, incluſa, viuificans, baſi deliqueſcens, apice adſcendens, multiplicatione diuiſibilitate terminoque infinita, in creatione accenſa, a primordio occulte feſtinat lenteque verſus minimam reſiſtentiam ad ſummum, ſuum exitum; quo vero corporeum coarctans debilius eo clauſtra citius referat metamorphoſin ſubitura, quaeque euaſura ſeſe cum corpore copulat, vt in nouas diſpergenda vitas circulus perennet.

22. GERMINATIO fit diſperſis *Seminibus*, per *Hilum* abſorbentibus aquam, vnde rumpuntur membranae a bibulis tumentibus *Cotyledonibus*, lactantibus *Corculum*, vsque dum foetus *Roſtellum* Radiculas exierat, quo erigatur *Plumula* accreſcens in *Herbam* anni, terminatam *Gemma* ſupradecompoſita.

23. VEGETATIO fit *Radiculis* ſugentibus tincturam aquoſam Humi, quae, calore quotidie addito, lente, pellitur per corporei externi vaſa, vnde nutritio exterioris interiorisque plantae, exhalante ſuperfluo, *Cortice* deponente ab interiore pariete *Librum*, quotannis ſecedentem in ſubſtantiam *Ligneam* (ex Annulis annotinis interſtinctis Alburno, demum ab emarcidis inferioribus ramis ſuboſſifacato) ſuſtentaturam Caudicem adſcendentem, intra cuius apices *Medulla* viua properat (*).

(*) NATVRA vbique *in finem ſui properat;*
in originem *parce vtitur viribus;*
in decurſu *fallentibus incrementis ſe diſpenſat;*
in exitu *ad ruinam toto impetu venit.*
SENECA.

MEDVLLAM concipio fasciculum e fibris Nerueis isocelem formantibus, in qua vis vitalis pollens rumpit extimos neruos, hinc diuergentes, penetrantes corticem etiamnum subgelatinosum, vbi hi nerui medullares apice similiter multiplicantur in Gemmam. A dissecto, per hunc neruum, vase adscendente, impeditoque suotus adscensu humoris propulsi, extenditur corticale in *Folium.*

FOLIVM hoc, quod exercetur volatu ventorum, attrahit praeparatque (exceptis Parasiticorum, antea praeparatorum) humores, pagina superiore a luce electricum inspirat, pagina inferiore roridum perspirat, a casu nunquam renasciturum.

DECLARATVR vero Larua herbae, vbi Medullae maior propulsio, quam includentis Corporei retentio, quo aperitur substantia *Corticis* in Calycem, *Libri* in Corollam, *Ligni* in Stamina, *Medullae* in Pistilla, terminante vegetationem noua vita, collectis filis in vltima Medullae Semina.

24. PROLEPSIS sistit Metamorphoseos Plantarum mysterium, quo Herbae *Larua* mutetur in *Declaratam* Fructificationem; Plantae enim est producere vel *Herbam* foliosam, vel etiam *Fructificationem.*

FOLIVM genuinum semper in sinu fouet Rami multiplicantis principium, siue actu, siue potentia tale; cumque Folium sit natum ob huius caussam, nec viciſſim, nequit existere Folium, nisi hoc principium perforauerat antea corticem, e quo ortum est, licet effectus ante suam caussam manifestus.

GEMMA genuina est *Rami* futuri compendium, in quem demum explicabitur. Gemma semper constat *Squamis*, totidem Foliorum rudimentis, etiamnum (a futuro ramulo non dum e longato) approximatis. *Cumque* Folia sine Gemma existere nequeant, necesse est quod Gemma lateat in sinu cuiusuis squamae gemmaceae, confirmante autopsia, adeoque nequit omnis Gemma aliud esse, quam corpus a foliis et gemmulis compositum. Sequitur itaque quod omnis Gemma constet Foliis cum suis Gemmulis et hae *Gemmulae* similiter ex minoribus squamis et gemmulis, et sic porro vsque in quintam progeniem (vt in Voluoce), nec vltra, confirmante metamorphosi. Ergo Ramus foliosus praesentis anni, foetus sit ramulis omnibus per *quinquennium* prodituris, succedentibus semper nouis ad extremos apices, in defoliatorum, ad basin, locum, vt numerus quinarius perennet.

rennet. Hoc fit in *Arboribus*, vbi medulla moratur a duriori ſubſtantia lignea; in *Plantis* annuis autem, vbi minor reſiſtentia corporei laxioris verſus medullam, valet haec breuius, absque mora gemmacea exire in Flores; quodcunque enim valet propulſionem Medullae augere et incluſiuam vim Corporei debilitare, id promouebit Floreſcentiam.

FLOREM dum producat Arbor, Natura anticipabit quinque annorum progenies, ſimul tum produituras, formando e foliis gemmaceis futuri anni *Bracteas*, ſequentis *Calycem*, inſequentis *Corollam*, conſequentis *Stamina*, ſubſequentis *Piſtillum*, refertum Medulla granulata *Seminum*, termino vitae vegetantis.

25. FLORESCENTIA fiſtit Plantarum *Sponſalia* in Flore, (*) et *Nuptias* in Antheſi.

FLOS, exuta Herbae Larua, prodit Planta declarata, interna, nuda et perfecta inſtar *Inſecti* alligati volitantis: *Coleoptrati* Calyce, *Alati* Corolla, conſtantis ſolis *Viſceribus* Genitalibus: *Maſculis* ſtaminibus ex Antheris *Teſticularibus*, repletis Polline *genitali*, continente *Fouillam* viuificantem, et *Femineis* Piſtillis ex Germinis *ouario*, terminato Stigmate *vuluifero*, tecto *pube* tubuloſa, reſudante *Lympham genitalem*.

ANTHESIS peragitur, dum Antherae ruptae ſpargunt ſuum *Pollen* veſiculare ſupra *Stigma*, quo efflat hoc incluſam *Fouillam* maſculam, abſorbendam a *Lympha genitali* feminea reſudante, vt corporeum maſculum addito Femineo medullari conficiat *ouum*, in iuſtam maturitatem fouendum intra Ouarium.

26. PRINCIPIVM Fructificationis, Fundamentum Botanices, eſt altius repetendum.

PROBLEMA: Supponas D. O. O. in primordio e ſimplici progreſſum ad compoſita; e paucis ad plura! adeoque a primo Vegetabili principio, tot tantum creaſſe plantas diuerſas, quot *ordines Naturales*. Has ordinum plantas, IPSVM dein ita inter ſe generando miſcuiſſe, vt totidem exorirentur plantae, quot hodie diſtincta exiſtunt *Genera*. Naturam dein Genericas has plantas, per generationes ambigenas (quae ſtructuram floris non mutant) inter ſe miſcuiſſe et multiplicaſſe in *Species* exiſtentes, quotquot poſſibiles, excluſis tamen e numero ſpecierum, ab eiusmodi generatione productis Plantis *Hybridis*, vtpote ſterilibus.

(*) Sponſalia plantarum. *Amoen. acad. XII.*

GENVS itaque omne eſt naturale, confirmante natura, ſaltum non faciente.

CHARACTER ergo non conſtituat vmquam genus, ſed ſedulo ſecundum Genus naturae conficiendus eſt.

PLANTAE congeneres ſunt quoad genus dignoſcendae e planta declarata, cum generatio ambigena illibata relinquat Fructificationem; ſed diſtinguendae in ſpecie ſecundum Herbam a ſociis ſororibus, diuerſo patre productis.

DIAGNOSIS ſic plantae conſiſtit in affinitate *Generis* et in diſcrimine *Speciei*.

NOMEN plantae itaque, vt vtramque diagnoſin indigitet, duplex erit: *Genericum* Cognomen gentilitium.
Specificum Praenomen triuiale.
ſub hoc vero *Synonyma* vaga authorum.

BOTANICVS ſequendo *Claſſificationes*, per *Characteres* plantae declaratae ducitur ad *Genus* nominatum; per *Differentias* Laruae ad *Speciei* appellationem; inde ad huius *Synonyma*; ex his ad *Authores*; exinde ad *omnia*, quae de obiecto quaeſtionis, ſeculi beneficio ad nos peruenere. Sic dicat ipſa planta ſuum Nomen, ſuamque Hiſtoriam in tanta multitudine ſpecierum imo indiuiduorum; hoc finis Botanices primus, ſeculi noſtri inuentum, in quod perficiendo deſudabunt omnes Botanici veri.

27. BOTANICVS *verus* deſudabit in augendo amabilem Scientiam:

DESCRIPTIONES conficiat verbis characteriſticis, Plantarum imprimis obſcuriorum, rariorum nouarumque, ad normam Delineationis plantae, *more C. L. filii et Schreberii in Decuriis.*

FIGVRAS, ſi poterit, addat, quae repreſentent Plantam perfectam, *quales dedere Vaillant*, *Dillenius*, *Ehret*, *Jacquin*, *Trew*, *Schmiedel*, etc.

DIFFERENTIAS ſpecificas eruat compendioſas, propriiſſimasque.

SYNONYMA authorum inquirat, imprimis ſelectiora; *vti Hallerus.*

GENVS naturale ſemper Speciei praefigat, et vbi nouum, *Charactere* naturali definiat ex omnium partium fructificationis ſitu, figura, numero, proportione.

SPECIES vagas nouasque ad certa genera referat, vti *Tournefort*, *Plumier*, *Browne*, *Jacquin.*

ORDINEM naturalem, vbi patet, indigitet.

STATIONES cuiusuis plantae notet, idcoque plures *Floras*, vbi licet, producat, imprimis *Auſtrales* et *Exoticas.*

PRO-

PROPRIETATES obſervet, quales *Duratio*, *Seminatio*, *Gemmatio*, *Vernatio*, *Aeſtiuatio*, *Nuptiae*, *Frondeſcentia*, *Calendarium*, *Horologium*, *Somnus*, *Qualitates*.

VSVS addat; quales vſus *Naturae* (Panis Pandoraeque) *Medicus*, *Oeconomicus* etc. et quaecunque in his cedant imprimis in gloriam Authoris et in commodum generis Humani, vt poſteri demum obambulent in ſerena luce.

BOTANOPHILI Fallaces, Ephebi, Hirquitallientes:
Leges Artis proclamant, antequam Naturales didicere.
Abſonos extollunt, Praeſtantiores rodunt zelo ſtomachoſo.
Compilant furtim aliena, propria vix detegunt.
Grano eruditionis reperto ſtentorii ebuccinant.
Genera e male aſſumtis lacerant, multiplicant.
Methodum naturalem ſibi notam crepant.

Dediſti mihi DOMINE artem,
meam mercedem,
et in illa laudabo nomen Tuum.

Dauid.

DE-

DELINEATIO PLANTAE.

I. THEORIA.

GENVS. Nomen *ſelectiſſimum.*
Character naturalis, eſſentialis, artificialis.
Claſſis Ordoque *Syſtematis praeſtantiſſimi.*
Ordo naturalis *demonſtrandus.*
SPECIES. Nomen triuiale.
Differentia ſpecifica *demonſtranda: certiſſima, breuiſſima.*
Synonyma *e* deſcriptione *ſ.* figura *ſelecta;* vernacula.
CRITICA. Etymologia nominis *generici, ſpecifici.*
Inuentor *cum* tempore.
Eruditio Hiſtorica, Critica, Antiqua.

II. DESCRIPTIO.

RADIX *duratione* annua, biennis, perennis.
figura a. fibroſa, ramoſa, fuſiformis, praemorſa.
b. repens, articulata, dentata.
c. globoſa, tuberoſa, faſcicularis, palmata.
d. bulboſa, granulata.
TRVNCVS *ſpecie* Caulis, Culmus, Scapus, Stipes.
duratione herbaceus, ſuffruticoſus, fruticoſus, arboreus.
ſolidus, inanis, fiſtuloſus.
menſura a. (proportio *ad folia reliquaſque partes.*)
b. craſſities *ex ſimili notiſſimo.*
directione a. erectus, ſtrictus, rigidus, laxus, obliquus, adſcendens, declinatus, incuruatus, nutans, diffuſus, procumbens, ſtoloniferus.
b. ſarmentoſus, radicans, repens.
c. geniculatus, flexuoſus, ſcandens, volubilis: *ſiniſtrorſum, dextrorſum.*
figura a. teres, ſemiteres, compreſſus, anceps, 3-10 angulatus, acutangulus, obtuſangulus.
b. 3-6 gonus, 3-5queter.

veſti-

veſtitu nudus, aphyllus, foliatus,
vaginatus, ſquamoſus, imbricatus.
ſuperficie a. ſuberoſus, rimoſus, tunicatus,
b. laeuis, ſtriatus, ſulcatus,
c. glaber, ſcaber, muricatus,
tomentoſus, villoſus, hiſpidus,
aculeatus, ſpinoſus, vrens.
d. ſtipulatus, membranatus, bulbiferus.
compoſitione a. enodis, ſimpliciſſimus, ſimplex, integer.
b. articulatus, prolifer, dichotomus,
brachiatus.
c. ſubramoſus, ramoſus, ramoſiſſimus.
d. virgatus, paniculatus, faſtigiatus.
e. patens, diuaricatus.
RAMIS a. ſtructura Caulis, Frondis.
b. alternis, diſtichis, ſparſis.
confertis, oppoſitis, verticillatis.
c erectis, coarctatis, diuergentibus,
diuaricatis, deflexis, reflexis, retroflexis,
fulcratis.
d. altitud. caulis, longis, breuibus, patentibus.

FOLIA

determinatione *loco* radicalia, caulina, ramea,
axillaria, floralia,
numero vnicum, duo, tria, pauca, plurima.
ſitu a. alterna, diſticha, bifaria,
ſparſa, conferta, imbricata,
faſciculata, bina, terna, quaterna, quina,
confluentia, approximata, remota.
b. oppoſita, decuſſata, ſtellata.
directione a. erecta, ſtricta, rigida, adpreſſa,
patentia; horizont. aſſurgentia, inflexa,
reclinata, recuruata, reuoluta, dependent.
b. obliqua, aduerſa, verticalia, reſupinata.
c. ſubmerſa, natantia, radicantia.
inſertione a. petiolata, peltata.
b. ſeſſilia, adnata, coadunnata, decurrentia, amplexicaulia, perfoliata, connata, vaginantia.

ſtru-

Deſcriptiones Fundamentales *ſecundum hanc delineationem plantae dederunt* Linne *filius et D.* Schreberus *in ſuis decuriis.*

ſtructura *figura* a. ſubrotunda, orbiculata, ouata, oualia.
b. oblonga, parabolica, cuneiformia, ſpatulata.
c. rotundata, lanceolata, elliptica, linearia, aceroſa.

angulis integra, 3-5 angularia, deltoidea, rhombea, trapeziformia.

ſinubus a. cordata, reniformia, lunata, ſagittata, haſtata, panduriformia, runcinata.
b. fiſſa, 2-5 loba, 2-fida, 3-5 partita, palmata, lyrata, pinnatifida, ſinuata, laciniata, ſquarroſa.

margine a. integerrima, crenata, ſerrata, ciliata, dentata, ſpinoſa, cartilaginea.
b. repanda, lacera, eroſa, daedalea.

apice a. obtuſa, emarginata, retuſa, praemorſa, truncata.
b. acuta, acuminata, cuſpidata, mucronata, cirroſa.

ſuperficie a. pagina: ſuperiore, inferiore, nuda, glabra, nitida, lucida, colorata.
b. neruoſa: trineruia, trineruata, triplineruia, eneruia, lineata, ſtriata, ſulcata.
c. venoſa, rugoſa, bullata, lacunoſa, auenia.
d. punctata, papilloſa, papuloſa, viſcida.
e. villoſa, tomentoſa, ſericea, lanata, barbata, piloſa, ſcabra, hiſpida, aculeata, ſtrigoſa.

expanſione plana, canaliculata, concaua, conuexa, cucullata, plicata, vndata, criſpa.

ſubſtantia a. *membranacea*, ſcarioſa, gibba, teretia, depreſſa, compreſſa, carinata.
b. compacta, tubuloſa, pulpoſa, carnoſa,
c. triquetra, ancipitia, lingulata, enſiformia, ſubulata, acinaciformia, dolabriformia.

menſura breuiſſima, longiſſima *reſpectu ad caulem articulosue*.

duratione decidua, caduca, perſiſtentia, perennia, ſemperuirentia.

com-

Ob loco *obuerſe*, e. gr. obcordata, obouata, etc.
Sub loco *fere*, e. gr. ſubcordata, ſubouata, etc.
Coadunantur ſaepe figurae eiusdem diuiſionis, non vero diuerſae,
bene lanceolato-ouata, ouato-lanceolata etc.
male lanceolato-acuta, ouato-mucronata.

compoſitione *Compoſita* articulata, Coniugata.
Digitata: binata, ternata, quinata.
Pedata.
Pinnata: biiuga, triiuga, quadriiuga, etc.
cum impari, abrupta, cirrhoſa.
Foliolis oppoſitis, alternis, interruptis, decurſiuis.
Decompoſita bigemina, biternata, bipinnata,
Supradecompoſita tergemina, triternata, tripinnata.

FVLCRA: Petiolus, Stipula, Cirrhus, Pubes, Arma, Pedunculus, Bractea.

PETIOLVS *figura* linearis, alatus, clauatus.
membranaceus, teres, ſemiteres, triqueter,
canaliculatus.
magnit. breuiſſimus, breuis, mediocris,
longus, longiſſimus,
inſert. inſertus, adnatus, decurrens,
amplexicaulis, vaginans, appendiculatus.
direct. erectus, patens, aſſurgens, recuruatus.
ſuperf. glaber, aculeatus, nudus,
articulatus, ſpineſcens.

STIPVLAE a. geminae, ſolitariae, nullae.
b. laterales, extrafoliac., intrafoliac., oppoſitifoliae
c. caducae, deciduae, perſiſtentes, ſpineſcentes.
d. ſeſſiles, adnatae, decurrentes, vaginantes.
e. ſubulatae, lanceolatae, ſagittatae, lunatae.
f. erectae, patentes, reflexae.
g. integerrimae, ſerratae, ciliatae, dentatae, fiſſae.
h. breuiſſimae, mediocres, longae.

CIRRHVS a. axillaris, foliaris, petiolaris, peduncularis.
b. ſimplex, trifidus, multifidus.
c. conuolutus, reuolutus.

PVBES a. pili, lana, barba, tomentum, ſtrigae.
b. ſetae: ſimplices, hamoſae, ramoſae, plumoſae, ſtellatae.
c. hami, glochides.
d. Glandulae, Vtriculi.
foliaceae, petiolares, pedunculares, ſtipulares.
e. viſcoſitas, glutinoſitas.

ARMA

Terminorum Definitiones *dedi in Amoen. Acad. 6. p. 217.* Figuras *autem in Horto Cliffortiano, Philoſophia Botanica, Lee Introduction, Miller Dictionario, Sauuageſii methodo.*

ARMA a. *Aculei*: recti, incurui, recurui.
b. *Furcae* bifidae, trifidae.
c. *Spinae* terminales, axillares, calycinae, foliares. simplices, diuiſae.
d. *Stimuli* pungentes, vrentes.

BRACTEAE a. coloratae, caducae, deciduae, perſiſtentes.
b. vna, duae, plures.
c. *Coma.*
d. Foliorum *caetera addenda.*

PEDVNCVLVS partialis (a-e), communis, Pedicellus.
a. *loco* radicalis, caulinus, rameus,
petiolaris, cirrhiferus,
terminalis, axillaris,
oppoſitifolius, lateriflorus, interfoliaceus, ſupra-foliaceus, extrafoliaceus.
b. *ſitu* alternus, ſparſus, oppoſitus, verticillatus.
c. *numero* ſolitarius, geminatus, vmbellula *ſeſſilis.*
d. *directione* adpreſſus, erectus, patens, cernuus, reſupinatus, declinatus, nutans, flaccidus, adſcendens,
pendulus, ſtrictus, flexuoſus, retrofractus.
e. *menſura* breuis, breuiſſimus, longus, longiſſimus.
f. *multiflorus*, vniflorus, biflorus, triflorus, etc. multiflorus.
g. *ſtructura* teres, triqueter, tetragonus,
filiformis, attenuatus, clauatus, incraſſatus,
nudus, ſquamoſus, foliatus, bracteatus,
geniculatus, articulatus.

INFLORESCENTIA, graduali modificatione ſcandit:
Spadix, Cyma, Vmbella, Vmbellula, Aggregatam,
Compoſita, Spica, Amentum, Strobilus, Corymbus,
Racemus, Panicula, Thyrſus, Faſciculus, Capitulum,
Verticillus, Lateriflor. etc.

Flores terminales, laterales, ſparſi,
ſeſſiles, pedunculati,
vnicus, ſolitarius, terni etc. copioſi,
erecti, cernui, nutantes, reſupinati,
verticales, horizontales.

a. VERTICILLVS a. ſeſſilis, pedunculatus.
b. nudus, inuolucratus, bracteatus.
c. confertus, diſtans.

b. CAPITVLVM a. ſubrotundum, globoſum, dimidiat.
b. folioſum, nudum. Faſciculus.

c. SPI-

c. SPICA a. ſimplex, compoſ. ſpicillis, glomerat.
b. ouata, ventricoſa, cylind. interrupta
c. imbricata, articulata, ramoſa, linearis, ciliata, foliacea, comoſa.
d. CORYMBVS ſimplex, compoſitus.
e. THYRSVS nudus, foliatus.
f. RACEMVS a. ſimplex, compoſitus.
b. vnilateralis, ſecundus, pedatus; coniugatus.
c. erectus, laxus, dependens.
d. nudus, foliatus.
g. PANICVLA Trunci ſtructura.

FRVCTIFICATIO ex *numero*, *figura*, *proportione*, *ſitu* partium.
Simplex. Compoſita ex Floſculis.
CALYX *Perianthium* fructificationis, floris, fructus.
Proprium a. monophyllum, polyphyllum.
b. 2-5 fidum, 2-5 partitum, integrum.
c. tubuloſum, patens, reflexum, inflatum.
d. abbreuiatum, longum, *longitud. tubi.*
e. obtuſum, acutum, ſpinoſum, aculeatum.
f. aequale, inaequale, labiatum.
Commune imbricatum, ſquarroſum, calyculatum, ſcarioſum.
Inuolucrum a. vniuerſale, partiale, proprium.
b. monophyllum-polyphyllum.
Gluma a. vniflora, 2-multiflora.
b. vniualuis, biualuis, multiualuis.
c. colorata, glabra, hiſpida.
Ariſta a. mutica, terminalis, dorſalis.
b. recta, tortilis, geniculata, recuruata.
Amentum ſquamoſum, nudum.
Spatha vniualuis, biualuis, dimidiata.
Calyptra recta, obliqua.
Volua approximata, remotiſſima.
COROLLA *Petali* a. Tubus ſ. Vngues; Limbus ſ. Laminae.
b. monopetala, 2-6-polypetala.
c. regularis, irregularis, inaequalis.
d. globoſa, campanul. infundibuliform. rotata.
ringens, perſonata: labio ſuperiore et inferiore; Rictu; Palato.
cruciata, concaua, patens.
Papilionacea: *vexillo, alis, carina.*

e. Compoſita: ligulata, tubuloſa, radiata.
f. Color.

Nectarium proprium, petalinum.

STAMINA *Filamenta* numero, figura, inſertione, proportione. aequalia, inaequalia; connata.

Antherae diſtinctae, connatae; laterales, incumbentes, erectae.
loculi, apertura.

Pollen figura.

PISTILLVM *Germen* ſuperum, inferum.

Stylus numero, proportione, diuiſione, figura.

Stigma numero, figura.

PERICARPIVM *Capſula:* figura, valuulae, loculamenta, diſſepimenta.
bicapſularis etc. bilocularis etc.
didyma, tricocca etc.

Siliqua figura, compreſſa, toruloſa, articulata.
Diſſepimentum parallelum, transuerſum.

Legumen figura, articulata, 1-2 locularis, iſthmis.

Folliculus vniualuis, figura.

Drupa ſucculenta, ſicca.

Pomum figura, loculamenta.

Bacca monoſperma etc. nidulantia ſemina.

Strobilus figura totius, ſquamarum.

SEMEN numero, figura, loculis, ſuperficie, conſiſtentia.

Hilum, *Corculum*.

Corona: Pappus ſtipitatus, capillaris, plumoſus,
Cauda, hamus, calyculus.

Nux vnilocularis, bilocularis etc.

Arillus cartilagineus, ſucculentus.

RECEPTACVLVM fructificationis, floris, fructus.

Commune a. nudum, punctatum, piloſum, paleaceum.
b. planum, conuexum, vnicum, ſubulatum.

Compoſitus flos ex *Floſculis*.

Aggregatus flos.

Vmbella a. ſimplex, compoſita ex *Vniuerſali Partialique*, prolifera.
b. concaua, faſtigiata, conuexa.
c. erecta, nutans.

Cyma nuda, bracteata.

Spadix a. vniflorus, multiflorus.
b. ſimplex, ramoſus.
c. Rachis *ſpica*.

III. HA-

III. HABITVS.

GEMMATIO *Bulbus* ſolidus, tunicatus, ſquamatus, caulinus.
Gemma *origine* petiolaris, ſtipularis, corticalis.
contento foliaris, floralis, communis.

VERNATIO conduplicata, conuoluta, inuoluta, reuoluta, imbricata, equitans, obuoluta, plicata, circinalis.

AESTIVATIO conuoluta, imbricata, conduplicata, valuata, inaequiualuis.

TORSIO a. conformis, diffórmis.
b. dextra, ſiniſtra, reciproca.
c. reſupinata, circinalis.

VARIATIO coloris, magnitudinis, pubeſcentiae, aetatis.
Externa: plicata, faſciata.
latifolia, tenuifolia, criſpa.
mutica.
Interna: a. mutilata, grandiflora.
b. multiplicata, plena, prolifera, criſtata.
c. viuipara, bulbigera.

SPONSALIA Mas, Femina, Androgyna, Hermaphrodita.
Generationis *myſteria.*

SEMINATIO. *Seminis* cauda, ala, pappus, hamuli, gluten, curuatio.
Pericarpii baccatio, inflatio, viſcoſitas, elaſticitas, *ſtructura.*

PLACENTATIO Dicotyledonis, Acotyledonis, Polycotyledonis.

IV. STATIO.

CLIMA boreale, mediterraneum, Alpinum.
Marinum.
orientale, auſtrale, occidentale, indicum;

SOLVM lacuſtre; littorale, maritimum, ſalſum, paluſtre, inundatum, vliginoſum, caeſpitoſum, nemoroſum, ſyluaticum, aruenſe, pratenſe, campeſtre, montanum, ruderale, cultum.

TERRA Humus, Argilla, Creta, Arena.
Paraſitica.

V. TEMPVS.

GERMINATIO dierum, menſium, annuum, bienne.

FRONDESCENTIA *Vernatio* praecox, aequalis, ſerotina.
Autumnatio praecox, lenta, cunctanea.

CALENDARIVM 1. Germinati Frondeſcentiae, Floreſcentiae.
2. Groſſificationis, Maturationis, Meſſis.
3. Exſolationis, Defoliationis, Congelationis.
4. Brumalis, Glacialis, Regelationis.

HOROLOGIVM a. *Vigiliae* meteoricae, tropicae, aequinoctiales.
b. apertionis, recluſionis.

SOMNVS conniuens, includens, circumſepiens, muniens, conduplicans, inuoluens, diuergens, dependens, inuertens, imbricans.

DVRATIO *Plantae* caducae, ſenſiles, perpetuae.
Flores ephemeri, tridui, menſtrui.
Fructus praecoces, ſerotini, annui.

VI. QVALITAS.

ODOR: Ambroſiacus, Fragrans, Spirans, Aromatius, Orgaſticus. Hircoſus, Nidoroſus, Teter, Nauſeoſus, Viroſus.

SAPOR: Aquoſus, Acidus, Pinguis, Dulcis, Mucoſus. Siccus, Amarus, Stipticus, Acris, Salſus.

COLOR Hyalinus, Ruber, Purpureus, Albus, Triſtis. Niger, Luteus, Viridis Cinereus, Teſtaceus.

TACTVS Humidus, Tomentoſus, Succoſus, Carnoſus, Viſcidus. Aridus, Lucidus, Scarioſus, Membranaceus, Scaber.

MENSVRA Linearis, Pollicaris, Spithamaeus, Pedalis, Vnguicularis, Palmaris, Dodrantalis, Orgyalis.

VII. VSVS.

NATVRALIS *Oeconomia* naturae eiusque *Politia*.
ſympathia 1. antipathia.
Pan *mammalium phytiphagorum domeſticorum*.
Pandora *inſectorum*.

ARTI-

ARTIFICIALIS *Culinaris:* Radices, Olera, **Fructus.**
Officinalis a. ſimplicia, praeparata.
b. pretium, locus.
Medica: Vires, Vſus.
Oeconomica inſtrumentalis
paſtoralis
tinctoria
culturae: Cerealia.
Macellum.
Officinalis.
Arboretum, **Frutetum.**
Pomona.
Paſcua.

CLAVIS SYSTEMATIS SEXVALIS.

NVPTIAE PLANTARVM.
Actus generationis incolarum Regni vegetabilis.
Floreſcentia.

PVBLICAE.
Nuptiae, omnibus manifeſtae, aperte celebrantur.
Flores vnicuique viſibiles.

MONOCLINIA.
Mariti et vxores vno eodemque thalamo gaudent.
Flores omnes hermaphroditi: ſtamina cum piſtillis in eodem flore.

DIFFINITAS.
Mariti inter ſe non cognati.
Stamina nulla ſua parte connata inter ſe ſunt.

INDIFFERENTISMVS.
Mariti absque ſubordinatione.
Stamina longitudine indeterminata.

1. MONANDRIA.
2. DIANDRIA.
3. TRIANDRIA.
4. TETRANDRIA.
5. PENTANDRIA.
6. HEXANDRIA.
7. HEPTANDRIA.
8. OCTANDRIA.
9. ENNEANDRIA.
10. DECANDRIA.
11. DODECANDRIA.
12. ICOSANDRIA.
13. POLYANDRIA.

SVBORDINATIO.
Mariti certi reliquis praeferuntur.
Stamina duo ſemper reliquis breuiora ſunt.
14. DIDYNAMIA. | 15. TETRADYNAMIA.

AFFINITAS.
Mariti propinqui et cognati ſunt.
Stamina cohaerent vel inter ſe, vel cum piſtillo.

16. MONADELPHIA.
17. DIADELPHIA.
18. POLYADELPHIA.
19. SYNGENESIA.
20. GYNANDRIA.

DICLINIA (a δίς bis et κλίνη thalamus) duplex thalamus.)
Mariti et Feminae diſtinctis thalamis gaudent.
Flores maſculi et feminei in eadem ſpecie.

21. MONOECIA.
22. DIOECIA.
23. POLYGAMIA.

CLANDESTINAE.
Nuptiae clam inſtituuntur.
Flores oculis noſtris nudis vix conſpiciuntur.
24. CRYPTOGAMIA.

CLAS-

CLASSIVM CHARACTERES.

I. MONANDRIA. a *μόνος* vnicus, et *ἀνὴρ* maritus.
Maritus vnicus in matrimonio.
Stamen vnicum in flore hermaphrodito.

II. DIANDRIA.
Mariti duo in eodem coniugio.
Stamina duo in flore hermaphrodito.

III. TRIANDRIA.
Mariti tres in eodem coniugio.
Stamina tria in flore hermaphrodito.

IV. TETRANDRIA.
Mariti quatuor in eodem coniugio.
Stamina quatuor in eodem flore cum fructu.
(Si Stamina 2 proxima breuiora sunt, referatur ad Cl. 14.)

V. PENTANDRIA.
Mariti quinque in eodem coniugio.
Stamina quinque in flore hermaphrodito.

VI. HEXANDRIA.
Mariti sex in eodem coniugio.
Stamina sex in flore hermaphrodito.
(Si ex his Stamina 2 opposita breuiora, pertinet ad Cl. 15.)

VII. HEPTANDRIA.
Mariti septem in eodem coniugio.
Stamina septem in flore eodem cum pistillo.

VIII OCTANDRIA.
Mariti octo in eodem thalamo cum femina.
Stamina octo in eodem flore cum pistillo.

IX. ENNEANDRIA.
Mariti nouem in eodem thalamo cum femina.
Stamina nouem in flore hermaphrodito.

X. DECANDRIA.
Mariti decem in eodem coniugio.
Stamina decem in flore hermaphrodito.

XI. DODECANDRIA.
Mariti duodecim ad nouendecim in eodem coniugio.
Stamina duodecim ad nouendecim *in flore hermaphrodito.*

XII. ICOSANDRIA ab *εικοσι* viginti et *ἀνὴρ*.
Mariti viginti communiter, saepe plures.
Stamina (non receptaculo) *calycis lateri interno adnata.*

XIII. POLYANDRIA. a *πολὺς* et *ἀνὴρ*.
Mariti viginti et vltra in eodem cum femina thalamo.
Stamina receptaculo inserta *a 20 ad 1000 in eodem, cum pistillo, flore.*

XIV. DIDYNAMIA. a δὶς bis, et δύναμις potentia.
Mariti quatuor, quorum 2 longiores, et 2 breuiores.
Stamina quatuor: quorum 2 proxima longiora sunt.

XV. TETRADYNAMIA.
Mariti sex, quorum 4 longiores in flore hermaphrodito.
Stamina sex: quorum 4 longiora, 2 autem opposita breuiora.

XVI. MONADELPHIA. a μόνος vnicus, et ἀδελφὸς frater.
Mariti, vt fratres, ex vna basi proueniunt.
Stamina filamentis in vnum corpus coalita sunt.

XVII. DIADELPHIA.
Mariti e duplici basi, tamquam e duplici matre, oriuntur.
Stamina filamentis in duo corpora connata sunt.

XVIII. POLYADELPHIA.
Mariti ex pluribus, quam duabus, matribus orti sunt.
Stamina filamentis in tria, vel plura, corpora coalita.

XIX. SYNGENESIA. a σὺν simul, et γένεσις generatio.
Mariti genitalibus foedus constituerunt.
Stamina antheris (raro filamentis) in cylindrum coalita.

XX. GYNANDRIA. a γυνὴ femina, et ἀνὴρ maritus.
Mariti cum femininis monstrose connati.
Stamina pistillis (non receptaculo) *insident.*

XXI. MONOECIA. a μόνος vnicus, et οἰκία domus.
Mares habitant cum feminis in eadem domo, sed diuerso thalamo.
Flores masculi et feminei in eadem planta sunt.

XXII. DIOECIA.
Mares et feminae habitant in diuersis thalamis et domiciliis.
Flores masculi in diuersa planta a femineis prognascuntur.

XXIII. POLYGAMIA. a πολὺς, et γάμος Nuptiae.
Mariti cum vxoribus et innuptis cohabitant in distinctis thalamis.
Flores hermaphroditi et masculi aut feminei in eadem specie.

XXIV. CRYPTOGAMIA. a κρυπτὸς occultus, et γάμος Nuptiae.
Nuptiae clam celebrantur.
Flores intra fructum vel singulari modo occultati.

ORDI-

ORDINES a Feminis ſeu Piſtillis, vt claſſes a Maribus ſeu Staminibus, deſumuntur; in Claſſe Syngeneſiae autem a caeteris differunt Ordines, e. gr.

MONOGYNIA, Digynia, Trigynia, etc. a γυνὴ femina, praepoſitis numeris graecis μόνος, δὶς, τρεις, τέσσαρες, etc.

i. e. *Piſtillum 1. 2. 3. 4. etc. Numerus hic piſtilli deſumitur a Baſi ſtyli; ſi ſtylus autem deficiat, a numero Stigmatum calculus fit.*

POLYGAMIA AEQVALIS conſtat multis nuptiis, coniugia pura contrahentibus.

i. e. *ex multis floſculis ſtaminibus et piſtillis inſtructis.*

Flores eiusmodi maximam partem vulgo Floſculoſi *dicuntur.*

POLYGAMIA SPVRIA, vbi thalami vere nuptorum diſcum occupant, et ambitum cingunt thalami concubinarum maritis deſtitutarum, vt a maritis vxoratis foecundentur.

i. e. *vbi floſculi hermaphroditi diſcum occupant, et marginem cingunt floſculi feminei, ſtaminibus deſtituti, idque triplici modo;*

(*a*) SVPERFLVA, cum feminae maritatae fertiles ſunt, et familiam propagare queunt; adeo vt concubinarum auxilium videatur ſuperfluum.

i. e. *cum flores diſci hermaphroditi ſtigmate inſtruuntur et ſemina proferunt; flores quoque feminei radium conſtituentes ſimiliter ſemina ferunt.*

(*b*) FRVSTRANEA, cum feminae maritatae fertiles ſunt et ſpeciem propagare queunt; concubinae autem ob defectum vuluae, veluti caſtratae, impraegnari nequeunt.

i. e. *cum flores diſci hermaphroditi ſtigmate inſtruuntur et ſemina proferunt; floſculi vero radium conſtituentes, quum ſtigmate careant, ſemina proferre nequeunt.*

(*c*) NECESSARIA, cum feminae maritatae, ob genitalium labem et vuluae defectum ſteriles, familiam propagare nequeunt; concubinis a maritis feminarum foecundatis, vxorum locum ſupplentibus, ſobolemque laete propagantibus.

i. e. *cum flores hermaphroditi ob defectum ſtigmatis piſtilli, ſemina perficere nequeunt; flores autem feminei in radio ſemina perfecta proferunt.*

(*d*) SEGREGATA, cum thalami plurium, cuiuscumque ſexus et coniugii, ita vniuntur, vt vnicum Thalamum communem conſtituant.

i. e. *cum calyces floriferi plures comprehenduntur a communi calyce, vt vnicum florem conficiant.*

CLASSIVM GENERA.

I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

Canna. 1
Amomum. 2
Coſtus. 3
Alpinia. 4
Maranta. 5
Curcuma. 6
Kaempferia. 7
Thalia. 8
Boerhauia. 9
Salicornia. 10
Hippuris. 11

DIGYNIA.

Coriſpermum. 12
Callitriche. 13
Blitum. 14
Cinna. 15

II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

Nyctanthes. 16
Iasminum. 17
Liguſtrum. 18
Phillyrea. 19
Olea. 20
Syringa. 21
Dialium. 22
Eranthemum. 23
Circaea. 24
Veronica. 25
Paederota. 26
Iuſticia. 27
Dianthera. 28
Gratiola. 29
Schwenkia. 1233
Pinguicula. 30
Vtricularia. 31
Verbena. 32
Lycopus. 33
Amethyſtea. 34
Cunila. 35
Ziziphora. 36
Monarda. 37
Rosmarinus, 38
Saluia. 39
Collinſonia. 40
Morina. 41

DIGYNIA.

Anthoxanthum. 42

TRIGYNIA.

Piper. 43

III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

Valeriana. 44
Olax. 45
Tamarindus. 46
Rumphia. 47
Cneorum. 48
Camocladia. 49
Melothria. 50
Ortega. 51
Loeflingia. 52
Polycnemum. 53
Hippocratea. 54
Crocus. 55
Ixia. 56
Gladiolus. 57
Antholyza. 58
Iris. 59
Moraea. 60
Wachendorfia. 61
Commelina. 62
Callisia. 63
Xyris. 64
Schoenus. 65
Cyperus. 66
Scirpus. 67
Eriophorum. 68
Nardus. 69
Lygeum. 70

DIGYNIA.

Bobartia. 71
Cornucopiae. 72
Saccharum. 73
Phalaris. 74
Paspalum. 75
Panicum. 76
Phleum. 77
Alopecurus. 78
Milium. 79
Agrostis. 80
Aira. 81
Melica. 82
Poa. 83
Briza. 84
Vniola. 85
Dactylis. 86
Cynosurus. 87
Festuca. 88
Bromus. 89
Stipa. 90
Auena. 91
Lagurus. 92
Arundo. 93
Aristida. 94
Lolium. 95
Elymus. 96
Secale. 97
Hordeum. 98
Triticum. 99

TRIGYNIA.

Eriocaulon. 100
Montia. 101
Proserpinaca. 102
Triplaris. 103
Holosteum. 104
Koenigia. 1241
Polycarpon. 105
Mollugo. 106
Minuartia. 107
Queria. 108
Lechea. 109

IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

Leucadendron. 110
Protea. 111
Globularia. 112
Cephalanthus. 113
Dipſacus. 114
Scabioſa. 115
Knautia. 116
Allionia. 117
Hedyotis. 118
Scabrita. 1242
Spermacoce. 119
Sherardia. 120
Aſperula. 121
Diodia. 122
Knoxia. 123
Houſtonia. 124
Galium. 125
Crucianella. 126
Rubia. 127
Fuchſia. 128
Siphonanthus. 129
Catesbaea. 130
Ixora. 131
Pauetta. 132
Peteſia. 133
Mitchella. 134
Callicarpa. 135
Aquartia. 136
Polypremum. 137
Penaea. 138
Blaeria. 139
Buddleia. 140
Exacum. 141
Plantago. 142
Scoparia. 143
Rhacoma. 144
Centunculus. 145
Sanguiſorba. 146
Ciſſus. 147
Epimedium. 148
Cornus. 149
Fagara. 150
Tomex. 151
Ptelea. 152
Ludwigia. 153
Oldenlandia. 154
Ammannia. 155
Isnarda. 156
Trapa. 157
Dorſtenia. 158
Cometes. 1243
Elaeagnus. 159
Struthiola. 1244
Brabeium. 160
Krameria. 161
Riuina. 162
Saluadora. 163
Camphorosma. 164
Alchemilla. 165

DIGYNIA.

Aphanes. 166
Crucita. 167
Bufonia. 168
Hamamelis. 169
Cuſcuta. 170
Hypecoon. 171

TETRAGYNIA.

Ilex. 172
Coldenia. 173
Potamogeton. 174
Ruppia. 175
Sagina. 176
Tillaea. 177
Myginda. 178

V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

Heliotropium. 179
Myoſotis. 180
Lithoſpermum. 181
Anchuſa. 182
Cynogloſſum. 183
Pulmonaria. 184
Symphytum. 185
Cerinthe. 186
Onosma. 187
Borago. 188
Aſperugo. 189
Lycopſis. 190
Echium. 191
Meſſerſmidia. 1245
Tournefortia. 192
Nolana. 193
Diapenſia. 194
Aretia. 195
Androſace. 196
Primula. 197
Cortuſa. 198
Soldanella. 199
Dodecatheon. 200
Cyclamen. 201
Menyanthes. 202
Hottonia. 203
Hydrophyllum. 204
Lyſimachia. 205
Anagallis. 206
Theophraſta. 207
Spigelia. 209
Ophiorrhiza. 210
Liſianthus. 1248
Randia. 211
Azalea. 212
Plumbago. 213
Nigrina. 1246
Phlox. 214
Conuoluulus. 215
Ipomoea. 216
Polemonium. 217
Campanula. 218
Roëlla. 219
Phyteuma. 220
Trachelium. 221
Samolus. 222
Nauclea. 223
Rondeletia. 224
Macrocnemum. 225
Bellonia. 226
Portlandia. 227
Cinchona. 228
Pſychotria. 229
Coffea. 230
Chiococca. 231
Hamellia. 232
Lonicera. 233
Trioſteum. 234
Morinda. 235
Conocarpus. 236
Kuhnia. 237
Erithalis. 238
Menais. 239
Muſſaenda. 241
Genipa. 240
Mathiola. 1231
Mirabilis. 242
Coris. 243
Broſſaea. 1229
Elliſia. 244
Verbaſcum. 245
Datura. 246
Hyoſcyamus. 247
Nicotiana. 248
Atropa. 249
Phyſalis. 250
Solanum. 251
Capſicum. 252
Strychnos. 253

Iac-

Iacquinia. 254
Chironia. 255
Cordia. 256
Patagonula. 208
Ehretia. 257
Varronia. 258
Laugeria. 259
Brunsfelsia. 260
Ceſtrum. 261
Lycium. 262
Chryſophyllum. 263
Sideroxylon. 264
Rhamnus. 265
Phylica. 266
Ceanothus. 267
Arduina. 1250
Buttneria. 268
Myrſine. 269
Celaſtrus. 270
Euonymus. 271
Diosma. 272
Brunia. 274
Cyrilla. 1247
Itea. 275
Galax. 276
Cedrela. 277
Mangifera. 278
Hirtella. 280
Plectronia. 1249
Ribes. 281
Gronouia. 282
Hedera. 283
Vitis. 284
Lagoecia. 285
Sauuageſia. 286
Roridula. 1234
Claytonia. 287
Achyranthes. 288
Celoſia. 289
Illecebrum. 290
Glaux. 291
Theſium. 292
Rauwolfia. 293
Paederia. 1252
Cariſſa. 1251
Cerbera. 294
Gardenia. 296
Vinca. 295
Nerium. 297
Echites. 299
Plumieria. 298
Cameraria. 300
Tabernaemontana. 301
Ceropegia. 302

DIGYNIA.

Pergularia. 1253
Periploca. 303
Cynanchum. 304
Apocynum. 305
Aſclepias. 306
Stapelia. 307
Herniaria. 308
Chenopodium. 309
Beta. 310
Salſola. 311
Anabaſis. 312
Creſſa. 313
Steris. 1254
Gomphrena. 314
Boſea. 315
Vlmus. 316
Nama. 317
Hydrolea. 318
Schrebera. 319
Heuchera. 320
Velezia. 447
Swertia. 321
Gentiana. 322
Phyllis. 323

Eryngium. 324
Hydrocotyle. 325
Sanicula. 326
Aſtrantia. 327
Bupleurum. 328
Echinophora. 329
Tordylium. 330
Caucalis. 331
Artedia. 332
Daucus. 333
Ammi. 334
Bunium. 335
Conium. 336
Selinum. 337
Athamanta. 338
Peucedanum. 339
Crithmum. 340
Cachrys. 342
Haſſelquiſtia. 341
Ferula. 343
Laſerpitium. 344
Heracleum. 345
Liguſticum. 346
Angelica. 347
Sium. 348
Siſon. 349
Bubon. 350
Cuminum. 351
Oenanthe. 352
Phellandrium. 353
Cicuta. 354
Aethuſa. 355
Coriandrum. 356
Scandix. 357
Chaerophyllum. 358
Imperatoria. 359
Seſeli. 360
Thapſia. 361
Paſtinaca. 362
Smyrnium. 363
Anethum. 364
Carum. 365
Pimpinella. 366

TRIGYNIA.

Rhus. 369
Viburnum. 370
Caſſine. 371
Sambucus. 372
Spathelia. 373
Staphylea. 374
Tamarix. 375
Turnera. 376
Telephium. 377
Corrigiola. 378
Pharnaceum. 379
Alſine. 380
Drypis. 381
Baſella. 382
Sarothra. 383

TETRAGYNIA.

Parnaſſia. 384
Euoluulus. 385

PENTAGYNIA.

Aralia. 386
Statice. 388
Linum. 389
Aldrouanda. 390
Droſera. 391
Craſſula. 392
Mahernia. 1255
Sibbaldia. 393

POLYGYNIA.

Myoſurus. 394
Apium. 367
Aegopodium. 368

VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

Bromelia. 395
Tillandſia. 396
Burmannia. 397
Tradeſcantia. 398
Pontederа. 399
Haemanthus. 400
Galanthus. 401
Leucoium. 402
Narciſſus. 403
Pancratium. 404
Crinum. 405
Amaryllis. 406
Bulbocodium. 407
Aphyllanthes. 408
Allium. 409
Lilium. 410
Fritillaria. 411
Vuularia. 412
Glorioſa. 413
Erythronium. 414
Tulipa. 415
Albuca. 416
Hypoxis. 417
Ornithogalum. 418
Scilla. 419
Cyanella. 420
Aſphodelus. 421
Anthericum. 422
Leontice. 423
Aſparagus. 424
Dracaena. 1256
Conuallaria. 425
Polianthes. 426
Hyacinthus. 427
Alethris. 428
Yucca. 429
Aloë. 430
Agaue. 431
Alſtrömeria. 432
Hemerocallis. 433
Acorus. 434
Orontium. 435
Calamus. 436
Iuncus. 437
Achras. 438
Richardia. 439
Burſera. 440
Prinos. 441
Berberis. 442
Loranthus. 443
Hillia. 444
Frankenia. 445
Peplis. 446

DIGYNIA.

Oryza. 448
Atraphaxis. 449

TRIGYNIA.

Flagellaria. 450
Rumex. 451
Scheuchzeria. 452
Triglochin. 453
Melanthium. 454
Medeola. 455
Trillium. 456
Colchicum. 457
Helonias. 458

TETRAGYNIA.

Petiueria. 459

POLYGYNIA.

Alisma. 460

VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

Trientalis. 461
Aeſculus. 462

DIGYNIA.

Limeum. 463

TETRAGYNIA.

Saururus. 464

HEPTAGYNIA.

Septas. 465

VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

Tropaeolum. 166
Osbeckia. 467
Rhexia. 468
Oenothera. 469
Gaura. 470
Epilobium. 471
Antichorus. 1257
Combretum. 475
Griſlea. 474
Allophyllus. 476
Ximenia. 477
Mimuſops. 478
Iambolifera. 479
Melicocca. 472
Amyris. 473
Santalum. 480
Memecylon. 481
Chlora. 1258
Lawſonia. 482
Vaccinium. 483
Erica. 484
Daphne. 485
Dirca. 486
Gnidia. 487
Stellera. 488
Paſſerina. 489
Lachnaea. 490
Baeckea. 491

DIGYNIA.

Schmidelia. 1259
Galenia. 492
Weinmannia. 493
Moehringia. 494

TRIGYNIA.

Polygonum. 495
Coccoloba. 496
Paullinia. 497
Cardioſpermum. 498
Sapindus. 499

TETRAGYNIA.

Paris. 500
Adoxa. 501
Elatine. 502

IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

Laurus. 503
Tinus. 504
Caſſyta. 505

TRIGYNIA.

Rheum. 506

HEXAGYNIA.

Butomus. 507

X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

Sophora. 508
Anagyris. 509
Cercis. 510
Bauhinia. 511
Hymenaea. 512
Parkinſonia. 513
Caſſia. 514
Poinciana. 515
Caeſalpinia. 516
Guilandina. 517
Guaiacum. 518
Cynometra. 519
Anacardium. 520
Codon. 1285
Dictamnus. 522
Ruta. 523
Toluifera. 524
Haematoxylon. 525
Proſopis. 1260
Chalcas. 1261
Adenanthera. 526
Trichilia. 528
Swietenia. 521
Melia. 527
Zygophyllum. 530
Quaſſia. 529
Fagonia. 531
Tribulus. 532
Thryallis. 533
Limonia. 534
Monotropa. 536
Trianthema. 537
Iuſſiaea. 538
Heiſteria. 535
Quisqualis. 539
Dais. 540

Melaſtoma. 544
Kalmia. 545
Ledum. 546
Rhododendrum. 548
Andromeda. 549
Epigaea. 550
Gaultheria. 551
Arbutus. 552
Clethra. 553
Pyrola. 554
Styrax. 591
Samyda. 543
Copaifera. 542
Bucida. 541

DIGYNIA.

Royena. 555
Hydrangea. 557
Cunonia. 556
Chryſoſplenium. 558
Saxifraga. 559
Tiarella. 560
Mitella. 561
Scleranthus. 562
Gypſophila. 563
Saponaria. 564
Dianthus. 565

TRIGYNIA.

Cucubalus. 566
Silene. 567
Stellaria. 568
Arenaria. 569
Cherleria. 570
Garidella. 571
Malpigia. 572
Baniſteria. 573
Triopteris. 574
Erythroxylon. 575

PENTAGYNIA.

Auerrhoa. 576
Spondias. 577
Cotyledon. 578
Sedum. 579
Penthorum. 580
Suriana. 581
Grielum. 1235
Oxalis. 582
Agroſtemma. 583
Lychnis. 584
Ceraſtium. 585
Spergula. 586
Forskohlea. 1262

DECANDRIA.

Neurada. 587
Phytolacca. 588

XI. DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

Asarum. 589
Bocconia. 591
Gethyllis. 590
Rhizophora. 592
Blakea. 593
Garcinia. 594
Halesia. 596
Decumaria. 597
Winterania. 598
Crataeua. 599
Triumfetta. 600
Peganum. 601
Hudsonia. 1203
Nitraria. 662
Portulaca. 903
Lythrum. 604
Ginora. 605

DIGYNIA.

Heliocarpus. 606
Agrimonia. 607

TRIGYNIA.

Reseda. 608
Euphorbia. 609

PENTAGYNIA.

Glinus. 610

OCTAGYNIA.

Illicium. 611

DODECAGYNIA.

Semperuiuum. 612

XII. ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

Cactus. 613
Philadelphus. 614
Psidium. 615
Eugenia. 616
Myrtus. 617
Punica. 618
Amygdalus. 619
Prunus. 620
Chrysobalanus. 621

DIGYNIA.

Crataegus. 622

TRIGYNIA.

Sorbus. 623
Sesuuium. 624

PENTAGYNIA.

Mespilus. 625
Pyrus. 626
Tetragonia. 627
Mesembryanthemum. 628
Aizoon. 629
Spiraea. 630

POLYGYNIA.

Rosa. 631
Rubus. 632
Fragaria. 633
Potentilla. 634
Tormentilla. 635
Geum. 636
Dryas. 637
Comarum. 638
Calycanthus. 639

XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

Marcgravia. 640
Rheedia. 641
Capparis. 643
Actaea. 644
Sanguinaria. 645
Podophyllum. 646
Chelidonium. 647
Papauer. 648
Argemone. 649
Cambogia. 650
Muntingia. 651
Saracenia. 652
Nymphaea. 653
Bixa. 654
Sloanea. 655
Trewia. 1239
Mammea. 656
Ochna. 657
Grias. 659
Calophyllum. 658
Tilia. 660
Laetia. 661
Microcos. 662
Elaeocarpus. 663
Lecythis. 664
Delima. 672
Vateria. 666
Lagerſtroemia. 667
Thea. 668
Caryophyllus. 669
Mentzelia. 670
Plinia. 671
Ciſtus. 673
Prockia. 674
Corchorus. 675
Seguiera. 676
Symplocos. 677

DIGYNIA.

Paeonia. 678
Curatela. 679
Calligonum. 680

TRIGYNIA.

Delphinium. 681
Aconitum. 682

TETRAGYNIA.

Tetracera. 683

PENTAGYNIA.

Aquilegia. 684
Nigella. 685
Reaumuria. 686

HEXAGYNIA.

Stratiotes. 687

POLYGYNIA.

Dillenia. 688
Liriodendrum. 689
Magnolia. 690
Michelia. 691
Uuaria. 692
Annona. 693
Anemone. 694
Atragene. 695
Clematis. 696
Thalictrum. 697
Adonis. 698
Ranunculus. 699
Trollius. 700
Iſopyrum. 701
Helleborus. 702
Caltha. 703
Hydraſtis. 704

XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

Aiuga. 705
Teucrium. 706
Satureia. 707
Thymbra. 708
Hyſſopus. 709
Nepeta. 710
Lauandula. 711
Sideritis. 712
Mentha. 713
Perilla 1236
Glecoma. 714
Lamium. 716
Galeopſis. 717
Betonica. 718
Stachys. 719
Ballotta. 720
Marrubium. 721
Leonurus. 722
Phlomis. 723
Molucella. 724
Clinopodium. 725
Origanum. 726
Thymus. 727
Meliſſa. 728
Dracocephalum. 729
Horminum. 730
Melittis. 731
Ocymum. 732
Trichoſtema. 733
Scutellaria. 734
Prunella. 735
Cleonia. 736
Praſium. 737
Phryma. 738

ANGIOSPERMIA.

Bartſia. 739
Rhinanthus. 740
Euphraſia. 741
Melampyrum. 742
Lathraea. 743
Schwalbea. 744
Tozzia. 745
Pedicularis. 746
Gerardia. 747
Chelone. 748
Geſnera. 749
Antirrhinum. 750
Cymbaria. 751
Craniolaria. 752
Martynia. 753
Torenia. 754
Besleria. 755
Scrophularia. 756
Celſia. 757
Digitalis. 758
Bignonia. 759
Citharexylon. 760
Halleria. 761
Creſcentia. 762
Gmelina. 763
Petraea. 764
Lantana. 765
Cornutia. 766
Loeſelia. 767
Capraria. 768
Selago. 769
Manulea. 1264
Hebenſtretia. 770
Erinus. 771
Buchnera. 772

Browallia.	773	Ruellia.	784
Linnaea.	774	Barleria.	785
Sibtorpia.	775	Duranta.	786
Limoſella.	776	Ouieda.	787
Vandellia.	1265	Volkameria.	788
Stemodia.	777	Clerodendrum.	789
Obollaria.	778	Vitex.	790
Orobanche.	779	Boutia.	791
Dodartia.	780	Columnea.	792
Lippia.	781	Acanthus.	793
Seſamum.	782	Pedalium.	794
Mimulus.	783	Melianthus.	795

XV.

TETRADYNAMIA.

SILICVLOSA.

Myagrum. 796
Vella. 797
Anaſtatica. 798
Subularia. 799
Draba. 800
Lepidium. 801
Thlaſpi. 802
Cochlearia. 803
Iberis. 804
Alyſſum. 805
Clypeola. 807
Peltaria. 806
Biſcutella. 808
Lunaria. 809

SILIQVOSA.

Ricotia. 810
Dentaria. 811
Cardamine. 812
Siſymbrium. 813
Eryſimum. 814
Cheiranthus 815
Heliophila. 816
Heſperis. 817
Arabis. 818
Turitis. 819
Braſſica. 820
Sinapis. 821
Raphanus. 822
Bunias. 823
Iſatis. 824
Crambe. 825
Cleome. 826

XVI.

MONADELPHIA.

PENTANDRIA.

Waltheria. 827
Hermannia. 828
Melochia. 829

ENNEANDRIA.

Brownaea. 833

DECANDRIA.

Connarus. 830
Hugonia. 831
Geranium. 832

DODECANDRIA.

Pentapetes. 834

POLYANDRIA.

Adanſonia. 836
Bombax. 835
Sida. 837
Malachra. 1266
Napaea. 838
Althaea. 839
Alcea. 840
Malua. 841
Lauatera. 842
Malope. 843
Vrena. 844
Goſſypium. 845
Hibiſcus. 846
Stewartia. 847
Camellia. 848
Meſua. 665
Moriſonia. 642

XVII.

DIADELPHIA.

PENTANDRIA.

Monnieria. 850.

HEXANDRIA.

Saraca. 1267
Fumaria. 849

OCTANDRIA.

Polygala. 851
Securidaca. 852

DECANDRIA.

Niſſolia. 853
Pterocarpus. 854
Erythrina. 855
Piſcidia. 856
Borbonia. 857
Spartium. 858
Geniſta. 859
Aſpalathus. 860
Vlex. 881
Amorpha. 861
Crotalaria. 862
Ononis. 863
Anthyllis. 864
Arachis. 876
Ebenus. 895
Lupinus. 865
Phaſeolus. 866
Dolichos. 867
Glycine. 868
Clitoria. 869
Piſum. 870
Orobus. 871
Lathyrus. 872
Vicia. 873
Eruum. 874
Cicer. 875

Cytiſus. 877
Geoffraea. 878
Robinia. 879
Colutea. 880
Glycyrrhiza. 882
Coronilla. 883
Ornithopus. 884
Hippocrepis. 885
Scorpiurus. 886
Aeſchynomene. 888
Hedyſarum. 887
Indigofera. 889
Galega. 890
Phaca. 891
Aſtragalus. 892
Biſerrula. 893
Pſoralea. 894
Trifolium. 896
Lotus 897
Trigonella. 898
Medicago. 899

XVIII.

POLYADELPHIA.

PENTANDRIA.

Theobroma. 900
Monſonia. 1268

ICOSANDRIA.

Citrus. 901

POLYANDRIA.

Melaleuca. 1269
Hopea. 1270
Hypericum. 902
Aſcyrum. 903

XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQVALIS.

Geropogon.	904	Calea.	941
Tragopogon.	905	Santolina.	942
Scorzonera.	906	Athanaſia.	943
Picris.	907	Tanacetum.	944
Sonchus.	908	Artemiſia.	945
Lactuca.	909	Gnaphalium.	946
Chondrilla.	910	Xeranthemum.	947
Prenanthes.	911	Carpeſium.	948
Leontodon.	912	Baccharis.	949
Hieracium.	913	Conyza.	950
Crepis.	914	Erigeron.	951
Andryala.	915	Tuſſilago.	952
Hyoſeris.	916	Senecio.	953
Seriola.	917	Aſter.	954
Hypochaeris.	918	Solidago.	955
Lapſana.	919	Cineraria.	957
Catananche.	920	Inula.	956
Cichorium.	921	Arnica.	958
Scolymus.	922	Doronicum.	959
Arctium.	923	Perdicium.	960
Serratula.	924	Helenium.	961
Carduus.	925	Bellis.	962
Cnicus.	926	Tagetes.	964
Onopordon.	927	Leyſera.	963
Cynara.	928	Zinnia.	974
Carlina.	929	Pectis.	965
Atractylis.	930	Chryſanthemum.	966
Carthamus.	931	Matricaria.	967
Bidens.	932	Cotula.	968
Cacalia.	933	Anacyclus.	969
Ethulia.	934	Anthemis.	970
Eupatorium.	935	Achillea.	971
Ageratum.	936	Tridax.	972
Pteronia.	937	Amellus.	978
Staehelina.	938	Sigesbeckia.	973
Chryſocoma.	939	Verbeſina.	975
Tarchonanthus.	940	Buphtalmum.	977

XX.

GYNANDRIA.

POLYGAMIA FRVSTRANEA.

Helianthus. 979
Rudbeckia. 980
Coreopsis. 981
Osmites. 983
Gorteria. 982
Zoegaea. 1271
Centaurea. 984

POLYGAMIA NECESSARIA.

Milleria. 985
Silphium. 986
Polymnia. 987
Chrysogonum. 988
Melampodium. 989
Calendula. 990
Arctotis. 991
Osteospermum. 992
Othonna. 993
Eriocephalus. 994
Filago.. 995
Micropus. 996

POLYGAMIA SEGREGATA.

Elephantopus. 997
Sphaeranthus. 998
Echinops. 999
Gundelia. 1000
Stoebe. 1001

MONOGYNIA.

Seryphium. 1003
Strumpfia. 1002
Corymbium. 1004
Jasione. 1005
Lobelia. 1006
Viola. 1007
Impatiens. 1008

DIANDRIA.

Orchis. 1009
Satyrium. 1010
Ophrys. 1011
Serapias. 1012
Limodorum. 1013
Arethusa. 1014
Cypripedium. 1015
Epidendrum. 1016
Gunnera. 1271

TRIANDRIA.

Sisyrinchium. 1017
Ferraria. 1018
Stilago. 1273

TETRANDRIA.

Nepenthes. 1019

PENTANDRIA.

Ayenia. 1020
Passiflora. 1021

HEXANDRIA.

Aristolochia. 1022
Pistia. 1023

DECANDRIA.

Kleynhouia. 1024
Helicteres. 1025

DODECANDRIA.

Cytinus. 1232

POLYANDRIA.

Xylopia. 1027
Greuia. 1026
Ambrosinia.. 1238
Arum. 1028
Dracontium. 1029
Calla. 1030
Pothos. 1031
Zostera. 1032

XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.
Zannichellia. 1034
Ceratocarpus. 1035
Cynomorium. 1033
Chara. 1203
Elaterium. 1036
DIANDRIA.
Anguria. 1037
Lemna. 1038
TRIANDRIA.
Typha. 1040
Sparganium. 1041
Zea. 1042
Tripſacum. 1044
Coix. 1043
Olyra. 1045
Carex. 1046
Axyris. 1047
Omphales. 1039
Tragia 1048
Hernandia. 1049
Phyllanthus. 1050
TETRANDRIA.
Centella. 1051
Serpicula 1274
Cicca. 1275
Betula. 1052
Buxus. 1053
Vrtica. 1054
Morus. 1055
PENTANDRIA.
Nephelium. 1277
Xanthium. 1056
Ambroſia. 1057
Parthenium. 1058
Iua. 1059
Hartogia. 273
Amaranthus. 1060
Solandra. 1061
Leca. 1276
HEXANDRIA.
Zizania. 1062
Pharus. 1063
HEPTANDRIA.
Guettarda. 1064
POLYANDRIA.
Ceratophyllum. 1065
Miriophyllum. 1066
Sagittaria. 1067
Theligonum. 1068
Poterium. 1069
Quercus. 1070
Iuglans. 1071
Fagus. 1072
Carpinus. 1073
Corylus. 1074
Platanus. 1075
Liquidamber. 1076
ADELPHIA.
Pinus. 1077
Thuja. 1078
Cupreſſus. 1079
Plukenetia. 1080
Dalechampia. 1081
Acalypha. 1082
Croton. 1083
Cupania. 279
Iatropha 1084
Ricinus. 1085
Sterculia. 1086
Stillingia. 1279
Hippomane. 1088
Hura. 1087
Gnetum. 1278
SYNGENESIA.
Trichoſanthes. 1089
Momordica. 1090
Cucurbita. 1091
Cucumis. 1092
Bryonia. 1093
Sicyos. 1904
GYNANDRIA.
Andrachne. 1095

XXII.

DIOECIA.

MONANDRIA.

Naias. 1096

DIANDRIA.

Vallisneria. 1097
Cecropia. 1099
Salix 1098

TRIANDRIA.

Empetrum. 1100
Osyris. 1101
Excoecaria. 1102
Caturus. 1280

TETRANDRIA.

Trophis. 1103
Batis. 1104
Viscum. 1105
Hippophae. 1106
Myrica. 1107

PENTANDRIA.

Pistacia. 1108
Xanthoxylon. 1109
Astronium. 1111
Canarium. 1281
Antidesma. 1110
Iretine. 1113
Spinacia. 1112
Acnida. 1114
Cannabis. 1115
Humulus. 1116
Zanonia. 1117
Feuillea. 1118

HEXANDRIA.

Tamus. 1119
Smilax. 1120
Raiania. 1121
Dioscorea. 1122
Populus. 1123
Rhodiola. 1124

ENNEANDRIA.

Mercurialis. 1125
Hydrocharis. 1126

DECANDRIA.

Carica. 1127
Kiggelaria. 1128
Schinus. 1130
Coriaria. 1129

DODECANDRIA.

Datisca. 1131
Menispermum. 1132

POLYANDRIA.

Cimicifuga. 1282
Cliffortia. 1133

MONADELPHIA.

Iuniperus. 1134
Taxus. 1135
Ephedra. 1136
Ciffampelos. 1138
Adelia. 1137

SYNGENESIA.

Ruscus. 1139

GYNANDRIA.

Clutia. 1140

XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

Musa. 1141
Ophioxylon. 1142
Celtis. 1143
Veratrum. 1144
Andropogon. 1145
Holcus. 1146
Apluda. 1147
Ischaemum. 1148
Cenchrus. 1149
Aegilops. 1150
Valantia. 1151
Parietaria. 1152
Atriplex. 1153
Terminalia. 1283
Cluſia. 1154
Acer. 1155
Gouana. 1157
Begonia. 1156
Mimoſa. 1158

DIOECIA.

Gleditſia. 1159
Fraxinus. 1160
Dioſpyros. 1161
Nyſſa. 1163
Anthoſpermum. 1164
Arctopus. 1165
Piſonia. 1162
Panax. 1166

TRIOECIA.

Ceratonia. 1167
Ficus. 1168

XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

Equiſetum. 1169
Onoclea. 1170
Ophioglosſum. 1171
Oſmunda. 1172
Acroſtichum. 1173
Polypodium. 1179
Hemionitis. 1176
Aſplenium. 1178
Blechum. 1175
Lonchitis. 1177
Pteris. 1174
Adiantum. 1180
Trichomanes. 1181
Marſilea. 1182
Pilularia. 1183
Iſoetes. 1184

MVSCI.

Lycopodium. 1185
Porella. 1186
Sphagnum. 1187
Phaſcum. 1187
Splachnum. 1190
Polytrichum. 1192
Mnium. 1193
Bryum. 1194
Hypnum. 1195
Fontinalis. 1190
Buxbaumia. 1188

ALGAE.

Marchantia. 1198
Iungermannia. 1196
Targionia. 1197
Anthoceros. 1201
Blasia. 1199
Riccia. 1200
Lichen. 1202
Byssus. 1208
Tremella, 1204
Vlua. 1206
Fucus. 1205
Conferua. 1207

FVNGI.

Agaricus. 1209
Boletus. 1210
Hydnum. 1211
Phallus. 1212
Clathrus. 1213
Heluella. 1214
Peziza. 1215
Clauaria. 1216
Lycoperdon. 1217
Mucor. 1218

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Scitamineae, inferae*: Fructu loculari infero.

2. AMOMVM. *Corolla* 3-partita: labio ouato.
6. CVRCVMA. *Cor.* 4-partita: labio ouato. *Stam.* 4 sterilia.
8. THALIA. *Cor.* 5 partita. *Drupa* Nucleo 2-loculari.
5. MARANTA. *Cor.* 5-fida, ringens: labio 2-partito magno.
7. KAEMPFERIA. *Cor.* 6-partita: labio 2-partito, plano.
1. CANNA. *Cor.* 6-partita: labio 2-partito reuoluto. *Cal.* 3-phyllus.
4. ALPINIA. *Cor.* 6-fida ventricosa: lobis lateralibus 2 emarginatis.
3. COSTVS. *Cor.* ringens: labio 3-fido: media emarginata.

† *Valeriana rubra, Calcitrapa.*

* * *Monospermae.*

9. BOERHAVIA. *Calyx.* o. *Cor.* 1-petala, campanulata.
11. HIPPVRIS. *Cal.* o. *Cor.* o.
10. SALICORNIA. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* o.

DIGYNIA.

* *Plantae.*

12. CORISPERMVM. *Cal.* o. *Cor.* 2-petala. *Semen* 1.
13. CALLITRICHE. *Cal.* o. *Cor.* 2-petala. *Capsula* 2-locularis.
14. BLITVM. *Cal.* 3-fidus baccatus. *Cor.* o. *Semen* 1.

* * *Gramineae.*

15. CINNA. *Cal.* Gluma 1-flora. *Cor.* Gluma 2-valuis.

MONOGYNIA.

1. CANNA. *Coralla* 6-partita, erecta: labio bipartito reuoluto. *Stylus* lanceolatus, corollae adnatus. *Calyx* 3-phyllus.
Sp. pl. 1.

indica. 1. C. foliis ouatis vtrinque acuminatis neruosis.
angustifolia. 2. C. foliis lanceolatis petiolatis neruosis. *Vide Sp. pl. 1625.*
glauca. 3. C. foliis lanceolatis petiolatis eneruibus.

2. AMOMVM. *Cor.* 4-fida: lacinia prima patente.
1.

Zingiber. 1. A. scapo nudo, spica ouata.
Zerumbet. 2. A. scapo nudo, spica oblonga obtusa.
Cardamomum. 3. A. scapo simpliciſſimo breuiſſimo, bracteis alternis laxis.
Gr. Par. 4. A. scapo ramoso breuiſſimo.

3. COSTVS. *Cor.* interior inflata, ringens: labio inferiore trifido.
2.

arabicus. 1. COSTVS. *Iacq. amer. 1. t. 1.* an?

4. ALPINIA. *Cor.* 6-fida, ventricosa: lobis 3 patentibus.
2.

racemos. 1. ALPINIA.

5. MARANTA: *Cor.* ringens, 5-fida: laciniis 2 alternis patentibus.
2.

arundin. 1. M. culmo ramoso.
Galanga. 2. M. culmo simplici.

6. CVRCVMA. *Stamina* 4 sterilia, quinto fertili.
2.

rotunda. 1. C. fol. lanceolato-ouatis: neruis lateralibus rariſſimis.
longa.

Character Amomi, Alpiniae, Curcumae, Thaliae *ab autoptis in plantis vivis accuratius describendus est.*

longa. 2. C. fol. lanceolatis: neruis lateralibus numerosissimis.

7. KAEMPFERIA. *Cor.* 6-partita: laciniis 3 maioribus
3. patulis, vnica bipartita.

Galanga. 1. K. fol. ouatis sessilibus.
rotunda. 2. K. fol. lanceolatis petiolatis.

8. THALIA. *Cor.* 5-petala, vndulata. *Drupa* nucleo bi-
3. loculari.

geniculat. 1. THALIA.
Synonymon Sloanei *Speciem diuersam Marantae determinare petalorum laciniis integris, nec laciniatis, statuit Millerus, confirmante Brownio.*

9. BOERHAVIA. *Cal.* 0. *Cor.* 1-petala, campanulata,
4. plicata. *Sem.* 1, nudum, inferum (Stam. 1. f. 2.).

erecta. 1. B. caule erecto glabro, floribus diandris. Boerhauia floribus paniculatis, seminibus pentagonis truncatis. *Gouan. hort. 2.*
diffusa. 2. B. caule diffuso. Valerianella folio subrotundo, flore purpureo, semine oblongo striato aspero. *Sloan. iam. 91. Rai. suppl. 244.*
scandens. 3. B. caule scandente, floribus diandris, foliis cordatis. Boerhauia floribus vmbellatis, seminibus filiformibus truncatis apice tuberculatis. *Gouan. hort. 2.*
diandra. 4. B. pubescens diffusa, floribus diandris.
repens. 5. B. caule repente. †
angustifol. 6. B. foliis linearibus acutis.

10. SALICORNIA. *Cal.* ventriculosus, integer. *Petala*
5. 0. *Sem.* 1.

herbacea. 1. S. herbacea patula articulis apice compressis emarginato-bifidis. Salicornia articulis apice cruciforibus obtusis. *Ger. prou. 328. Bauh. pin. 2. p. 105. t. 50.*
Spica articulata; flores terni, approximati, monandri, in quouis articulo virique. Bauh.

fruticoſa. 2. S. caule erecto fruticoſo. Salicornia articulis ſubaequalibus obtuſis, internodiis approximatis. *Ger. prou. 328.*

virginica. 3. S. herbacea erecta, ramis ſimpliciſſimis. *Rami oppoſiti, indiuiſi, terminati ſpica longa, articulata; diſtinguenda ab herbacea, quae etiam creſcit in Virginia.*

arabica. 4. S. articulis obtuſis baſi incraſſatis, ſpicis ouatis.

caſpica. 5. S. fruticoſa articulis cylindricis, ſpicis filiformibus.

11. HIPPVRIS. *Cal.* o. *Petala* o. *Stigma* ſimplex. *Sem.* 1.
6.

vulgaris. 1. HIPPVRIS.

DIGYNIA.

12. CORISPERMVM. *Cal.* o. *Petala* 2. *Sem.* 1, ouale, nudum.
6.

hyſſopifol. 1. C. floribus lateralibus.

ſquarroſ. 2. C. ſpicis ſquarroſis.

13. CALLITRICHE. *Cal.* o. *Petala* 2. *Capſula* 2-locularis, 4-ſperma.
6.

verna. 1. C. fol. ſuperioribus oualibus, flor. androgynis.

autumnalis. 2. C. fol. omnibus linearibus apice bifidis, flor. hermaphroditis. Alſine aquatica minor ſ. fluitans. *Bauh. pin. 257.*

14. BLITVM. *Cal.* 3-fidus. *Petala* o. *Sem.* 1, calyce baccato.
6.

capitatum. 1. B. capitellis ſpicatis terminalibus.

virgatum. 2. B. capitellis ſparſis lateralibus.

15. CINNA. *Cal.* Gluma 2-valuis, vniflora. *Cor.* Gluma 2-valuis. *Sem.* 1.
7.

arundin. 1. CINNA.

CLAS-

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Flores inferi, monopetali, regulares.*

20. OLEA. *Cor.* 4-fida. *Drupa.*
21. CHIONANTHVS. *Cor.* 4-fida: laciniis longiſſimis.
19. PHILLYREA. *Cor.* 4-fida. *Bacca* 1-ſperma.
18. LIGVSTRVM. *Cor.* 4-fida. *Bacca* 4-ſperma.
22. SYRINGA. *Cor.* 4-fida: lacin. linearibus. *Capſula* 2-locularis.
1240. DIALIVM. *Cor.* 5-petala. *Cal.* nullus.
13. ERANTHEMVM. *Cor.* 5-fida: laciniis obouatis, planis. *Capſula.*
17. IASMINVM. *Cor.* 5-fida *Bacca* dicocca.
16. NYCTANTHES. *Cor.* 8-fida. *Bacca* dicocca.

* * *Flores inferi, monopetali, irregulares. Fructus Capſularis.*

26. PAEDEROTA. *Cor.* 4-fida. *Cal.* quinquepartitus.
25. VERONICA. *Cor.* 4-partito limbo: lacinia inferiore anguſtiore.
29. GRATIOLA. *Cor.* 4-fida, irregularis. *Stam.* 4: 2 ſterilia.
1233. SCHWENKIA. *Cor.* ſubaequalis: ore plicato-ſtellato, glanduloſo. *Stam.* 3 ſterilia.
27. IVSTICIA. *Cor.* ringens. *Capſula* vngue elaſtico.
28. DIANTHERA. *Cor.* ringens. *Antherae* 2 in ſingulo filamento.
30. PINGVICVLA. *Cor.* ringens, calcarata. *Cal.* 5-fidus.
31. VTRICVLARIA. *Cor.* ringens, calcarata. *Cal.* 2-phyllus.
† *Bignonia Catalpa.*

* * * *Flores inferi, monopetali, irregulares. Fructus gymnoſpermi.*

32. VERBENA. *Cor.* ſubaequalis. *Cal.* lacinia ſuprema breuiore.
33. LYCOPVS. *Cor.* ſubaequalis. *Stam.* diſtantia.
34. AMETHYSTEA. *Cor.* ſubaequalis: lacinia infima concaua.
36. ZIZIPHORA. *Cor.* ringens: galea reflexa. *Cal.* filiformis.
37. MONARDA. *Cor.* ringens: galea lineari obuoluente genitalia.
38. ROSMARINVS. *Cor.* ringens: galea falcata. *Stam.* curua.

39. SALVIA. *Cor.* ringens. *Filamenta* transuerſe pedicellata.

35. CVNILA. *Cor.* ringens: galea plana. *Stam.* 4: 2 rudimenta.

40. COLLINSONIA. *Cor.* ſubringens: labio capillari-multifido.

* * * * *Flores ſuperi.*

41. MORINA. *Cal. fructus* dentato-ariſtatus; *floris* bifidus.

24. CIRCAEA. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 2-petala, obcordata.

† *Valeriana Cornucopiae.*
Boerhauia diandra, ſcandens, erecta.

DIGYNIA.

42. ANTHOXANTHVM. *Cal.* Gluma 1-flora, oblonga. *Cor.* Gluma ariſtata.

TRIGYNIA.

43. PIPER. *Cal.* 0. *Cor.* 0. *Bacca* 1-ſperma.

MONOGYNIA.

16. NYCTANTHES. *Corolla* 8-fida. *Cal.* 8-fidus. *Pericarpium* dicoccum.

8.

arbor triſtis. 1. N. caule tetragono, fol. ouatis acuminatis, pericarpiis membranaceis compreſſis. *Fructus ſiccus capſularis eſt.*

Sambac. 2. N. fol. inferioribus cordatis obtuſis, ſuperioribus ouatis acutis.

vndulata. 3. N. fol. ouatis acuminatis vndulatis, ramis teretibus.

hirſuta. 4. N. petiolis pedunculisque villoſis. *Osb. it. 205.*

anguſtif. 5. N. fol. obtuſis lanceolatis ouatisque.

17. IASMINVM. *Cor.* 5-fida. *Bacca* dicocca. *Sem.* arillata. *Antherae* intra tubum.

9.

officinale. 1. I. fol. oppoſitis pinnatis: foliolis diſtinctis.

grandiflorum. 2. I. fol. oppoſitis pinnatis: foliolis extimis confluentibus.

azoricum. 3. I. fol. oppoſitis ternatis.

fruticans. 4. I. fol. alternis ternatis ſimplicibusque, ramis angulatis.

humile. 5. I. fol. alternis acutiuſculis ternatis pinnatisque, ramis angulatis.

odoratiſſ. 6. I. fol. alternis obtuſis ternatis pinnatisque, ramis teretibus.

18. LIGVSTRVM. *Cor.* 4-fida. *Bacca* tetraſperma.

10.

vulgare. 1. LIGVSTRVM.

19. PHILLYREA. *Cor.* 4-fida. *Bacca* monoſperma.

10.

media. 1. P. fol. ouato-lanceolatis ſubintegerrimis.

anguſtif. 2. P. fol. lineari-lanceolatis integerrimis. *Varietas praecedentis ſecundum Gerardum.*

latifolia. 3. P. fol. ouato-cordatis ſerratis.

β. P. latifolia laeuis. *Bauh. pin. 476. Gerard.*

20. OLEA. *Cor.* 4-fida: laciniis ſubouatis. *Drupa* monoſperma.
11.

europaea. 1. O. fol. lanceolatis.
capenſis. 2. O. fol. ouatis.
americ. 3. O. fol. lanceolato-ellipticis. *Mantiſſ. 24.*

21. CHIONANTHVS. *Cor.* 4-fida: laciniis longiſſimis. *Drupa.*
11.

virginic. 1. C. pedunculis trifidis trifloris.
zeilonic. 2. C. pedunculis paniculatis multifloris.

22. SYRINGA. *Cor.* 4-fida. *Capſula* bilocularis.
11.

vulgaris. 1. S. fol. ouato-cordatis.
perſica. 2. S. fol. lanceolatis.

1240. DIALIVM. *Cor.* 5-petala. *Cal.* nullus. *Stamina* ad latus ſuperius.

indum. 1. DIALIVM. *Mantiſſ. 24.*

23. ERANTHEMVM. *Cor.* 5-fida: tubo filiformi. *Antherae* extra tubum. *Stigma* ſimplex. *Fructus.*
12.

capenſe. 1. ERANTHEMVM.

24. CIRCAEA. *Cor.* dipetala. *Cal.* diphyllus, ſuperus. *Sem. 1.* biloculare.
12.

lutetian. 1. C. caule erecto, racemis pluribus, foliis ouatis.
alpina. 2. C. caule proſtrato, racemo vnico, foliis cordatis.

25. VE-

25. VERONICA. *Cor.* Limbo 4-partito: lacinia infima anguſtiore. *Capſula* bilocularis.
12.

* *Spicatae.*

ſibirica. 1. V. ſpicis terminalibus, fol. ſeptenis verticillatis, caule ſubhirto.

virginic. 2. V. ſpicis terminalibus, fol. quaternis quinisque.

ſpuria. 3. V. ſpicis terminalibus, fol. ternis aequaliter ſerratis.

maritim. 4. V. ſpicis terminalibus, fol. ternis inaequaliter ſerratis.

longifolia. 5. V. ſpicis terminalibus, fol. oppoſitis lanceolatis ſerratis acuminatis.

incana. 6. V. ſpicis terminalibus, fol. oppoſitis crenatis obtuſis, caule erecto tomentoſo.

ſpicata. 7. V. ſpica terminali, fol. oppoſitis crenatis obtuſis, caule adſcendente ſimpliciſſimo.

hybrida. 8. V. ſpicis terminalibus, fol. oppoſitis obtuſe ſerratis ſcabris, caule erecto.

pinnata. 20. V. ſpica terminali, fol. linearibus dentato-pinnatis, caulibus proſtratis. *Mantiſſ. p. 24.*

officinal. 9. V. ſpicis lateralibus pedunculatis, fol. oppoſitis, caule procumbente.

β. V. ſpicis lateralibus terminalibusque pedunculatis, foliis oppoſitis ſubrotundis glabris, caule procumbente ſtolonifero. *Ger. prou. 322.* V. repens ex alis ſpicata, fol. ſubrotundis firmis glabris denticulatis. *All. ſpec. 1. p. 21. t. 4. f. 3.*

* * *Corymboſo-racemoſae.*

aphylla. 10. V. corymbo terminali, ſcapo nudo.

bellidioid. 11. V. corymbo terminali, caule adſcendente diphyllo, fol. obtuſis crenatis.

fruticuloſa. 12. V. corymbo terminali, foliis lanceolatis obtuſiuſculis crenatis, caulibus fruticuloſis. *Iacq. vin. 200.* * Veronica tertia fruticans. *Cluſ. hiſt. 1. p. 347. Pedunculi foliis floralibus longiores.*

alpina. 13. V. corymbo terminali, fol. oppoſitis, calycibus hiſpidis.

ſerpyllifol. 14. V. racemo terminali ſubſpicato, fol. ouatis glabris crenatis.

Beccabunga. 15. V. racemis lateralibus, fol. ouatis planis, caule repente.

Anagallis. 16. V. racemis lateralibus, fol. lanceolatis ferratis, caule erecto.

ſcutellat. 17. V. racemis lateralibus alternis: pedicellis pendulis, fol. linearibus integerrimis.

Teucrium. 18. V. racemis lateralibus longiſſimis, fol. ouatis rugoſis dentatis obtuſiuſculis, caulibus procumbentibus.

piloſa. 23. V. racemis ſubſpicatis, fol. ouatis obtuſis plicatis, caule proſtrato piloſo. *Sp. pl. 1663.*

proſtrata. 22. V. racemis lateralibus, fol. oblongo-ouatis ſerratis, caulibus proſtratis.

pectinata. 35. V. racemis lateralibus foliatis, fol. oblongis pectinato-ſerratis, caul. proſtratis. *Mantiſſ. 24.*

montana. 21. V. racemis lateralibus paucifloris, calyc. hirſutis, fol. ouatis rugoſis crenatis petiolatis, caule debili. *Folia ſubtus rubra. Hall.*

Chamaedrys. 23. V. racemis lateralibus, fol. ouatis ſeſſilibus rugoſis dentatis ſeſſilibus, caule debili. *Calycina foliola inaequalia lanceolata. Gouan.*

auſtriaca. 19. V. racemis lateralibus, fol. lineari-lanceolatis pinnato-dentatis.

multifida. 20. V. racemis lateralibus, fol. multipartitis laciniatis, caulib. erectis.

latifolia. 24. V. racemis lateralibus, fol. cordatis rugoſis dentatis, caule ſtricto. *Calycina foliola ouata aequalia. Gouan.*

paniculata. 25. V. racemis lateralibus longiſſimis, fol. lanceolatis ternis ſerratis, caule adſcendente.

* * * *Pedunculis vnifloris.*

agreſtis. 26. V. flor. ſolitariis, fol. cordatis inciſis pedunculo breuioribus. *Calycina foliola ouata aequalia. Gouan.*

aruenſis. 27. V. flor. ſolitariis, fol. cordatis inciſis pedunculo longioribus. *Calycina foliola lanceolata inaequalia. Gouan.*

hederifol. 28. V. flor. ſolitariis, fol. cordatis planis quinquelobis.

triphyllos. 29. V. flor. ſolitariis, fol. digitato-partitis, pedunculis calyce longioribus.

verna. 30. V. flor. ſolitariis, fol. digitato-partitis pedunculis calyce breuioribus.

romana. 31. V. flor. ſolitariis ſubſeſſilibus, fol. oblongis ſubdentatis, caule erecto.

acinifolia. 32. V. flor. ſolitariis pedunculatis, fol. ouatis glabris crenatis, caule erecto ſubpiloſo.

peregrina. 33. V. flor. ſolitariis ſeſſilibus, fol. lanceolato-linearibus glabris obtuſis integerrimis, caule erecto.

mariland. 34. V. flor. ſolitariis ſeſſilibus, fol. linearibus, caul. diffuſis.

26. PAEDEROTA. *Cor.* 4-fida. *Cal.* 5-partitus. 20. *Capſ.* bilocularis.

bon. ſpei. 1. P. foliis pinnatis.

Bonarota. 2. P. foliis ſerratis.

27. IVSTICIA. *Cor.* ringens. *Capſ.* bilocularis, vngue elaſtico diſſiliens. *Stamina* anthera ſingulari. 20.

* *Fruticoſae.*

Adhatoda. 1. I. arborea, fol. lanceolato-ouatis, bracteis ouatis perſiſtentibus, corollarum galea concaua. *Fabr. helmſt. 217.*

Ecbolium. 2. I. arborea, fol. lanceolato-ouatis, ſpic. tetragonis, bracteis ouatis ciliatis, corollarum galea reflexa. *Fabr. helm. 217.* *

Caulis *fruticoſus*, *teretiuſculus*, *compreſſus*, *articulatus*. Folia *petiolata*, *glabra*, *acuminata*, *integerrima*. Spica *terminalis*, *ſtrobiliformis*, *tetragona*: bracteis *patulis*, *erectis*, *imbricatis*, *ſubciliatis*. Corollae tubus *filiformis*, *incuruus*, *bractea longior*. Limbus *caeruleſcens*. Lab. ſuperiore *linerari*, *anguſtiſſimo*, *refracto*, *apice bifido*. L. inferiore *trifido*, *media latiore*. Anthera *ad refracturam lab. ſuperioris*.

Betonica. 6. I. fruticoſa, fol. lanceolato-ouatis, bracteis ouatis acuminatis venoſo-reticulatis coloratis.

ſcorpioides. 4. I. fruticoſa, fol. lanceolato-ouatis hirſutis ſeſſilibus, ſpicis recuruatis.

picta. 5. I. fruticoſa, fol. lanceolato-ouatis pictis, corollis fauce inflatis.

infundibuliform. 3. I. fruticoſa, fol. lanceolato-ouatis quaternis, bracteis lanceolatis ciliatis,

ſpi-

ſpinoſa. 19. I. fruticoſa, ſpicis axillaribus, pedunculis lateralibus. *Sp. pl. 1663.*

ſeſſilis. 20. I. fruticoſa, flor. axillaribus ſeſſilibus. *Sp. pl. 1663.*

hyſſopifol. 7. I. fruticoſa, fol. lanceolatis integerrimis, pedunc. trifloris ancipitibus, bracteis calyce breuioribus.

* * *Herbaceae.*

procumbens. 8. I. fol. lanceolatis integerrimis, ſpic. terminalibus lateralibusque alternis, bracteis ſetaceis, caul. procumbente.

pectinat. 9. I. diffuſa, ſpicis axillaribus ſeſſilibus tomentoſis ſecundis dorſo imbricatis: bracteis ſemilanceolatis.

repens. 10. I. fol. ouatis ſubcrenatis, ſpic. terminalibus, bracteis lanceolatis, caule repente. *Variat fol. lanceolatis ſeſſilibus.*

chinenſis. 11. I. herbacea, fol. ouatis, flor. lateralibus, pedunc. trifloris, bracteis oualibus.

echioides. 12. I. fol. lanceolato-linearibus obtuſis ſeſſilibus, racemis adſcendenti-ſecundis, bracteis ſetaceis.

ſexangularis. 13. I. fol. ouatis integerrimis, bracteis cuneiformibus, ramis ſexangularibus.

chartaginenſis. 21. I. fol. lanceolato-oualibus, flor. ſpicatis, bracteis oblongo-cuneatis. *Sp. pl. 1663.*

aſſurgens. 14. I. fol. ouatis integerrimis, bracteis ſubulatis, ramis hexagonis.

naſuta. 15. I. fol. lanceolato-ouatis integerrimis, pedunc. dichotomis.

biualuis. 17. I. fol. lanceolato-ouatis, pedunculis ſexfloris: pedicellis lateralibus bifloris, bracteis ouatis parallelis. *(excluſo Rumphii ſynonymo.)*

purpurea. 16. I. fol. ouatis vtrinque mucronatis integerrimis glabris, caule geniculato, ſpic. ſecundis.

gangetic. 18. I. fol. ouatis, racemis ſimplicibus longis, flor. alternis ſecundis, bracteis obſoletis.

28. DIANTHERA. *Cor.* ringens. *Capſula* 2-locularis vngue elaſtico diffiliens. *Stamen* ſingulum *Antheris* binis alternis.
24.

american. 1. D. ſpicis ſolitariis alternis.

comata. 2. D. ſpicis filiformibus verticillatis; inferioribus vmbellatis.

29. GRATIOLA. *Cor.* irregularis. *Stamina* 2 sterilia. *Capſ.* 2-locularis. *Cal.* 7-phyllus: 2 exterioribus patulis.
24.

officinal. 1. G. flor. pedunculatis, fol. lanceolatis ſerratis.
Monnieria. 2. G. fol. ouali-oblongis, pedunc. vnifloris, caule repente. *Iacq. obſ. 4. t. 1. Stamina 4 antherifera. Stigma capitatum.*
virginica. 3. G. fol. lanceolatis obtuſis ſubdentatis.
peruuiana. 4. G. floribus ſubſeſſilibus.

1233. SCHWENKIA. *Cor.* ſubaequalis, fauce plicata glanduloſa. *Stam.* 3 ſterilia. *Capſ.* 2-locularis, polyſperma.

americ. 1. SCHWENKIA. *Gen. plant. 567. Schwenk. Hort. med. Hag. 1766. oct. p. 328. t. 1. in ordine naturali Browalliis proxima. Folia etiam alterna.*

30. PINGVICVLA. *Cor.* ringens, calcarata. *Cal.* bilabiatus, 5-fidus. *Capſ.* vnilocularis.
25.

luſitanic. 1. P. nectario apice incraſſato.
vulgaris. 2. P. nectario cylindraceo longitudine petali.
alpina. 3. P. nectario conico petalo breuiore.
villoſa. 4. P. ſcapo villoſo.
Scapus ſetaceus, vix manifeſte pubeſcens. Flos violaceus calcari exſerto. Differt a P. vulgari quod ſextuplo omnibus partibus minor.

31. VTRICVLARIA. *Cor.* ringens, calcarata. *Cal.* 2-phyllus, aequalis. *Capſ.* vnilocularis.
25.

alpina. 1. V. nectario ſubulato, fol. ouatis integerrimis. *Iacq. amer. 7. t. 6.*
folioſa. 2. V. nectario conico, fructibus cernuis, radicibus vtriculo deſtitutis.

vulga-

vulgaris. 3. V. nectario conico, scapo pauciflora. *Oed. dan. t. 138.*
minor. 4. V. nectario carinato.
subulata. 5. V. nectario subulato.
gibba. 6. V. nectario gibboso.
bifida. 7. V. scapo nudo bifido.
caerulea. 8. V. scapo nudo: squamis alternis vagis subulatis.

32. VERBENA. *Cor.* infundibulif. subaequalis, curua. *Calycis* vnico dente truncato. *Semina* 2 s. 4, nuda. (*Stam.* 2. s. 4.) 27.

orubica. 1. V. diandra, spicis longissimis foliosis.
indica. 2. V. diandra, spicis longissimis carnosis nudis, fol. lanceolato-ouatis oblique dentatis, caule laeui.
iamaicensis. 3. V. diandra, spicis longissimis carnosis nudis, fol. spatulato-ouatis serratis, caule hirto. Valerianoides. *Boerh. lugdb. 2. p. 270.*
floecadifol. 4. V. diandra, spic. ouatis, fol. lanceolatis serrato-plicatis, caule fruticoso.
prismatica. 5. V. diandra, spic. laxis, calyc. alternis prismaticis truncatis aristatis, fol. ouatis obtusis.
mexican. 6. V. diandra, spic. laxis, calyc. fructus reflexis rotundato-didymis hispidis.
lappulacea. 7. V. tetrandra, calyc. subrotundis erectiusculis, sem. echinatis. *Iacq. obs. 37. t. 24.* Burseria. *Loefl. it. 194. n. 69. Semina bilocularia sunt.*
curassauica. 8. V. diandra, spic. longis, calyc. aristatis, fol. ouatis serratis.
nodiflora. 9. V. tetrandra, spic. capitato-conicis, fol. serratis, caule repente. *Habitat etiam in* Sicilia. *Cyrill.* Similima *erecta, minus glabra, foliis lanceolatis, ex Ind. orientali.*
bonariensis. 10. V. tetrandra, spicis fasciculatis, foliis lanceolatis amplexicaulibus.
hastata. 11. V. tetrandra, spicis longis acuminatis, fol. hastatis.
carolina. 12. V. tetrandra, spicis filiformibus, fol. indiuisis lanceolatis serratis obtusiusculis subsessilibus. *Dill. elth. t. 301. f. 388.*

urticifol. 13. V. tetrandra, ſpicis filiformibus paniculatis, fol. indiuiſis ouatis ſerratis acutis petiolatis.

ſpuria. 14. V. tetrandra, ſpicis filiformibus, fol. multifido-laciniatis, caul. numeroſis.

officinalis. 15. V. tetrandra, ſpicis filiformibus paniculatis, fol. multifido laciniatis, caule ſolitario.

ſupina. 16. V. tetrandra, ſpicis filiformibus ſolitariis, fol. bipinnatifidis.
Caulis teretiuſculus, ſubcompreſſus, ſubpubeſcens.
Flores caeruleſcentes.

33. LYCOPVS. *Cor.* 4-fida: lacinia vnica emargina-
30. ta. *Stamina* diſtantia. *Semina* 4, retuſa.

europaeus. 1. L. foliis ſinuato-ſerratis.
virginic. 2. L. foliis aequaliter ſerratis.

34. AMETHYSTEA. *Cor.* 5-fida: lacinia infima
30. patentiore. *Stam.* approximata. *Calyx* ſubcampanulatus. *Sem.* 4, gibba.

caerulea. 1. AMETHYSTEA.

35. CVNILA. *Cor.* ringens: labio ſuperiore erecto,
30. plano. *Filamenta* caſtrata duo. *Semina* 4.

mariana. 1. C. fol. ouatis ſerratis, corymb. terminalibus dichotomis.

pulegioides. 2. C. fol. oblongis bidentatis, flor. verticillatis. *Bracteae vtrinque binae floribus maiores, praeter alias minutas.*

thymoid. 3. C. fol. oualibus integerrimis, flor. verticillatis, caul. tetragono.

36. ZIZIPHORA. *Cor.* ringens: labio ſuperiore reflexo, integro. *Cal.* filiformis. *Semina* 4.
31.

capitata. 1. *Z.* capitulis terminalibus, fol. ouatis.
hiſpanica. 2. *Z.* flor. racemoſo-ſpicatis, bract. obouatis neruoſis acutis, fol. ouatis.
tenuior. 3. *Z.* floribus lateralibus, fol. lanceolatis.
acinoides. 4. *Z.* floribus lateralibus, fol. ouatis.

37. MONARDA. *Cor.* inaequalis: labio ſuperiore lineari filamenta inuoluente. *Semina* 4.
32.

fiſtuloſa. 1. M. capit. terminalibus, caule obtuſangulo.
didyma. 2. M. flor. capitatis ſubdidynamis, caule acutangulo.
clinopod. 3. M. flor. capitatis, fol. laeuiſſimis ſerratis.
punctata. 4. M. flor. verticillatis, corollis punctatis, bracteis coloratis.
ciliata. 5. M. flor. verticillatis, corollis inuolucro longioribus.

38. ROSMARINVS. *Cor.* inaequalis, labio ſuperiore bipartito. *Filamenta* longa, curua, ſimplicia cum dente.
33.

officinalis. 1. ROSMARINVS.

39. SALVIA. *Cor.* inaequalis. *Filamenta* transuerſe pedicello affixa.
33.

aegyptiac. 1. S. fol. lanceolatis, denticulatis, flor. pedunculatis. Planta *pedalis*, *ſtricta*, *brachiata*. Folia *nuda*, *denticulata*, *ſcabra*, *ſubtus rugoſiſſima*. Spicae *quaſi ſpinoſae*. Flores *terni*, *pedicellati*, *minutiſſimi*. Corollae *albae*: *Lab. ſuperiore breuiſſimo*, *emarginato*, *non compreſſo*. *L. inferiore trifido*: *intermedia violacea punctata*. Stamina *parua antheris caeruleſcentibus*.
cretica. 2. S. fol. lanceolatis, calycibus diphyllis.

lyra-

lyrata. 3. S. fol. radicalibus lyratis dentatis, corollarum galea breuiſſima.

officinalis. 4. S. fol. lanceolato-ouatis integris crenulatis, flor. ſpicatis, calyc. acutis.

pomifera. 5. S. fol. lanceolato-ouatis integris crenulatis, flor. ſpicatis, calyc. obtuſis.

urticifol. 6. S. fol. ouato-oblongis duplicato-ſerratis, calyc. tridentatis: lacinia ſumma tridentata,
Corollae minutae: Lab. ſuperiore breui. Piſtillum lab. ſuperiore longius. ♄

ſerotina. 38. S. fol. cordatis ſerratis mollibus, flor. racemoſo-ſpicatis: corollis vix calycem excedentibus. *Mant. 25.*

viridis. 7. S. fol. oblongis crenatis, corollarum galea ſemi-orbiculata, calyc. fructiferis reflexis.

Hormin. 8. S. fol. obtuſis crenatis, bracteis ſummis ſterilibus maioribus coloratis.

ſylveſtris. 9. S. fol. cordato-lanceolatis undulatis biſerratis maculatis acutis, bract. coloratis flore breuioribus,

nemoroſa. 10. S. fol. cordato-lanceolatis ſerratis planis, bract. coloratis, corollæ labio infimo reflexo.

ſyriaca. 18. S. fol. cordatis dentatis: inferioribus repandis, bract. cordatis breuibus acutis, calyc. tomentoſis, Saluia caul. fruticoſo, fol. ouatis ſinuatis crenatis rugoſis hirtis. *Ard ſpec. 1. p. 9. t. 1.*

haematodes. 11. S. folio cordato-ouatis rugoſis tomentoſis, calyc. hiſpidis, rad. tuberoſa.
Caulis *erectus, viſcidus.* Folia *cordata, repanda, rugoſa, ſupra laeuia maculis ferrugineis: ſuprema parua, ſeſſilia.* Calyx *Lab. ſuperiore ſupra concauo, carinato, obtuſo, emarginato; L. inferiore bifido.* Corollae *caeruleae S. ſylueſtris: Lab. ſuperiore falcato. L. inferiore trifido: media latiſſima, emarginata, ſaccata, reflexa.* Stylus *galea longior*: Antherae *coadunatae, nigrae; polline luteo.*

pratenſis. 12. S. fol. cordato-oblongis crenatis; ſummis amplexicaulibus, verticillis ſubnudis, corollis galea glutinoſis.

dominic. 13. S. fol. cordatis obtuſis crenatis ſubtomentoſis, corollis calyce anguſtioribus.

Verbenae. 14. S. fol. ſerratis ſinuatis laeuiuſculis, coroll. calyce anguſtioribus. Saluia fol. pinnatifido-ſinuatis, corollae labiis approximatis. *Ger. prou. 258.*

clandeſtina. 15. S. fol. ſerratis pinnatifidis rugoſiſſimis; ſpica obtuſa, coroll. calyce anguſtioribus. Saluia fol. pinnato-dentatis aſperis hirſutis, verticillis piloſis, flor. apetalis. *Zinn. gœt.* 298. *Herba S. verbenacae foliis S. ceratophyllae.*

pyrenaic. 16. S. fol. obtuſis eroſis, ſtam. corolla duplo longioribus.

diſermas. 17. S. fol. cordato-oblongis eroſis, ſtaminibus corollam aequantibus.

mexican. 19. S. fol. ouatis vtrinque acuminatis ſerratis.

hiſpanica. 20. S. fol. ouatis petiolis vtrinque mucronatis, ſpic. imbricatis, calyc. trifidis.

indica. 21. S. fol. cordatis acute crenatis: ſummis ſeſſilibus, verticillis ſubnudis remotiſſimis.

verticillata. 22. S. fol. cordatis crenato-dentatis, verticillis ſubnudis, ſtylo corollae labio inferiore incumbente.

glutinoſa. 23. S. fol. cordato-ſagittatis ſerratis acutis.

canarienſis. 24. S. fol. haſtato-triangularibus oblongis crenatis obtuſis.

africana. 25. S. fol. ſubrotundis ſerratis: baſi truncatis dentatis.

aurea. 26. S. fol. ſubrotundis integerrimis: baſi truncatis dentatis.

colorata. 33. S. fol. ellipticis ſubintegerrimis tomentoſis, calyc. limbo membranaceo colorato.

paniculata. 34. S. fol. obouato-cuneiformibus denticulatis nudis, caul. fruteſcente. *Mant.* 25.

acetabuloſa. 35. S. fol. obouatis dentatis, cal. campanulatis patentibus piloſis, caul. fruticuloſo. *Mant.* 25.

aegyptiac. 36. S. fol. oblongis repandis, cal. ſpinoſis, bracteis cordatis mucronatis concauis. *Mant.* 26.

Sclarea. 27. S. fol. rugoſis cordatis oblongis villoſis ſerratis, bracteis coloratis calyce longioribus concauis acuminatis.

ceratophylla. 30. S. fol. rugoſis pinnatifidis lanatis, verticillis ſummis ſterilibus.

Aethiopis. 29. S. fol. oblongis eroſis lanatis, verticill. lanatis, corollae labio crenato, bract. recuruatis ſubſpinoſis.

pinnata. 31. S. foliis compoſitis pinnatis.

argentea. 28. S. fol. oblongis dentato-angulatis lanatis, verticillis ſummis ſterilibus; bracteis concauis.

cerato-phylloides. 37. S. fol. pinnatifidis rugoſis villoſis, caul. paniculato ramoſiſſimo. *Mant.* 26.

Forsko-hlei. 37. S. fol. lyrato-auriculatis, caul. ſubaphyllo, corollis galea ſemibifida. *Mant.* 26.

nutans. 32. S. fol. cordatis inaequaliter baſi exciſis, caule nudo, ſpic. ante floreſcentiam cernuis. *Act. petrop.* 1747. *t.* 14.

40. COLINSONIA. *Cor.* inaequalis: labio inferiore multifido, capillari. *Sem.* 1. perfectum.
39.

canadenſ. COLLINSONIA.

41. MORINA. *Cor.* inaequalis. *Cal. fructus* 1-phyllus, dentatus. *Cal. floris* bifidus. *Sem.* 1. ſub calyce floris.
39.

perſica. 1. MORINA.

DIGYNIA.

42. ANTHOXANTHVM. *Cal.* Gluma 2-valuis, 1-flora. *Cor.* Gluma 2-valuis, acuminata. *Sem.* 1.
40.

odoratum. 1. A. ſpica oblonga ouata, floſcul. ſubpedunculatis ariſta longioribus, *Stillingf. miſcel. t.* 1.

indicum. 2. A. ſpica lineari, floſcul. ſeſſilibus ariſta breuioribus.

paniculat. 3. A. floribus paniculatis.

TRIGYNIA.

43. PIPER. *Cal.* o. *Cor.* o. *Bucca* monoſperma.

nigrum. 1. P. fol. ouatis ſubſeptemneruiis glabris, petiolis ſimpliciſſimis.

Betle. 2. P. fol. oblongiuſculis acuminatis ſeptemneruiis, petiolis bidentatis.

Malamiris. 3. P. fol. ouatis acutiuſculis ſubtus ſcabris: neruis quinque ſubtus eleuatis.
Siriboa. 4. P. fol. inaequaliter cordatis ſubſeptemneruiis venoſis.
longum. 5. P. fol. cordatis petiolatis ſeſſilibusque.
decuman. 7. P. fol. cordatis nouemneruils reticulatis.
Amalago. 6. P. fol. lanceolato-ouatis quinqueneruiis rugoſis.
reticulat. 8. P. fol. cordatis quinqueneruiis reticulatis.
aduncum. 9. P. fol. ouato-lanceolatis: neruis alternis, ſpicis vncinatis.
pellucid. 10. P. fol. cordatis petiolatis, caule herbaceo. *Iacq. ſpec.* 16.
acuminat. 11. P. fol. lanceolato-ouatis neruoſis carnoſis.
obtuſifol. 12. P. fol. ouatis eneruiis.
rotundif. 13. P. fol. orbiculatis ſolitariis carnoſis. *Iacq. obſ.* 17.
maculoſum. 14. P. fol. peltatis ouatis.
peltatum. 15. P. fol. peltatis orbiculato-cordatis obtuſis repandis, ſpic. vmbellatis.
diſtachyon. 16. P. fol. ouatis, ſpicis coniugatis.
vmbellatum. 17. P. fol. cordatis ſubrotundis acutis venoſis, ſpic. vmbellatis.
trifolium. 18. P. fol. ternis ſubrotundis.
quadrifol. 19. P. fol. quaternis cuneiformibus ſeſſilibus.
veruicillatum. 20. P. fol. verticillatis ouatis trineruiis.

CLAS-

Piperis *ſpecies, imprimis* Saururi Plum. *in ſolo natali examinandae, vtrum differant a reliquis in partibus fructificationis.*

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Flores ſuperi.*

44. VALERIANA. *Cor* 5-fida, baſi gibba. *Sem.* vnicum.
50. MELOTHRIA. *Cor.* 5-fida, rotata. *Bacca* 3-locularis.
55. CROCVS. *Cor.* 6-petaloidea, erecto-patula. *Stigmata.* conuoluta, colorata.
59. IRIS. *Cor.* 6-petaloidea: Pet. alternis reflexis. *Stigma* petaloideum.
60. MORAEA. *Cor.* 6-petaloidea: Pet. omnibus patulis.
58. ANTHOLYZA. *Cor.* 6-fida, tubuloſa recuruata.
57. GLADIOLVS. *Cor.* 6-petaloidea: Pet. ſuperioribus 3-conuergentibus.
56. IXIA. *Cor.* 6-petaloidea, patens. *Stigm.* 3, ſimplicia.

* * *Flores inferi.*

61. WACHENDORFIA. *Cor.* 6-petaloidea, patens. *Cal.* nullus.
62. COMMELINA. *Cor.* 6-petala: Petalis 3 ſ. 4 calyciformibus. *Nectaria* cruciata, petiolata.
54. HIPPOCRATEA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-partitus. *Capſ.* 3, bialues.
52. LOEFLINGIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* 1-locularis.
46. TAMARINDVS. *Cor.* 3-petala. *Cal.* 4-partitus. *Legum.* ſuculentum.
63. CALLISIA. *Cor.* 3-petala. *Cal.* 3-phyllus. *Capſ.* 2-locularis.
47. RVMPHIA. *Cor.* 3-petala. *Cal.* 3-fidus. *Drupa* nucleo 3-loculari.
48. CNEORVM. *Cor.* 3-petala. *Cal.* 3-dentatus. *Bacca* 3. cocca.
64. XYRIS. *Cor.* 3-petala. *Cal.* 2-ualuis. *Capſ.* 3-locular.
49. CAMOCLADIA. *Cor.* 3-partita. *Cal.* 3-partitus. *Stylus.* o. *Drupa.*

45. Olax. *Cor.* 3-fida. *Cal.* integer. *Glans.*
51. Ortegia. *Cor.* nulla. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* 1-locular.
53. Polycnemvm. *Cor.* nulla. *Cal.* 5-phyllus, ſubtus 3-phyllus *Sem.* 1, nudum.

* * * *Flores Graminei valuulis Glumae calycinae.*

65. Schoenvs. *Cor.* nulla. *Cal.* paleis faſciculat. *Sem.* ſubrotund.
66. Cypervs. *Cor.* nulla. *Cal.* paleis diſtichis. *Sem.* nudum.
67. Scirpvs. *Cor.* nulla. *Cal.* paleis imbricatis. *Sem.* nudum.
68. Eriophorvm. *Cor.* nulla. *Cal.* paleis imbricatis. *Sem.* lanigerum.
69 Nardvs. *Cor.* biualuis. *Cal.* nullus. *Sem.* tectum.
70. Lygevm. *Cor.* 2-biualues. *Cal.* Spatha. *Sem.* 2-locular.

DIGYNIA.

* *Flores vniflori vagi.*

71. Bobartia. *Cal.* multiualuis, imbricatus.
76. Panicvm. *Cal.* 3-valuis: tertio dorſali minore.
72. Cornvcopiae. *Cal.* 2-valuis. *Corolla.* 1-valuis. *Iuuolucr.* commune 1-phyllum, multiflorum.
94. Aristida. *Cal.* 2-valuis. *Corolla* 1-valuis apice ariſtis 3.
78. Alopecvrvs. *Cal.* 2-valuis. *Corolla* 1-valuis apice ſimplici.
77. Phlevm. *Cal.* 2-valuis truncatus, mucronatus, ſeſſilis.
74. Phalaris. *Cal.* 2-valuis: valuis ca inatis, aequalibus, corollam includentibus.
75. Paspalvm. *Cal.* 2-valuis: valuis ſubrotundis figura corollae.
79. Milivm. *Cal.* 2-valuis: valuis ventricoſis corolla maioribus.
80. Agrostis. *Cal.* 2-valuis: valuis acutis corolla breuioribus.
86. Dactylis. *Cal.* 2-valuis: valua maiore longiore compreſſa carinata.
90. Stipa. *Cal.* 2-valuis. *Corolla* ariſta terminali inarticulata.
92. Lagvrvs. *Cal.* 2-valuis villoſus. *Cor.* ariſtis 2 terminalibus & 1 dorſali.
73. Saccharvm. *Cal.* nullus eiuſque loco lanugo.

† *Arundo epigeios, calamagroſtis, arenaria.*

* * *Flores biflori vagi.*

81. Aira. *Cal.* 2-valuis. *Floſculi* abſque rudimento tertii.

82. Me-

GRAMINA *reliqua ſecundum ſexum diſpoſita.*

Polygamia.
Aegilops
Cenchrus
Iſchaemum
Apluda
Holcus
Andropogon

Monoecia 3.
3. *Olyra*
Coix
Triculum
6. *Zizania*
Pharus

Hexandria.
Oryza.
Diandria.
Anthoxanthum.
Monandria.
Cinna.

82. MELICA. *Cal.* 2-valuis. *Rudimento* tertii inter floſculos.

† *Tripſacum hermaphroditum.*

*** *Flores multiflori vagi.*

85. UNIOLA. *Cal.* multiualuis, carinatus.
84. BRIZA. *Cal.* 2-valuis. *Cor.* cordata: valuis ventricoſis.
83. POA. *Cal.* 2-valuis. *Cor.* ouata: valuis acutiuſculis.
88. FESTVCA. *Cal.* 2-valuis. *Cor.* oblonga: valuis mucronatis.
89. BROMVS. *Cal.* 2-valuis. *Cor.* oblonga: valuis ſub apice ariſtatis.
91. AVENA. *Cal.* 2-valuis. *Cor.* oblonga: valuis dorſo ariſta contorta.
93. ARVNDO. *Cal.* 2-valuis. *Cor.* baſi lanatà, mutica.

* *Dactylis glomerata.*

**** *Flores multiflori, inſidentes Receptaculi elongati dentibus.*

97. SECALE. *Cal.* oppoſitus, biflorus, biualuis, ſolitarius.
99. TRITICVM. *Cal.* oppoſitus, multiflorus, biualuis, ſolitarius.
98. HORDEVM. *Cal.* lateralis, vniflorus, biualuis, ternus.
96. ELYMVS. *Cal.* lateralis, multiflorus, biualuis, binus ternuſue.
95. LOLIVM. *Cal.* lateralis, multiflorus, vniualuis, ſolitarius.
87. CYNOSVRVS. *Cal.* 2-valuis, multiflorus. *Recept.* proprium vnilaterale, foliaceum.

TRIGYNIA.

* *Flores inferi.*

104. HOLOSTEVM. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* apice dehiſcens.
105. POLYCARPON. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* 3-valuis.
109. LECHEA. *Cor.* 3-petala. *Cal.* 3-phyllus. *Capſ.* 3-cocca.
100. ERIOCAVLON. *Cor.* 3-petala. *Cal.* compoſit. *Sem.* 1, coronatum corolla.
101. MONTIA. *Cor.* 1-petala. *Cal.* 2-phyllus. *capſ.* 3-valuis, 3-ſperma.
106. MOLLVGO. *Cor.* nulla. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* 3-locularis.
107. MINVARTIA. *Cor.* nulla. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* 1-locularis, polyſperma.
108. QVERIA. *Cor.* nulla. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* 1-ſperma.
1241. KOENIGIA. *Cor.* nulla. *Cal.* 3-phyllus. *Sem.* 1, ouatum.
103. TRIPLARIS. *Cor.* nulla. *Cal.* 3-partitus. *Sem.* 1, calyce foliaceo patente.

* *Tillea.*

** *Flores ſuperi.*

102. PROSERPINACA. *Cor.* nulla. *Cal.* 3-partitus, ſuperus. *Sem.* 1. triloculare.

MONOGYNIA.

44. VALERIANA. *Cal.* o. *Cor.* 1-petala, basi hinc 44. gibba, supera. *Sem.* 1.

rubra. 1. V. flor. monandris caudatis, fol. lanceolatis integerrimis. *varietas β foliis linearibus octuplo angustioribus.*

calcitrap. 2. V. flor. monandris, fol. pinnatifidis.

cornucop. 3. V. flor. diandris ringentibus, fol. ouatis sessilibus.

dioica. 4. V. flor. triandris dioicis, fol. pinnatis integerrimis.

officinal. 5. V. flor. triandris, fol. omnibus pinnatis.

Phu. 6. V. flor. triandris, fol. caulinis pinnatis; radicalibus indiuisis.

tripteris. 7. V. flor. triandris, fol. dentatis: radicalibus cordatis; caulinis ternatis ouato-oblongis. *Iacq. vind.* 201.

montana. 8. V. flor. triandris, fol. ouato-oblongis subdentatis, caule simplici. *Iacq. vind.* 202. (*excluf. synonymo vltimo.*)

celtica. 9. V. flor. triandris, fol. ouato-oblongis obtusis integerrimis. *Jacq. vind.* 203.

tuberosa. 10. V. flor. triandris, fol. radicalibus lanceolatis integerrimis; reliquis pinnatifidis. *Ger. prou.* 218.

saxatilis. 11. V. flor. triandris, fol. subdentatis: radicalibus ouatis; caulinis lineari-lanceolatis. *Iacq. vind.* 204.

elongata. 17. V. flor. triandris, fol. radicalibus ouatis; caulinis cordatis sessilibus inciso-subhastatis. *Sp. pl.* 1664.

pyrenaica. 12. V. flor. triandris, fol. caulinis cordatis serratis petiolatis: summis ternatis.

scandens. 13. V. flor. triandris, fol. ternatis, caul. scandente.

chinensis. 14. V. flor. triandris, fol. omnibus cordatis repando-lobatis. *Burm. ind. t.* 6. *f.* 3.

Locusta. 16. V. flor. triandris, caule dichotomo, fol. linearibus.

olitoria. α. fructu simplici.

vesicaria. β. calycibus inflatis: dent. 6-inflexis; inuolucella 5-phylla, 3-flora.

coronata. γ. fructu sexdentato.

di-

Valeriana *maxime omnium differt fructificationis.* Corolla *regulari s. irregulari.* Stam. 1. 2. 3. 4. Fructu *monospermo s. dispermo, nudo coronato papposo*, &c.

discoidea. δ. fructu duodecim-dentato, hypocraterif. acuminibus retrorsum vncinatis.
dentata. ε. feminis corona tridentata.
radiata. ζ. inuolucro flores cingente.
pumila. η. caul. dichotomo, fol. imis dentatis: summis linearibus multifidis. *Sauu. monsp.* 13. *Gouan. hort.* 23. Valeriana semine vmbilicato rotundo nudo. *Tournef. inst.* 132. Phu minimum. *Lob. ic.* 716.
mixta. 17. V. flor. triandris, caule quadrifido, fol. imis bipinnatifidis, sem. pappo plumoso.
echinata. 15. V. flor. triandris regularibus, fol. dentatis, fructu lineari tridentato: extimo maiore recuruato. Valeriana flor. triandris, caul. dichotomo, pedunc. conicis. *Ger. prou.* 218.
supina. 19. V. flor. tetrandris, inuolucellis hexaphyllis trifloris, fol. integris. *Mant.* 27.
sibirica. 18. V. flor. tetrandris aequalibus, fol. pinnatifidis, sem. paleae ouali adnatis.

45. OLAX. *Cal.* integer. *Cor.* infundibuliformis, 3-fida. *Nectario* 4-phyllo.
48.

zeylanic. 1. OLAX.

46. TAMARINDVS. *Cal.* 4-partitus. *Petala* 3. *Nectarium* setis 2 breuibus sub filamentis. *Legumen* pulposum.
48.

indica. 1. TAMARINDVS. *Iacq. amer.* 10. *t.* 10.

47. RVMPHIA. *Cal.* 3-fidus. *Petala* 3. *Drupa* 3-locularis.
49.

amboinensis. 1. RVMPHIA.

48. CNEORVM. *Cal.* 3-dentatus. *Petala* 3, aequalia. *Bacca* 3-cocca.
49.

tricoccon. 1. CNEORVM.

49. CAMOCLADIA. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-partita. *Drupa* oblonga: nucleo bilobo.
49.

pinnatifol. 1. foliolis integris.
dentata. 2. C. foliolis ſpinoſo-dentatis. *Iacq. amer.* 13. *t.* 173. *f.* 4.

50. MELOTHRIA. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* campanulata, 1-petala. *Bacca* 3-locularis, polyſperma.
49.

pendula. 1. MELOTHRIA. *Pedunculi filiformes, laxi, vniflori; vidi duos flores maſculos praeter hermaphroditos.*

51. ORTEGIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0. *Capſ.* 1-locularis. *Sem.* plurima.
49.

hiſpanic. 1. ORTEGIA. Statura *Galii.* Caulis *erectus, rigens, ſcabriuſculus, vtrinque canaliculatus geniculis incraſſatis.* Folia *oppoſita, linearia, patentia, dorſo minime glabra.* Stipulae *binae vtrinque inter foliorum oppoſitiones, minutae, ſetaceae, baſi craſſiuſcula colorata.* Rami *alterni.* Panicula *terminalis, dichotoma.* Flores e *dichotomia breuiſſime pedunculati, uirides.* Stylus *filiformis.* Stigmata 3, *diſtincta, oblonga, pubeſcentia, ſingula ſtylo craſſiora. Affinis maxime Polycarpo.*

52. LOEFLINGIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala, minima. *Capſ.* 1-locularis, 3-valuis.

hiſpanica. 1. LOEFLINGIA.

53. POLYCNEMVM. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 5, calyciformia. *Sem.* 1, ſubnudum.
50.

aruenſe. 1. POLYCNEMVM. *Gou. hort.* 24.

54. HIP-

54. HIPPOCRATEA. *Cal.* 5-partitus. *Petala.* 5. *Capſ.* 3, obcordatae.
50.

volubilis. 1. HIPPOCRATEA. *Iacq. amer. t.* 9.

55. CROCVS. *Cor.* 6-partita, aequalis. *Stigmata* conuoluta.
50.

ſatiuus. 1. C. ſpatha vniualui radicali, corollae tubo longiſſimo.
officinalis. α. autumnalis *fol. anguſtioribus margine reuolutis.*
vernus. β. vernalis *fol. latioribus margine patulo.*

56. IXIA. *Cor.* 6-petala, patens, aequalis. *Stigmata* 3, erectiuſculo-patula.
51.

roſea. 12. I. ſcapo vnifloro aphyllo breuiſſimo. *Mill. ic.* 160. *t.* 240. *Dau. Royen.*
Bulbocodium. 1. I. ſcapo vnifloro breuiſſimo, fol. angulatis caulinis, ſtigmatibus ſextuplicibus.
vniflora. 11. I. ſcapo vnifloro, fol. enſiformibus, ſpatha lacera. *Mantiſſ.* 27.
corymboſ. 3. I. flor. corymboſis pedunculatis, caule ancipiti.
africana. 2. I. flor. capitatis, ſpathis laceris.
chinenſis. 9. I. fol. enſiformibus, panic. dichotoma, flor. pedunculatis. *Trew. ehret.* 23. *t.* 52.
bulbifera. 4. I. fol. linearibus, axillis bulbiferis, flor. alternis, ſtam. lateralibus. *Mill. ic.* 158. *t.* 236. *f.* 2.
flexuoſa. 5. I. fol. linearibus, racemo flexuoſo multifloro.
polyſtach. 6. I. fol. linearibus, ſcapo ſpicis pluribus.
ſcillaris. 7. I. fol. enſiformibus ſtriatis, ſpica elongata. *Bulbus deorſum imbricatus.*
maculata. 12. I. fol. enſiformibus, flor. alternis: petalis baſi obſcuris, *Sp. pl.* 1664. Ixia foliis gladioli glabris, floribus corymboſis terminalibus. *Mill. ic. t.* 156. *f.* 1. Siſyrinchium majus afric. flore luteo macula notato. *Old. afric.* 32.
crocata. 8. I. fol. enſiformibus, flor. alternis: petalis baſi hyalino-feneſtratis. Ixia planifolia, caule multifloro, ſpatha breuiſſima. *Mill. ic.* 160. *t.* 239. *f.* 2. *excluſis ſynonymis. Petala feneſtrata, vt alae Phalaenae Atlantis, ſingularia.*

hirſu-

hirſuta. 10. I. hirſutiſſima, vmbella bifida racemoſa. *Mant.* 27. *affinis Wachendorfiae, ſed germen inferum.*

57. GLADIOLVS. *Cor.* 6-partita, ringens. *Stamina* adſcendentia.
52.

commun. 1. G. fol. enſiformibus, flor. diſtantibus. Gladiolus floribus vno verſu diſpoſitis maior et procerior. *Bauh. pin.* 41. γ. Gladiolus vtrinque floridus. *Bauh. pin.* 41.

imbricat. 2. G. fol. enſiformibus, flor. imbricatis.

alatus. 4. G. fol. enſiformibus, petalis lateralibus latiſſimis.

plicatus. 5. G. fol. enſiformibus plicatis villoſis, ſcapo laterali, corollis regularibus.

triſtis. 6. G. fol. lineari-cruciatis, corollis campanulatis. Gladiolus floribus linearibus ſulcatis, flor. alternis, pet. acutioribus. *Mill. ic.* 157. *t.* 235. *f.* 1. *Breyn. prodr.* 3. *t.* 7. *f.* 1. *Corollae aeſtiuatio Gladioli: petalo ſupremo intra lateralia proxima.*

vndulatus. 7. G. fol. enſiformibus, petalis ſubaequalibus lanceolatis vndulatis. *Mant.* 27.

recuruus. 8. G. fol. enſiformibus, petalis ſubaequalibus lanceolatis recuruatis. *Mant.* 28.

ſpicatus. 3. G. fol. linearibus caule ſimpliciſſimo, flor. ſpicatis,

alopecuroides. 10. G. fol. linearibus, ſpica diſticha imbricata.

anguſtus. 7. G. fol. linearibus, flor. diſtantibus, corollarum tubo limbis longiore.

ramoſus. 8. G. caule ramoſo, fol. linearibus.

capitatus. 9. G. caule ramoſo, capit. pedunculatis, rad. tuberoſa.

58. ANTHOLYZA. *Cor.* tubuloſa, irregularis, re-
54. curuata. *Capſ.* infera.

ringens. 1. A. corollae labiis diuaricatis, fauce compreſſa.

Cunonia. 2. A corollis rectis: labii quinquepartiti lobis duobus externis latioribus adſcendentibus.

aethiopica. 3. A corollis incuruatis: labii quinquepartiti lobis duobus alternis patulis maioribus lanceolatis.

Mer-

Meriania. 4. A. flor. infundibuliformibus. Watſonia. *Mill. ic. t.* 276.

minor. *ß.* Watſonia humilis, fol. lineari enſiformibus., tubo floris longiſſimo. *Mill. ic.* 198. *t.* 297. *f.* 2. *floribus pallidis, longe tenuior.* Meriana *differt facie, ſed limites a Gladiolis et Ixiis ſeparantes non ſuccurrunt.*

59. IRIS. *Cor.* 6-partita: *Petalis* alternis reflexis. 55. *Stigmata* petaliformia.

* *Barbatae: nectariis petalorum reflexorum.*

ſuſiana. 1. I. corolla barbata, caule foliis longiore vnifloro.

florentina. 2. I. corollis barbatis, caule foliis altiore ſubbifloro, floribus ſeſſilibus.

germanica. 3. I. corollis barbatis, caul. foliis altiore multifloro, floribus inferioribus pedunculatis.

aphylla. 6. I. coroll. barbatis, ſcapo nudo longitudine foliorum multifloro.

ſambucina. 4. I. coroll. barbatis, caul. foliis altiore multifloro, petalis deflexis planis; erectis emarginatis.

ſqualens. 5. I. coroll. barbatis, caule foliis altiore multifloro, petalis deflexis replicatis; erectis emarginatis.

variegata 7. I. coroll. barbatis, caul. ſubfolioſo longitudine foliorum multifloro.

biflora. 8. I. coroll. barbatis, caul. foliis breuiore trifloro. Caulis *teres.* Folia *extrorſum ſubfalcata.* Germen *teres, exaratum* 3 *ſtriis.* Corollae *violaceae, non emarginatae.* Petala *erecta barba alba adiectis ſtriis albis ramoſis. Floret quotannis bis.*

pumila. 9. I. coroll. barbatis caul. foliis breuiore vnifloro.
ε. Iris anguſtifolia maritima minor. *Bauh. pin.* 33.
η. Chamaeiris flore luteo & pallide luteo. *Bauh. pin.* 34.
ϑ. Chamae Iris ſaxatilis gallica. *Bauh. pin.* 34. *Caulis interdum foliis longior euadit.*

** *Imberbes: petalis deflexis laeuibus.*

pſeud-Acorus 10. I. coroll. imberbibus, petalis interioribus ſtigmate minoribus, fol. enſiformibus.

foeti-

verſicolor. 13. I. coroll. imberbibus, germinibus ſubtrigonis, caul. tereti flexuoſo, fol. enſiformibus.

virginie. 14. I. coroll. imberbibus, germinibus trigonis, caul. ancipiti.

martinicenſis. 15. I. coroll. imberbibus, germinibus trigonis, petalis baſi foueolis glanduloſis. *Iacq. amer. 7. t. 7.*

ſpuria. 16. I. coroll. imberbibus, germinibus ſexangularibus: caul. tereti, fol. ſublinearibus.

graminea. 17. I. coroll. imberbibus, germinibus ſexangularibus, caule ancipiti, fol. linearibus.

verna. 18. I. coroll. imberbibus, caul. vnifloro foliis breuiore, rad. fibroſa.

tuberoſa. 19. I. coroll. imberbibus, fol. tetragonis.

Xiphium. 20. I. coroll. imberbibus, flor. binis, fol. ſubulato-canaliculatis caule breuioribus.

perſica. 21. I. corolla imberbi, petalis interioribus breuiſſimis patentiſſimis. I. bulboſa praecox minus odora perſica variegata. *Moriſ. hiſt. 2. p. 357. Foliis ſubulato-canaliculatis caule longioribus.*

Siſyrinchium. 22. I. coroll. imberbibus, fol. canaliculatis, bulb. geminis ſuperimpoſitis.

60. MORAEA. *Cor.* hexapetala; *Petala* 3 interiora patentia; reliqua Ireos. 59.

vegeta. 1. M. fol. canaliculatis.
α. Moraea ſpatha biflora, caule planifolio, flor. minoribus. *Mill. ic. 159. t. 138. f. 1.*
β. Moraea ſpatha vniflora, caul. planifolio, flor. maioribus. *Mill. ic. 159. t. 138. f. 2.*

iuncea. 2. M. fol. ſubulatis.

iridioides. 3. M. fol. enſiformibus. *Mant. 28. differt haec ab Iridibus corolla tota patente; modo haec ſuffeciant.*

foetidiſſima. 11. I. coroll. imberbibus: petalis interioribus patentiſſimis, caul. vnangulato, foliis enſiformibus.

ſibirica. 12. I. coroll. imberbibus, germinibus trigonis, caul. tereti, fol. linearibus.

61. WA-

61. WACHENDORFIA. *Cor.* hexapetala, inaequalis, infera. *Capſ.* trilocularis, ſupra.
59.

thyrſiflor. 1. W. ſcapo ſimplici.
paniculat. 2. W. ſcapo polyſtachyo. Erythrobulbus hellebori albiplicatis foliis. *Pluk. mant.* 70. f.

62. COMMELINA. *Cor.* 6-petala. *Nectaria.* 3, cruciata, filamentis propriis inſerta.
60.

* *Dipetalae ob duo petala maiora.*

commun. 1. C. coroll. inaequalibus, fol. ouato-lanceolatis acutis, caul. repente glabro.
africana. 2. C. coroll. inaequalibus, fol. lanceolatis glabris, caule decumbente.
benghalenſis. 3. C. corollis inaequalibus, fol. ouatis obtuſis, caule repente.
erecta. 4. C. coroll. inaequalibus, fol. ouato-lanceolatis, caule erecto ſubhirſuto ſimpliciſſimo.

** *Tripetalae*: Zanoniae Pl. *petalis* 3 *maioribus.*

virginica. 5. C. corollis ſubaequalibus, fol. lanceolatis ſubpetiolatis ore barbatis, caul. erectis.
tuberoſa. 6. C. coroll. aequalibus, fol. ſeſſilibus ouato-lanceolatis ſubciliatis.
Zanonia. 7. C. coroll. aequalibus, pedunc. incraſſatis, fol. lanceolatis: vaginis tumidis margine hirſutis, bracteis geminis.
nudiflora. 8. C. coroll. aequalibus, pedunc. capillaribus, fol. lineari-lanceolatis, inuolucro nullo.
axillaris. 9. C. coroll. aequalibus, flor. ſeſſilibus, fol. linearibus.

63. CALLISIA. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3. *Antherae* geminae. *Capſ.* bilocularis.
62.

repens. 1. CALLISIA. Hapalanthus repens. *Iacq. amer.* 12. *t.* 11.

64. XYRIS. *Cor.* 3-petala, aequalis, crenata. *Glumae.* 2-valves in capitulum. *Capſ.* ſupera.
62.

indica. XYRIS.

65. SCHOE-

65. SCHOENVS. *Glumae* paleaceae, vniualues, congeſtae. *Cor.* o. *Sem.* 1. ſubrotundum inter glumas. 62.

* *Culmo tereti.*

Mariſcus. 1. S. culmo tereti, fol. margine dorſoque aculeatis.

aculeatus. 2. S. culmo tereti ramoſo, capit. terminalibus, inuolucro triphyllo breuiſſimo rigido patente.

mucronatus. 3. S. culmo tereti nudo, ſpiculis ouatis faſciculatis, inuolucro ſubhexaphyllo, fol. canaliculatis. *Barr. ic.* 203. *f.* 1. Radix *repens.* Folia *plurima radicalia, in faſciculum collecta, longiſſima, canaliculata, ſubteretia, margine ſcabra (non carnoſa ſ. ſtupoſa; nec plana.* (Culmus *nudus, teres, firmus, laeuis, foliis craſſior longeque breuior.* Inuolucrum *triphyllum, foliis ſimile ſed breuius; interius adhuc tria folia breuiora.* Spicae *plurimae, ſeſſiles in capitulum, acutiuſculae, imbricatae ſquamis ouatis, concauis, acutis.* Filamenta 3, *linearia.* Germen *oblongum.* Stylus *ſimplex.* Stigmata 3, *oblonga.*

nigricans. 5. S. culmo tereti nudo, capit. ouato, inuolucri diphylli valuula altera ſubulata longa.

ferrugin. 6. S. culmo tereti nudo, ſpica duplici, inuolucri valvula maiore ſpicam aequante.

capenſis. 7. S. culmo tereti ramoſiſſimo vaginato, ſpicis ouatis nudis dichotomis pendulis. *Fructificationem obſcure vidi. Fructus inferus, triangulus, trilocularis.*

* * *Culmo triquetro.*

coloratus. 8. S. culmo triquetro, capitulo ſubrotundo: inuolucro longiſſimo plano variegato.

compreſſ. 10. S. culmo ſubtriquetro nudo, ſpica diſticha, inuolucro monophyllo.

glomeratus. 11. S. culmo triquetro folioſo, flor. faſciculatis, fol. planis, pedunc. lateralibus geminis.

albus. 12. S. culmo ſubtriquetro folioſo, flor. faſciculatis, fol. ſetaceis.

fuſcus. 9. S. culmo tereti folioſo, ſpiculis ſubfaſciculatis, fol. filiformibus canaliculatis. *Sp. pl.* 1664.

66. CY-

66. CYPERVS. *Glumae* paleaceae, diſtiche imbricatae, *Cor.* o. *Sem.* 1. nudum.

66.

* *Culmo tereti.*

articulat. 1. C. culmo tereti nudo articulato.

minimus. 2. C. culmo tereti nudo, ſpicis ſub apice.

* * *Culmo triquetro.*

ſquarroſ. 3. C. culmo triquetro folioſo, vmbella folioſa glomerata, ſpic. ſtriatis ſquarroſis.

Haſpan. 4. C. culmo triquetro folioſo, vmbella ſupradecompoſita, ſpiculis vmbellato-ſeſſilibus.

longus. 5. C. culmo triquetro folioſo, vmbella folioſa ſupradecompoſita, pedunc. nudis, ſpicis alternis.

eſculent. 7. C. culmo triquetro nudo, vmbella folioſa, radicum tuberibus ouatis: zonis imbricatis.

rotundus. 6. C. culmo triquetro ſubnudo, vmbella decompoſita, ſpic. alternis linearibus.

diſformis. 8. C. culmo triquetro ſubnudo, vmbella diphylla ſimplici trifida, ſpicis cuſpidatis: intermedia ſeſſili.

Iria. 9. C. culmo triquetro ſeminudo, vmbella folioſa decompoſita, ſpiculis alternis, granis diſtinctis.

elatus. 10. C. culmo triquetro nudo, vmbella folioſa ſupradecompoſita, ſpicis digitalibus imbricatis, ſpiculis ſubulatis.

glomerat. 12. C. culmo triquetro nudo, vmbella triphylla ſupradecompoſita, ſpicis glomerato-rotundatis, ſpiculis ſubulatis.

elegans. 11. C. culmo triquetro nudo, vmbella folioſa, pedunc. nudis proliferis, ſpicis confertis: mucronibus patulis.

odoratus. 13. C. culmo triquetro nudo, vmbella decompoſita ſimpliciter folioſa, pedicellis diſtiche ſpicatis.

compreſſus. 14. C. culmo triquetro nudo, vmbella vniuerſali triphylla, glumis mucronatis: lateribus membranaceis.

flaueſc. 15. C. culmo triquetro nudo, vmbella triphylla, pedunculis ſimplicibus inaequalibus, ſpicis confertis lanceolatis.

fuſcus. 16. C. culmo triquetro nudo, vmbella trifida, pedunculis ſimplicibus inaequalibus, ſpicis confertis linearibus. *Iacq. vind. 206.*

pumilus. 17. C. culmo triquetro nudo, vmbella diphylla compoſita, ſpiculis alterno-digitatis lanceolatis, glumis mucronatis. *Cent. 110.*

ſtrigoſus. 18. C. culmo triquetro nudo, vmbella ſimplici, ſpiculis linearibus confertiſſimis horizontalibus.

ligularis. 19. C. culmo triquetro, vmbellae ſpiculis capitatis oblongis ſeſſilibus inuolucris longiſſimis ſerrato-aſperis. *Sloan. iam. t. 9.*

Papyrus. 20. C. culmo triquetro nudo, vmbella ſimplici inuolucro breuiore, inuolucellis triphyllis ſetaceis longioribus, ſpiculis ternis.
Inuolucrum 8-*phyllum*, *vmbella breuius: foliolis exterioribus 4 latioribus.* Vmbella *vniuerſalis ſubaequalis*, *copioſiſſima*, *radiis baſi vaginatis.* Inuolucella *triphylla*, *ſetacea*, *erecta*, *longitudine inuolucri vniuerſalis:* Vmbellulae *pedunculis ternis*, *breuiſſimis.* Spiculae *plures*, *alternae*, *ſubulatae*, *ſeſſiles.*

alternifolius. 21. C. culmo triquetro nudo apice alternatim folioſo, pedunc. lateralibus proliferis. *Mant. 28.* * Schoenus ſpathaceus. *Sp. pl. 63. eſt omnino Cyperi ſpecies.*

67. SCIRPVS. *Glumae* paleaceae, vndique imbricatae. *Cor.* o. *Sem.* 1, imberbe. 70.

* *Spica vnica.*

mutatus. 4. S. culmo triquetro nudo, ſpica cylindrica terminali.

articulatus. 1. S. culmo tereti nudiuſculo ſemigeniculato, capitulo glomerato laterali.

paluſtris. 2. S. culmo tereti nudo, ſpica ſubouata terminali.

geniculat. 5. S. culmo tereti nudo, ſpica oblonga terminali.

caeſpitoſ. 6. S. culmo ſtriato nudo, ſpica biualui terminali longitudine calycis, radicibus ſquamula interſtinctis. *Oed. dan. t. 167.*

capitatus. 3. S. culmo tereti nudo ſetiformi, ſpica ſubgloboſa terminali.

articularis. 7. S. culmo tereti nudo ſetiformi, ſpica ouata biualui, ſeminibus nudis.

fluitans. 8. S. culmis teretibus nudis alternis, caule folioſo flaccido.

* * *Cul-*

* * *Culmo tereti polyſtachio.*

lacuſtris. 9. *S.* culmo tereti nudo, ſpicis ouatis pluribus pedunculatis terminalibus.

Holoſchoenus. 10. *S.* culmo tereti nudo, ſpicis ſubgloboſis glomeratis pedunculatis, inuolucro diphyllo inaequali mucronato. *Pluk. phyt. 40. f. 4.*

romanus. 11. *S.* culmo tereti nudo, capitulo laterali conglobato, bractea reflexa.

ſetaceus. 12. *S.* culmo nudo ſetaceo, ſpic. lateralibus ſubſolitariis ſeſſilibus.

ſupinus. 13. *S.* culmo tereti nudo, ſpic. ſeſſilibus in medio culmo glomeratis.

capillaris. 14. *S.* culmo nudo capillari, ſpicis pedunculatis ſeſſilibusque lateralibus.

* * * *Culmo triquetro, Panicula nuda.*

triqueter. 28. *S.* culmo triquetro nudo, ſpicis ſubſeſſilibus pedunculatisque, mucronem aequantibus. *Mant. 29.* *

mucronatus. 15. *S.* culmo triangulo nudo acuminato, ſpicis conglomeratis ſeſſilibus lateralibus. Scirpo-Cyperus panicula glomerata e ſpicis imbricatis compoſita. *Scheuch. gram. 404. t. 9. f. 14. Culmi triquetri, trianguli, tricarinati angulis compreſſis. Mucro floribus multo longior, ad latus reflexus.*

dichotomus. 16. *S.* culmo triquetro nudo, vmbella decompoſita, ſpic. dichotomiae ſeſſilibus.

echinatus. 17. *S.* culmo triquetro nudo, vmbella ſimplici, ſpicis ouatis.

retrofractus. 18. *S.* culmo triquetro, vmbella ſimplici, ſpicarum floſculis retrofractis.

ferrugin. 19. *S.* culmo triquetro ſubnudo, inuolucris longitudine paniculae ciliatis.

ſpadiceus. 20. *S.* culmo triquetro nudo, vmbella ſubnuda, ſpic. oblongis ſeſſilibus terminalibusque.

* * * * *Culmo triquetro, Panicula foliacea.*

miliaceus. 22. *S.* culmo triquetro nudo, vmbella ſupradecompoſita, ſpicis intermediis ſeſſilibus inuolucro ſetaceo.

maritim. 21. S. culmo triquetro, panicula conglobata foliacea, ſpicularum ſquamis trifidis: intermedia ſubulata. Cyperus rotundus vulgaris. *Bauh. pin. 13. Gerard.*

luzulae. 23. S. culmo triquetro nudo, vmbella folioſa prolifera, ſpiculis ſubrotundis.

ſyluatic. 24. S. culmo triquetro folioſo, vmbella foliacea, pedunculis nudis ſupradecompoſitis, ſpic. confertis.

corymboſus. 25. S. culmo triquetro folioſo, corymbis lateralibus ſimplicibus: terminali prolifero, ſpic. ſubulatis. *Cent. 112.*

michelianus. 26. S. culmo triquetro, capitulo globoſo, inuolucro polyphyllo longo.

* * * * * *Culmo triquetro. Capitulo terminali.*

cephalotes. 27. S. culmo triquetro nudo, capitulo ouato ſquarroſo, inuolucro triphyllo longo.

68. ERIOPHORVM. *Glumae* paleaceae, vndique imbricatae. *Cor.* o. *Sem.* 1. *Lana* longiſſima cinctum.

76.

vaginatum. 1. E. culmis vaginatis teretibus, ſpica ſcarioſa.
polyſtach. 2. E. culm. teretibus, fol. planis, ſpicis pedunculatis.
virginic. 3. E. culm. folioſis teretibus, fol. planis, ſpica erecta.
cyperinum. 4. E. culm. teretibus folioſis, panic. ſupradecompoſita prolifera, ſpiculis ſubternis.
alpinum. 5. E. culm. nudis triquetris, ſpica pappo breuiore.

69. NARDVS. *Cal.* o. *Cor.* 2-valuis.

77.

ſtricta. 1. N. ſpica ſetacea recta ſecunda.
gangitis. 2. N. ſpica recurua. *Obſcura, an N. ariſtati varietas?*
ariſtatus. 3. N. calycibus ariſtatis. Nardus *incuruus* ſpica incurua aequali, calycibus gluma exteriore ariſtato-acuminata, floribus diſtantibus alternis. *Gouan. monſp. 33.* Nardus ſpica ſubulata articulata incurua tereti. *Ger. prou. 73.*
ciliaris. 4. N. ſpica incurua ciliata.

70. LYGEVM. *Spatha* 1-phylla. *Corollae* binae fu-
78. pra idem germen. *Nux* bilocularis.

ſpartum. 1. LYGEVM.

DIGYNIA.

71. BOBARTIA. *Cal.* imbricatus. *Corolla* gluma,
78. biualui ſupera.

indica. 1. BOBARTIA.

72. CORNVCOPIAE. *Inuolucr.* 1-phyllum, infun-
79. dibulif. crenatum, multiflorum. *Calyx* 2-valuis. *Cor.* 1. valuis.

cucullat. 1. ſpica mutica, cucullo crenato.
alopecuroi-des. 2. C. ſpica ariſtata, cucullo hemiſphaerico recepta. *Mant. 29.* * *Alopecuro pratenſi valde affinis.*

73. SACCHARVM. *Cal.* o. ſed lanugo longa. *Cor.*
79. 2-valuis.

officinar. 1. S. floribus paniculatis.
ſpicatum. 2. S. floribus ſpicatis, fol. vndatis. *Cal. nullus. Cor. valuula vtraque ariſtata.*

74. PHALARIS. *Cal.* 2-valuis, carinatus, longitu-
79. dine aequalis, corollam includens.

canarien. 1. Ph. panicula ſubouata ſpeciformi, glumis carinatis.
bulboſa. 2. Ph. panic. cylindrica, glumis carinatis.
aquatica. 3. Ph. panic. ſpiciformi ouato-oblonga, glumis carinatis lanceolatis.

phleoides. 5. Ph. panic. cylindrica ſpiciformi, glabra paſſim viuipara. Gramen typhoides, ſpica purpuraſcente foliacea. *Scheuch. gram. 67. excluſo Gram. nis typh. aſper 1. ſynonymo.*

Spica pallens in lobos diuiſibilis, adſperſa hinc inde glumis viuiparis.

vtricula-ta. 4. Ph. panic. ſpicata, petalis ariſta articulata, vagina ſupremi folii ſpathiformi.

paradoxa. 9. Ph. panic. cylindrica, floſculis mucronatis: neutris plurimis; infimis praemorſis. *Sp. pl. 1665. Lin. dec. 35. t. 18.* Phalaris panicula ouato-oblonga apice dilatata. *Ger. prou. 75? praecedenti valde affinis.*

arundina-cea. 6. Ph. panic. oblonga ventricoſa ampla.

erucaef. 7. Ph. panic. ſecunda lineari, calycibus bifloris.

oryzoides. 8. Ph. panic. effuſa, glumarum carinis ciliatis. Homalo-cenchrus. *Act. Helu. 4. p. 307. Petalis. caret.*

75. PASPALVM. *Cal.* 2-valuis, orbiculatus. *Cor.* 81. eiusdem magnitudinis. *Stigmata* penicilliformia.

diſſectum. 1. P. ſpicis alternis, rachi membranacea, flor. alternis apice piloſis. *Folia vtrinque pubeſcentia.*

ſcrobiculatum. 5. P. ſpicis alternis, rachi membranacea, flor. alternis, calyc. multineruiis ſcrobiculatis. *Mant. 29.* *

virgatum. 2. P. ſpiculis paniculatis alternis baſi villoſis, flor. geminis. *Valuula calycis exterior breuiſſima margine hirſuta.*

paniculatum. 3. P. ſpicis paniculatis verticillato-aggregatis.

diſtichum. 4. P. ſpicis duabus altera ſeſſili, flor. acuminatis.

76. PANICVM. *Cal.* 3-valuis: valuula tertia minima. 82.

* *Spicata.*

alopecuroides. 1. P. ſpica tereti, inuolucris ſetaceis baſi ciliatis faſciculatis vnifloris floſculo quadruplo longioribus.

poly-

polyſtachion. 2. P. ſpic. teretibus, inuolucellis vnifloris faſciculato-ſetoſis, culmis erectis ſuperne ramoſis. *Culmus inferne radicans.*

verticillatum. 3. P. ſpic. verticillata, racemulis quaternis, inuolucell. vnifloris biſetis, culmis diffuſis.

glaucum. 4. P. ſpica tereti, inuolucellis bifloris faſciculato-piloſis, ſeminibus vndulato-rugoſis. *Pedunculus valde ſulcatus.*

viride. 5. P. ſpica tereti, inuolucellis bifloris faſciculato-piloſis, ſeminibus neruoſis.

italicum. 6. P. ſpica compoſita, ſpiculis glomeratis ſetis immixtis, pedunc. hirſutis.

Crus corui. 9. P. ſpic. alternis ſecundis, ſpiculis ſubdiuiſis, glumis ſubariſtatis hiſpidis, rachi trigona.

Crus galli. 8. P. ſpic. alternis coniugatisque, ſpiculis ſubdiuiſis, glumis ariſtatis hiſpidis, rachi quinquangulari.

colonum. 10. P. ſpiculis alternis ſecundis muticis ouatis ſcabris, rachi teretiuſcula.

dimidiatum. 12. P. ſpica dimidiata ſecunda, rachi lineari membranacea: extus floſculis aggregatis.

hirtellum. 7. P. ſpica compoſita: ſpiculis adpreſſis alternis, calycibus geminis: valuulis omnibus ariſtatis: extima longiſſima. Panicum *vndulatifolium*, fol. lanceolatis vndulatis, caule repente, geniculis radicatis. *Ard. ſpec. 2. p. 14. t. 4.* Gramen ſupinum, breui hirſuto folio, paniculis echinatis ſingularibus. *Bocc: muſ. 2. p. 66. t. 55.* Culmi *repentes.* Folia *vndulata. Florum* Ariſtae *filiformes, obtuſae, ſanguineae, glutinoſae, demum vncinatae.* Stamina Piſtillaque *alba; ex America facta Italica.*

ſanguinal. 13. P. ſpic. digitatis baſi interiore nodoſis, floſcul. geminis muticis, vaginis foliorum punctatis.

dactylon. 14. P. ſpicis digitatis patentibus: baſi interiore villoſis, flor. ſolitariis, ſarmentis repentibus.

filiforme. 15. P. ſpic. ſubdigitatis approximatis erectis filiformibus, rachi flexuoſa: dentibus bifloris: altero ſeſſili. *Culmi ſubaphylli.*

lineare. 16. P. ſpicis digitatis ſubquaternis linearibus, floſc. ſolitariis ſecundis muticis.

compoſit. 11. P. ſpica compoſita, ſpiculis linearibus ſecundis, floſc. geminis remotis, calycibus ariſtatis.

* *Paniculata.*

dichotom. 17. P. paniculis ſimplicibus, culmo ramoſo dichotomo.
ramoſum. 29. P. panicula ramis ſimplicibus, flor. ſubternis: inferiore ſubſeſſili, culmo ramoſo. *Mant. 29.*
coloratum. 30. P. panicula patente, ſtaminibus piſtillisque coloratis, culmo ramoſo. *Mant. 30.*
miliaceum. 23. P. panicula laxa flaccida, foliorum vaginis hirtis, glumis mucronatis neruoſis. *Culmus ramoſus.*
capillare. 20. P. panicula capillari erecta patente, foliorum vaginis hirtis.
groſſarium. 18. P. panicula ramis ſimplicibus, floribus geminis: pedicello altero breuiſſimo; altero longitudine floris.
latifolium. 24. P. panicula racemis lateralibus ſimplicibus, fol. ouato-lanceolatis collo piloſis.
clandeſtinum. 19. P. racemis occultatis intra foliorum vaginas.
breuifolium. 25. P. paniculatum, foliorum vaginis longitudinaliter ciliatis.
arboreſcens. 26 P. paniculatum ramoſiſſimum, fol. ouato-oblongis acuminatis.
virgatum. 28. P. panicula virgata, glum. acuminatis laeuibus: extima dehiſcente.
repens. 27. P. panicula virgata, fol. diuaricatis.
patens. 21. P. panicula oblonga flexuoſa capillari patente, calycibus bifloris, fol. lineari-lanceolatis, culmo radicante.
diuaricatum. 22. P. paniculis breuibus muticis, culmo ramoſiſſimo diuaricatiſſimo, pedicellis bifloris: alterno breuiore.

77. PHLEVM. *Cal.* 2-valuis, ſeſſilis, linearis, truncatus, apice bicuſpidato. *Cor.* incluſa. 87.

pratenſe. 1. P. ſpica cylindrica longiſſima ciliata, culmo erecto.
alpinum. 3. P. ſpica ouato-cylindracea. *Spica nigra.*
nodoſum. 2. P. ſpica cylindrica, culmo adſcendente, fol. obliquis, rad. bulboſa. *Spica glabra. Antherae albae.*
arenarium. 4. P. ſpic. ouata ciliata, culmo ramoſo.
choenoid. 5. P. ſpic. ouatis obuolutis, fol. breuiſſimis mucronatis amplexicaulibus.

78. ALO-

78. ALOPECVRVS. *Cal.* 2-valuis. *Cor.* 1-valuis. 88.

bulboſus. 7. A. culmo erecto, ſpica cylindrica, rad. bulboſa. *Sp. pl. 1665.*

pratenſ. 2. A. culmo ſpicato erecto, glumis villoſis, coroll. ariſtatis.

agreſtis. 2. A. culmo ſpicato erecto, glumis laeuibus. *Ger. prou. 74.* Alopecurus myoſuroides. *Huſſ. angl. 25.*

geniculat. 3. A. culmo ſpicato infracto, coroll. muticis *in lacubus natans eſt.*

hordeiform. 3. A. racemo ſimplici, floſc. ariſtis circumuallatis.

monſpelienſis. 4. A. panicula ſubſpicata, calycibus ſcabris, coroll. ariſtatis. Alopecurus ariſtatus. *Gouan. hort. 30.* Agroſtis panicula oblonga calycibus aequalibus terminatis ariſtis longis rectis. *Ger. prou. 80. Sub Calyce eſt tuberculum. Corolla breuiſſima.*

paniceus. 5. A. panicula ſubſpicata, glumis villoſis, corollis ariſtatis.

79. MILIVM. *Cal.* 2-valuis, vniflorus. *Corolla* breuiſſima. *Stigmata* penicilliformia. 90.

punctatum. 5. M. paniculae ramis ſimpliciſſimis, floribus alternis geminis ſecundis.

lendigerum. 4. M. panicula ſubſpicata, flor. ariſtatis. Agroſtis *ventricoſa* calycibus inferne ventricoſis: valuula exteriore acuminata longitudine ariſtae. *Gouan. hort. 39. 547. t. 1. f. 2.*

effuſum. 1. M. floribus paniculatis diſperſis muticis.

confert. 2. M. floribus paniculatis confertis.

paradox. 3. M. floribus paniculatis ariſtatis. Agroſtis panicula patente, petalorum ariſta terminali recurua. *Ger. prou. 81.* Agroſtis racemis ternatis pendulis, ſpiculis ariſtatis: ariſta vndulata longa. *Scop. carn. 136.* Agroſtis floſculis ariſtatis gemellis: altero ſterili; terminalibus ternatis. *Sauu. monſp. 35.*

80. AGROSTIS. *Cal.* 2-valuis, vniflorus, corolla
91. paulo minor. *Stigmata* longitudinaliter hiſpida.

* *Ariſtatae.*

ſpica venti. 1. A. petalo exteriore ariſta recta ſtricta longiſſima, panicula patula.

interrupt. 5. A. petalo exteriore ariſtato, panicula attenuata coarctata interrupta.

miliacea. 2. A. petalo exteriore ariſta terminali recta ſtricta mediocri.

bromoides. 16. A. panicula ſimplici anguſtata, corolla pubeſcente: ariſta recta calyce longiore. *Mant. 30.* *

auſtralis. 17. A. panicula ſubſpicata, ſeminibus ouatis pubeſcentibus: ariſta longitudine calycis. *Mant. 30.* *

arundinacea. 3. A. panicula oblonga, petalo exteriore baſi villoſo ariſtaque torta calyce longiore.

Calamagroſtis. 4. A. panicula incraſſata, petalo exteriore toto lanato apice ariſtato, culmo ramoſo. *Scheuch. gram. 140.*

ſerotina. 18. A. panicula floſculis oblongis mucronatis, culmo obtecto foliis breuiſſimis. *Mant. 30.* * Feſtuca ſerotina. *Sp. pl. 111.*

rubra. 6. A. paniculae parte florente patentiſſima, petalo exteriore glabro: ariſta terminali tortili recurua. *Hudſ. angl. 92.*

canina. 7. A. calycib. elongatis, petalorum ariſta dorſali, recurua, culmis proſtratis ſubramoſis. *Panicula elongata ſaepius, ramulis coarctata, purpuraſcens, Ariſta ſetacea, alba, floſculo duplo longiore, recta, medio notata geniculo fuſco.*

* * *Muticae.*

ſtolonifera. 8. A. paniculae ramulis patentibus muticis, culmo repente, calyc. aequalibus.

capillaris. 9. A. panicula capillari patente, calyc. ſubulatis aequalibus hiſpidiuſculis coloratis, floſculis muticis. *Stilling. miſc. t. 3.*

ſylua-

ſyluatica. 16. A. panicula coarctata mutica, calyc. aequalibus: virgineis corolla breuioribus, foecundatis duplo longioribus. *Sp. pl. 1665.*

alba. 10. A. panicula laxa, calyc. muticis aequalibus. Agroſtis *paluſtris* panicula coarctata mutica, calycibus aequalibus hiſpidiuſculis, culmo repente. *Hudſ. angl. 27.*

pumila. 19. A. panicula mutica ſecunda, culmis faſciculatis erectis. *Mant. 31.* *

minima. 11. A. panicula mutica filiformi. *Vernalis.*

virginic. 12. A. panicula contracta mutica, fol. inuoluto-ſubulatis rigidis exſtantibus.

mexicana. 20. A. panicula oblonga congeſta, calycibus corolliſque acuminatis ſubaequalibus muticis. *Mant. 31.* *

indica. 13. A. panicula contracta mutica, racem. lateralibus erectis alternis.

cruciata. 15. A. ſpicis quaternis cruciatis baſi glabris, valuulis petaloideis ariſtatis.

radiata. 14. A. ſpicis ſubquinis cruciatis baſi villoſis, valuulis petaloideis ariſtatis.

81. AIRA. *Cal.* 2-valuis, 2-florus. *Floſculi* absque interiecto rudimento. 94.

* *Muticae.*

indica. 1. A. ſpica ſubouata ſecunda, floſc. obtuſis muticis, fol. planis.

caerulea. 3. A. panic. coarctata, flor. pedunculatis muticis conuoluto-ſubulatis, fol. planis.

arundin. 4. A. panic. oblonga ſecunda mutica imbricata, fol. planis.

minuta. 5. A. panic. laxa ſubfaſtigiata ramoſiſſima, floſc. muticis.

aquatica. 6. A. panic. patente, flor. muticis laeuibus calyce longioribus, fol. planis. *Variat in loco ſicco calycibus 5-floris floſculis valde remotis. Schreber.*

* * *Ariſtatae.*

ſubſpicata. 7. A. fol. planis, panic. ſpicata, floſc. medio ariſtatis: ariſta reflexa laxiore.

caeſpi-

caeſpitoſa. 8. A. fol. planis, panicula patente, petalis baſi villoſis ariſtatisque: ariſta recta breui. *Oed. dan. 240.*

flexuoſa. 9. A. fol. ſetaceis, culmis ſubnudis, panicula diuaricata, pedunc. flexuoſis. *Oed. dan. 157.*

montana. 10. A. fol. ſetaceis, panicula anguſtata, floſc. baſi piloſis ariſtatis: ariſta tortili longiore. *Varietas praecedentis ſecundum Hudſ. angl. 30, ſed differt glumis baſi piloſis. Gerard.*

alpina. 11. A. fol. ſubulatis, panicula denſa, floſculis baſi piloſis ariſtatis: ariſta breui.

caneſcens. 12. A. fol. ſetaceis: ſummo ſpathaceo paniculam inferne obuoluente. *Panicula deflorata longius e vagina exit.*

praecox. 13. A. fol. ſetaceis: vaginis angulatis, flor. paniculato-ſpicatis, floſc. baſi ariſtatis. *Affinis praecedenti, ſed puſilla.*

caryophyllea. 14. A. fol. ſetaceis, panicula diuaricata, flor. ariſtatis diſtantibus. *Stillingf. miſcell. t. 5.*

82. MELICA. *Cal.* 2-valuis, 2-florus. *Rudimentum* 97. floris inter floſculos.

ciliata. 1. M. floſculi inferioris petalo exteriore ciliato.

nutans. 2. M. petalis imberbibus, panicula nutante ſimplici.

minuta. 5. M. culmo ramoſo, fol. ſetaceis, petalis imberbibus. *Mant. 32.* *

papilionacea. 4. M. calycis valuula inferiore maxima colorata, petalo exteriore ſubciliato. *Mant. 31.* *

altiſſima. 3. M. petalis imberbibus, panicula ramoſiſſima.

83. POA. *Cal.* 2-valuis, multiflorus. *Spicula* ouata: valuulis margine ſcarioſis acutiuſculis. 98.

aquatica. 1. P. panicula diffuſa, ſpicul. ſexfloris linearibus. *Floſculi 5-10.*

alpina. 3. P. panicula diffuſa ramoſiſſima, ſpicul. ſexfloris cordatis.

triuia-

triuialis. 4. P. panicula diffusa, spiculis trifloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti.

angustifolia. 5. P. panicula diffusa, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti.

pratensis. 6. P. panicula diffusa, spicul. quinquefloris glabris, culmo erecto tereti.

annua. 7. P. panicula diffusa angulis rectis, spicul. obtusis, culmo obliquo compresso. *Stillingf. t. 7.*

flaua. 8. P. panicula diffusa, spicul. ouato-oblongis nitidis.

pilosa. 9. P. panicula patente stricta: ramificationibus primariis pilosis.

palustris. 2. P. panicula diffusa, spiculis subtrifloris pubescentibus, fol. subtus scabris.

amabilis. 10. P. panicula patente, spicul. octodecim-floris linearibus. *Maxime affinis* P. Eragrostidi *floribus purpureis, glumis trineruiis, quarum inferiores sensim cadunt.*

Eragrostis. 11. P. panicula patente, pedicellis flexuosis, spicul. serratis decemfloris, glumis trineruiis.

capillaris. 12. P. panicula laxa patentissima capillari, fol. pilosis, culmo ramosissimo.

malabarica. 13. P. paniculae ramis simplicissimis, flor. sessilibus, sem. distantibus, culmo repente.

chinensis. 14. P. paniculae ramis simplicissimis, flor. sessilibus, sem. imbricatis, culmo erecto.

tenella. 25. P. panicula oblonga capillari subuerticillata, flosculi sexfloris minutissimis.

rigida. 16. P. panicula lanceolata subramosa secunda: ramulis alternis secundis. Poa panicula coarctata secunda, spiculis sexfloris linearibus alternis rigidis. *Ger. prou. 30.* Culmus *rigidus, breuissimus.* Panicula *lanceolata, rigida, decomposita:* Ramis *alternis, alternatim spiculatis, pedicellis rigidis, spica breuioribus.* Spiculae *suboctofloraе, lineares, acutae.* Flosculi *acutiusculi, apice subscarioſi.* Calyx *carinatus.*

compress. 17. P. panicula coarctata secunda, culmo obliquo compresso.

nemoralis. 18. P. panicula attenuata, spicul. subbifloris mucronati scabris, culmo incuruo.

bulbosa. 19. P. panicula secunda patentiuscula, spiculis quadrifloris.

ſpicata. 22. P. panicula ſpicata, floribus ſubulatis, floſculis remotis. *Mant. 32.* *

diſtans. 23. P. panicula ramis ſubdiuiſis, flor. quinquefloris: floſculis diſtantibus obtuſis. *Mant. 32.* *

criſtata. 21. P. panicula ſpicata, calyc. ſubpiloſis ſubquadrifloris pedunculo longioribus, petalis ariſtatis. Aira criſtata. *Sp. pl. 94.* 24.

ß. Feſtuca maritima. *Sp. pl. 110. cultura in hanc tranſiit.*

ciliaris. 20. P. panicula glomerata, glumarum valuulis interioribus piloſo-ciliatis.

84. BRIZA. *Cal.* 2-valuis, multiflorus. *Spicula* diſticha: valuulis cordatis, obtuſis: interiore minuta.

102.

minor. 1. B. ſpicul. triangulis, calyce floſculis longiore.

virens. 2. B. ſpiculis ouatis, calyce floſculis aequali.

media. 3. B. ſpicul. ouatis, calyce floſculis breuiore.

maxima. 4. B. ſpicul. cordatis: floſculis ſeptendecim. *Panicula potius Racemus eſt.*

Eragroſt. 5. B. ſpicul. lanceolatis: floſcul. viginti. *Culmi decumbentes ramoſi rigidi geniculis rubris. Ora folio oppoſita barbata. Spiculae fuſcae.*

Conf. Gramen filiceum, paniculis integris. *Moriſ. hiſt. 3. p. 204. ſ. 8. t. 6. f. 53. vix ſpecie diuerſum, ſed magis glabrum, panicula fere in ſpicam conglomerata, calycibus 20-floris.*

Poae Eragroſtidi *maxime affinis; an ſolo loco diuerſa?*

85. VNIOLA. *Cal.* multiualuis. *Spicula* ouata, carinata.

163.

panicul. 1. V. paniculata, ſpiculis ouatis.

bipinnata. 2. V. panicula ſubſpicata, racemis pinnatis ſubtus imbricatis.

mucronata. 3. V. ſpica diſticha, ſpiculis ouatis, calycibus ſubariſtatis.

ſpicata. 4. V. ſubſpicata, fol. inuolutis rigidis.

86. DACTYLIS. *Cal.* 2-valuis, compreſſus: altera valuula maiore carinata.

104.

cynoſuroides. 1. D. ſpic. ſparſis ſecundis ſcabris numeroſis.

glomerat. 2. D. panicula ſecunda glomerata. *Calyx 4-florus, vix tamen Feſtucis aſſociandа.*

lagopoides. 3. D. ſpicis ſubrotundis pubeſcentibus, culmo proſtrato ramoſo. *Mant. 33.* *

87. CYNOSVRVS. *Cal.* 2-valuis, multiflorus; *Receptac.* proprium vnilaterale, foliaceum.

105.

criſtatus. 1. C. bracteis pinnatifidis. *Stillingfl. miſcell. t. 11.*

echinat. 2. C. bracteis pinnato-paleaceis ariſtatis. Racemus *glomeratus, ſecundus.* Bracteae *ad flores tantum exterius, alternatim pinnatae, vniflorae, radiis in ariſtam deſinentibus.* Cal. *2-valuis, 2-florus, membranaceus, apice valde attenuatus.* Cor. *2-valuis apice exteriore Ariſta recta.* Stylus *bifidus.*

Lima. 3. C. ſpica ſecunda, calycis gluma interiore ſpiculis ſubiecta.

durus. 4. C. ſpiculis ſecundis alternis ſeſſilibus rigidis obtuſis appreſſis. *Sp. pl. 1677.*

caeruleus. 5. C. bracteis integris. Sesleria. *Ard. ſpec. 2. p. 18. t. 6. f. 3, 4, 5.*

Coracan. 9. C. ſpicis digitatis incuruatis, culmo compreſſo erecto, fol. ſuboppoſitis. *Spicularum Raches depreſſae, latere interiore Floribus alternis, extrorſum ſeſſilibus.* Flores *ouato-oblongi, compreſſi, mutici, rachi adpreſſi.* Calyces *4 flori valuula interiore inferiore et minore, vtraque vero compreſſa carinata, vti corolla.*

aegyptius. 7. C. ſpic. digitatis quaternis obtuſis patentiſſimis, calycibus mucronatis, caule repente, fol. oppoſitis. Caulis *laeuis, geniculatus, in genua procumbens.* Spiculae *4 ſ. 5, horizontales rachi mucronata vltra flores protenſa.* Flores *alterni, diſtichi.* Calyces *biflori, mutici.*

indi-

indicus. 8. C. spic. digitatis linearibus, culmo compresso declinato basi nodoso, fol. alternis. *Calyces subquadriflori.*

virgatus. 6. C. panicula ramis simplicibus, floribus sessilibus subsexfloris: vltimo sterili; infimis subaristatis.

aureus. 10. C. paniculae spiculis sterilibus pendulis ternatis, flor. aristatis.

88. FESTVCA. *Cal.* 2-valuis. *Spicula* oblonga, teretiuscula, glumis acuminatis. 108.

* *Panicula secunda.*

ouina. 1. F. panicula secunda coarctata aristata, culmo tetragono nudiusculo, fol. setaceis. *Stillingf. misc. t. 8.*

bromoides. 10. F. panicula secunda, spiculis erectis laeuibus, calycis valuula altera aristata. *Similis F. ouinae, sed foliis latioribus.*

reptatrix. 2. F. paniculae ramis simplicibus, spiculis subsessilibus.

duriuscula. 3. F. panicula secunda oblonga, spicul. oblongis laeuibus, fol. setaceis. Gramen foliis iunceis breuibus minus. *Bauh. pin. 5. Conuenit cum* F. dumetorum *Foliis radicalibus filiformibus canaliculatis; caulinis planis gramineis; differt vero Glumis laeuibus.* 24.

dumetor. 4. F. panicula spiciformi pubescente, foliis filiformibus.

rubra. 5. F. panicula secunda scabra, spicul. sexfloris aristatis: flosculo vltimo mutico, culmo semitereti.

amethystina. 6. F. panicula flexuosa, spicul. secundis inclinatis submuticis, foliis setaceis.

myurus. 8. F. panicula spicata nutante, calyc. minutissimis muticis, flor. scabris: aristis longis.

phoenicoides. 16. F. racemo indiuiso, spiculis alternis subsessilibus teretibus, fol. inuolutis mucronato-pungentibus. *Mant. 33.* *

* * *Panicula aequali.*

fusca. 7. F. panicula erecta ramosa, spicul. sessilibus carinatis muticis.

decum-

decumbens. 12. F. panicula erecta, spicul. subouatis muticis, calyce floseulis maiore, culmo decumbente.

elatior. 13. F. panicula secunda erecta, spicul. subaristatis: exterioribus teretibus. Gramen arundinaceum, locustis viridi-spadiceis loliaceis breuius aristatis. *Scheuch. gram.* 266.

fluitans. 14. F. panicula ramosa erecta, spicul. subsessilibus teretibus muticis. *Stillingf. misc. t.* 20.

cristata. 15. F. panicula spicata lobata, spicul. ouatis latis sexfloris hirsutis.

calycina. 11. F. panicula contracta, spiculis linearibus, calyce floseulis longiore, foliis basi barbatis.

89. BROMVS. *Cal.* 2-valuis. *Spicula* oblonga, teres, districha: arista infra apicem.

112.

secalinus. 1. B. panicula patente, spic. ouatis: aristis rectis, sem. distinctis.

mollis. 2. B. panicula erectiuscula, spic. ouatis pubescentibus: aristis rectis, fol. mollissime villosis.

squarrosus. 3. B. panicula nutante, spic. ouatis: aristis diuaricatis.

purgans. 4. B. panicula nutante crispa, fol. vtrinque nudis: vaginis pilosis, glumis villosis.

ciliatus. 5. B. panicula nutante, fol. vtrinque vaginisque subpilosis, glumis ciliatis.

sterilis. 6. B. panicula patula, spicul. oblongis distichis, glumis subulato-aristatis.

arvensis. 7. B. panicula nutante, spicul. ouato-oblongis.

geniculatus. 19. B. panicula erecta, floseulis distantibus, pedunculis angulatis, culmo genu procumbente. *Mant.* 33. *

tectorum. 8. B. panicula nutante, spicul. linearibus.

giganteus. 12. B. panicula nutante, spicul. quadrifloris: aristis breuioribus.

rubens. 10. B. panicula fasciculata, spicul. subsessilibus villosis: aristis erectis.

scoparius. 11. B. panicula fasciculata, spicul. subsessilibus glabris: aristis patulis.

rigens. 18. B. panicula spicata: spiculis subsessilibus erectis pubescentibus subquadrifloris. *Mant.* 33. *

racemoſus. 13 .B. racemo ſimpliciſſimo , pedunc. vnifloris, flor. ſex-floris laeuibus ariſtatis.

triflorus- 16. B. panicula patente, flor. ſubtrifloris.

madriten-ſis. 9. B. panicula rariore patulo-erecta, ſpiculis linearibus : intermediis geminis, pedicellis ſuperne incraſſatis.

ramoſus. 20. B. culmo ramoſiſſimo, ſpiculis ſeſſilibus, foliis inuoluto-ſubulatis. *Mant.* 34.*

pinnatus. 14. B. culmo indiuiſo, ſpicul. alternis ſubſeſſilibus teretibus ſubariſtatis. *Oed. dan. t.* 164. folia plana.

criſtatus. 15. B. ſpicul. diſtiche imbricatis ſeſſilibus depreſſis.

diſtachyos. 17. B. ſpicis duabus erectis alternis. Bromus ſpiculis ſubbinatis compreſſis ſeſſilibus. *Ger. prou.* 98. *t.* 3. *f.* 1. Feſtuca *ciliata* valuulis interioribus glumae corollinae ciliatis, panicula ſtricta ſecunda ſimplici. *Gouan. hort.* 48. 547. Gramen feſtuceum myurum elatius, ſpica heteromalla gracili. *Barr. ic.* 99. *f.* 2. *Spiculae ſeſſiles, plano obuerſae ſcapo , vt in Triticis , calyce acuto; in ſpontaneo ſpiculae* 2, *in culto* 3, *ariſtatae.*

90. STIPA. *Cal.* 2-valuis, vniflorus. *Cor.* valuula exteriore ariſta terminali : baſi articulata. 115.

pennata. 1. S. ariſtis lanatis.

iuncea. 3. S. ariſtis nudis rectis , calyc. ſemine longioribus , fol. intus laeuibus.

capillata. 2. S. ariſtis nudis curuatis , calyc. ſemine longioribus , fol. intus pubeſcentibus.

tenaciſſima. 4. S. ariſtis baſi pilloſis , panicula ſpicata , fol. filiformibus.

auenacea. 5. S. ariſtis nudis, calyc. ſemen aequantibus.

membran. 6. S. pedicellis dilatatis membranaceis. *Sp. pl.* 650.

arguens. 7. S. ariſtis nudis, bracteis baſi barbatis, floſcul. ſeſſili-faſciculatis.

ſpinifex. 8. S. floſculis muticis , bracteis capitulorum faſciculatis maximis mucronatis, *Mant.* 34. *

91. AVENA. *Cal.* 2valuis, multiflorus: arista dorsali contorta. 117.

sibirica. 1. A. paniculata, calyc, vnifloris, sem. hirsutis, aristis calyce triplo longioribus.

elatior. 2. A. paniculata, calyc. bifloris, flosc. hermaphrodito submutico, masculo aristato.

stipiformis. 15. A. paniculata, calyc. bifloris, aristis semine duplo longioribus, culmo ramoso. *Mant.* 34.*

pensylvanica. 3. A. panicula attenuata, calyc. bifloris, sem. villosis, aristis calyce duplo longioribus.

loeflingiana. 4. A. panicula contracta, flosc. binis, altero pedunculato, apice biaristatis, dorso arista reflexa. *Habitat vsque in Cap. b. spei.*

satiua. 5. A. paniculata, calycib. dispermis, sem. laeuibus altero aristato.

nuda. 6. A. paniculata, cal. trifloris, receptaculo calycem excedente, petalis, dorso aristatis.

fatua. 7. A. paniculata. calyc. trifloris, flosc. omnibus basi pilosis: aristis totis laeuibus.

sesquitertia. 15. A. paniculata, calyc. subtrifloris, flosc. omnibus aristatis, receptaculis barbatis. *Mant.* 34. *

pubescens. 13. A. subspicata, calyc. subtrifioris basi pilosis, fol. planis pubescentibus. *Sp. pl.* 1165.

sterilis. 8. A. paniculata, calyc. quinquefloris: exterioribus flosculis aristisque basi pillosis; interioribus muticis.

flauescens. 9. A. panicula laxa, calyc. trifloris breuibus, flosc. omnibus aristatis.

fragilis. 10. A. spicata, calyc. quadrifloris flosculo longioribus.

pratensis. 11. A. subspicata, calyc. quinquefloris.

spicata. 12. A. spicata, calyc. sexfloris longioribus: petalo exteriore apice aristato furcatoque.

bromoides. 14. A. subspicata, spicul. binatis: altera pedunculata, aristis diuaricatis, calyc. octofloris. *Sp. pl.* 1666.

92. LAGVRVS. *Cal.* 2-valuis: arista villosa. *Cor.* petalo exteriore aristis 2 terminalibus: tertia dorsali retorta. 119.

ouatus. 1. L. spica ouata aristata.

cylindricus. A. L. ſpica cylindrica mutica. *Ger. prou.* 104. Gramen pratenſe alopecuroides, ſericea panicula. *Barr. ic.* 11.

93. ARVNDO. *Cal.* 2-valuis. *Floſculi* congeſti, lana cincti. 120.

Bambos. 1. A. calyc. multifloris, ſpic. ternis ſeſſilibus.
Donax. 2. A. calyc. quinquefloris, panicula diffuſa.
phragm. 3. A. calyc. quinquefloris, panicula laxa.
epigeios. 4. A. calyc. vnifloris, panicula erecta, fol. ſubtus glabris.
Calamagroſtis. 5. A. calyc. vnifloris, laeuibus, coroll. lanuginoſis, culmo ramoſo.
arenaria. 6. A. calyc. vnifloris, fol. inuolutis mucronato pungentibus.

94. ARISTIDA. *Cal.* biualuis. *Cor.* vniualuis: ariſtis 3 terminalibus. 121.

adſcenſion. 1. A. panicula ramoſa, ſpicis ſparſis.
americ. 2. A. paniculae ramis ſimpliciſſimis, ſpicis alternis.
plumoſa. 3. A. paniculata, ariſta intermedia longiore lanata, culm. villoſis. *Sp. pl.* 1666.

95. LOLIVM. *Cal.* 1-phyllus, fixus, multiflorus. 122.

perenne. 1. L. ſpica mutica, ſpicul. compreſſis multifloris.
tenue. 2. L. ſpica mutica tereti: ſpiculis trifloris.
temulent. 3. L. ſpica ariſtata, ſpicul. compreſſis multifloris.

96. ELYMVS. *Cal.* lateralis, 2-valuis, aggregatus, multiflorus. 122.

arenarius. 1. E. ſpica erecta arcta, calyc. tomentoſis floſculo longioribus.
ſibiric. 3. E. ſpica pendula arcta, ſpicul. binatis calyce longioribus.
philadelphicus. 2. E. ſpica pendula patula, ſpiculis ſexfloris: inferioribus ternatis.

cana-

canadenſis. 4. E. ſpica nutante patula, ſpiculis inferioribus ternatis; ſuperioribus binatis.
caninus. 8. E. ſpica nutante arcta, ſpiculis rectis inuolucro deſtitutis: infimis geminis.
virginic. 5. E. ſpica erecta, ſpiculis 3-floris, inuolucro ſtriato
europaeus. 9. E. ſpica erecta: ſpiculis biſloris inuolucro aequalibus. *Mant.* 35.
Cap. med. 6. E ſpiculis biſloris, inuolucris ſetaceis patentiſſimis.
Hyſtrix. 7. E. ſpica erecta, ſpiculis inuolucro deſtitutis patentibus. *Sp. pl.* 560.

97. SECALE. *Cal.* oppoſitus, 2-valuis, 2-florus, ſolitarius. 124.

cereale. 1. S. glumarum ciliis ſcabris. *Habitat in Creta.*
villoſum. 2. S. glumarum ciliis villoſis, ſquamis calycinis cunei-formibus.
orientale. 3. S. glumis hirſutis, ſquamis calycinis ſubulatis.
creticum. 4. S. glumis extrorſum ciliatis.

98. HORDEVM. *Cal.* lateralis, biualuis, vniflorus, ternus. 125.

vulgare. 1. H. floſculis omnibus hermaphroditis ariſtatis: ordinibus duobus erectioribus.
hexaſticon. 2. H. floſculis omnibus hermaphroditis ariſtatis, ſem. ſexfariam aequaliter poſitis.
diſtichon. 3. H. floſculis lateralibus maſculis muticis, ſem. angularibus imbricatis. *Habitat ad Samaram* Tatariae *fluuium.*
Zeocriton. 4. H. floſculis lateralibus maſculis muticis, ſem. angularibus patentibus corticatis.
bulboſum. 5. H. floſculis omnibus ternis fertilibus ariſtatis, inuolucris ſetaceis ciliatis.
nodoſum. 7. H. floſculis lateralibus maſculis muticis, inuoluc. ſetaceis laeuibus: *Radix bulboſa, copioſa.* Floſculi *laterales muti ci: intermedio ariſtato. Inuolucella ſunt vere ariſtata, ariſtis purpuraſcentibus, floſculo ſuo longioribus* (ergo minimo *deleatur.*)

murinum, 6. H. floſculis lateralibus maſculis ariſtatis, inuolucris intermediis ciliatis.

iubatum. 8. H. ariſtis inuolucrisque ſetaceis longiſſimis.

99. TRITICVM. *Cal.* 2-valuis, ſolitarius, ſubtri- 126. florus. *Flos* obtuſiuſculus, acutus.

* *Annua.*

aeſtiuum. 1. T. calyc. quadrifloris ventricoſis glabris imbricatis ariſtatis.

hybernum. 2. T. calyc. quadrifloris ventricoſis laeuibus imbricatis ſubmuticis.

turgidum. 3. T. calyc. quadrifloris ventricoſis villoſis imbricatis obtuſis.

polonicum. 4. T. calyc. bifloris nudis, floſculis longiſſime ariſtatis, racheos dentibus barbatis.

Spelta. 5. T. calyc. quadrifloris truncatis, floſculis ariſtatis hermaphroditis: intermedio neutro.

monococ. 6. T. calyc. ſubtrifloris: primo ariſtato, intermedio ſterili.

* * *Perennia.*

iuncum. 8. T. calyc. quinquefloris truncatis, fol. inuolutis.

repens. 9. T. calyc. quadrifloris ſubulatis acuminatis, fol. planis.

maritimum. 10. T. calyc. multifloris, floſculis mucronatis, ſpica ramoſa. Feſtuca panicula coarctata ſecunda, ſpicul. rigidis, pedicell. acutangulis. *Ger. prou.* 94. Poa ſpicata, ſpicul. alternis ſeſſilibus ſubſexfloris. *Hudſ. angl.* 35. Gramen pumilum loliaceo ſimile, *Rai. angl.* 3. *p.* 395. Gramen exile duriuſculum maritimum, foliol. circumuolutis ſubiunceis breuibus. *Pluk. phyt.* 32. *f.* 7. Gramen maritimum, paniculis aſperis loliaceis. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 135. *t.* 95. Gramen caninum maritimum paniculatum. *Rai. hiſt.* 1286.

tenellum. 7. T. calycibus ſubquadrifloris, floſc. muticis acutis, fol. ſetaceis. Feſtuca ſpica ſecunda recta, ſpicul. compreſſis ſubariſtatis. *Ger. prou.* 96.

vnilaterale. 11. T. calycibus vnilateralibus alternis muticis. *Mantiſſ.* 35.

TRI-

TRIGYNIA.

100. ERIOCAVLON. *Cal.* communis, capitulum imbricatum. *Petala* 3, aequalia. *Stam.* ſupra germen. 128.

triangulare. 1. E. culmo triangulari, fol. enſiformibus, capitulo ouato.
quinquan. 2. E. culmo quinquangulari, fol. enſiformibus.
ſexangul. 3. E. culmo ſexangulari, fol. enſiformibus.
ſetaceum. 4. E. culmo ſexangulari, fol. ſetaceis.
decangul. 5. E. culmo decangulari, fol. enſiformibus.

301. MONTIA. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 1-petala, irregularis. *Capſ.* 1-locularis, 3-valuis. 129.

fontana, 1. MONTIA. *Oed. dan. t.* 151.

102. PROSERPINACA. *Cal.* 3-partitus, ſuperus. *Cor.* 0. *Sem.* 1. triloculare. 129.

paluſtris. 1. PROSERPINACA.

103. TRIPLARIS. *Cal.* maximus, tripartitus. *Cor.* 0. *Antherae* lineares. *Nux* triquetra intra calycis baſin ouatam. 130.

america. A. TRIPLARIS. Triplaris *pyramidalis* ſpicis erectis terminalibus. *Iacq. amer.* 13. *t.* 173. *f.* 5.

104. HOLOSTEVM. *Cal.* 5-phyllus. *Petala.* 5. *Capſ.* 1-locularis, ſubcylindracea, apice dehiſcens.

cordatum. 1. H. foliis ſubcordatis. *Fabr. helmſt.* 184. *Petala alba ſubtrifida, calyce minora.*
ſucculent. 2. H. foliis ellipticis carnoſis.
hirſutum. 3. H. foliis orbiculatis hirſutis.
vmbellat. 4. H. floribus vmbellatis.

1241. KOENIGIA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* nulla. *Sem.* 1, ouatum, nudum.

islandica. 1. KOENIGIA. *Mant.* 35. *

1105. POLYCARPON. *Cal.* 5-phyllus. *Petala.* 5, minima, ouata. *Capſ.* 1-locularis, 3-valuis.
131.

tetraphylla. 1. POLYCARPON.

1106. MOLLVGO. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0. *Capſ.* 3-locularis, 3-valuis.
132.

oppoſitifolia. 1. M. fol. oppoſitis lanceolatis, ramis alternis, pedunc. lateralibus confertis vnifloris.

ſtricta. 2. M. fol. ſubquaternis lanceolatis, flor. paniculatis nutantibus, caule erecto angulato. Alſine multiflora floribunda glabra bengalenſis. *Pluk. phyt.* 21. *t.* 256. *f.* 2. Alſine erecta pentaphylla, flore albo. *Burm. zeyl.* 13. *t.* 7. *f.* 1. *Paniculae foliis longiores, primo ſecundoque dichotomae. dein racemoſae. Flores nutantes; albi, ſimillimi M. verticillatae.* ⊙.

Spergula. 4. M. fol. quinis obouatis, ramis alternis. pedunc. vnifloris.

pentaph. 3. M. fol. quinis obouatis aequalibus, flor. paniculatis.

verticillata. 5. M. fol. verticillatis cuneiformibus acutis, caule ſubdiuiſo decumbente, pedunc. vnifloris,

1107. MINVARTIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0. *Capſ.* 1-locularis, 3-valuis. *Sem.* nonnulla.
132.

dichotoma. 1. M. flor. confertis dichotomiae.

campeſtris. 2. M. flor. terminalibus alternis, bractea longioribus.

montana. 3. M, flor. lateralibus alternis bractea breuioribus.

108. QVERIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. *Capſ.* 1-lo-
132. cularis, 3-valuis. *Sem.* 1.

hiſpanica. 1. Q. floribus confertis.
canadenſ. 2. Q. flor. ſolitariis, caule dichotomo.

109. LECHEA. *Cal.* 3-phyllus. *Petala.* 3, linearia.
133. *Capſ.* 3-locularis, 3-valuis: valuulis totidem inferioribus. *Sem.* 1

minor, 1, L. fol. lineari-lanceolatis, flor. paniculatis.
maior. 2. L. fol. ouato-lanceolatis, flor. lateralibus vagis.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Fl. monopetali ſ. dipetali, monoſpermi, inferi.*

110. LEVCADENDRON. *Corollulae* 2-petallae : altero trifido. *Sem.* pappo piloſo. *Stamina* intra apices petali.

111. PROTEA. *Corollulae.* 1-petalaè, regulares. *Sem.* pappo nudis.

112. GLOBVLARIA. *Corollulae* 1-petalae, irregulares. *Sem.* pappo nudis.

** *Fl. monopetali, monoſpermi, ſupperi.* aggregati.

113. CEPHALANTHVS. *Cal.* communis o. *Recept.* globoſum. villoſum. *Sem.* lanuginoſa.

114. DIPSACVS. *Cal.* communis foliaceus. *Recept.* conicum, paleaceum. *Sem.* columnaria.

115. SCABIOSA. *Cal.* communis. *Recept.* eleuatum, ſubpalaceum. *Sem.* coronata, inuoluta.

116. KNAVTIA. *Cal.* communis oblongus. *Recept.* planum, nudum. *Sem.* apice villoſa.

117. ALLIONIA. *Cal.* commun. 3-phyllus, 3-florus, *Proprius* ſuperus o. *Sem.* nuda.

* *Valeriana ſibirica.*

*** *Fl. monopetali, monocarpi, inferi.*

136. AQVARTIA. *Cor.* rotata. *Cal.* ſubquadrifidus. *Bacca* polyſperma.

135. CALLICARPA. *Cor.* tubuloſa. *Cal.* 4-fidus. *Bacca* 4-ſperma.

143. SCOPARIA. *Cor.* rotata. *Cal.* 4-partitus. *Capſ.* 1-locularis, 2-valuis.

145. CENTVNCVLVS. *Cor.* rotata. *Cal.* 4-partitus. *Capſ.* 1-locularis, circumſciſſa.

142. PLANTAGO. *Cor.* refracta. *Cal.* 4-partitus. *Capſ.* 2-locularis, circumſciſſa.

137. POLYPREMVM. *Cor.* rotata. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 2-locularis, emarginata.

140. BVDDLEIA. *Cor.* campanulata. *Cal.* 4-fidus. *Capſ.* 2-locularis, biſulca.

141. EXACVM. *Cor.* ſubcampanulata. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 2-locularis, compreſſa.

138. PENAEA. *Cor.* campanulata. *Cal.* 2-phyllus. *Capſ.* 4-locularis, 4-valuis.

139. BLAERIA. *Cor.* ſubcampanulata. *Cal.* 4-partitus. *Capſ.* 4-locularis, angulis dehiſcens.

* *Swertia corniculata, dichotoma.*
* *Gentianae quadrifidae.*

Fl. monopetali, monocarpi, ſuperi.

128. FVCHSIA. *Cor.* 8-fida. *Cal.* integer. *Bacca* 4-locularis, polyſperma.

132. PAVETTA. *Cor.* tubuloſa. *Cal.* 4-dentatus. *Bacca.* 1-ſperma.

131. IXORA. *Cor.* tubuloſa. *Cal.* 4-partitus. *Bacca* 2-locularis. *Sem.* 2.

133. PETESIA. *Cor.* tubuloſa. *Cal* 4-dentatus. *Bacca* 2-locularis, polyſperma.

130. CATESBAEA. *Cor.* tubuloſa. *Cal.* 4-dentatus. *Bacca* 1-iocularis, polyſperma.

134. MITCHELLA. *Cor.* 2, tubuloſae. *Cal.* 4-dentatus. *Bacca* 4-ſperma, biflora, bifida.

118. HEDYOTIS. *Cor.* tubuloſa. *Cal.* 4-partitus. *Capſ.* didyma, polyſperma, apice dehiſcens.

154. OLDENLANDIA. *Cor.* tubuloſa. *Cal.* 4-partitus. *Capſ.* didyma, polyſperma, dehiſcens inter dentes.

146. SANGVISORBA. *Cor.* plana. *Cal.* 2-phyllus. *Capſ.* 4-gona, inter calycem et corollam.

* *Coffea occidentalis.*
* *Peplis tetrandra.*

Fl. monopetali, dicocci, inferi.

124. HOVSTONIA. *Cor.* tubuloſa. *Cal.* 4-dentatus. *Capſ.* 2-locularis, 2-valuis.

1242. SCABRITA. *Cor.* tubuloſa. *Cal.* tubuloſus, truncatus. *Sem.* compreſſa, emarginata.

Fl. monopetali, dicocci, ſuperi. Stellatae.

127. RVBIA. *Cor.* campanulata. *Fructus* baccati.

125. GALIVM. *Cor.* plana. *Fructus.* ſubgloboſi.

121. ASPERVLA. *Cor.* tubuloſa. *Fructus.* ſubgloboſi.

120. SHERARDIA. *Cor.* tubuloſa. *Fructus.* coronatus. *Sem.* 3-dentatis.

119. SPERMACOCE. *Cor.* tubulosa. *Fructus.* coronatus. *Sem.* 2-dentatis.

123. KNOXIA. *Cor.* tubulosa. *Fructus.* bipartibilis, sulcatus.

112. DIODIA. *Cor.* tubulosa. *Fructus.* tetragonus, coronatus, 2-valuis.

126. CRVCIANELLA. *Car.* tubulosa, aristata. *Fructus* nudus. *Sem.* linearia.

Fl. monopetali, tetracocci, inferi.

129. SIPHONANTHVS. *Cor.* tubulosa. *Cal.* 5-partitus. *Baccae* 4. 1-spermae.

Fl. tetrapetali, inferi.

148. EPIMEDIVM. *Petala* Nectar. 4, incumb. *Cal.* 4-phyllus. *Siliqua* 1-locularis.

144. RHACOMA. *Pet.* fimbriata, *Cal.* 4-fidus. *Capf.* 1-sperma.

152. PTELEA. *Pet.* coriacea. *Cal.* 4-partitus. *Drupa* exsucca, compressa.

151. TOMEX. *Pet.* oblonga. *Cal.* tubulosus. *Bacca.*

150. FAGARA. *Pet.* staminibus breuiora. *Cal.* 4-fidus. *Capf.* 2-valuis, 1-sperma.

155. AMMANNIA. *Pet.* rarissime praesentia. *Cal.* tubulosus, 8-dent. *Capf.* 4-locularis.

* *Cardamine hirsuta.*
* *Euonymus europaeus.*

Fl. tetrapetali, superi.

157. TRAPA. *Cal.* 4-partitus. *Nux* armata spinis conicis, oppositis.

147. CISSVS. *Cal.* cingens germen. *Bacca* 1-sperma.

149. CORNVS. *Cal.* 4-dentatus, deciduus. *Drupa* nucleo 2-loculari.

153. LVDWIGIA. *Cal.* 4-partitus. *Capf.* 4-locularis, tetragona.

Fl. incompleti, inferi.

1244. STRVTHIOLA. *Cor.* 4-fida. *Bacca* 1-sperma, sicca. *Nectar* 8-glandulis.

160. BRABEIVM. *Cor.* 4-petala. *Drupa* sicca. *Nux* ouata.

161. KRAMERIA. *Cor.* 4-petala. *Bacca* sicca, 1-sperma, echinata.

162. RIVINA. *Cor.* 4-petala. *Bacca* 1-sperma. *Sem.* scabrum.

163. SALVADORA. *Cal.* 4-fidus. *Bacca* 1-sperma. *Sem.* arillatum.

164. CA-

164. CAMPHOROSMA. *Cal.* 4-fidus. *Capſ.* 1-ſperma.
165. ALCHEMILLA. *Cal.* 8 fidus. *Sem.* 1, calyce incluſum.
158. DORSTENIA. *Cal. Receptac.* planum, carnoſum, commune.
1243. COMETES. *Vmbella* 4-phylla, 3-flora. *Capſ.* 3-cocca.
* *Corchorus coreta.*
* *Ammannia.*
* *Conuallaria bifolia.*

Fl. incompleti, ſuperi.
156. ISNARDIA. *Cal.* campanulatus, perſiſtens. *Capſ.* 4-locularis.
159. ELAEAGNVS. *Cal.* campanulatus, deciduus. *Drupa.*

DIGYNIA.

168. BVFONIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 1-locularis, 2-valuis, 2-ſperma.
171. HYPECOVM. *Cor.* 4-petala, inaequalis. *Cal.* 2-phyllus. *Siliqua.*
169. HAMAMELIS. *Cor.* 4-petala, longiſſima. *Cal.* duplex. *Nux* bilocularis, bicornis.
170. CVSCVTA. *Cor.* 4-fida, ouata. *Cal.* 4-fidus. *Capſ.* 2-locularis, circumſciſſa.
166. APHANES. *Cor.* o. *Cal.* 8-fidus. *Sem.* 2.
167. CRVZITA. *Cor.* o. *Cal.* 4-phyllus: exterior 3-phyllus. *Sem.* 1.
* *Herniaria fruticoſa.*
* *Gentiana.*
* *Swertia.*

TETRAGYNIA.

172. ILEX. *Cor.* 1-petala. *Cal.* 4-dentatus. *Bacca.* 4-ſperma.
173. COLDENIA. *Cor.* 1-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Sem.* 2, bilocularia.
176. SAGINA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Capſul.* 4 locularis, polyſperma.
177. TILLAEA. *Cor.* 3. ſ. 4-petala. *Cal.* 3. ſ. 4-phyllus. *Capſ.* 3. ſ. 4, polyſpermae.
178. MYGINDA. *Cor* 4-petala. *Cal.* 4-partitus. *Drupa.* 1-ſperma.
174. POTAMOGETON. *Cor.* o. *Cal.* 4-phyllus. *Sem.* 4, ſeſſilia.
175. RVPPIA. *Cor.* o. *Cal.* o. *Sem.* 4, pedicellata.

MO-

MONOGYNIA.

110. LEVCADENDRON. *Floſculi* 2-petali: altero 3-fido. *Recept.* ſubuilloſum. *Cal.* proprius 0. *Antherae* ſubconnatae.
134.

pinifolium. 16. L. fol. linearibus, floſculis disiunctis racemoſis ſpicatis. *Mant.* 36. *
racemoſ. 1. L. fol. ſetaceis, floſculis disjunctis racemoſis.
proteoid. 2. L. fol. ſubulatis, ramis determinatis, flor. terminalibus.
cancellat. 3. L. fol. ſubulatis, ramis ſparſis, flor. lateralibus.
Serraria. 14. L. fol. ſetaceis multifidis, flor. lateralibus.
cyanoides 13. L. fol. ſetaceis ſemitrifidis, floſculis glomeratis.
Lepidocarpod. 4. L. fol. lanceolatis, flor. oblongis, calycum ſquamis ſummis hirſutis.
ſpecioſum. 15. L. fol. lanceolatis integris, calyc. ſtrobiliformibus tomentoſis apice penicillatis. *Mant.* 36. *
repens. 5. L. fol. lanceolatis, flor. oblongis, calycum ſquamis glabris.
acaulon. 6. L. fol. lanceolatis, flor. ſubrotundis, caule ſuffruticoſo vnifloro.
Scolymocephalum. 7. L. fol. lanceolatis, flor. ſubrotundis, caule frutiçoſo ramoſo.
cynaroides. 8. L. fol. integris, flor. depreſſis, corollarum limbis cylindricis.
hirtum. 9. L. fol. lanceolatis apice calloſis, caule hirſuto, flor. ſparſis axillaribus.
cucullat. 10. L. fol. calloſo-tricuſpidatis inuoluentibus flores laterales.
Hypophyll. 11. L. fol. calloſo-triſcuſpidatis lanceolatis, calycibus turbinatis nudis.
conocarp. 12. L. foliis calloſo-quinquedentatis.

111. PROTEA. *Petalum* 4-fidum, germen cingens, *Cal.* proprius 0. *Recept.* paleaceum.
137.

argentea. 1. P fol. lanceolatis obliquis acutis ſparſis, villoſo-ſericeis planis: floralibus verticillatis.

coni-

conifera. 2. P. fol. lineari lanceolatis integerrimis acutis glabris obliquis.

Leuiſanus. 3. P. fol. ſpatulatis. Brunia Leuiſanus. *Sp. pl.* 289.

112. GLOBVLARIA. *Cal. commun.* imbricatus; *proprius* tubulatus, inferus *Corollul.* labio ſuperiore 2-partito: inferiore 3-partito. *Recept.* paleaceum.

139.

Alypum. 1. G. caule fruticoſo, fol. lanceolatis tridentatis integrisque.

biſnagarica. 2. G. caule fruticoſo, fol. radicalibus cuneiformibus retuſis, caulinis lanceolatis.

vulgaris. 3. G. caule herbaceo, fol. radicalibus tridentatis, caulinis lanceolatis.

ſpinoſa. 4. G. fol. radicalibus crenato-aculeatis, caulinis integerrimis mucronatis.

cordifol. 5. G. caule ſubnudo, fol. cuneiformibus tricuſpidatis: intermedio minimo.

nudicaul. 6. G. caule nudo, fol. integerrimis lanceolatis. *Caulis fructifer vno alteroue foliolo. Ger.*

orientalis. 7. G. caule ſubnudo, capitulis alternis ſeſſilibus, fol. lanceolato-ouatis integris.

113. CEPHALANTHVS. *Cal. communis* o: *proprius* ſuperus, infundibuliformis. *Recept.* globoſum, nudum. *Sem.* 1. lanuginoſum.

138.

occidental. 1. C. fol. oppoſitis ternatisque.

11. DIPSACVS. *Cal. commun.* polyphyllus; *proprius* ſuperus. *Recept.* paleaceum.

fullonum. 1. D. foliis ſeſſilibus ſerratis, *β* paleis recuruatis.

laciniatus. 2. D. foliis conatis ſinuatis.

piloſus. 3. D. foliis petiolatis appendiculatis-

115. SCABIOSA. *Cal commun.* polyphyllus; *proprius* duplex ſuperus. *Recept.* paleaceum ſ. nudum.
141.

* *Corollulis quadrifidis.*

alpina. 1. S. corollulis quadrifidis aequalibus, cal. imbricatis, flor. cernuis, fol. pinnatis: foliolis lanceolatis ſerratis.

rigida. 5. S. corollulis quadrifidis ſubradiantibus, cal. imbribricatis obtuſis, fol. lanceolatis ſerratis auriculatis.

tranſylvanica. 2. S. corollulis quadrifidis aequalibus, calyc. paleisque ariſtatis, fol. radicalibus lyratis; caulinis pinnatifidis.

ſyriaca. 3. S. corollulis quadrifidis aequalibus, calycibus imbricatis paleisque ariſtatis, caul. dichotomo, fol. lanceolatis. *Caulis piloſus. Folia ſerrata. Flores in dichotomia ſubſeſſiles. Calyx vix vllus, ſed Paleae in conum ouatum imbricatae, ariſtatae, ouatae. Pappus hemiſphaericus, denticulis* 20.

leucantha. 4. S. corollulis quadrifidis ſubaequalibns, ſquamis calycinis ouatis obtuſis, fol. pinnatifidis. *Folia linearia, pinnata? foliolis decurrentibus; infima ſcabra. Flores ſubgloboſi, albi. Calyx hemiſphaericus, imbricatus. Corollulae lacinia inferior deflexa, paulo longior.*

Succiſa. 6. S. corollulis quadrifidis aequalibus, caule ſimplici, ramis approximatis, fol. lanceolato-ouatis.

integrif. 7. S. corollulis quadrifidis radiantibus, fol. indiuiſis; radicalibus ouatis ſerratis, rameis lanceolatis: caule herbaceo. Scabioſa corollulis quadrifidis, caule fiſtuloſo. *Ger. prou.* 220. (*excluſis C. Bauhini et Cluſii ſynonymis.*)

tatarica. 9. S. corollulis quadrifidis radiantibus, fol. lanceolatis pinnatifidis: lobis imbricatis, caul. hiſpido.

eruenſis. 10. S. corollulis quadrifidis radiantibus, fol. pinnatifidis inciſis, caul. hiſpido.

ſyluatica. 8. S. corollulis quadrifidis radiantibus, fol. omnibus indiuiſis ouato-oblongis ſerratis, caul. hiſpido. *Iacq. vind.* 22. *obſ.* 28.

** Ce-

** * Corollulis quinquefidis.*

gramuntia. 11. S. corollulis quinquefidis, cal. breuissimis, fol. caulinis bipinnatis filiformibus. *Sauu. monsp. 268. Gou. monsp. 62.* Scabiosa corollulis quinquefidis, foliis tripinnatis setaceis. *Ger. prou. 220.* Scabiosa capitulo globoso minor. *Bauh. pin. 270. sec. Gouan.*

columbaria. 12. S. corollulis quinquefidis radiantibus, fol. radicalibus ouatis crenatis, caulinis pinnatis setaceis. Scabiosa glabra, foliis carnosis virentibus. *Herm. par. 221. t. 221.* (*exclude β varietatem.*)

maritima. 13. S. corollulis quinquefidis radiantibus calycę breuioribus, fol. pinnatis: summis linearibus integerrimis.

stellata. 15. S. corollulis quinquefidis radiantibus, fol. dissectis, receptaculis florum subrotundis. *Pappus seminum limbo 40 radiato.*

prolifera. 16. S. corollulis quinquefidis radiantibus, flor. subsessilibus, caul. prolifero, fol. indiuisis. *Affinis S. stellatae. Habitat in Aegypto.* ☉

atropurpurea. 17. S. corollulis quinquefidis radiantibus, fol. dissectis, receptaculis florum subulatis. *Calyx 12-phyllus, linearis, recuruatus, longitud. corollae.*

argentea. 18. S. corollulis quinquefidis radiantibus, fol. pinnatifidis: laciniis linearibus, pedunc. longissimis, caul. tereti. Caulis *pilis albis, raris. Folia pinnatifida, linearia: radicalia subdentata; caulina indiuisa, versus basin ciliata. Calyx basi valde pilosus, 8-phyllus, recuruatus, corollae longitudine. Corollae albidae: limbo caerulescente. Corollulae radii 6, radiantes maiores: Lab. super. breuissimo, bifido. Lab. infer. lato, trifido, obtuso, subplicato, aequali. Corollulae disci albi, quinquefidi regulares, extus hirsutae. Stamina alba.*

africana. 19. S. corollulis quinquefidis aequalibus fol. simplicibus incisis, caule fruticoso.

cretica. 20. S. corollulis quinquefidis, fol. lanceolatis subintegerrimis, caule fruticoso.

graminif. 21. S. corollulis quinquefidis, fol. linear-lanceolatis integerrimis, caule herbaceo.

palaestina. 25. S. corollulis quinquefidis radiantibus: laciniis omnibus trifidis, fol. indiuisis subserratis: summis basi pinnatifidis. *Mant. 37.* *

iserensis. 26. S. corollulis quinquefidis radiantibus calyce longioribus, foliis bipinnatis linearibus. *Mant. 37.* *

ucranica. 14. S. corollulis quinquefidis radiantibus, fol. radicalibus pinnatifidis: caulinis linearibus basi ciliatis.

ochroleuc. 23. S. corollulis quinquefidis radiantibus, foliis bipinnatis linearibus. Scabiosa angustifolia alba altera. *Bauh. pin. 270. Barr. ic. 770. f. 2. affinis S. columbariae.*

papposa. 24. S. corollulis quinquefidis inaequalibus, caule herbaceo erecto, fol. pinnatifidis, seminib. aristatis plumoso-que-papposis. *Caulis filiformis, brachiatus panicula subdichotoma. Pedunculi axillares, filiformes, longi. Calyx polyphyllus; foliolis ouatis, longe acuminatis. Semina pappo plumoso cum adiacente Arista crassiore longiore. Subtomentosa sunt pedunculi et calyces.* ⊙

pterocephala. 22. S. corollulis quinquefidis, caule fruticoso procumbente, fol. laciniatis hirsutis, pappo plumoso.

116. KNAUTIA. *Cal. commun.* oblongus, simplex, quinqueflorus; *proprius* simplex. superus. *Corollulae* irregulares. *Recept.* nudum.
146.

orientalis. 1. K. fol. incisis, corollulis quinis calyce longioribus.

propontica. 2. K. fol. superioribus lanceolatis integerrimis, corollulis denis calyce aequalibus. *Sp. pl. 1666.*

117. ALLIONIA. *Cal. commun.* oblongus, simplex, triflorus; *proprius* obsoletus, superus. *Corollulae* irregulares. *Recept.* nudum.
174.

violacea. 1. A. fol. cordatis, calycibus quinquefidis.

incarnat. 2. A. fol. oblique ouatis, calycibus triphyllis.

118. HEDYOTIS. *Cor.* 1-petala, infundibulif. *Capſ.* 2-locularis, polyſperma, infera. 147.

fruticoſa. 1. H. fol. lanceolatis petiolatis, corymbis terminalibus inuoluratis.
Auricul. 2. H. fol. lanceolato-ouatis, floribus verticillatis.
herbacea. 3. H. fol. lineari-lanceolatis, caule herbaceo dichotomo, pedunculis geminis.

1242. SCABRITA. *Cor.* 1-petala, hypocrateriformis. *Sem.* 2, emarginata, ſupera. *Cal.* truncatus.

ſcabra. 1. SCABRITA. *Mant.* 37. *

119. SPERMACOCE. *Cor.* 1-petala, infundibulif. *Semina* 2, bidentata. 147.

tenuior. 1. S. glabra, fol. linearibus, ſtamin. incluſis, flor. verticillatis.
verticillata. 2. S. glabra, fol. lanceolatis, verticillis globoſis.
hirta. 3. S. ſcabra, fol. oblongis: ſummis quaternis, flor. verticillatis. ⊙ *Caulis tetragonus angulis acutiſſimis deorſum piloſis, ceterum glaber, ramoſiſſimus, rigidus.* Folia *elliptica, lineata, ſcabra vtrinque (ſubtus vero imprimis neruis), non villoſa ſubpetiolata petiolis connexis membrana multifeta.* Flores *albi, tubuloſi, laterales.* Stamina *fauce longiora.* Antherae *violaceae.*
hiſpida. 5. S. hiſpida, fol. obouatis. *Valde affinis S. hirtae.* Folia *ſuperiora quaterna omnia, neque lineata, neque neruoſa.* Calycis *laciniae longitudine ventris.* Capſula *2-locularis* Seminibus 2, *oblongis, laeuibus, extus conuexis.*
procumbens. 6. S. procumbens, fol. linearibus, corymb. lateralibus pedunculatis.
ſpinoſa. 4. S. ſuffruticoſa, fol. linearibus ſpinulis ciliatis.

120. SHERARDIA. *Cor.* 1-petala, infundibulif. 149. *Semina* 2, tridentata.

aruenſis. 1. S. fol. omnibus verticillatis, floribus terminalibus.

muralis. 2. S. foliis floralibus binis oppoſitis binis floribus. Galium fol. ſenis linearibus, ramis ſimplicibus, fructibus hiſpidis ſubſeſſilibus. *Ger. prou. 227. Allion. nicaeenſ. 4.*

fruticoſa. 3. S. foliis quaternis aequalibus, caule fruticoſo.

121. ASPERVLA. *Cor.* 1-petala, infundibulif. 150. *Semina* 2, globoſa.

odorata. 1. A. fol. octonis lanceolatis, florum faſciculis pedunculatis.

aruenſis. 2. A. fol. ſenis, flor. ſeſſilibus terminalibus aggregatis.

taurina. 3. A. fol. quaternis ouato-lanceolatis, flor. faſciculatis terminalibus. *Rami alterni. Pedunculi alterni, 1, 2. Flores faſciculati Bracteis ciliatis. Flores omnes hermaphroditi Piſtillo bipartito, quod rarius ante marceſcentiam floris excreſcit.*

craſſifolia. 7. A. fol. quaternis oblongis lateralibus reuolutis obtuſiuſculis pubeſcentibus. *Mant. 37.* *

tinctoria. 4. A. fol. linearibus: inferioribus ſenis; intermediis quaternis, caule flaccido, flor. plerisque trifidis.

pyrenaic. 5. A. fol. quaternis lanceolato-linearibus, caule erecto, floribus ſaepius trifidis.

cynanchica. 6. A. fol. quaternis linearibus: ſuperioribus oppoſitis, caule erecto, flor. quadrifidis.

laeuigata. 8. A. fol. quaternis ellipticis eneruiis laeuiuſculis, pedunc. trichotomis, ſem. laeuibus. *Mant. 38.*

122. DIODIA. *Cor.* 1-petala, infundibulif. 151. *Capſula* 2-locularis, 2-ſperma.

virginica. 1. DIODIA.

123. KNOXIA. *Cor.* 1-petala, infundibulif. *Sem.* 2, ſulcata: *calycis* vnicum folium maius. 151.

zeylanic. 1. KNOXIA.

124. HOVSTONIA. *Cor.* 1-petala, infundibulif. *Capſ.* 2-locularis, 2-ſperma, ſupera. 152.

caerulea. 1. H. foliis radicalibus ouatis, caule compoſito, pedunculis primis bifloris.

purpurea. 2. H. fol. ouato-lanceolatis, corymbis terminalibus, flor. ſuperis. *(an diuerſi generis?)*

125. GALIVM. *Cor.* 1-petala, plana. *Sem.* 2, ſubrotunda. 152.

* *Fructu glabro.*

rubioides. 2. G. foliis quaternis lanceolato-ouatis aequalibus ſubtus ſcabris, caule erecto, fructibus glabris. *Hall. emend. 206.*

paluſtre. 3. G. fol. quaternis obouatis inaequalibus, caulibus diffuſis.

bermudianum. 4. G. fol. quaternis linearibus obtuſis, ramis ramoſiſſimis.

trifidum. 5. G. fol. quaternis linearibus, caule procumbente ſcabro, corollis trifidis.

montanum. 15. G. fol. ſubquaternis linearibus laeuibus, caul. debili ſcabro, ſem. glabris.

tinctorium. 6. G. fol. linearibus caulinis ſenis; ramorum quaternis, caule flaccido, pedunc. ſubbifloris, fructibus glabris.

vliginoſum. 7. G. fol. ſenis lanceolatis retrorſum ſerrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu maioribus. *Fl. ſuec. 2. n. 127.*

ſpurium. 8. G. fol. ſenis lanceolatis carinatis ſcabris retrorſum aculeatis, geniculis ſimplicibus, fructibus glabris.

ſaxatile. 9. G. fol. ſenis obouatis obtuſis, caule ramoſiſſimo procumbente.

minutum. 10. G. fol. octonis lanceolatis mucronatis ferrato-aculeatis glabris incuruis, fructibus reflexis.

pusillum. 11. G. fol. octonis hispidis linearibus acuminatis subimbricatis, pedunc. dichotomis.

verum. 12. G. foliis octonis lincaribus sulcatis, ramis floriferis breuibus. *Antherae defloratae fiunt fuscae.*

Mollugo. 14. G. fol octonis ouato-linearibus subserratis patentissimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus.

sylvaticum. 13. G. fol. octonis laeuibus subtus scabris: floralibus binis, pedunc. capillaribus, caul. laeui. *Flores ante florescentiam nutantes. D. Schreber.*

aristatum. 1. G. fol. octonis lanceolatis laeuibus, panicula capillari, petalis aristatis, sem. glabris. Galium laeuigatum. *Sp. pl. 1667.* Galium *hericum*, caule debili, foliis octonis lanceolato-linearibus mucronatis, floribus aristatis. *Turr. diar. ital. 1764. v. 119. Habitat. in* Baldo.

hierosolymitanum. 18. G. fol. denis lanceolato-linearibus, vmbellis fastigiatis, fructibus glabris.

glaucum. 16. G. foliis verticillatis linearibus, pedunc. dichotomis, caule laeui.

purpureum. 17. G. fol. verticillatis lineari-setaceis, pedunc. capillaribus folio longioribus.

rubrum. 19. G. fol. verticillatis linearibus patulis, pedunc. breuissimis.

* * *Fructu hispido.*

boreale. 20. G. fol. quaternis lanceolatis trineruiis glabris, caule erecto, sem. hispidis.

maritimum. 24. G. fol. quaternis hispidis, pedunc. vnifloris, fructibus villosis. *Mant. 38.* *

rotundifol. 21. G. fol. quaternis ouatis obtusis aculeato-ciliatis, sem. hispidis.

graecum. 25. G. hirtum, fol. subsenis lineari-lanceolatis, caul. lignosis. *Mant. 38.* *

Aparine. 22. G. fol. octonis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fruct. hispidis.

parisiens. 23. G. fol. verticillatis linearibus, pedunc. bifloris, fructibus hispidis.

126. CRVCIANELLA. *Cor.* 1-petala. infundibulif. tubo filiformi; limbo vnguiculato. *Cal.* 2-phyllus. *Sem.* 2, linearia.
157.

anguſtif. 1. C. erecta, fol. ſenis linearibus, flor. ſpicatis.
latifolia. 2. C. procumbens, fol. quaternis lanceolatis, flor. ſpicatis. *Variat caule erecto.*
aegyptiaca. 6. C. fol. quaternis ſublinearibus, flor. ſpicatis quinquefidis. *Mant. 38.* *
patula. 3. C. diffuſa, fol. ſenis, flor. ſparſis.
maritima. 4. C. procumbens ſuffruticoſa, fol. quaternis mucronatis, flor. oppoſitis quinquefidis.
monſpeliaca. 5. C. procumbens, fol. acutis: caulinis quaternis ouatis; rameis linearibus, flor. ſpicatis.

127. RVBIA. *Cor.* 1-petala, campanulata. *Baccae* 2, monoſpermae.
158.

tinctorum. 1. R. foliis annuis, caule aculeato. Rubia ſylu. monſpaſſulana maior. *Bauh. hiſt. 3. p. 715.*
peregrin. 2. R. foliis perennantibus ellipticis ſupra laeuibus.
anguſtif. 3. R. fol. perennantibus linearibus ſupra ſcabris. *Mant. 39.* *

128. FVCHSIA. *Cor.* 1-petala, infundibuliformis: limbo 8-fido. *Bacca* infera, 4-locularis, polyſperma.
159.

triphylla. 1. FVCHSIA. *Plum. ic. 133. f. 1. Mill. dict.* †

129. SIPHONANTHVS. *Cor.* 1-petala, infundibulif. longiſſima, infera. *Baccae* 4, monoſpermae.
159.

indica. 1. SIPHONANTHVS. *Act. petrop. 1736. p. 214. t. 15.*

130. CATESBAEA. *Cor.* 1-petala, infundib. longiſſima, ſupera. *Stamina* intra faucem. *Bacca* polyſperma.
159.

ſpinoſa. 1. CATESBAEA.

131. IXORA. *Cor.* 1-petala, infundib. longa, ſupera. *Stamina* ſupra faucem. *Bacca* 4-ſperma.
159.

coccinea. 1. I. fol. oualibus ſemiamplexicaulibus, floribus faſciculatis. *Cotyledones ouatae, maiuſculae. Caulis ruber. Stipulae inter folia oppoſita, acuminatae, ſolitariae, vt in Coffea.* H. V.

alba. 2. I. fol. lanceolato-ouatis, floribus faſciculatis.

american. a. I. fol. ternis lanceolato-ouatis, floribus thyrſoideis.

132. PAVETTA. *Cor.* 1-petala, infundib. ſupera. *Stigma* curuum. *Bacca* 2-ſperma.
160.

indica. 1. PAVETTA. *Rumph. amb. 4. t. 47. Pluk. phyt. 147. f. 1.*

133. PETESIA. *Cor.* 1-petala, infundibulif. *Stigma* bifidum. *Bacca* polyſperma.
160.

ſtipularis. 1. P. fol. lanceolato-ouatis ſubtus tomentoſis, thyrſis lateralibus.

Lygiſtum. 2. P. fol. ouatis nudis lineatis, caule flexuoſo.

134. MITCHELLA. *Cor.* 1-petalae, ſuperae, binae eidem germini. *Stigm.* 4. *Bacca* bifida, 4-ſperma.
161.

repens. 1. MITCHELLA.

135. CALLICARPA. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida. *Bacca* 4-ſperma.
161.

americana. 1. C. fol. ſerratis *ſimillima ex Ind. orientali vix diſtinguenda, Foliis ſubtus albo-tomentoſis, ſerraturis magis mucronatis, apice minus producto.*

integrifol. 2. C. fol. integerrimis. *Iacq.* †

136. AQVAR-

136. AQVARTIA. *Cal.* companulatus. *Cor.* rotata, laciniis linearibus. *Bacca* polyſperma.
161.

aculeata. 1. AQVARTIA.

137. POLYPREMVM. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-fida, rotata: lobis obcordatis. *Capſ.* compreſſa, emarginata, 2-locularis.
161.

procumb. 1. POLYPREMVM.

138. PENAEA. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* campanulata. *Styl.* 4-angularis. *Capſ.* tetragona, 4-locularis, 8-ſperma.
162.

Sarcocoll. 1. P. foliis ouatis planis.
mucron. 2. P. foliis cordatis acuminatis.
ſquamoſa. 3. P. foliis rhombaeo-cuneiformibus carnoſis.

139. BLAERIA. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-fida. *Stamina* receptaculo inſerta. *Capſ.* 4-locularis, polyſperma.
162.

ericoides. 1. B. flor. congeſtis terminalibus.
puſilla. 2. B. flor. ſparſis. *Mant.* 39. *

140. BVDDLEIA. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida. *Stamina* ex inciſuris. *Capſ.* 2-ſulca, 2-locularis, polyſperma.
162.

americ. 1. B. fol. ouatis.
occident. 2. B. fol. lanceolatis.

141. EXACVM. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-fida: tubo globoso. *Capſ.* 2-ſulca, 2-locularis, polyſperma, apice dehiſcens. 163.

ſeſſile. 1. E. floribus ſeſſilibus.
pedunculat. 2. E. floribus pedunculatis. *Affinis Gentianis.*

142. PLANTAGO. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida: limbo reflexo. *Stamina* longiſſima. *Capſ.* 2-locularis, circumſciſſa. 163.

* *Scapo nudo.*

maior. 1. P. fol. ouatis glabris, ſcapo tereti, ſpica floſculis imbricatis.
aſiatica. 2. P. fol. ouatis glabris, ſcapo angulato, ſpica floſculis diſtinctis.
media. 3. P. fol. ouato-lanceolatis pubeſcentibus, ſpica cylindrica, ſcapo tereti.
virginica. 4. P. fol. lanceolato-ouatis pubeſcentibus ſubdenticulatis, ſpicis floribus remotis, ſcapo tereti. *Flos in America corollas explicat et ſtamina exſerit, in Europa vero vix; folia ſemitrineruia et Scapus pubeſcentia.*
altiſſima. 5. P. fol. lanceolatis quinqueneruiis dentatis glabris, ſpica oblonga cylindrica, ſcapo ſubangulato.
lanceolat. 6. P. fol. lanceolatis, ſpica ſubouata nuda, ſcapo angulato. *Variet. 2. Ger. prou.* 333. *t.* 12.
Lagopus. 7. P. fol. lanceolatis ſubdenticulatis, ſpica ouata hirſuta, ſcapo tereti.
luſitanica. 17. P. fol. lato-lanceolatis trineruiis ſubdentatis ſubpiloſis, ſpica oblonga hirſuta, ſcapo angulato. *Sp. pl. 1667.*
albicans. 8. P. fol. lanceolatis obliquis villoſis, ſpica cylindrica erecta, ſcapo tereti.
alpina. 9. P. fol. linearibus planis, ſcapo tereti hirſuto, ſpica oblonga erecta. *Boec. muſ. 2. p. 22.*
cretica. 18. P. fol. linearibus, ſcapo tereti breuiſſimo lanato, ſpica ſubrotunda nutante.
maritim. 11. P. fol ſemicylindraceis integerrimis baſi lanatis, ſcapo tereti.

ſubu-

ſubulata. 12. P. fol. ſubulatis triquetris ſtriatis ſcabris, ſcapo tereti.

Serraria. 13. P. fol. lanceolatis quinqueneruiis dentato-ſerratis, ſcapo tereti.

Coronop. 14. P. fol. linearibus dentatis, ſcapo tereti.

Loeflingi. 15. P. fol. linearibus ſubdentatis, ſcapo tereti, ſpica ouata, bracteis carinatis membranaceis.

vniflora. 16. P. fol. ſubulatis, ſcapo vnifloro. *Oed. dan. t. 170. Planta monoica.*

* * *Caule ramoſo.*

Pſyllium. 17. P. caule ramoſo herbaceo, fol. ſubdentatis recuruatis, capitulis aphyllis.

indica. 18. P. caule ramoſo herbaceo, fol. integerrimis, reflexis ciliatis, capitulis foliofis. *Calycis foliola duo inferiora obtuſiſſima, ſpathulata, valde gibba, intus concaua. Corollae tubuloſae, calyce duplo ſaepe longiores.*

cynops. 19. P. caule ramoſo ſuffruticoſo, foliis integerrimis filiformibus ſtrictis, capitulis ſubfoliatis.

afra. 20. P. caule ramoſo fruticoſo, fol. lanceolatis dentatis, capitulis aphyllis. Pſyllium foliis laciniatis, *Bocc. ſic. 8. t. 7. f. B.*

143. SCOPARIA. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-partita, rotata. *Capſ.* 1-locularis, 2-valuis, polyſperma.

168.

dulcis. 1. S. fol. ternis, flor. pedunculatis. *Iacq. amor. 17.*

procumb. 2. S. fol. quaternis, flor. ſeſſilibus. *Iacq. amer. 18.*

144. RHACOMA. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-partita. *Capſ.* 1-locularis, monoſperma.

169.

Croſſopetalum. 1. RHACOMA.

145. CENTVNCVLVS. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida, patens. *Stam.* breuia. *Capſ.* 1-locularis, circumſciſſa.

169.

minimus. 1. CENTVNCVLVS. *Oed. dan. t. 177.*

146. SAN-

146. SANGVISORBA. *Cal.* 2-phyllus. *Germen* inter calycem corollamque.
169.

officinal. 1. S. ſpicis ouatis.
media. 2. S. ſpicis cylindricis.
canadenſ. 3. S. ſpicis longiſſimis.

147. CISSVS. *Bacca* 1-ſperma, cincta calyce *Corollaque* quadripartita.
170.

vitiginea. 1. C. fol. cordatis ſubquinquelobis tomentoſis. (*excluſis Synonymis Rhedi, Rumphii.*)
cordifolia. 2. C. fol. cordatis integerrimis.
Sicyoides. 3. C. fol. ſubcordatis nudis ſetaceo-ſerratis, ramulis teretibus. Ciſſus foliis ſimplicibus nitidis. *Iacq. amer. 22. t. 15.* Vitis foliis dentatis. *Plum. ic. 259. f. 2.* Funis crepitans. *Rumph. amb. 5. p. 446. t. 146. f. 1.* Schunumbi valli. *Rheed. mal. 7. t. 11.*
quadrangularis. 6. C. fol. cordatis carnoſis ſerrato-dentatis, caule tetragono tumidiuſculo. *Mant. 39.*
acida. 4. C. fol. ternatis obouatis glabris carnoſis inciſis. *Rumph. amb. 5. t. 166. f. 2.*
trifoliata. 5. C. fol. ternatis ſubrotundis hirſutis ſubdentatis, ramis membranaceo-angulatis. *Iacq. amer. 23. t. 182. f. 10.*

148. EPIMEDIVM. *Nectaria* 4, cyathiformia, petalis incumbentia. *Cor.* 4-petala. *Cal.* caducus. *Siliqua.*
171.

alpinum. 1. EPIMEDIVM.

149. CORNVS. *Inuolucrum* 4-phyllum ſaepius. *Petala* ſupera 4. *Drupa* nucleo 2-loculari.
171.

florida. 1. C. arborea, inuolucro maximo: foliolis obcordatis. *Kalm. canad. 2. p. 321.*
maſcula. 2. C. arborea, vmbellis inuolucrum aequantibus.

ſan-

ſanguin. 3. C. arborea, cymis nudis, ramis rectis.
alba. 6. C. arborea, cymis nudis, ramis recuruatis. *Mant.* 40.
ſuecica. 4. C. herbacea, ramis binis.
canadenſ. 5. C. herbacea, ramis nullis.

150. FAGARA. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-petala. *Capſ.* 172. biualuis, monoſperma.

Pterota. 1. F. foliolis emarginatis.
Piperita. 3. F. foliolis crenatis.
tragodes. 2. F. articulis pinnarum ſubtus aculeatis. *Iacq. amer.* 21. *t.* 14.
octandra. 4. F. foliolis tomentoſis. *Mant.* 40.

151. TOMEX. *Cal.* 1-phyllus, cylindricus. *Stam.* 172. longa. *Stigma* emarginatum. *Bacca.*

tomentoſ. 1. TOMEX.

152. PTELEA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-partitus, infe- 173. rus. *Fructus* membrana ſubrotunda, centro monoſpermos.

trifoliata. 1. P. foliis ternatis.
viſcoſa. 2. P. foliis ſimplicibus. Dodonea. *Fabr. helmſt.* 430.

153. LVDVIGIA. *Cor* tetrapetala. *Cal.* 4-partitus, 173. ſuperus. *Capſ.* 4-gona, 4-locularis, infera, polyſperma.

alternifol. 1. L. foliis alternis lanceolatis, caule erecto. *Flores laterales, axillares, ſolitarii. Capſulae cubicae, calyce minores.*
oppoſitifol. 2. L. foliis oppoſitis lanceolatis, caule diffuſo.
erigata. 3. L. foliis oppoſitis lanceolatis, caule erecto. *Mant.* 40.

154. OLDENLANDIA. *Cor.* tetrapetala. *Cal.* 4-partitus, ſuperus. *Capſ.* 2-locularis, infera poly-ſperma.
174.

verticillata. 6. O. flor. verticillatis ſeſſilibus, ſtipulis ſetigeris. *Mant.* 40.*

repens. 7. O. capſ. ſeſſilibus hiſpidis, fol. lanceolatis. *Mant.* 40.*

uniflora. 1. O. pedunc. ſimpliciſſimis lateralibus, fructibus hirtis, fol. ſubouatis acutis.

biflora. 2. O. pedunc. bifloris petiolo longioribus, fol. lanceolatis. Antirrhinum humile anguſtifolium, flore gemello ex alis foliorum. *Burm. zeyl. 22. t. 11.*

umbellat. 3. O. umbellis nudis lateralibus alternis, fol. linearibus.

corymboſ. 4. O. pedunc. multifloris, fol. lineari-lanceolatis. *Sp. pl. 1679.*

paniculata. 5. O. pedunc. paniculatis terminalibus, fol. ouali-lanceolatis. *Sp pl. 1667.* Mollugo zeylanica ſylueſtris anguſtifolia, flore albo. *Burm. zeyl. 161. t. 71. f. 2.*

155. AMMANNIA. *Cor.* 4-petala, calyci inſerta, vel nulla. *Cal.* 1-phyllus, plicatus, 8-dentatus, inferus. *Capſ.* 4-locularis.
174.

latifolia. 1. A. fol. ſemiamplexicaulibus, caule tetragono.

ramoſior. 2. A. fol. ſubpetiolatis, caule ramoſo.

baccifer. 3. A. fol. ſubpetiolatis, capſ. calyce maioribus coloratis. *Burm. ind. t. 15. f. 3.* Cornelia verticillata. *Ard. ſpec. 2. p. 9. t. 1. e China facta Italica.*

156. ISNARDIA. *Cor.* nulla. *Cal.* 4-fidus. *Capſula* 4-locularis, cincta *calyce.*
175.

paluſtris. 1. ISNARDIA.

157. TRAPA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-partitus. *Nux* ſpinis 4, oppoſitis cincta, quae calycis folia fuere.
175.

natans. 1. TRAPA.

158. DOR-

158. DORSTENIA. *Receptac.* commune 1-phyllum, carnoſum, in quo *Semina* ſolitaria nidulantur. (*) 176.

Houſtoni. 3. D. ſcapis radicatis, fol. cordatis angulatis acutis, receptaculis quadrangulis.
Contrajerua. 1. D. ſcapis radicatis, fol. pinnatifido-palmatis ſerratis, receptaculis quadrangulis.
Drakena. 2. D. ſcapis radicatis, fol. pinnatifido palmatis integerrimis, receptaculis ovalibus.
cauleſc. 4. D. pedunculis caulinis.

1243. COMETES. *Involucr.* 4-phyllum, 3-florum. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 3-cocca.

alterniflora. 1. COMETES. *Mant.* 39. *

159. ELAEAGNVS. *Cor.* nulla. *Cal.* 4-fidus, campanulatus, ſuperus. *Drupa* infra *calycem* campanulatum. 176.

anguſtif. 1. E. foliis lanceolatis.
orientalis. 4. E. fol. oblongis ovatis opacis. *Mant.* 41. *
ſpinoſa. 2. E. foliis ellipticis.
latifolia. 3. E. foliis ovatis.

1244. STRVTHIOLA. *Cor.* nulla. *Cal.* tubuloſus: ore glandulis 8. *Bacca* exſucca, monoſperma.

virgata. 1. S. pubeſcens. *Mant.* 41. *
erecta. 2. S. glabra. *Mant.* 41. * Paſſerina dodecandra. *Sp. pl.* 513. (*excluſo ſynonymo Burm.*)

160. BRABEJVM. *Cor.* 4-petala, infera. *Cal.* nullus. *Drupa* villoſa, ſupera. 177.

ſtellatif. 1. BRABEIVM.

161. KRA-

(*) Dorſteniae *omnis flores in viua planta attente obſeruandi et deſcribendi.*

161. KRAMERIA. *Cal.* o. *Cor.* 4-petala: *Nectario* 177. superiore 3-partito; inferiore 2-phyllo. *Bacca* ficca, echinata, 1-ſperma.

Ixina. 1. KRAMERIA.

162. RIVINA. *Cor.* 4-petala, perſiſtens. *Cal.* nul- 177. lus. *Bacca* 1-ſperma: Semine lentiforme.

humilis. 1. R. racemis ſimplicibus, floribus tetrandris, fol. pubeſcentibus.

laevis. 4. R. racemis ſimplicibus, floribus retrandris, fol. glabris. *Mant. 41.* *

octandra. 2. R. racemis ſimplicibus, floribus octandris dodecandriſue. *Iacq. ſpec. 6. t. 2. Stamina 4 intra calycis folia; reliqua 8 alternantia. Antherae haſtatae. Stylus nullus. Stigma penicilliforme. Semen lentiforme, nitidum.*

panicul. 3. R. paniculae racemis compoſitis oppoſitisque.

163. SALVADORA. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* o. *Bacca* 1- 178. ſperma. *Sem.* arillo veſtitum.

perſica. 1. SALVADORA.

164. CAMPHOROSMA. *Cal.* vrceolatus: denti- 178. bus 2 oppoſitis, alterniſque minimis. *Cor.* nulla. *Caſſ.* 1-ſperma.

monſpel. 1. C. foliis hirſutis linearibus.

acuta. 2. C. foliis ſubulatis rigidis glabris.

glabra. 3. C. fol. ſubtriquetris glabris inermibus.

Pteranthus. 4. C. ramoſiſſima, pedunc. enſiformibus dilatatis, bracteis criſtatis. *Mant. 41.* *

165. ALCHEMILLA. *Cal.* 8-fidus. *Cor.* o. *Sem.* 1. 178.

vulgaris. 1. A. foliis lobatis.
alpina. 2. A. fol. digitatis ſerratis.
pentaph. 3. A. fol. quinatis multifidis glabris.

DIGYNIA.

166. APHANES. 179. *Cal.* 8-fidus. *Cor.* o *Sem.* 2. nuda.

aruenſis. 1. APHANES.

167. CRVZITA. 179. *Cal.* 4-phyllus: exterior 3-phyllus. *Cor.* o. *Sem.* 1.

hiſpanica. A. CRVZITA.

168. BVFONIA. 179. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Capſ.* 1-locularis, 2-ſperma.

tenuifolia. 1. BVFONIA. *Ger. prov.* 400. * *variat Staminibus* 4 *et* 2.

169. HAMAMELIS. 180. *Involucr.* 3-phyllum. *Cal.* proprius 4-phyllus. *Petala* 4. *Nux* 2-cornis, 2-locularis.

virginica. 1. H. MAMELIS. *Frutex huic ſimillimus, cui* Corolla *nulla.* Stamina *plurima* (20-40), *longa, flaua, filiformia, compreſſa, antheris minutis; an itaque flores ſexu diverſi? miſit D. Garden.*

170. CVSCVTA. 180. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 1-petala. *Capſ.* 2-locularis.

europaea. 1. C. floribus ſeſſilibus.
americ. 2. C. floribus pedunculatis. *Iacq. amer.* 24.

171. HYPECOVM. *Cal.* 2-phyllus. *Petala* 4: exterioribus duobus latioribus, 3-fidis. *Fructus* siliqua.
181.

procumb. 1. H. siliquis arcuatis compressis articulatis.
pendulum. 2. H. siliquis cernuis teretibus cylindricis.
erectum, 3. H. siliquis erectis teretibus torulosis. *Stamina videntur Tetradynama.*

TETRAGYNIA.

172. ILEX. *Cal.* 4-dentatus *Cor.* rotata. *Stylus* 0. *Bacca* 4-sperma.
181.

* *Flores quadrifidi.*

Aquifolium. 1. I. fol. ovatis acutis spinosis. *Polygama dioica*: *Planta hermaphrodita 5-petala, pentandra. Ger.*
Cassine. 2. I. fol. ovato-lanceolatis serratis.
asiatica. 3. I. fol. lato-lanceolatis obtusis integerrimis.

* * *Flores trifidi.*

cuneifol. 4. I. fol. cuneiformibus tricuspidatis. *Plum. ic.* 103. *f.* 2.
Dodonæa. 5, I. fol. pinnatis. *Cal.* 3-*dentatus. Cor.* 3-*fida. Stam.* 3. *Sem.* 3.

173. COLDENIA. *Cal.* 4-phyllus... *Cor.* infundibulif. *Styl.* 4. *Sem.* 2, bilocularia.
182.

procumb. 1. COLDENIA. *Planta depressa ramis alternis. Folia alterna, subpetiolata, obovata, latere superiore sublunata, plicata secundum serraturas profundas, tomentosa exceptis plicis. Flores axillares, nonnulli, sessiles. Styli* 4. *Sem.* 2, *bilocularia, intus plana, extus muricato-angulata.*

174. POTAMOGETON. *Cal.* 0. *Petala* 4. *Stylus.* 0. *Sem.* 4.
182.

natans. 1. P. fol. oblongo-ovatis petiolatis natantibus.
perfoliat. 2. P. fol. cordatis amplexicaulibus.

den-

denſum. 3. P. fol. ovatis acuminatis oppoſitis confertis, caulibus dichotomis, ſpica quadriflora.

lucens. 4. P. fol. lanceolatis planis in petiolos deſinentibus.

criſpum. 5. P. fol. lanceolatis alternis undulatis ſerratis.

ſerratum. 6. P. fol. lanceolatis oppoſitis ſubundulatis, *an varietas praecedentis?*

compreſſum. 7 P. Fol. linearibus obtuſis- caule compreſſo.

pectinatum. 8. P. fol. ſetaceis parallelis approximatis diſtichis.

ſetaceum. 9. P. fol. lanceolatis oppoſitis acuminatis.

graminеum. 10. P. fol. lineari-lanceolatis alternis ſeſſilibus ſtipula latioribus.

marinum. 11. P. fol. linearibus alternis diſtinctis inferne vaginantibus.

puſillum. 12. P. fol. linearibus oppoſitis alternisque diſtinctis baſi patentibus, caule tereti.

175. RVPPIA. *Cal.* o. *Cor.* o. *Sem.* 4. pedicellata. 184.

maritima. 1. RVPPIA.

176. SAGINA. *Cal.* 4-phyllus. *Petala.* 4. *Capſ.* 1-locularis, 4-valvis, polyſperma. 184.

procumb. 1. S. ramis procumbentibus. *Ard. ſpec.* 2. *p.* 23. *t.* 8. *f.* 2. *Variat floribus corollatis et apetalis, vt Jacq. vind.* 26.

erecta. 2. S. caule erecto ſubunifloro. Sagina fol. lineari-lanceolatis. *Ger. prov.* 402. *Calycis foliola lanceolata, acuminata.*

virginic. 3. S. caule erecto, floribus oppoſitis.

177. TILLAEA. *Cal.* 3-*f.* 4-partitus. *Petala* 3. *f.* 4. aequalia. *Capf.* 3. *f.* 4, polyfpermae.
168.

aquatica. 1. T, erecta dichotoma, foliis acutis, flor. quadrifidis.
muſcoſa. 3. T. procumbens, flor. trifidis.

178. MYGINDA. *Cal.* 4-partitus. *Petal.* 4. *Drupa* globoſa.
1661

vragoga. MYGINDA. *Iacq. amer.* 24. *t.* 16. *Sp. pl.* 1661.

CLAS-

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Fl. Monopetali, inferi, monoſpermi.*

242. MIRABILIS. *Nucula* infra corollam! *Cor.* infundib. *Stigm.* globoſum.

213. PLVMBAGO. *Sem.* 1. *Stam.* valuis inſerta. *Cor.* infundib. *Stigm.* 5-fidum.

* *Fl. Monopetali inferi diſpermi.* Aſperifoliae.

186. CERINTHE. *Cor.* fauce nuda, ventricoſa. *Sem.* 2-oſſea, 2-locularia.

1245. MESSERSMIDIA. *Cor.* fauce nuda, infundib. *Sem.* 2, ſuberoſa, 2-ſperma.

* *Fl. Monopetali, inferi, tetraſpermi.* Aſperifoliae.

191. ECHIVM. *Cor.* fauce nuda, irregularis! campanulata.

179. HELIOTROPIVM. *Cor.* fauce nuda, hypocraterif. lobis dente interiectis *Sem.* 4.

184. PVLMONARIA. *Cor.* fauce nuda, infundib. *Cal.* priſmaticus.

181. LITHOSPERMVM. *Cor.* fauce nuda, infundib. *Cal.* 5-partitus.

187. ONOSMA. *Cor.* fauce nuda, ventricoſa. *Sem.* 4.

185. SYMPHYTVM. *Cor.* fauce dentata, ventricoſa.

188. BORAGO. *Cor.* fauce dentata, rotata.

190. LYCOPSIS. *Cor.* fauce fornicata, infundib. tubo curuato.

189. ASPERVGO. *Cor.* fauce fornicata, infundib. *Fructus* compreſſus.

183. CYNOGLOSSVM. *Cor.* fauce fornicata, infundib. *Sem.* depreſſa, latere affixa.

182. ANCHVSA. *Cor.* fauce fornicata, infundib. tubo baſi priſmatico.

180. MYOSOTIS. *Cor.* fauce fornicata, hypocrateriform. lobis emarginatis.

* *Fl. Monopetali, inferi, pentaſpermi.*

193. NOLANA. *Cor.* monopetala. *Sem.* 5, baccata, 2 ſ. 4-locularia.

* *Fl. Monopetali, inferi, angioſpermi.*

243. CORIS. *Capſ.* 1-locularis, 5-valuis. *Cor.* irregularis! *Stigm.* capitatum.

204. HYDROPHYLLVM. *Capſ.* 1-locularis, 2-valuis. *Cor.* nectariis 5 exarata. *Stig.* 2-fidum.

276. GALAX. *Capſ.* 1-locularis, 2-valuis. *Cor.* hypocrateriif. *Stig.* ſubrotundum.

198. CORTVSA. *Capſ.* 1-ocularis, oblonga. *Cor.* rotata, *Stig.* ſubcapitatum.

206. ANAGALLIS. *Capſ.* 1-locularis, circumſciſſa. *Cor.* rotata. *Stig.* capitatum.

285. LYSIMACHIA. *Capſ.* 1-locularis, 10-valuis. *Cor.* rotata. *Stig.* obtuſum.

201. CYCLAMEN. *Capſ.* 1-locul. intus pulpoſa; *Cor.* reflexa. *Stig* acutum.

200. DODECATHEON. *Capſ.* 1-locularis, oblonga. *Cor.* reflexa. *Stig.* obtuſum.

199. SOLDANELLA. *Capſ.* 1-locularis. *Cor.* lacera! *Stig* ſimplex.

197. PRIMVLA. *Capſ.* 1-locularis. *Cor.* infundib. fauce peruia, *Stig.* globoſum.

196. ANDROSACE. *Capſ.* 1-locularis. *Cor.* hypocrat. fauce coarct. *Stig.* globoſum.

195. ARETIA. *Capſ.* 1-locularis? *Cor.* hypocrateriſ. *Stig.* depreſſo-capitatum.

203. HOTTONIA. *Capſ.* 1-locularis. *Cor.* tubus infra ſtamina! *Stig.* globoſum.

202. MENYANTHES. *Capſ.* 1-locularis. *Cor.* villoſa! *Stig.* 2-fidum.

207. THEOPHRASTA. *Capſ.* 1-locularis, maxima! *Cor.* campanulata. *Stig.* acutum.

209. SPIGELIA. *Capſ.* 2-locularis, didyma! *Cor.* infundib. *Stig.* ſimplex.

210. OPHIORRHIZA. *Capſ.* 2-locularis, 2-partita! *Cor.* infundib. *Stig.* 2-fidum.

215. CONVOLVVLVS. *Capſ.* 2-locul., 2-ſperma. *Cor.* campanulata, *Stig.* 2-fidum.

1248. LISIANTHVS. *Capſ.* 2-locul. polyſperma. *Cor.* infundib. ventricoſa. *Styl.* perſiſtens.

208. PATHAGONVLA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* rotata. *Stylus* dichotomus!

1246. NIGRINA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* infundib. *Cal.* inflatus.

246. DATVRA. *Capſ.* 2-locular. 4-valuis! *Cor.* infundib. *Cal.* deciduus.

247. HYOSCYAMVS. *Capſ.* 2-locul. operculata! *Cor.* infundib. *Stig.* capitatum.

284. NICOTIANA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* infundib, *Stig.* emarginat.

245. VERBASCVM. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* rotata. *Stig.* obtuſum. *Stam.* declinata.

255. CHIRONIA. *Capſ.* 2-locularis *Cor.* tubo vrceolato. *Anther.* defloratae ſpirales.

194. DIAPENSIA. *Capſ.* 3-locularis. *Cor.* hypocrater. *Cal.* 8-phyllus.

214. PHLOX. *Capſ.* 3-locularis. *Cor.* hypoc. tubo curuo. *Stigm.* 3-fidum.

217 POLEMONIVM. *Capſ.* 3-locularis. *Cor.* 5-partita. *Stam.* valuis impoſita.

216. IPOMOEA. *Capſ.* 3-locularis. *Cor.* infundib. *Stig.* capitatum.

1229. BROSSAEA. *Capſ.* 5-locul. *Cor.* truncata. *Cal.* carnoſus.

212. AZALEA. *Capſ.* 5-locularis. *Cor.* campanulata. *Stig.* obtuſum.

302. CEROPEGIA. *Folliculi* 2. *Cor.* limbo conniuente. *Sem.* pappoſa.

297. NERIVM. *Folliculi* 2. erecti. *Cor.* fauce coronata. *Sem.* pappoſa.

299. ECHITES. *Follic.* 2, recti. *Cor.* infundibulif. fauce nuda. *Sem.* pappoſa.

1253. PERGVLARIA. *Follic.* 2. *Cor.* hypocraterif. *Nectaria* 5, ſemiſagittata.

298. PLVMIERIA. *Follic.* 2, refracti. *Cor.* infundib. *Sem.* alata.

300. CAMERARIA. *Follic.* 2, lobati. *Cor.* hypocrat. *Sem.* alata.

301. TABERNAEMONTANA. *Follic.* 2, pulpoſi. *Cor.* hypocrat. *Sem.* ſimplicia.

295. VINCA. *Follic.* 2, erecti *Cor.* hypocrat. *Sem.* ſimplicia.

1251. CARISSA. *Baccae* 2, polyſpermae.

254 IACQVINIA. *Bacca* 1-ſperma. *Cor.* 10-fida: nectario 5 phyllo-

259. LAVGERIA. *Bacca* 1-ſper. Nuc. 5-loc. *Stig.* capitat.

1252. PAEDERIA. *Bacca* 2-ſperma, inflata, fragilis.

258. VARRONIA. *Bacca* 1-ſper. Nuc. 4-loc.! *Stig.* 4-plex.

256. CORDIA. *Bacca* 1-ſper. Nuc. 4-loc. *Stig.* dichotomum! *Calyx* baccae accretus.

257. EHRETIA. *Bacca* 4-ſper. Nuc. 2-loc. *Stig.* emarginatum.

192. TOVRNEFORTIA. *Bacca* 4-ſper. apice pertuſa! *Sem.* 2-locularia.

293. RAVWOLFIA. *Bacca* 2-ſperma. *Sem.* cordata.

294. CERBERA. *Bacca* 2-ſperma. *Nuces* compreſſae, retuſae.

1250. ARDVINA. *Bacca* 2-ſperma. *Sem.* oblonga. *Coroll.* curuata. *Stig.* 2-fidum.

269. MYRSINE. *Bacca* 1-ſperma. *Stig.* villoſum.

261. CESTRVM. *Bacca* 1-locularis. notata! *Filam.* dente.

260. BRVNFELSIA. *Bacca* 1-locularis. *Cor.* longiſſima.

211. RANDIA. *Bacca* 1-locul. corticoſa. *Cal.* truncatus.

253. STRYCHNOS. *Bacca* 2-locul. corticoſa. *Stig.* capitatum.

252. CAPSICVM. *Bacca* 2-locul. exſucca. *Antherae* conniuentes.

251. SOLANVM. *Bacca* 2-locularis. *Antherae* biperforatae!

250. PHYSALIS. *Bacca* 2-loc. calyce inflato. *Antherae* approximatae.

249. ATROPA. *Bacca* 2-locularis. *Stam.* diſtantia, incuruata.

244. ELLISIA. *Baca* 2-locularis. *Sem.* 2: altero ſuperiore.

262. LYCIVM. *Bacca* 2-locularis. *Stam.* baſi villo claudentia.

234. MENAIS. *Bacca* 4-locularis. *Cal.* 3-phyllus. *Stig.* duo.

264. SIDEROXYLON. *Bacca* 5-ſperma. *Cor.* 10-fida, lacin. interioribus conniuentibus.

263. CHRISOPHYLLVM. *Bacca* 10-ſperma. *Cor.* 10-fida, lacin. exterioribus patentiſſimis.

* *Achras.*

* *Fl. Monopetali, ſuperi.*

222. SAMOLVS. *Capſ.* 1-locul. apice 5 valuis. *Cor.* hypocrat. *Stig.* capitatum.

226. BELLONIA. *Capſ.* 1-loc. vmbilico roſtrato. *Cor.* rotata. *Stig.* acutum.

225. MACROCNEMVM. *Capſ.* 2-loc. turbinata. *Cor.* campanul. *Stig.* bilobum. *Sem.* imbricata.

224. RONDELETIA. *Capſ.* 3-locul. ſubgloboſa. *Cor.* infundib. *Stig.* obtuſum.

228. CINCHONA. *Capſ.* 2-locul. intus dehiſcens! *Cor.* hirſuta. *Stig.* ſimplex.

227. PORTLANDIA. *Capſ.* 2-locul., coronata. *Cor.* ventricoſa. *Stig.* ſimplex. *Sem.* imbricata.

219. ROELLA. *Capſ.* 2-locul. coronata. *Cor.* rotata. *Stig.* 2-fidum.

220. PYTHEVMA. *Capſ.* 2-ſ. 3-locul. perforata. *Cor.* 5-partita. *Stig.* 2-ſ. 3-fidum.

218. CAMPANVLA. *Capſ.* 3-ſ. 5-locul. perforata. *Cor.* campanul. *Stig.* 3-fidum.

221. TRACHELIVM. *Capſ.* 3-locul. perforata. *Cor.* infundib. *Stig.* capitatum.

231. MATTHIOLA. *Bacca* 1-ſperma. *Cor.* infundib. indiuiſa. *Stig.* obtuſum.

135. MORINDA. *Bacca* 1-ſperma, aggregata. *Cor.* infundib. *Stig.* 2-fidum.

229. PSYCOTHRIA. *Bacca* 2-ſper. *Sem.* ſulcata! *Cor.* infundib. *Stig.* emarginatum.

239. COFFEA. *Bacca* 2-ſper. *Sem.* arillata! *Cor.* hypocrat *Stigm.* 2-partitum.

231. CHIOCOCCA. *Bacca* 2-ſperma. *Cor.* infundib. *Stig.* ſimplex.

296. GARDENIA. *Bacca* 2-locul. polyſperma. *Cor.* infundib. *Cal.* lacin. enſiformibus verticalibus.

240. GENIPA. *Bacca* 2-locul. ſubrotunda. *Cor.* rotata. *Stig.* clauatum.

233. LONICERA. *Bacca* 2-locul. ſubrotunda. *Cor.* inaequalis. *Stig.* capitatum.

234. TRIOSTEVM. *Bacca* 3-locular. coriacea. *Cor.* inaequalis. *Stig.* oblongum.

241. MVSSAENDA. *Bacca* 4-locularis, oblonga. *Cor.* infundib. *Stig.* 2-partitum.

232. HAMELIA. *Bacca* 5-locul. polyſperm. *Cor.* tubo longo. *Stigm.* lineare.

238. ERITHALIS. *Bacca* 10-locul. ſubgloboſa. *Cor.* rotata. *Stig.* acutum.

* *Rubia.*
* *Crucianella.*
* *Prinos.*

* *Fl. Pentapetali, inferi.*

280. HIRTELLA. *Bacca* 1-ſperma. *Stylus* lateralis. *Stam.* perſiſtentia, ſpiralia.

265. RHAMNVS. *Bacca* 3-locularis, rotunda. *Cal.* tubul. corollifer. *Squamae* oris 5, conuergentes.

266. PHYLICA. *Bacca* 3-cocca. *Cal.* tubul. corollifer. *Squamae* oris 5, conuergentes.

267. CEANOTHVS. *Bacca* 3-cocca. *Cal.* tubul. corollifer. *Petala* fornicata.

270. CELASTRVS. *Bacca* 3-cocca. *Cal.* planus *Sem.* arillata.

271. EVONYMVS. *Bacca* capsularis, lobata. *Cal.* patens. *Sem.* baccato-arillata.

224. VITIS. *Bacca* 5-sperma. *Cor* saepe emarcido-connata. *Stylus* nullus.

278. MANGIFERA. *Drupa* reniformis. *Cor* petalis lanceolatis. *Nucleus* lanuginosus.

277. CEDRELA. *Capſ.* 5-loc. basi dehiscens! *Cor.* receptaculo unita. *Sem.* alata.

268. BYTTNERA. *Capſ.* 5-cocca. *Cal.* coloratus. *Stam.* Nectario annexa.

272. DIOSMA. *Capſ.* 5-plex. *Nectar.* germen coronans. *Sem.* arillata.

287. CLAYTONIA. *Capſ.* 1-loc., 3-valuis. *Cor.* 2-valuis! *Stig.* 3-fidum.

1234. RORIDVLA. *Capſ.* 1-locul. 3-valuis. *Nectarium* antherae ſcrotiforme.

275. ITEA. *Capſ.* 1-loc. 2-valuis. *Cal.* corollifer. *Stig.* obtuſum.

286. SAVVAGESIA. *Capſ.* 1-locularis. *Nectar.* 5-phyllum! *Petala* fimbriata.

274. BRVNIA. *Sem.* 1, villoſum. *Recept.* comm. villoſum. *Stam.* vnguibus petal. inſerta.

237. KVHNIA. *Sem.* 1, pappoſum. *Recept. comm.* nudum.

223. NAVCLEA. *Sem.* 1, biloculare. *Recept. comm.* nudum.

* *Caeſalpinia pentandra.* * *Bombax pentandrum.*
* *Caſſia nictitans.* * *Violae.*

* *Fl. Pentapetali, ſuperi.*

281. RIBES. *Bacca* polyſperma. *Cal.* corrollifer. *Styl.* 2-fidus.

283. HEDERA. *Bacca* 5-ſperma. *Cal.* cingens fructum. *Stig.* ſimplex.

1249. PLECTRONIA. *Bacca* 2-ſperma. *Cal.* vnguibus clauſus. *Anther.* incluſae, geminatae.

282. GRONOVIA. *Capſ.* 1-ſper. colorata. *Cal.* coloratus. *Petala* minuta.

285. CY-

1247. CYRILLA. *Capſ.* 2-locularis, polyſperma. *Stylus* bifidus. Petala acuminata.

285. LAGOECIA. *Sem.* 2, nuda. *Cal.* pinnato-pectinatus. *Petala* bicornia.

239. CONOCARPVS. *Sem.* 1, depreſſum. *Recept.* aggregans. *Petala* conniuentia.

* *Fl. incompleti, inferi.*

288. ACHYRANTHES. *Sem.* 1, oblongum. *Cal.* exterior 3-phyllus, nudus.

289. CELOSIA. *Capſ.* 3-ſperma. *Cal.* exterior 3-phyllus, coloratus.

290. ILLECEBRVM. *Capſ.* 1-ſper. 5-valuis. *Cal.* ſimplex, rudis.

291. GLAVX. *Capſ.* 5-ſper. 5-valuis. *Cal.* ſimplex, rudior, campanulatus.

* *Polygonum amphibium, lapathifolium.*

* *Ceratonia.*

* *Fl. incompleti, ſuperi.*

292. THESIVM. *Sem.* 1, coronatum. *Cal.* ſtaminifer.

* *Loranthus.* * *Trianthema.*

DIGYNIA.

* *Fl. Monopetali, inferi.*

307. STAPELIA. *Folliculi* 2. *Cor.* rotata: Nectariis ſtellatis.

304. CYNANCHVM. *Folliculi* 2. *Cor.* rotata: Nectario cylindrico.

393. PERIPLOCA. *Folliculi* 2. *Cor.* rotata: Nectariis 5, filiformibus.

305. APOCYNVM. *Folliculi* 2. *Cor.* campan. Nectariis glanduloſis 5. Setis 5.

306. ASCLEPIAS. *Folliculi* 2. *Cor.* reflexa: Nectariis 5, auriformibus vnguiculatis.

321. SWERTIA. *Capſ.* 1-loc. 2 valuis. *Cor.* rotata: poris 5, nectariferis.

322. GENTIANA. *Capſ.* 1-loc. 2-valuis. *Cor.* tubuloſa, indeterminata.

313. CRESSA. *Capſ.* 1-ſper. 2-valuis. *Cor.* hypocrater: limbo reflexo.

318. HYDROLEA. *Capſ.* 2-loc. 2-valuis. *Cor.* rorata.

319. SCHREBERA. *Fruct.* 2-locularis. *Cor.* infundib. *Nectarii Squama* filamentis ſingulis adnata.

1254. STERIS. *Bacca* polyſperma. *Cor.* rotata.

* *Fl. Pentapetali, inferi.*

447. VELEZIA. *Capſ.* 1-loc. 1-valuis. *Cor.* 5-petala. *Cal.* tubuloſus.

317. NAMA. *Capſ.* 1-loc. 3-valuis. *Cor.* 5-petala, minor.

320. HEVCHERA. *Capſ.* 2-loc. 2-roſtrata. *Cor.* 5-petala, calyci inſerta.

312. ANABASIS. *Bacca* 1-ſperma. *Cor.* 5-petala, minima.

* *Staphylaea pinnata.*

* *Fl. incompleti.*

311. SALSOLA. *Sem.* 1, cochleatum, tectum. *Cal.* 5-phyllus.

309. CHENOPODIVM. *Sem.* 1, orbiculare. *Cal.* 5-phyllus foliolis concauis.

310. BETA. *Sem.* 1, reniforme. *Cal.* 5-phyllus baſi ſemen fouens.

308. HERNIARIA. *Sem.* 1, ovatum, tectum. *Cal.* 5-partitus. *Filam.* 5, ſterilia.

314. GOMPHRENA. *Capſ.* 1-ſperma, circumſciſſa. *Cal.* diphyllus. compreſſus, coloratus.

315. BOSEA. *Bacca* 1-ſperma. *Cal.* 5-phyllus.

316. VLMVS. *Bacca* exſucca, compreſſa. *Cal.* 1-phyllus, emarceſcens.

* *Rhamnus Zizyphus.*

* *Polygonum virginianum.*

* *Trianthem. pentandra.*

* *Fl. Pentapetali, ſuperi, diſpermi.* Vmbellatae.

A. *Inuolucro vniuerſali partialique.*

323 PHYLLIS. *Fl.* diſperſi.

324. ERYNGIVM. *Fl.* capitati. *Recept.* paleaceum.

325. HYDROCOTYLE. *Fl.* ſubumbellati. fertiles. *Sem.* compreſſa.

326. SANICVLA. *Fl.* ſubumbellati, abortiui. *Sem.* muricata.

327. ASTRANTIA. *Fl.* vmbellati, abortiui. *Inuol.* colorata. *Sem.* rugoſa.

345. HERACLEVM. *Fl.* radiati, abortiui. *Inuol.* deciduum. *Sem.* membranacea.

352. OENANTHE. *Fl.* radiati, abortiui radio. *Inuol.* ſimplex. *Sem.* coronata, ſeſſilia.

329. ECHINOPHORA. *Fl.* radiati, obortiui. *Inuol.* ſimplex. *Sem.* ſeſſilia.

331. CAVCALIS. *Fl.* radiati, abortiui. *Inuol.* ſimplex. *Sem.* muricata.

332. ARTEDIA *Fl.* radiati, abortiui. *Inuol.* pinnatum. *Sem.* margine crenis foliaceis.

333. DAVCVS. *Fl.* radiati, abortiui. *Inuol.* pinnatum. *Sem.* hiſpida.

330. TORDYLIVM. *Fl.* radiati, fertiles. *Inuol.* ſimplex. *Sem.* margine crenata.

344. LASERPITIVM. *Fl.* floſculoſi, abortiui. *Pet.* cordata. *Sem.* 4-alata.

339. PEVCEDANVM. *Fl.* floſculoſi, abortiui. *Inuol.* ſimplex. *Sem.* depreſſa, ſtriata.

334. AMMI. *Fl.* floſculoſi, fertiles. *Inuol.* pinnatum. *Sem.* gibba, laeuia.

331. HASSELQVISTIA. *Fl.* floſc. fertil. *Pet.* cordata. *Sem.* Radii plana; Diſci vrceolata.

336. CONIVM. *Fl.* floſc. fertil. *Pet.* cordata. *Sem.* gibba, coſtato-ſulcata. *Inuolucella* dimidiata.

335. BVNIVM. *Fl.* floſc. fert. *Pet.* cordata. *Inuolucella* ſetacea.

338. ATHAMANTA. *Fl.* floſc. fert. *Pet.* cordata. *Sem.* conuexa, ſtriata.

328. BVPLEVRVM. *Fl.* floſc. fert. *Pet.* inuoluta. (*Plerisque folia indiuiſa ſ. inuolucella petaliformia.*)

348. SIVM. *Fl.* floſc. fert. *Pet.* cordata. *Sem.* ſubouata, ſtriata.

337. SELINVM. *Fl.* floſc. fert. *Pet.* cordata. *Sem.* depreſſa, ſtriata.

351. CVMINVM. *Fl.* floſc. fert. *Pet.* cordata. *Vmb.* 4-fida. *Inuol.* ſetaceis, longiſſimis.

343. FERVLA. *Fl.* floſc. fert. *Pet.* cordata. *Sem.* plana.

340. CRITHMVM. *Fl.* floſc. fert. *Pet.* planiuſcul. *Inv.* horizontale.

350. BVBON. *Fl.* floſc. fert. *Pet.* planiuſc. *Inv.* 5-phyllum.

342. CACHRYS. *Fl.* floſc. fert. *Pet.* planiuſc. *Sem.* cortice ſuberoſo.

346. LIGVSTICVM. *Fl.* floſc. fert. *Pet* inuoluta. *Inuol.* membranacea.

347. ANGELICA. *Fl.* floſ. fert. *Pet.* planiuſc. *Vmbellulae* globoſae.

349. SISON. *Fl.* floſc. fert. *Pet.* planiuſc. *Vmb.* depauperata.

B. *Inuolucris partialibus;* vniuerſali nullo.

355. AETHVSA. *Fl.* ſubradiat. fert. *Inuolucel.* dimidiata.

356. CORIANDRVM. *Fl.* radiat. abortiui. *Fr.* ſubgloboſi.
357. SCANDIX. *Fl.* radiat. abort. *Fr.* oblongi
358. CHAEROPHYLLVM. *Fl.* floſc. abort. *Inuol.* 5-phylla.
352. PHELLANDRIVM. *Fl.* floſc. fertiles. *Fr.* coronati.
359. IMPERATORIA. *Fl.* floſc. fertiles. *Vmb.* expanſo-plana.
360. SESELI. *Fl.* floſc. fertiles. *Vmb.* rigidula.
354. CICVTA. *Fl.* floſc. fertiles. *Pet.* planiuſcula.

* *Bupleurum rotundifolium. Apium Petroſ. et Aniſum.*

C. *Inuolucro nullo;* nec vniuerſali, nec partialibus.

363. SMYRNIVM. *Fl.* floſc. abortiui. *Sem.* reniformia, angulata.
364. CARVM. *Fl.* floſc. abortiui. *Sem.* gibba, ſtriata.
361. THAPSIA. *Fl.* floſc. fertiles. *Sem.* membranaceo-alata, emarginata.
362. PASTINACA. *Fl.* floſc. fertiles. *Sem.* depreſſo-plana.
364. ANETHVM. *Fl.* floſc. fertiles. *Sem.* marginata, ſtriata.
368. AEGOPODIVM. *Fl.* floſc. fertiles. *Sem.* gibba, ſtriata. *Pet.* cordata.
367. APIVM. *Fl.* floſc. fertiles. *Sem.* minuta, ſtriata. *Pet.* inflexa.
366. PIMPINELLA. *Fl.* floſc. fertiles. *Vmbellae ante floreſcentiam nutantes. Pet. cordata.*

TRIGYNIA.

* *Fl. ſuperi.*

370. VIBVRNVM. *Cor.* 5-fida. *Bacca* 1-ſperma.
372. SAMBVCVS. *Cor.* 5-fida. *Bacca* 3-ſperma.

* *Fl. inferi.*

369. RHVS. *Cor.* 5-petala. *Bacca* 1-ſperma.
371. CASSINE. *Cor.* 5-petala. *Bacca* 3-ſperma.
373. SPATHELIA. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 3-locularis, 3-gona, 1-ſperma. *Filament.* baſi dentata.
374. STAPHYLEA. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 2-ſ. 3-fida, inflata.
375. TAMARIX. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 1-locularis. *Sem.* pappoſa.
381. DRYPIS. *Cor.* 5-petala. coronata. *Capſ.* 1-ſperma, circumſciſſa.
376. TVRNERA. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 1-locularis. *Cal.* 1-phyllus corollifer.

383. SAROTHRA. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 1-locularis, colorata. *Cal.* 1-phyllus.

380. ALSINE. *Cor.* 5-petala, *Capſ.* 1-locularis. *Cal* 5-phyllus. *Petal* 2-fida.

377. TELEPHIVM. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 1-locul. triquetra. *Cal.* 5-phyllus.

373. CORRIGIOLA. *Cor.* 5-petala. *Sem.* 1, triquetrum. *Cal.* 5-partitus.

379. PHARNACEVM. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* 3-locularis. *Cor.* nulla.

382. BASELLA. *Cal.* 6-fidus. *Sem.* 1, globoſum, calyce baccato. *Cor.* 0.

* *Rhamnus Paliurus.*
* *Celaſtrus.*

TETRAGYNIA.

384. PARAASIA. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 4-valuis. *Nectar.* 5, ciliato-glanduloſa.

385. EVOLVVLVS. *Cor.* 1-petala. *Capſ.* 4-locularis.

PENTAGYNIA.

* *Fl ſuperi.*

386. ARALIA. *Cor.* 5-petala. *Bacca* 5-ſpermae.

* *Fl. inferi.*

392. CRASSULA. *Cor.* 5-partita. *Capſ.* 5, polyſperma.

389. LINVM. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 10-locularis, 2-ſperma.

390. ALDOVANDA. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 1-locularis, 10-ſperma.

391. DROSERA. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 1-locul. apice dehiſcens.

1265. MAHERNIA. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 5-locularis.

393. SIBBALDIA. *Cor.* 5-petala. *Sem.* 5. *Cal.* 10-fidus.

388. STATICE. *Cor.* 5-partita. *Sem.* 1, calyce infundib. veſtitum.

* *Ceraſtium pentandrum.*
* *Spergula pentandra.*
* *Gerania pentandra.*

POLYGYNIA.

394. MYOSVRVS. *Cal.* 5-phyllus. *Nectar.* 5-lingulata. *Sem.* numeroſa.

*. *Ranunculus hederaceus.*

MONO-

179. HELIOTROPIVM. *Cor.* hypocrateriformis, 5-fida, interiectis dentibus: fauce clausa fornicibus.
187.

peruuianum. 1. H. foliis lanceolato-ouatis, caule frutescente, spicis numerosis aggregato-corymbosis. *Caules bipedales, fruticosi, hirti, inferius longius ramosi. Folia elliptica s. ouato-oblonga, lineata, rugosa, pubescenti-scabra, vtrinque viridia, breuius petiolata. Pedunculi versus extremitates, hirti, bifidi s. dichotomi. Spicae secundae, recuruatae. Corollae caeruleſcentes, similes H. indico.*

indicum. 2. H. fol. cordato-ouatis acutis scabriusculis, spicis solitariis, fruct. bifidis.

europaeum. 3. H. fol. ouatis integerrimis tomentosis rugosis, spicis coniugatis.

supinum. 4. H. fol. ouatis integerrimis tomentosis plicatis, spic. solitariis. *Gou. monsp. 17. c. figura.*

fruticosum. 5. H. fol, lineari-lanceolatis pilosis, spicis solitariis sessilibus.

curassauicum. 6. H. fol. lancolato-linearibus glabris aueniis, spic. coniugatis.

orientale. 7. H. fol. linearibus glabris aueniis, flor. sparsis lateralibus.

gnaphalodes. 8. H. fol. linearibus obtusis tomentosis, pedunc. dichotomis, spicar. flor. quaternis, caule frutescente. *Iacq. amer. 25. t. 173. f. 11. Morif. hist. 3. s. 11. t. 28. f. 6.*

180. MYOSOTIS *Cor.* hypocrateriformis, 5-fida, emarginata: fauce clausa fornicibus.
188.

scorpioid. 1. M. semin. nudis, foliorum apicibus callosis.

virginian. 2. M. semin. aculeato-glochidibus, fol. ouato-oblongis ramis diuaricatis.

Lappu-

Lappula. 3. M. ſemin. aculeis glochidibus, fol. lancolaeis piloſis.

apula. 4. M. ſemin. nudis, fol. hiſpidis, racemis folioſis.

181. LITHOSPERMVM. *Cor.* infundib. fauce perforata, nuda. *Cal.* 5-partitus.

189.

officinale. 1. L. ſem. laeuibus, coroll. vix calycem ſuperantibus. fol. lanceolatis. *Canadenſe totum hirtum.*

aruenſe. 2. L. ſem. rugoſis, cor. vix calycem ſuperantibus.

virginic. 3. L. fol. ſuboualibus neruoſis, cor. acuminatis.

orientale. 7. L. ramis floriferis lateralibus, bracteis cordatis amplexicaulibus. Anchuſa orientalis. *Sp. pl.* 191. *Caulis ſterilis erectus, pilis rarioribus. Folia lanceolata, baſi anguſtiora, integerrima, obtuſa, vtrinque pilis roriferis. Rami floriferi ex alis foliorum inferiorum: Bracteis cordatis, minoribus, piloſo roridis. Flores ſubpedunculati, lutei, infundibuliformes abſque fornicibus, fauce patula. Stamina tubo breuiora Antheris nigris.*

purpuroc. 4. L. ſem. laeuibus, cor. calycem multoties ſuperantibus.

fruticoſ. 5. L. fruticoſum, fol. linearibus hiſpidis, ſtaminib. corollam aequantibus.

diſpermum. 6. L. ſeminibus duobus, calycibus patentibus. *Semina tantum duo ſunt, nec tamen bilocularia.*

182. ANCHVSA. *Cor.* infundibulif. fauce clauſa fornicibus. *Sem.* baſi. inſculpta.

191.

officinal. 1. A. fol. lanceolatis, ſpic. imbricatis ſecundis.

anguſtifol. 2. A. racem. ſubnudis coniugatis.

vndulata. 3. A. ſtrigoſa, fol. linearibus dentatis, pedicellis bractea minoribus, calyc. fructiferis inflatis.

tinctoria. 7. A. tomentoſa, fol. lanceolatis obtuſis, ſtamin. corolla breuioribus.

virginic. 5. A. floribus ſparſis, caule glabro.

lanata. 6. A. fol. villoſis, calycibus hirſutis, ſtaminib. corolla longioribus. *(excluſo Synonymo.)*

semperuirens. 8. A. pedunculis diphyllis capitatis. *Caules ad latera capitis radicis, erecti, hispidi. Folia ouata, lineata, albo maculata, petiolata, remota. Pedunculi axillares Bracteis 2 oppositis, sessilibus, lanceolato-ouatis, multiflori. Corollae caeruleae tubo breui. vti Omphalodis.*

183. CYNOGLOSSVM. 192. *Cor.* infundibuliform. fauce clausa fornicibus. *Semina* depressa, interiore tantum latere stylo affixa.

officinale. 1. C. stamin. corolla breuioribus, fol. lanceolatis tomentosis sessilibus.
virginicum. 2. C. fol. amplexicaulibus ouatis. Cerinthe minor perennis virginiana, flore luteo. *Morif. hist. 3. p. 446. s. 11. t. 29. f. 7. potius.*
cheirifol. 3. C. coroll. calyce duplo longioribus, fol. lanceolatis.
apenninum. 4. C. stamin. corollam aequantibus.
lusitanic. 6. C. fol. lineari-lanceolatis, scabris.
linifolium. 5. C. fol. lineari-lanceolatis, glabris.
Omphalodes. 8. C. repens, fol. radicalibus cordatis.

184. PVLMONARIA. 194. *Cor.* infundibuliform. fauce peruia. *Cal.* prismatico-5-gonus.

* *Perianthium longitudine tubi corollae.*

angustif. 1. P. fol. radicalibus lanceolatis. *Hall. emend.* 168.
officinal. 2. P. fol. radicalibus ouato-cordatis scabris. Symphytum maculosum s. Pulmonaria latifolia. *Bauh. pin.* 259.
suffruticosa. 3. P. fol. linearibus scabris, cal. subulatis quinquepartitis. *Sp. pl.* 1667.

* * *Calyces tubo carollae dimidio breuiores.*

virginic. 3. P. calyc. abbreuiatis, fol. lanceolatis obtusiusculis.
sibirica. 4. P. calyc. abbreuiatis, fol. radicalibus cordatis.
maritim. 5. P. calyc. abreuiatis, fol. ouatis, caule ramoso procumbente.

185. SYM-

185. SYMPHYTVM. *Corollae* limbus tubulato-ventricosus: fauce clausa radiis subulatis.
195.

officinale. 1. S. fol. ouato-lanceolatis decurrentibus.
tuberosum. 2. S. semidecurrentibus: fol. summis oppositis.
orientale. 3. S. fol. ouatis suppetiolatis.

186. CERINTHE. *Corollae* limbus tubulato-ventricosus: fauce peruia. *Semina* 2, bilocularia.
195.

maior. 1. C. fol. amplexicaulibus, corollis obtusiusculis patulis.
minor. 2. C. fol. amplexicaulibus integris, corollis acutis clausis.

187. ONOSMA. *Corolla* campanulata: fauce peruia. *Semina* 4.
196.

simplicissf. 1. O. fol. confertis lanceolato-linearibus pilosis.
orientalis. 2. O. fol. lanceolatis hispidis, fructibus pendulis.
echioides. 3. O. fol. lanceolatis hispidis, fructibus erectis.

188. BORRAGO. *Corolla* rotata: fauce radiis clausa.
197.

officinalis. 1. B. fol. omnibus alternis, calyc. patentibus. *Pedunculi terminales, multiflori.*
indica. 2. B. fol. ramificationum oppositis amplexicaulibus, pedunc. vnifloris.
africana. 3. B. fol. oppositis petiolatis ouatis, pedunc. multifloris. *Planta hispida, stimulis adspersa. Folia ouata, opposita, petiolata, at floralia alterna. Pedunculi e summis alis & ramulis, pilosi, multiflori. Flores parui, cernui, caerulaei, medio flauo, punctis 5 purpureis.*
orientat. 4. B. calyc. tubo corollae breuioribus, fol. cordatis. *Pedunculi axillares multiflori.*

189. ASPERVGO. *Cal.* fructus compreſſus: lamellis plano-parallelis, ſinuatis.
198.

procumb. 1. A. calyc. fructus compreſſis.
aegyptiaca. 2. A. calyc. fructus ventricoſis.

190. LYCOPSIS. *Corolla* tubo incuruato.
198.

veſicaria. 1. L. fol. integerrimis, caule proſtrato, cal. fructeſcentibus inflatis pendulis.
pulla. 2. L. fol. integerrimis, caule erecto, cal. fructeſcentibus inflatis pendulis.
variegata. 3. L. fol. repandis dentatis calloſis, caule decumbente coroll. cernuis.
aruenſis. 4. L. fol. lanceolatis hiſpidis, calyc. floreſcentibus erectis.
orientalis. 5. L. fol. ouatis integerrimis ſcabris, calyc. erectis.
virginic. 6. L. fol. lineari-lanceolatis confertis tomentoſis mollibus, caule erecto.

191. ECHIVM. *Cor.* irregularis, fauce nuda.
199.

fruticoſum. 1. E. caule fruticoſo, ramis foliisque piloſis. Buglossum africanum, echii folio, flore purpureo. *Pluk. mant.* 33. *t.* 341. *f.* 7. *Stamina corolla non longiora.*
capitatum. 8. E. caule piloſo, flor. capitato-corymboſis aequalibus, ſtamin. corolla longioribus, fol. hiſpidis. *Mant.* 42. *.
laeuigatum. 2. E. caule laeui, fol. lanceolatis nudis margine apiceque ſcabris aequalibus. (*excluſo ſynonymo Plukeneti.*)
italicum. 3. E. caule erecto piloſo, ſpicis hirſutis, corollis ſubaequalibus: ſtaminib. longiſſimis. *Hudſ. angl.* 70.
vulgare. 4. E. caule tuberculato-hiſpido, fol. caulinis lanceolatis hiſpidis, flor. ſpicatis lateralibus.
violaceum. 9. E. corol. ſtamina aequantibus, tubo calyce breuiore. *Mant.* 42. *
creticum. 5. E. caule procumbente, calyc. fructeſcentibus diſtantibus.
orientale. 6. E. caule ramoſo, fol. caulinis ouatis, flor. ſolitariis lateralibus.
luſitanic. 7. E. corollis ſtamine longioribus.

1245.

1245. MESSERSMIDIA. *Cor.* infundibulif. fauce nuda. *Bacca* ſuberoſa, bipartibilis : ſingulo diſpermo.

Arguzia. Messersmidia. *Mant.* 42. * Tournefortia ſibirica. *Sp. pl.* 202. *Act. petrop.* 1763. *t.* 315. *t.* 11. 4.

192. TOVRNEFORTIA. *Bacca* 2-locularis, diſperma, ſupera, apice duobus poris perforata.
201.

ferrata. 1. T. fol. ouatis ſerratis, petiol. ſpineſcentibus, ſpic. terminalibus recuruis

hirſutiſſima. 2. T. fol. ouatis petiolatis, caule hirſuto, ſpic. ramoſiſſimis terminalibus.

volubilis. 3. T. fol. ouatis acuminatis glabris, petiol. reflexis, caule volubili.

foetidiſſima. 4. T. fol. ouato-lanceolatis hirtis, pedunc. ramoſis, ſpicis pendulis.

humilis. 6. T. fol. lanceolatis ſeſſilibus, ſpic. ſimplicibus recuruis lateralibus.

cymoſa. 5. T. fol. ouatis integerrimis nudis, ſpic. cymoſis.

ſuffruticoſa. 8. T. fol. ſublanceolatis incanis, caul. ſuffruticoſo.

193. NOLANA. *Cor.* campanulata. *Stylus* inter germina. *Sem.* 5. baccata, bilocularia.
202.

proſtrata. 1. Nolana. *Lin. dec.* 1. *t.* 2. Atropa foliis geminatis, calycibus polycarpis, caule humifuſo. *Gouan. hort.* 82. *t.* Walkeria *Ehret. act. angl.* 1764. *n.* 53. *p.* 130. *t.* 10. Zwingera. *Act. helu.* 5. *p.* 267. *t.* 1, Neudorffia peruuiana repens, flore caeruleo. *Plant. fam.* 219.

194. DIAPENSIA. *Cor.* hypocraterif. *Cal.* 5-phyllus, imbricatus foliolis tribus. *Stamina* tubo corollae impoſita. *Capſ.* 3-locularis.
202.

lapponic. 1. D. florib. pedunculatis.
helvetica. 2. D. floribus ſubſeſſilibus. *Iacq. vind.* 303. * *Semina quinque, cuneiformi globoſa. Capſula 5-valvis.*

195. ARETIA. *Cor.* hypocraterif. 5-fida: tubo ouato. *Stigma* depreſſo-capitatum. *Capſ.* 1-locularis, globoſa.
203.

alpina. 1. A. ſcapis vnifloris. *Flores caerulei ſegmentis emarginatis. Capſula 5 valvis.*

196. ANDROSACE. *Involucrum.* vmbellulae. *Corollae* tubus ouatus: ore glanduloſo. *Capſ.* 1-locularis, globoſa.
203.

maxima. 1. A. perianthiis fructuum maximis.
elongata. 6. A. fol. ſubdentatis, pedicellis longiſſimis, corollis calyce breuioribus.
ſeptentrionalis. 2. A. fol. lanceolatis dentatis glabris, perianth. angulatis corolla breuioribus.
villoſa. 3. A. fol. piloſis, perianth. hirſutis.
lactea. 4. A. fol. lanceolatis glabris, vmbella inuolucris multoties longiore.
carnea. 5. A. fol. ſubulatis glabris, vmbella inuolucra aequante.

197. PRIMVLA. *Involucr.* vmbellulae. *Corollae* tubus cylindricus ore patulo.
204.

veris. 1. P. fol. dentatis rugoſis.
farinoſa. 2. P. fol. crenatis glabris, florum limbo plano.
Auricul. 3. P. fol. ſerratis glabris.

mini-

minima. 5. P. fol. cuneiformibus dentatis nitidis hirſutis, ſcapis ſubunifloris. Primula foliis cuneiformibus nitidis, ſcapis vnifloris: *Iacq. vind. 208. ſpec. t. 14.* Primula foliis petiolatis hirſutis ouatis ſerratis, ſcapo paucifloro. *Hall. emend. 40. Inuolucrum diphyllum. Calyx tubo breuior, vnicus, ſeſſilis. Corolla lutea, intus hirſuta.*

Vitaliana. 6. P. fol. linearibus integerrimis, flor. ſeſſilibus. *Caules procumbentes. Folia hirſuta. Flos, 1. ſ. 2. pedunculo proprio, breui. ex apice caulis.*

integrifolia. 4. P. fol. integerrimis glabris oblongis, calyc. tubulosis obtuſis. *Iacq. vid. 209. ſpec. t. 15, Corollae laciniae ſemibifidae tubo ſimplici absque collo coarctato.*

198. CORTVSA. *Corolla* rotata: fauce annulo eleuato. *Capſ.* 1-locularis, oualis, apice 5-valui.
206.

Matthiol. 1. C. calycibus corolla breuioribus. *All. act. helu. 4. p. 271.*

Gmelini. 2. C. calycibus corollam excedentibus. *Folia renifor. mi-cordata, crenis lobata lobis rotundatis, pilis adſperſa, longius petiolata. Scapi nudi, foliis altiores. Vmbella ſubtriflora inuolucri foliolis ouatis. Corollae albae.*

199. SOLDANELLA. *Corolla* campanulata, lacero-multifida. *Capſ.* 1-locularis,, apice multidentata.
206.

alpina. 1. SOLDANELLA.

200. DODECHATEON. *Cor.* rotata, reflexa. *Stam.* tubo inſidentia. *Capſ.* 1-locularis oblonga.
207.

Meadia. 1. DODECATHEON.

201. CYCLAMEN. *Cor.* rotata, reflexa, tubo breuiſſimo: fauce prominente. *Bacca* tecta capſula.
207.

europaeum. 1. C. Corolla retroflexa.

indicum. 2. C. corolla limbo nutante.

202. MENYANTHES. *Corolla* hirsuta. *Stigma* 2-fidum. *Capſ.* 1-locularis.
207.

Nymph. 1. M. fol. cordatis integerrimis, coroll. ciliatis.
Indica. 2. M. fol. cordatis ſubcrenatis, petiolis floriferis, coroll. interne pilloſis. *Rumph. amb. 6. t. 72.*
trifoliat. 3. M. foliis ternatis.

203. HOTTONIA. *Corolla* hypocrateriformis. *Stamina* tubo corollae impoſita. *Capſ.* 1-locularis.
208.

paluſtris. 1. H. pedunculis verticillato-multifloris.
indica. 2. H? pedunculis axillaribus vnifloris.

204. HYDROPHYLLVM. *Cor.* campanulata, interne ſtriis 5, melliferis longitudinalibus *Stigm.* 2-fidum. *Capſ.* globoſa, 2-valuis.
208.

virginicum. 1. H. foliis pinnatifidis. Dentariae affinis, Echii flore, capſula anagallidis. *Dod. mem. 77. t. 77.*
canadenſ. 2. H. foliis lobato-angulatis.

205. LYSIMACHIA. *Cor.* rotata. *Capſ.* globoſa, mucronata 10-valuis.
209.

* *Pedunculis multifloris.*

vulgaris. 1. L. paniculata, racem. terminalibus.
Ephemerum. 2. L. racem. ſimplicibus terminalibus, petalis obtuſis, ſtaminibus corolla breuioribus.
atropurpurea. 3. L. ſpicis terminalibus, petalis lanceolatis, ſtamin. corolla longioribus.
thyrſiflor. 4. L. racemis lateralibus pedunculatis.

** *Pedunculis vnifloris.*

quadrifolia. 5. L. fol. quaternis ſubſeſſilibus, pedunc. quaternis vnifloris.

pun-

punctata. 6. L. fol. ſubquaternis, pedunc. verticillatis vniflorîs.
ciliata. 7. L. petiol. ciliatis, flor. cernuis. *Pedunculus ſub flore turbinatus. Petala ſerrata mucronata.*
Linum-ſtellat. 8. L. calyc. corollam ſuperantibus, caule erecto ramoſiſſimo. *Corolla Centunculi 5-fida. Fructus 5-valuis.*
nemorum. 9. L. fol. ouatis acutis, floribus ſolitariis, caule procumbente. *Oed. dan. t.* 174.
Nummul. 10. L. fol. ſubcordatis, flor. ſolitariis, caule repente.
tenella. 11. L. fol. ouatis acutiuſculis, pedunc. folio longioribus, caule repente.

206. ANAGALLIS. *Cor.* rotata. *Capſ.* circum-
211. ſciſſa.

aruenſis. 1. A. fol. indiuiſis, caule procumbente.
monelli. 2. A. fol. indiuiſis, caule erecto.
latifolia. 3. A. fol. cordatis amplexicaulibus, caule compreſſo.
linifolia. 4. A. fol. linearibus, caule erecto.

207. THEOPHRASTA. *Cor.* campanul. laciniis et
212. diuiſuris obtuſis. *Capſ.* 1-locularis, globoſa, maxima, polyſperma.

americana. 1. THEOPHRASTA.

208. SPIGELIA. *Cor.* infundibulif. *Capſ.* didyma,
213. 2-locularis, polyſperma.

Anthelm. 1. SPIGELIA.

209. OPHIORRHIZA. *Cor.* infundibulif. *Germen*
213. 2-fidum. *Stigmata* 2. *Fructus.* 2-lobus.

Mungos. 1. O. foliis lanceolato-ouatis.
Mitreola. 2. O. foliis ouatis.

1248. LISIANTHVS. *Cor.* tubo ventricoſo laciniis recuruatis. *Cal.* carinatus. *Stigm.* 2-lobum. *Capſ.* 2-locularis, oblonga.

longifolius. 1. L. fol. lanceolatis. *Mant. 43.*
cordifolius. 2. L. fol. cordatis. *Mant. 43.*

210. RANDIA. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* hypocraterif.
213. *Bacca* 1-locularis cortice capſulari.

mitis. 1. R. ſubinermis.
aculeata. 2. R. Ramis biſpinoſis.

211. AZALEA. *Cor.* campanulata. *Stamina* recepta-
214. culo inſerta. *Capſ.* 5-locularis.

pontica. 2. A. fol. nitidis lanceolatis vtrinque glabris, racemis terminalibus. *Sp. pl.* 1669.
indica. 1. A. flor. ſubſolitariis, calyc. piloſis.
nudiflora. 2. A. fol. ouatis, corollis piloſis, ſtaminibus longiſſimis.
viſcoſa. 4. A. fol. margine ſcabris, corollis piloſo-glutinoſis.
lapponic. 5. A. foliis adſperſis punctis excauatis.
procumb. 6. A. ramis diffuſo procumbentibus.

212. PLVMBAGO. *Cor.* infundibulif. *Stamina* ſqua-
215. mis baſin corollae claudentibus inſerta. *Stigma* 5-fidum. *Sem.* 1, oblongum, tunicatum.

europaea. 1. P. foliis amplexicaulibus lanceolatis ſcabris.
zeylanic. 2. P. foliis petiolatis ouatis glabris, caul. filiformibus.
roſea. 3. P. fol. petiolatis ouatis glabris, caule geniculis gibboſis.
ſcandens. 4. P. fol. petiolatis ouatis glabris, caul. flexuoſo-ſcandente.

1246. NIGRINA. *Cor.* infundibuliformis. *Cal.* inflatus. *Stigma* obtuſum. *Capſ?* bilocularis.

viſcoſa. 1. NIGRINA. *Mant. 42.**

213. PHLOX. *Cor.* hypocraterif. *Filamenta.* inaequalia. *Stigma* 3-fidum. *Cal.* prismaticus. *Capſ.* 3-locularis, 1-ſperma.
216.

paniculata. 1. P. fol. lanceolatis margine ſcabris, corymbis paniculatis.
maculata. 2. P. fol. lanceolatis laeuibus, racemo oppoſite corymboſo.
piloſa. 3. P. fol. lanceolatis villoſis, caule erecto, corymbo terminali.
carolina. 4. P. fol. lanceolatis laeuibus, caul. ſcabro, corymb. ſubfaſtigatis.
glaberrima. 5. P. fol. lineari-lanceolatis glabris, caule erecto, corymbo terminali.
diuaricat. 6. P. fol. lato-lanceolatis: ſuperioribus alternis, caule bifido, pedunculis geminis.
ouata. 7. P. fol. ouatis, flor. ſolitariis.
ſubulata. 8. P. fol. ſubulatis hirſutis, flor. oppoſitis.
ſibirica. 9. P. fol. linearibus villoſis, pedunc. ternis.
ſetacea. 10. P. fol. ſetaceis glabris, flor. ſolitariis.

214. CONVOLVVLVS. *Cor.* campanulata, plicata. *Stigm.* 2. *Capſ.* 2-locularis: loculis diſpermis,
218.

* *Caule volubili.*

aruenſis. 1. C. fol. ſagittatis vtrinque acutis, pedunc. ſubunifloris.
ſepium. 2. C. fol. ſagittatis poſtice truncatis, pedunc. tetragonis vnifloris.
Scammonia. 3. C. fol. ſagittatis poſtice truncatis, pedunc. teretibus ſubtrifloris.
Medium. 4. C. fol. linearibus haſtato-acuminatis: auriculis dentatis, pedunc. ſubunifloris, calyc. ſagittatis, caule volubili.
panduratus. 5. C. fol. cordatis integris panduriformibus, calyc. laeuibus.
carolinus. 6. C. fol. cordatis integris trilobisque villoſis, calyc. laeuibus, capſ. hirſutis, pedunc. ſubbifloris.

hede-

hederac. 7. C. fol. cordatis integris trilobisque, coroll. indiui. fis, fructibus erectis:

Nil. 8. C. fol. cordatis trilobis, coroll. ſemiquinquefidis, pedunculis petiolo breuioribus.

purpureus. 9. C. fol. cordatis indiuiſis, fructibus cernuis, pedicellis incraſſatis.

Batatas. 11. C. fol. cordatis haſtatis quinqueneruiis, caule repente tuberifero hiſpido. *An huius plures ſpecies diſtinctae?*

biflorus. 43. C. fol. cordatis pubeſcentibus, pedunc. geminis, corollis lobis trifidis. *Sp. pl.* 1668.

verticillatus. 12. C. fol. cordatis oblongis nudis, pedunc. vmbellatis bifidis multifloris.

vmbellat. 13. C. fol. cordatis, caule volubili, pedunc. vmbellatis.

malabar. 14. C. fol. cordatis glabris, caule perenni villoſo.

canarienſis. 15. C. fol. cordatis pubeſcentibus, caule perenni villoſo, pedunc. multifloris.

muricat. 47. C. fol. cordatis, pedunc. incraſſatis calycibusque laeuibus, caule muricato. *Mant.* 44.*

anceps. 44. C. fol. cordatis, caule volubili vtrinque carinato. *Mant.* 43.*

Turpethum. 17. C. fol. cordatis angulatis, caule membranaceo quadrangulari, pedunc. multifloris.

peltatus. 16. C. fol. peltatis, pedunc. multiflor. *Rumph. amb.* 5. *t.* 157.

Ialapa. 45. C. fol. difformibus; cordatis angulatis oblongis lanceolatisque, caul. volubili, pedunculis vnifloris. *Mant.* 43.*

ſericeus. 46. C. fol. lanceolato-ellipticis, ſubtus tomentoſo-ſericeis, pedunc. ſubvmbellatis, calyc. pilloſis, caule volubili. *Mant.* 43.*

tomentoſ. 18. C. fol. trilobis tomentoſis, caule lanuginoſo.

althaeoides. 19. C. fol. cordatis ſinuatis ſericeis: lobis repandis, pedunc. bifloris, *ſpontanea pedunculis vniſloris eſt.*

cairicus. 21. C. fol. palmato-pinnatifidis integerrimis, pedunc. paniculatis.

macrocarpos. 20. C. fol. palmato-pedatis quinquepartitis, pedunc. vnifloris.

paniculatus. 23. C. fol. palmatis: lobis ſeptem ouatis acutis integerrimis, pedunc. paniculatis.

macrorhizos. 22. C. fol. digitatis ſeptenis integerrimis : caul. glabro, pedunc. trifloris.

quinquefolius. 25. C. fol. digitatis glabris dentatis, pedunc. laeuibus.

pentaphyllus. 24. C. fol. digitatis quinis piloſis integerrimis, caule piloſo.

** *Caule proſtrato, ſ. non volubili.*

ſiculus. 26. C. fol. cordato-ouatis, pedunc. vnifloris: bracteis lanceolatis, flor. ſeſſilibus.

lineatus. 29. C. fol. lanceolatis ſericeis lineatis petiolatis, pedunc. bifloris, calycibus ſericeis ſubfoliaceis. *All. taur.* 55.

Cneorum. 30. C. fol. lanceolatis tomentoſis, flor. vmbellatis, calyc. hirſutis, caule erecto. *Caulis terminatur Vmbella tetraphylla, 5-radiata : Pedunculo centrali vnifloro; aphyllo; lateralibus 4-ſ. 5-floris. Bracteae 2 ſub bifurcatura, et 2 ſub altero flore. Calyces obtuſi: hirſuti vti bracteae.*

Cantabrica. 31. C. fol. lineari-lanceolatis acutis, caule ramoſo erectiuſculo, calyc. piloſis, pedunc. ſubbifloris. β. Conuoluulus terreſtris. *Sp. pl.* 224.

Dorycnium. 28. C. fol. ſublinearibus ſericeis, caule fruticuloſo paniculato, calyc. nudiuſculis obtuſis.

corymboſ. 33. C. fol. cordatis, pedunc. vmbellatis, caule repente.

ſpithamaeus. 32. C. fol. cordatis pubeſcentibus, caule recto, pedunculis vnifloris.

perſicus. 34. C. fol. oualibus tomentoſis, pedunc. vnifloris. *Tota planta Verbaſci inſtar tomentoſa. Flos albus, Lerche.*

tricolor. 35. C. fol-lanceolato-ouatis glabris, caule declinato, floribus ſolitariis.

repens. 36. C. fol. ſagittatis poſtice obtuſis, caule repente, pedunculis vnifloris.

reptans. 37. C. fol. haſtato-lanceolatis : auriculis rotundatis, caule repente, pedunc. vnifloris.

hirtus. 38. C. fol. cordatis ſubhaſtatisque villoſis, caule petioliſque piloſis, pedunc. multiflor.

Soldanell. 39. C. fol. reniformibus, pedunc. vnifloris.

Pes caprae. 40. C. fol. bilobis, pedunc. vnifloris.

braſ.

braſilienſ. 41. C. fol. emarginatis baſi biglandulofis, pedunc. trifloris.

littoralis. 42. C, fol. oblongis lobato-palmatis, pedunc. vnifloris, caule repente. *Plum. ic. 90. f. 2.*

215. IPOMOEA. *Cor.* infundibulif. *Stigma.* capitato-globoſum. *Capſ.* 3-locularis.

227.

* *Floribus diſtinctis.*

Quamoclit. 1. I. fol. pinnatifidis linearibus, flor. ſubſolitariis.

vmbellat. 2. I. fol. digitatis ſeptenis, pedunc. vmbellatis breuiſſimis.

carolina. 3. I. fol. digitatis: foliolis petiolatis, pedunc. vnifloris.

coccinea. 6. I. fol. cordatis acuminatis baſi angulatis, pedunc. multifloris.

lacunoſa. 7. I. fol. cordatis acuminatis ſcrobiculatis baſi angulatis, pedunc. ſubunifloris flore breuioribus.

ſolanifol. 11. I. fol. cordatis acutis integerrimis, flor. ſolitariis.

tuberoſa. 4. I. fol. palmatis: lobis ſeptenis lanceolatis acutis integerrimis, pedunc. trifloris. *Iacq. obſ. 39.* Ipomoea heptadactyla maior ſcandens, flore maiori campanulato, calyce membranaceo, ſeminibus villoſis. *Brown. iam. 155. Flores ſulphurei.*

digitata. 5. I. fol. palmatis: lobis ſeptenis lanceolatis obtuſis, pedunc. trifloris.

bona nox. 9. I. fol. cordatis acutis integerrimis, caul. aculeato, flor. ternis, coroll. indiuiſis.

campanulata. 8. I. fol. cordatis, pedunc. multifloris, perianthio exteriore orbiculari, coroll. campanulatis lobatis.

violacea. 10. I. fol. cordatis integerrimis, flor. confertis, corollis indiuiſis.

carnea. 18. I. fol. cordatis glabris, pedunc. multifloris, coroll. marginatis. *Sp. pl.* 1668.

repanda. 19. I. fol. cordatis oblongis repandis, pedunc. ramoſis cymoſis. *Sp. pl.* 1668.

glaucifol. 12. I. fol. ſagittatis poſtice truncatis, pedunc. bifloris,

triloba. 13. I. fol. trilobis cordatis, pedunc. trifloris.

hederifol. 14. I. fol. trilobis cordatis, pedunc. multifloris racemoſis.

* * *Floribus aggregatis.*

hepaticif. 15. I. fol. trilobis, flor. aggregatis.

tamni-

tamnifol. 16. I. fol. cordatis acuminatis pilosis; flor. aggregatis.
Pes tigrid. 17. I. fol. palmatis, flor. aggregatis.

216. POLEMONIVM. *Cor.* 5-partita. *Stamina* 230. squamis basin corollae claudentibus inserta. *Stigma.* 3-fidum. *Capsf.* 3-locularis, supera.

caeruleum. 1. P. fol. pinnatis, flor. erectis, calyc. tubo corollae longioribus
reptans. 2. P. fol. pinnatis septenis, flor. terminalibus nutantibus. *Differt a praecedenti Radice repente; Foliolis 7, nec 17; Panicula laxa, subnutante, nec stricta.*
rubrum. 3. P. fol. pinnatifidis linearibus, flor. racemosis pendulis.
dubium. 4. P. fol. inferioribus hastatis, superioribus lanceolatis. †

217. CAMPANVLA. *Cor.* campanulata fundo 231. clauso valuis staminiferis. *Stigma* 3-fidum. *Capsf.* infera, poris lateralibus dehiscens.

* *Foliis laeuioribus angustioribus.*

cenisia. 41. C. caul. vnifloris, fol. ouatis glabris integerrimis subciliatis. *Sp. pl.* 1669. *Hall. emend.* 161.
vniflora. 1. C. caule vnifloro, calyce corollam aequante. *Caulis solitarius erectus.*
pulla. 1. C. cauliculis vnifloris, fol. caulinis ouatis crenatis, calyc. cernuis. *Iacq. obs. 30. t. 18.*
rotundif. 3. C. fol. radicalibus reniformibus, caulinis linearibus.
patula. 4. C. fol. strictis: radicalibus lanceolato-oualibus, panicula patula.
Rapunculus. 5. C. fol. vndulatis: radicalibus lanceolato oualibus, panicula coarctata.
perfoliifol. 6. C. fol. radicalibus obouatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis.
pyramidalis. 7. C. fol. laeuibus serratis cordatis: caulinis lanceolatis: caulib. iunceis simplicibus, vmbellis sessilibus lateralibus.

ame-

americana. 8. C. fol. cordatis lanceolatisque, petiolis ciliatis, flor. ſecundis, coroll. quinquepartitis planis.

lilifolia. 9. C. fol. lanceolatis: caulinis acute ſerratis, flor. paniculatis nutantibus.

rhomboid. 10. C. fol. rhomboidibus ſerratis, ſpica ſecunda, calycib. dentatis. *β.* Campanula alpini. *Sp. pl.* 1669.

** *foliis ſcabris latioribus.*

latifolia. 11. C. fol. ouato lanceolatis, caule ſimpliciſſimo tereti, flor. ſolitariis pedunculatis, fruct. cernuis.

rapunculoides. 12. C. fol. cordato-lanceolatis, caule ramoſo, flor. ſecundis, ſparſis, calyc. reflexis.

bononienſis. 13. C. fol. ouato-lanceolatis ſubtus ſcabris ſeſſilibus; caule paniculato. †

graminif. 14. C. fol. lineari-ſubulatis, capitulo terminali. *Similis Phyteumae hemiſphaericae, ſed grandior. Radix multis caeſpitibus. Folia anguſtiſſima, graminea. baſi ciliata; caulina ſubamplexicaulia, moxque ſubulata. Caules ſimpliciſſimi, vix foliis longiores. Flores faſciculati in capitulum, Bracteis ovatis apice ſubulatis. Stigma bifidum.*

alpina. 41. C. caule ſimplici, pedunc. vnifloris axillaribus diphyllis. *Sp. pl.* 1669. *Bracteae duae.*

ſpicata. 15. C. hiſpida, ſpica laxa; flor. alternis, fol. linearibus integerrimis.

Trachelium. 16. C. caule angulato, fol. petiolatis, calyc. ciliatis, pedunc. trifidis.

glomerat. 17. C. caule angulato ſimplici, flor. ſeſſilibus, capitulo terminali.

Ceruicar. 18. C. hiſpida, flor. ſeſſilibus, capitulo terminali, fol. lanceolato-linearibus vndulatis.

thyrſoidea. 19. C. hiſpida racemo ouato-oblongo terminali, caule ſimpliciſſimo, fol. lanceolato-linearibus. *Iacq. vind.* 211. *obſ.* 34. *t.* 21.

petraea. 20. C. caul. angulato ſimplici, flor. ſeſſilibus capitato-glomeratis, fol. ſubtus tomentoſis. *Pluk. phyt.* 152. *f.* 1.

*** *Capſulis obtectis calycis ſinubus reflexis.*

dichotom. 24. C. capſ. quinquelocularibus obtectis, caule dichotomo, flor. cernuis.

Me-

Medium. 21. C. capſ. quinquelocularibus obtectis, caul. indiviſo, erecto folioſo, flor. erectis.

barbata. 22. C. capſ. quinquelocularibus obtectis, caule ſimpliciſſimo unifolio, fol. lanceolatis, corollis barbatis.

mollis. 25. C. capſ. quinquelocularibus obtectis pedunculatis, caul. proſtrato, fol. ſuborbiculatis. Campanula hirſuta, ocymi folio caulem ambiente, flore pendulo. *Bocc. ſic.* 83. Viola mariana minor caerulea, folio ſubrotundo, calyce corniculato. *Barr. ic.* 759.

ſaxatilis. 26. C. capſ. quinquecarinatis obtectis, flor. alternis nutantibus, fol. obouatis crenatis.

ſibirica. 23. C. capſ. trilocularibus obtectis, caule paniculato.

tridentata. 42. C. capſ. quinqueloculari obtecta, caule vnifloro, fol. radicalibus tridentatis. *Mant.* 44. *

laciniata. 27. C. capſ. obtectis pedunculatis, fol. ſerratis: radicalibus lyratis; caulinis lanceolatis.

ſtricta. 28. C. capſ. obtectis, fol. hirtis: caulinis lanceolatis ſerratis, caul. ſimpliciſſimo, flor. ſeſſilibus.

canarienſis. 29. C. capſ. quinquelocularibus, fol. oppoſitis haſtatis dentatis petiolatis.

Radix *tuberoſo-fuſiformis.* Caulis *ſolitarius, erectus, teres, laeuis, tripedalis articulis ineraſſatis.* Rami *terni: ſuperioribus longioribus, apice dichotomis.* Folia *petiolata, haſtata, denticulata, laeuia, venoſa*: Caulina *terna;* Ramea *oppoſita.* Flores *e dichotomia ramorum ſuperiorum, ſolitarii, pedunculati, cernui.* Calyx *germine hexagono, coronato foliolis lanceolatis, recuruatis, laeuibus.* Corolla *campanulata, foliis maior, rufa Fritillariae imperialis.* Nectarium *valuulis diſtantibus.* Filamenta *patentia.* Antherae *apice pendulae.* Stylus *clauatus, ſtaminibus longior.* Stigma *fiſſum; plerumque numerus* Senarius *in germine, calyce, corolla, ſtaminibus, nectario, Stigmate; rarius* quinarius *obtinet.*

fruticoſa. 30. C. capſ. columnaribus quinquelocularibus, caule fruticoſo, fol. lineari-ſubulatis, pedunc. longiſſimis.

Speculum. 31. C. caule ramoſiſſimo diffuſo, fol. oblongis ſubcrenatis, flor. ſolitariis, capſ. priſmaticis.

hybrida. 32. C. caule basi subramoso stricto, fol. oblongis crenatis, calyc. aggregatis corolla longioribus, capsf. prismaticis.

Pentagonia. 34. C. caule subdiuiso ramosissimo, fol. linearibus acuminatis.

perfoliata. 35. C. caule simplici, fol. cordatis dentatis amplexicaulibus, flor. sessilibus aggregatis.

capensis. 36. C. fol. lanceolatis dentatis hispidis, pedunc. longissimis, capsf. strigosis.

Elatines. 37. C. fol. cordatis dentatis pubescentibus petiolatis, caul. prostratis, pedunc. capillaribus multifloris.

hederacea. 38. C. fol. cordatis quinquelobis petiolatis glabris, caule laxo.

erinoides. 43. C. caul. diffusis, fol. lanceolatis subserratis decurrentibus linea scabra. flor pedunculatis solitariis. *Mant.* 44. *

heterophylla. 39. C. fol. subouatis glabris integerrimis, caulibus diffusis.

Erinus. 40. C. caul. dichotomo, fol. sessilibus: superioribus oppositis tridentatis. *Ramificatio oppositа. Corolla regularis, calyce minor. Stigma trifidum; omnia campanulae.*

218. ROELIA. 241.

Cor. infundibulif. fundo clauso staminiferis valvulis. *Stigma* 2-fidum. *Capsf.* 2-locularis. cylindrica, infera.

ciliata. 1. R. fol. ciliatis: mucrone recto.

reticulata. 2. R. fol. ciliatis: mucrone reflexo. *Folia Gorteriae ciliaris.*

219. PHYTEVMA. 241.

Cor. rotata laciniis linearibus, 5-partita. *Stig.* 3-fidum. *Capsf.* 2-s. 3-locularis, infera.

pauciflor. 1. P. capitulo subfolioso. fol. omnibus lanceolatis. *Capsf. 2. s. 3-locularis.*

hemisphe-rica. 2. P. capit. subrotundo, fol. linearibus integerrimis.

orbicu-

orbicular. 3. P. capit. ſubrotundo, fol. ſerratis: radicalibus cordatis. 24.
ſpicata. 4. P. ſpica oblonga, capſ. bilocularibus, fol. radicalibus cordatis.
comoſa. 5. P. faſciculo terminali ſeſſili, fol. dentatis; radicalibus cordatis. *Barr. ic.* 889.
pinnata. 6. P. flor. ſparſis, fol. pinnatis.

220. TRACHELIVM. *Cor.* infundibuliform. *Stigma* globoſum. *Capſ.* trilocularis, infera.
243.

caeruleum. 1. TRACHELIVM.

221. SAMOLVS. *Cor.* hypocrateriformis. *Stamina* munita ſquamulis corollae. *Capſ.* 1-locularis, infera.
243.

valerandi. 1. SAMOLVS.

222. NAVCLEA. *Cor.* infundibuliformis. *Sem.* 1, inferum, biloculare. *Receptac. commune* globoſum.
243.

orientalis. 1. NAVCLEA.

223. RONDELETIA. *Cor.* infundibuliformis. *Capſula* 2-locularis, infera, polyſperma, ſubrotunda, coronata.
243.

americ. 1. R. fol. ſeſſilibus, panicula dichotoma.
aſiatica. 1. R. fol. petiolatis oblongis acutis.
obouata. 4. R. fol. petiolatis ſubouatis obtuſis. *Sp. pl.* 1671.
trifoliata. 3. R. fol. ternis. *Sp. pl.* 1671.

224. MACROCNEMVM. *Cor.* campanulata. *Capſ.* infera, 2-locularis. *Sem.* imbricata.
244.

jamaicenſe. 1. MACROCNEMVM.

225. BELLONIA. *Cor.* rotata. *Capſ.* 1-locularis, infera, polyſperma, calyce roſtrata.
244.

aſpera. 1. BELLONIA.

226. PORTLANDIA. *Cor.* clauato-infundibuliformis. *Antherae* longitudinales. *Capſ.* pentagona, retuſa, bilocularis, polyſperma, coronata calyce 5-phyllo.
244.

grandifl. 1. P. flor. pentandris.
hexandra. 2. P. flor. hexandris. *Mant.* 45. *

227. CINCHONA. *Cor.* infundibulif. apice lanata, *Capſ.* infera, 2-locularis, diſſepimento parallelo.
244.

officinal. 1. CINCHONA. *Folia oppoſita, petiolata, integerrima, ſubtus tomentoſa. Flores paniculati, pedicellati. Cal. monophyllus, minimus, campanulatus, obſoletiſſime 5-dentatus. Cor. infundibuliformis, extus tomentoſa: Tubus cylindricus, calyce multoties longior. Limbus tubo breuior, 5-partitus: laciniis ouato-oblongis, patentibus, apice intus margineque lanatus. Filamenta 5, ſetacea, e medio tubi. Antherae oblongae, ſupra baſin exteriorem affixae in fauce corollae. Capſula bipartibilis, dehiſcens in duas partes diſſepimento parallelo, latere interiore dehiſcentes. miſit D. Mutis.*

228. PSYCHOTRIA. *Cal.* 5-dentatus, coronans. *Cor.* tubuloſa. *Bacca* globoſa. *Sem.* 2, hemiſphaerica, ſulcata.
245.

aſiatica. 1. PSYCHOTRIA ſtipulis emarginatis, fol. lanceolato-ouatis. Pſychotria cartaginenſis fruteſcens, fol. obouatis. *Iacq. amer.* 65. *t.* 174. *f.* 22.

her.

herbacea. 2. P. caule herbaceo repente, fol. cordatis petiolatis. *Iacq. amer.* 66. *t.* 46.

229. COFFEA 246. *Cor.* hypocrateriformis. *Stamina* ſupra tubum. *Bacca* infera, diſperma. *Sem.* arillata.

arabica. 1. C. flor. quinquefidis diſpermis. *Folio ſubtus in alis neruorum coſtalium punctо ſecretorio inſtruuntur.*

occidentalis. 2. C. flor. quadrifidis, baccis monoſpermis. *Iacq. amer.* 67. *t.* 47.

230. CHIOCOCCA. 346. *Cor.* infundibuliformis, aequalis. *Bacca* 1-locularis, 2-ſperma, infera.

racemoſa. 1. C. fol. oppoſitis *β.* Chiococca ſcandens ſarmentis tenuiſſimis et fere indiuiſis. *Brown. jam.* 164. *obſ.* Chiococca alternifolia *an Ceſtri ſpecies?*

231. HAMELLIA. 246. *Cor.* 5-fida. *Bacca* 5-locularis, infera, polyſperma.

patens. 1. H. racemis patentibus. *Iacq. amer.* 71. *t.* 50. *an vna vel plures ſpecies?*

232. LONICERA. 246. *Cor.* monopetala, irregularis. *Bacca* polyſperma, 2-locularis, infera.

* Periclymena *caule volubili.*

Caprifolium. 1. L. flor. verticillatis terminalibus ſeſſilibus, fol. ſummis connato-perfoliatis.

ſempervirens. 2. L. verticillis aphyllis terminalibus, fol. ſummis connato-perfoliatis. *Flores fere regulares.*

dioica. 14. L. verticillis aphyllis terminalibus, fol. omnibus connato-perfoliatis.

Periclymenum. 3. L. capitul. ouatis imbricatis terminalibus, fol. omnibus diſtinctis.

* * Chamaeceraſa *pedunculis biſloris.*

nigra. 4. L. pedunc. bifloris, bacc. diſtinctis, fol. ellipticis integerrimis. *Folia iuniora hirſuta, integerrima, ſubplicata, vnde quaſi ſerrata. Stipulae ouato-lanceolatae. Bracteae ſquamis 2 aridis et foliolis 3 transuerſis latis. Calyx latiuſculus. Corolla purpuraſcens. Semina 5. Haller. emend.* 135.

tatarica. 5. L. pedunc. bifloris, bacc. diſtinctis, fol. cordatis obtuſis. *Flores albi.*

Xyloſteum. 6. L. pedunc. bifloris, bacc. diſtinctis, fol. integerrimis pubeſcentibus. *Flores albi.*

pyrenaic. 7. L. pedunc. bifloris, bacc. diſtinctis, fol. oblongis glabris.

alpigena. 8. L. pedunc. bifloris, bacc. coadunatis didymis. fol. ouali-lanceolatis. *Folia glabra. Corollae non calcaratae, luteae, inaequales. Calycis laciniae 2 ſuperiores vix diſtinctae. Bacca tota diſperma.*

caerulea. 9. L. pedunc. bifloris, bacc. coadunatis globoſis, ſtylis indiuiſis. *Cortex flauiſſimus. Semina ſaepe* 10. *Flores flaui.*

* * * *Caule erecto, pedunculis multifloris*

marilandica. 10. L. ſpicis terminalibus, fol. ouato-oblongis acuminatis diſtinctis ſeſſilibus.

Symphor. 11. L. capitul. lateralibus pedunculatis, fol. petiolatis.

Dieruill. 12. L. racem. terminalibus, fol. ſerratis.

corymboſ. 13. L. corymb. terminalibus. fol. ouatis acutis.

233. TRIOSTEVM. 250.

Cor. monopetala, ſubaequalis. *Cal.* longitudine corollae. *Bacca* 3-locularis, monoſperma, infera.

perfoliat. 1. T. floribus verticillatis ſeſſilibus.

anguſtif. 2. T. floribus oppoſitis pedunculatis.

234. MORINDA. 250.

Flores aggregati, monopetali. *Stigma* 2-fidum. *Drupae* aggregatae.

vmbellat. 1. M. erecta, fol. lanceolato-ouatis, pedunc. confertis.

citrifolia. 2. M. arborea, pedunc. ſolitariis.

Royoc. 3. M. procumbens.

235. CONOCARPVS. *Cor.* 5-petala? *Semina* nuda, 250. solitaria, infera. *Flores* aggregati.

erecta. 1. C. erecta, fol. lanceolatis. *Iacq. amer.* 78. *t.* 52. *f.* 1. Conocarpus Manghana arbor curaſſauica, foliis ſalignis. *Cateſb. car.* 2. *p.* 33. *t.* 35.

procumbens. 3. C. procumbens, fol. obouatis. *An varietas C. erectae?*

racemoſa. 2. C. fol. lanceolato-ouatis obtuſiuſculis, fructibus ſegregatis. Conocarpus floribus completis remotis. *Iacq. amer.* 80. *t.* 53. *Huic petala* 5, *ſubrotunda; in prioribus nulla. Stamina huic* 10.

236. KVHNIA. *Flos* compoſitus, floſculoſus. *Sem.* 1662. ſolitaria: pappo plumoſo. *Receptac.* nudum.

eupatorioides. 1. KVHNIA. *Linn. dec.* 21. *t.* 11. Eupatorium alternifolium, foliis alternis, calycibus multifloris, pappo plumoſo. *Ard. ſpec.* 2. *p.* 40. *t.* 20. *Differt ab omnibus floribus compoſitis, Antheris ſeparatis, etiam ab Eupatorio foliis alternis.*

237. ERITHALIS. *Cor.* 5-partita. *Cal.* vrceolatus. 251. *Bacca* 10-locularis, infera.

fruticoſa. 1. ERITHALIS. Erithalis *odorifera* arborea erecta. *Iacq. amer.* 72. *t.* 173. *f.* 23. Sambucus ligno duro odoratiſſimo ſ. Santalum racemoſum, foliis obtuſis. *Plum. ic. t.* 249. *f.* 2. *Arbor foliis oppoſitis; Corymbis compoſitis.*

238. MENAIS. *Cor.* hypocraterif. *Cal.* 3-phyllus. 251. *Bacca* 4-locularis. *Sem.* ſolitaria.

topiaria. 1. MENAIS.

239. MVSSAENDA. *Cor.* infundibulif. *Stigm.* 2. craſſiuſcula. *Bacca* oblonga, infera. *Sem.* 4-fariam diſpoſita.
251.

fruticoſa. 1. M. panicula foliis coloratis.
formoſa. 2. M. inermis. flor. ſeſſilibus ſolitariis. *Mant.* 45. *
ſpinoſa. 3. M. ſpinoſa, flor. ſeſſilibus aggregatis. *Mant.* 45. *

240. GENIPA. *Cor.* rotata. *Stigma.* clauatum. *Bacca* bilocularis. *Sem.* nidulantia, cordata.
251.

americ. 1. GENIPA. *Plum. ic. t.* 136. Ianipha. *Marg. braſ.* 92.

1231. MATTHIOLA. *Cor.* tubuloſa, ſupera, indiuiſa. *Calyx* integer. *Drupa* nucleo globoſo.
1161.

ſcabra. 1. MATTHIOLA. *Arbuſcula viſa ſolo Plumiero, dum occurrat attente deſcribenda, imprimis quoad characterem etiamnum dubium.*

241. MIRABILIS *Cor.* infundibul. ſupera. *Cal.* inferus. *Nectarium* globoſum, germen includens.
252.

dichotom. 2. M. flor. ſolitariis axillaribus erectis ſeſſilibus.
Ialapa. 1. M. flor. congeſtis terminalibus erectis.
longiflor. 3. M. flor. congeſtis longiſſimis ſubnutantibus terminalibus, fol. ſubuilloſis.

242. CORIS. *Cor.* monopetala, irregularis. *Cal.* ſpinoſus. *Capſ.* 5-valuis, ſupera.
252.

monſpel. 1. CORIS.

1229. BROSSAEA. *Cor.* truncata. *Cal.* carnoſus.
1661. *Capſ.* 5-locularis, polyſperma.

coccinea. 1. BROSSAEA. *Planta obſcura, et charactere dubia, praeter ea quae habet Plumier. Statura Codio nonnihil ſimilis videtur.*

243. ELISIA. *Cor.* monopetala, infundibul. *Bacca*
1662. carnoſa, bilocularis. *Sem.* 2, muricata: altero ſuperiore.

Nyctelea. ELLISIA. Polemonium Nyctelea. *Sp. pl.* 231. Planta lithoſpermo affinis. *E. N. C.* 1761. *p.* 330.

244. VERBASCVM. *Cor.* rotata, ſubinaequalis. *Capſ.*
253. 2-locularis, 2-valuis.

Thapſus. 1. V. fol. decurrentibus vtrinque tomentoſis, caul. ſimplici.
Thapſoides. 12. V. fol. decurrentibus, caul. ramoſo. *an hybrida V. Thapſi?*
boerhaui. 12. V. fol. ſublyratis, flor. ſeſſilibus. *Mant.* 45.
phlomoides. 3. V. fol. ouatis vtrinque tomentoſis. inferioribus petiolatis.
Lychnit. 2. V. fol. cuneiformi-oblongis.
nigrum. 4. V. fol. cordato-oblongis petiolatis.
phoeniceum. 5. V. fol. ouatis nudis crenatis radicalibus, caule ſubnudo racemoſo. *Folia Radicalia ouata, ſubſeſſilia, nuda, laeuia, rugoſa, vix crenata. Caulis erectus, ſimplex, bipedalis. Rami ex alis infimis, erecti, ſimplices, longitudine caulis; omnes angulati, ſubpubeſcentes pilis apice viſcidis. Folia Caulina cordata, ſeſſilia, glabra, rugoſo-venoſa. Racemus omnium terminalis ſimplex, pedalis. Pedunculi ſimplices, ſolitarii, vniflori. Calyx 5-partitus: foliolis inferioribus fere minoribus. Corolla rotata, ſaturate purpurea. Filamenta purpurea, barbata: horum ſuperiora 3 barba alba. Antherae reniformes, compreſſae, nigricantes polline fuluo. Piſtillum purpureum, deflexum.*

Blattaria. 6. V. fol. amplexicaulibus oblongis glabris, pedunc. ſolitariis.
Arcturus. 7. V. fol. lyrato-pinnatis.
ſinuatum. 9. V. fol. radicalibus pinnatifido-repandis tomentoſis; caulinis amplexicaulibus nudiuſculis; rameis primis oppoſitis.
osbeckii. 10. V. fol. inciſis nudis, caule folioſo, calyc. lanatis, pedunc. biflоris.
ſpinoſum. 8. V. caule folioſo ſpinoſo fruteſcente.
myconi. 11. V. fol. lanatis radicalibus, ſcapo nudo. *Trew. ehret.* 26. *t.* 57. *Mill. ic. t.* 277.

245. DATVRA *Cor.* infundib. plicata. *Cal.* tubuloſus, angulatus, deciduus. *Capſ.* 4-valuis. 255.

ferox. 1. D. pericarpiis ſpinoſis erectis ouatis: ſpinis ſummis maximis conuergentibus.
Stramon. 2. D. pericarp. ſpinoſis erectis ouatis, fol. ouatis glabris.
Tatula. 3. D. pericarp. ſpinoſis erectis ouatis, fol. cordatis glabris dentatis.
faſtuoſa. 5. D. pericarp. tuberculatis nutantibus globoſis, fol. ouatis angulatis. *Rumph. amb.* 5. *t.* 243. *f.* 2. *Caulis rufus punctis ſ. lineolis albis.*
Metel. 4. D. pericarp. ſpinoſis nutantibus globoſis, fol. cordatis ſubintegris pubeſcentibus. *Calyx non angulatus, ſed teres, ſubtumidus, peniformis.*
arborea. 6. D. pericarp. glabris inermibus nutantibus, caule arboreo.

246. HYOSCYAMVS *Cor.* infundibul. obtuſa. *Stam.* inclinata. *Capſ.* operculata, 2-locularis. 257.

niger. 1. H. fol. amplexicaulibus ſinuatis, flor. ſeſſilibus.
albus. 2. H. fol. petiolatis ſinuatis obtuſis, flor. ſubſeſſilibus.
aureus. 3. H. fol. petiolatis dentatis acutis, flor. pedunculatis, fructib. pendulis.
muticus. 6. H. fol. petiolatis ouatis acutangulis; cal. muticis, bracteis indiuiſis. *Mant.* 45. *

puſil-

puſillus. 4. H. fol lanceolatis dentatis : floralibus inferioribus binis, calyc. ſpinoſis.

phyſaloides. 5. H. fol. ouatis integerrimis, calyc. inflatis ſubgloboſis. *Deſcriptio Pulmonariae hirtae Sp. pl.* 1667. *huius eſt. Figura in Diſſert. Aphonini.*

Scopolia. 7. H. fol. ouatis integris, cal. inflatis campanulatis laeuibus. *Mant.* 46.

247. NICOTIANA *Cor.* infundibul. limbo plicato. 258. *Stam.* inclinata. *Capſ.* 2-ualuis, 2-locularis.

Tabacum. 3. N. fol. lanceolato-ouatis ſeſſilibus decurrentibus, flor. acutis.

fruticoſa. 2. N. fol. lanceolatis ſubpetiolatis amplexicaulibus, flor. acutis, caule fruteſcente.

ruſtica. 4. N. fol. petiolatis ouatis integerrimis, flor. obtuſis.

paniculata. 3. N. fol. petiolatis cordatis integerrimis, flor. paniculatis obtuſis clauatis.

virens. 5. N. fol. cordatis crenatis, racemis recuruatis, caule hiſpido pruriginoſo.

glutinoſa. 6. N. fol. petiolatis cordatis integerrimis, flor. racemoſis ſecundis ſubringentibus.

puſilla. 1. N. fol. oblongo-oualibus radicalibus, flor. racemoſis acutis.

248. ATROPA. *Cor.* campanulata. *Stam.* diſtantia. 259. *Bacca* globoſa, 2-locularis.

Mandrag. 1. A. acaulis. ſcapis vnifloris.

Belladonn. 2. A. caule herbaceo, fol. ouatis integris.

phyſaloides. 3. A. caule herbaceo, fol. ſinuato-angulatis, calyc. clauſis acutangulis. Alkekengi calyc. profunde diuiſo, fruct. ſicco. *Act. petrop.* 1761. *p.* 319.

arboreſc. 5. A. caule fruteſcente, pedunc. confertis, corollis reuolutis, fol. oblongis.

fruteſc. 4. A. caule fruticoſo, pedunc. confertis. fol. cordato-ouatis obtuſis.

249. PHYSALIS. *Cor.* rotata. *Stam.* conniuentia. 261. *Bacca* intra calycem inflatum, bilocularis.

* *Perennes.*

somnifer. 1. P. caule fruticoso, ramis rectis, flor. confertis.
flexuosa. 2. P. caule fruticoso, ramis flexuosis, flor. confertis.
arboresc. 3. P. caule fruticoso, fol. ovatis pilosis, flor. solitariis, corollis reuolutis.
curassav. 4. P. caule fruticoso, fol. ouatis tomentosis.
viscosa. 5. P. fol. geminis repandis obtusis subtomentosis, caule herbaceo superne paniculato.
pensylua-nica. 11. P. fol. ouatis subrepandis obtusis nudiusculis, flor. geminis, caule herbaceo. *Sp. pl.* 1670.
Alkekeng. 6. P. fol. geminis integris acutis, caule herbaceo inferne subramoso.
peruuiana. 12. P. pubescens, fol. cordatis integerrimis. *Sp. pl.* 1670.

* * *Annuae.*

angulat. 7. P. ramosissima, ramis angulatis glabris, fol. ouatis dentatis.
pubescens. 8. P. ramosissima, fol. villoso-viscosis. flor. pendulis. *Baccae globosae, calycem replentes.*
minima. 9. P. ramosissima, pedunc. fructiferis folio villoso longioribus. *Planta parua, patens, pilis oblongis ad ramorum alas.*
pruinosa. 10. P. ramosissima, fol. subuillosis, pedunc. strictis. Alkekengi barbadense nanum, alliariae folio. *Dill. elth.* 10. *t.* 9. *f.* 9. (*nec t.* 12. *f.* 12). *Calyces basi plana. Baccae subturbinatae.*

250. SOLANVM. *Cor.* rotata. *Antherae* subcoalitae, 263. apice poro gemino dehiscentes, *Bacca* 2-locularis.

* *Inermia.*

verbascifolium. 1. S. caule inermi fruticoso, fol. ouatis tomentosis integerrimis, vmbellis compositis.

gui-

gvineenſ. 2. S. caule inermi fruticoſo, fol. ovatis integerrimis, pedunc. lateralibus filiformibus.

Pſeudo-Capſicum. 3. S. caule inermi fruticoſo, fol. lanceolatis repandis, vmbell. ſeſſilibus.

diphyllum. 4. S. caule inermi fruticoſo, fol. geminis: altero minore, flor. cymoſis.

Dulcamara. 5. S. caule inermi fruteſcente flexuoſo, fol. ſuperioribus haſtatis, racemis cymoſis.

quercifol. 6. S. caule inermi ſubherbaceo augulato flexuoſo ſcabro, fol. pinnatifidis, racemis cymoſis. *Soror Dulcamarae.*

radicans. 7. S. caule inermi herbaceo laeui teretiuſculo proſtrato radicante, fol. pinnatifidis, racemis cymoſis.

hauanenſe. 32. S. caule inermi fruteſcente, fol. lanceolatis nitidis integerrimis, pedunc. ſubbifloris. *Mant.* 47.*

racemoſum. 33. S. caule inermi fruteſcente, fol. lanceolatis repandis undulatis, racem. longis rectis. *Mant.* 47.

bonarienſ. 8. S. caule ſubinermi fruteſcente, fol. cuneiformibus ſinuato-repandis. *Mill. ic. t.* 294.

tuberoſum. 10. S. caule inermi herbaceo, fol. pinnatis integerrimis, pedunc. ſubdiuiſis.

pimpinellifolium. 12. S. caule inermi herbaceo, fol. pinnatis integerrimis, racem. ſimplicibus.

Lycoperſicum. 11. S. caule inermi herbaceo, fol. pinnatis inciſis, racem. ſimplicibus.

peruuianum. 13. S. caule inermi herbaceo, fol. pinnatis inciſis tomentoſis, racem. bipartitis folioſis, baccis piloſis.

montan. 13. S. caule inermi herbaceo, fol. ſubcordatis repandis.

rubrum. 34. S. caule inermi ſubperennante, fol. geminis ouatis integerrimis, pedunc. ſubumbellatis.

nigrum. 15. S. caule inermi herbaceo, fol. ouatis dentato-angulatis, racemis diſtichis nutantibus.

aethiopicum. 9. S. caule inermi herbaceo, fol. ovatis repando-angulatis, pedunc. fertilibus unifloris cernuis. *Pluck. phyt.* 226. *f.* 4.

Melongena. 13. S. caule inermi herbaceo, fol. ouatis tomentoſis, pedunc pendulis incraſſatis, calyc. inermibus. *Pluk. phyt.* 226. f. 2.

* * *Aculeata.*

inſanum. 30. S. caule aculeato herbaceo, fol. ouatis tomentoſis, pedunc. pendulis incraſſatis, calyc. aculeatis. *Pluk. phyt. t.* 226. *f.* 3.

ferox

ferox. 17. S. caule aculeato herbaceo, fol. cordatis angulatis tomentosis aculeatis, baccis hirtis calyce obtectis.

campechiense. 18. S. caule aculeato herbaceo hirto, fol. cordatis sinuatis subtomentosis, calyc. aculeatissimis.

mammosum. 19. S. caule aculeato herbaceo, fol. cordatis angulato-lobatis: vtrinque villosis aculeatis.

paniculatum. 20. S. caule petiolisque aculeatis, fol. sinuato-angulatis supra glabris, flor. paniculatis.

virginianum. 21. S. caule aculeato angulato, fol. pinnatifidis vndique aculeatis: laciniis sinuatis obtusis, calyc. aculeatis. *Differt a S. sodomeo ramis angulatis.*

indicum. 22. S. caule aculeato fruticoso, fol. cuneiformibus angulatis subvillosis integerrimis: aculeis vtrinque rectis.

fuscatum. 23. S. caule aculeato fruticoso, fol. ouatis obtuse lobatis: aculeis vtrinque rectis: superioribus coloratis.

carolinense. 24. S. caule aculeato annuo, fol. hastato-angulatis: aculeis vtrinque rectis, racem. laxis.

sodomeum. 25. S. caule aculeato fruticoso tereti, fol. pinnatifido-sinuatis sparse aculeatis nudis, calyc. aculeatis. *Folia subtus nuda.*

sanctum. 26. S. caule aculeato fruticoso, aculeis tomentosis foliisque oblique ouatis repandis.

tomentosum. 27. S. caule aculeato fruticoso: aculeis aceros is, fol. cordatis inermibus subrepandis: tenellis purpureo-puluerulentis.

bahamense. 28. S. caule aculeato fruticoso, fol. lanceolatis repandis obtusis margine reflexis, racemis simplicibus.

igneum. 29. S. caule aculeato fruticoso, fol. lanceolatis acuminatis basi vtrinque reuolutis, racemis simplicibus.

trilobatum. 23. S. caule aculeato fruticoso, fol. cuneiformibus subtrilobis glabris obtusis inermibus.

* * * *Spinosa.*

lycioides. 34. S. caule spinoso fruticoso, fol. ellipticis. *Mant.* 46.

251. CAPSICVM. *Cor.* rotata. *Bacca* exsucca. 270.

annuum. 1. C. caule herbaceo, pedunc. solitariis.

baccatum. 3. C. caule fruticoso laeui, pedunc geminis. *Mant.* 47.* Capsicum frutescens. *Sp. pl.* 271. *β. distincta sit Species.*

gros-

groſſum. 4. C. caule ſuffruteſcente, fructibus incraſſatis variis. *Mant.* 47. Piper indicum, ſiliquis ſurrectis rotundis, maximum. *Bauh. pin.* 103. Piper indicum. *Besl. cyſt. aut. 2. t. 2. f. 1.*

fruteſcens. 2. C. caule fruticoſo ſcabriuſculo, pedunc. ſolitariis. (*excluſa varietate β.*)

252. STRYCHNOS. *Cor.* 5-fida. *Bacca* 1-locularis, cortice lignoſo. 271.

nux vom. 1. S. fol. ouatis, caule inermi.
colubrin. 2. S. fol. ouatis acutis, cirrhis ſimplicibus.

253. IACQUINIA. *Cor.* 10-fida. *Stam.* receptaculo inſerta. *Bacca* 1-ſperma. 271.

armillaris. 2. I. fol. obtuſis cum acumine. *Iacq. amer.* 53. *t.* 39. *Pedunculi huic racemoſi, ſequentibus uniflori. Loeflingii deſcriptio bona.*
ruſcifolia. 1. I. fol. lanceolatis acuminatis.
linearis. 2. I. fol. linearibus acuminatis.

254. CHIRONIA. *Cor.* rotata. *Piſtillum* declinatum. *Stam.* tubo corollae inſidentia. *Antherae* demum ſpirales. *Peric.* 2-loculare. 272.

trinerv. 1. C. herbacea, calycinis foliolis membranaceo-carinatis.
linoides. 2. C. herbacea, fol. linearibus. *Calycis foliola ſubulata.*
iaſminoid. 3. C. herbacea, fol. lanceolatis.
campanulata. 4. C. herbacea, fol. ſublinearibus, calyc. longitudine corollae.
angularis. 5. C. herbacea, caule acutangulo, fol. ouatis amplexicaulibus.
baccifera. 7. C. fruteſcens baccifera.
fruteſcens. 8. C. fruteſcens fol. lanceolatis ſubtomentoſis, calyc. campanulatis. *Calycis foliola ouata obtuſa ſubtomentoſa.*

255. CORDIA. *Cor.* infundibuliformis. *Stylus* dichotomus. *Drupa* nucleis 2-locularibus.
173.

Myxa. 1. C. fol. ouatis ſupra glabris, corymb. lateralibus, calyc. decemſtriatis, *Folia Alni ſerrato-angulata, ſubtus ſcabra.*
Sebeſtena. 3. C. fol. oblongo-ouatis repandis ſcabris.
Geraſcanthus. 4. C. fol. lanceolato-ouatis ſcabris, panicula terminali, calyc. decemſtriatis. *Iacq. amer.* 43. *t.* 175. *f.* 16.
macrophylla. 4. C. fol. ouatis villoſis ſeſquipedalibus.
Callococca. 5. C. fol. cordato-ouatis integerrimis, flor. corymboſis, calyc. interne tomentoſis.

208. PATAGONVLA. *Cor.* rotata. *Styl.* dichotomus. *Cal.* fructiferus maximus.
212.

american. 1. PATAGONVLA.

256. EHRETIA *Bacca* 2-locularis. *Sem.* ſolitaria, bilocularia. *Stigma* emarginatum.
274.

Tinifolia. 1. E. fol. oblongo-ouatis integerrimis glabris, flor. paniculatis.
ſpinoſa. 2. E. ſpinoſa. *Iacq. amer.* 46. *t.* 80. *f.* 18.
Bourreria. 3. E. fol. ouatis integerrimis laeuibus, flor. ſubcorymboſis, calyc. glabris.
exſucca. 4. E. fol. cuneiformi-lanceolatis margine reflexis. Bourreria *exſucca* fructibus exſuccis quadrifidis. *Iacq. amer.* 45. *t.* 173. *f.* 17.

257. VARRONIA. *Cor* 5-fida. *Drupa* Nucleo 4. loculari.
275.

lineata. 1. V. fol. lanceolatis lineatis, pedunc. lateralibus petiolo adnatis, ſpicis globoſis.
bullata. 2. V. fol. ovatis venoſo rugoſis, ſpicis globoſis.
martinenſis. 6. V. fol. ouatis acuminatis, ſpicis oblongis.

globo-

globosa. 3. V. fol. lanceolato-oblongis, caul. dichotomo, pedunc. axillaribus elongatis nudis, spicis globosis.
curassauica. 4. V. fol. lanceolatis, spicis oblongis.
alba. 5. V. fol. cordatis, flor. cymosis. *Iacq. amer. 41.*

258. LAVGERIA. *Cor.* 5-fida. *Drupa.* Nucleo 5-loculari.
276.

odorata. 1. LAVGERIA. *Oppositifolia. Variat spinosa et inermis.*

259. BRVNSFELSIA. *Cor.* infundibuliformis, longissima. *Bacca* 1-vnilocularis, polysperma.
276.

americana. 1. BRVNSFELSIA. *Ad ringentes pertinere. Dau. Royen.*

260. CESTRVM. *Cor.* infundibuliformis. *Stamina* in medio denticulum exferentia. *Bacca* 1-locularis.
277.

nocturn. 1. C. flor. pedunculatis.
diurnum. 2. C. flor. sessilibus.

261. LYCIVM. *Cor.* tubulosa, fauce clausa filamentorum barba. *Bacca* 2-locularis.
277.

afrum. 1. L. fol. linearibus.
barbarum. 2. L. fol. lanceolatis, calyc. bifidis. Lycium foliis lanceolatis acutis. *Mill. dict. 6.*
europaeum. 3. L. fol. obliquis, ramulis flexuosis teretibus. *Mant. 47.*
capsulare. A. L. fol. lanceolatis tenuibus glabris, pedunc. calycibusque pubescentibus, pericarp. capsularibus.

262. CHRYSOPHYLLYM. *Cor.* campanulata, 10-fida: laciniis alternis patulis. *Bacca* 10-sperma.
278.

Cainito. 1. C. fol. ouatis parallele striatis, subtus tumentoso nitidis. *Iacq. amer. 51. t. 37.*

β. Chryſoph. fol. oblongo-ouatis, ſuperne glabris, ſubtus ferrugineis, flor. alaribus corymboſis. *Mill. dict.*

γ. Chryſoph. iamaicenſe, fructu purpureo. *Iacq. amer. 52.*

Chryſoph. fructu globoſo, fol. ſubtus ferrugineis. *Brown. iam. 171. t. 14. f. 2.*

Anona fol. ſubtus ferrugineis. *Sloam. iam. 2. p. 170. t. 229.*

δ. Chryſoph. caeruleum, fructu caeruleo globoſo. *Iacq. amer. 52. t. 37.*

glabrum. 2. C. fol. vtrinque glaberrimis. *Iacq. amer. 53. t. 38.*

263. SIDEROXYLON. *Cor.* 10-fida: laciniis alternis incuruis. *Stigma* ſimplex. *Bacca.* 5-ſperma.

278.

mile. 1. S. inerme, flor. ſeſſilibus. *Confer* Laurifolia africana. *Comm. hort. 1. p. 95. t. 100. ſed flores absque dentibus inter ſtamina. D. Royen.*

inerme. 1. S. inerme, fol. perennantibus obouatis, pedunc. teretibus.

melanophleus. 4. S. inerme, fol. perennantibus lanceolatis, pedunc. angulatis. *Mant. 48.* *

tenax. 5. S. ſubinerme, fol. deciduis lanceolatis ſubtus tomentoſis, pedunc. filiformibus. *Mant. 48.* *

lycioides. 2. S. ſpinoſum, fol. deciduis lanceolatis.

decandrum. 3. S. ſpinoſum, fol. deciduis ellipticis. *Mant. 48.* *

ſpinoſum. 7. S. fol. perennantibus.

foetidiſſimum. 6. S. inerme, fol. ſuboppoſitis, flor. patentiſſimis. *Mant. 49.*

264. RHAMNVS. *Cal.* tubuloſus: ſquamis ſtamina munientibus. *Cor.* nulla. *Bacca.*

279.

* *Spinoſi.*

cathart. 1. R. ſpinis terminalibus, flor. quadrifidis dioicis, fol. ouatis, caul. erecto.

infectorius. 21. R. ſpinis terminalibus, flor. quadrifidis dioicis, caulib. procumbentibus. *Mant. 49.*

lycioi-

lycioides. 2. R. ſpinis terminalibus, fol. linearibus.
oleoides. 3. R. ſpinis terminalibus, fol. oblongis integerrimis.
ſaxatilis. 20. R. ſpinis terminalibus, flor. quadrifidis hermaphroditis. *p.* 1671.
pentaphyllus. 21. R. ſpinis terminalibus, fol. ternatis quinatisque. *Iacq. obſ. 2. p. 17.* Rhamnus ſiculus. *Boce. ſic. 43. t. 21.*

* * *Inermes.*

Sarcomphalus. 6. R. inermis, fol. oualibus coriaceis integerrimis emarginatis.
Micranthus. 7. R. inermis, fol. ouato-lanceolatis obliquis pubeſcentibus, ſtipul. lanceolatis acuminatis deciduis. *Plumieriae ſpeciem facit Millerus.*
cubenſis. 10. R. inermis, flor. hermaphroditis, capſ. triloculatibus, fol. rugoſis integerrimis tomentoſis. *Habitus Viburni Lantanae. Folia vtrinque tomentoſa. Fructus praecedentis.*
colubrinus. 8. R. inermis, flor. monogynis hermaphroditis erectis, capſ. tricoccis, petiolis ferrugineo-tomentoſis. Rhamnus arboreus, fol. obouatis venoſis. *Brown. iam. 172.* Petala *lanceolata ex ſinubus calycis.* Stamina *intra petala.* Callus *nectariferus tranſuerſus inter baſin ſtaminum.* Stylus *triqueter. Ramuli, pedunculi, petioli et foliorum nerui ſubtus ſunt ferrugineo-ſubtomentoſi.*
alpinus. 4. R. inermis, flor. dioicis, fol. duplicato-crenatis.
pumilus. 21. R. inermis repens, flor. hermaphroditis, fol. ſerratis. *Mant. 49.*
Frangula. 5. R. inermis flor. monogynis hermaphroditis, fol. integerrimis.
lineatus. 11. R. inermis, flor. hermaphroditis, fol. ouatis lineatis repandis ſubtus reticulatis.
Alaternus. 9. R. inermis, flor. dioicis, ſtigmate triplici, fol. ſerratis.

* * * *Aculeati.*

Paliurus. 12. R. aculeis geminatis: inferiore reflexo, flor. trigynis.
Lotus. 13. R. aculeis geminatis: altero recuruo, fol. ouato-oblongis.
iguaneus. 17. R. aculeis geminatis: altero patente, racemis axillaribus monoicis, fol. nudis. *Folia alterna, glabra, ſubſerrata. Calyx absque ſquamis petaloides, absque tubo. Floris feminei Stylus 2 ſtigmatibus bifidis. Drupa nucleo vniloculari.*

Napeca. 14. R. aculeis ſubgeminatis recuruis, pedunc. corymboſis, flor. ſemidigyniis, fol. ſerratis vtrinque laeuibus.

Iuiuba. 15. R. aculeis ſolitariis, recuruis, pedunc. aggregatis, flor. ſemidigyniis, fol. retuſis ſubtus tomentoſis.

Oenoplia. 16. R. aculeis ſolitariis recuruis, pedunc. aggregatis ſubtreſſilibus, fol. ſemicordatis ſubtus tomentoſis.

Zizyph. 18. R. aculeis geminatis: altero recuruo, flor. digynis, fol. ouato-oblongis. *A Syria in Italiam translata a Sexto Pampinio, tempore Auguſti.*

Sp. Chriſt. 19. R. aculeis geminatis rectis, fol. ouatis.

265. PHYLICA. *Perianth.* 5-partitum, turbinatum. 283. *Petala* 0. *Squamae* 5 ſtamina munientes. *Capſ.* tricocca.

ericoides. 1. P. fol. linearibus verticillatis.

plumoſa. 2. P. fol. lineari-ſubulatis: ſummis hirſutis.

radiata. A. P. fol. linearibus triquetris ſparſis, caule piloſo, bracteis apice glabris coloratisque. *Cent.* 20.

dioica. B. P. fol. cordatis. *Burmann.*

buxifol. 3. P. fol. ouatis ſparſis ternisque ſubtus tomentoſis.

266. CEANOTHVS. *Petala* 5, ſaccata, fornicata. 284. *Bacca* ſicca, 3-locularis, 3 ſperma.

americ. 1. C. fol. trineruiis.

aſiaticus. 2. C. fol. ouatis eneruiis.

african. 3. C. fol. lanceolatis eneruiis, ſtipul. ſubrotundis. *Fabr. helm.* 234. *Pluk. phyt.* 126. *f.* 1. *an huius ſpecies vera?*

1250. ARDVINA. *Cor.* 1-petala. *Stigma* 2-fidum. *Bacca* 2-locularis. *Sem.* ſolitaria.

biſpinoſa. ARDVINA. *Mant.* 52.

267. BVTTNERIA. *Cor.* 5-petala. *Filamenta* apice petalis connata. *Capſ.* 5-cocca, muricata.
284.

ſcabra. 1. BVTTNERIA. *Iacq. amer. 76. Frutex ſarmentoſus, Rubi fruticoſi. aculeis recuruis. Folia alterna, oblonga, petiolo coſtaque aculeata. Racemi axillares, aggregati.*

268. MYRSINE. *Cor.* ſemi 5-fida, conniuens. *Germen* corollam replens. *Bacca* 5-locularis, 5-ſperma.
285.

africana. 1. MYRSINE. *Flores axillares terni pedunculis breuibus. Corolla pallida, punctis teſtaceis ſcabra, ciliata clauſa. Stamina laciniis corollae oppoſita, nec alterna. Stigma penicilliforme. Bacca figura et magnitudine vuae vrſi, caerulea. Nucleus eiusdem formae, globoſus, depreſſiuſculus.*

269. CELASTRVS. *Cor.* 5-petala, patens. *Capſ.* 5-angularis, 3-locularis. *Sem.* calyptrata.
285.

bullatus. 1. C. inermis, fol. ouatis integerrimis.
ſcandens. 2. C. inermis, caule volubili.
myrtifol. 3. C. inermis, fol. ouatis ſerrulatis, flor. racemoſis, caule erecto.
luxifol. 4. C. ſpinis folioſis, ramis angulatis, fol. obtuſis.
ſyderoxylon. 5. C. ſpinis nudis, ramis teretibus, fol. acutis.
lucidus. 6. C. fol. oualibus nitidis integerrimis marginatis. *Mant. 49.*

207. EVONYMVS. *Cor.* 5-petala. *Capſ* 5-gona, 5-locularis, 5-valuis, colorata. *Sem.* calyptrata.
286.

europaeus. 1. E. flor. plerisque quadrifidis.
americ. 2. E. flor. omnibus quinquefidis.

271. DIOSMA. *Cor.* 5-petala. *Nectarium* coronaeformae, 5-fidum, supra germen. *Caps.* 5, coalitae. *Sem.* calyptrata.
286.

oppositif. 1. D. fol. subulatis acutis oppositis.
hirsuta. 2. D. fol. linearibus hirsutis.
rubra. 3. D. fol. linearibus mucronatis glabris carinatis, subtus bifariam punctatis.
ericoides. 4. D. fol. lineari-lanceolatis, subtus conuexis, bifariam imbricatis.
cuppressina. 10. D. fol. ouatis triquetris imbricatis, flor. solitariis terminalibus sessilibus. *Mant. 50.* Brunia vniflora. *Sp. pl. 289.*
crenata. 8. D. fol. lanceolato-oualibus glanduloso-crenatis, flor. solitariis. *Calycis fol. subulata, crenata.*
vniflora. 7. D. fol. ouato-oblongis, flor. solitaris terminalibus. *Calycis foliola ouata, magna, foliisque fere latiora.*

272. BRVNIA. *Flores* aggregati. *Filamenta* vnguibus petalorum inserta. *Stigma* 2-fidum. *Sem.* solitaria.
288.

nodiflora. 1. B. fol. imbricatis triquetris acutis.
lanugin. 2. B. fol. linearibus patulis, apice callosis.
ciliata. 3. B. fol. ouatis acuminatis ciliatis.
abrotan. 4. B. fol. lineari-lanceolatis patentibus triquetris apice callosis.

1247. CYRILLA. *Petala* acuta, receptaculo inserta. *Caps.* 2-locularis. *Stylus* 2-fidus, persistens.

racemiflora. 1. CYRILLA. *Mant. 50.*

273. ITEA. *Petala* longa, calyci inserta. *Caps.* 1-locularis, 2-valuis. 289.

virginis. 1. ITEA. *Frutex humanae altitudinis. Folia alterna, petiolata, ouata, serrata. Racemi terminales, albi. Facies Padi.*

274. GALAX. *Cor.* hypocrater. *Cal.* 10-phyllus. *Caps.* 1-locularis, 2-valuis, elastica. 289.

aphylla. 1. GALAX.

275. CEDRELA. *Cal.* marcescens. *Cor.* 5-petala. infundibuliformis, basi ad $\frac{1}{3}$ receptaculo adnata. *Caps.* lignosa, 5-locularis, 2-valuis. *Sem.* deorsum imbricata, ala membranacea. 289.

odorata. A, C. floribus paniculatis.

276. MANGIFERA. *Cor.* 5-petala. *Drupa* reniformis. 290.

indica. 1. MANGIFERA.

277. HIRTELLA. *Petala* 5. *Filamenta* longissima, persistentia, spiralia. *Bacca* 1-sperma. *Stylus* lateralis. 290.

americana. 1. HIRTELLA. *Iacq. amer. 8. t. 8.*

1249. PLECTRONIA. *Petala* 5. calycis fauci inserta. *Bacca* 2-sperma, infera.

ventosa. 1. PLECTRONIA. *Mant. 52.*

278. RIBES. *Petala* 5 et ſtamina calyci inſerta. *Stylus* 2-fidus. *Bacca* polyſperma, infera.
290.

* Ribeſia *inermia*.

rubrum. 1. R. inerme, racem. glabris pendulis, flor.! planiuſculis.
alpinum. 2. R. inerme, racem. erectis. bracteis flore longioribus.
nigrum. 3. R. inerme, racem. piloſis, flor. oblongis.

* * Groſſulariae *aculeatae*.

reclinata. 4. R. ram. ſubaculeatis reclinatis, pedunc. bractea triphylla.
Groſſularia. 5. R. ram. aculeatis, petiolorum ciliis piloſis, baccis hirſutis.
oxyacant. 6. R. ramis vndique aculeatis.
Vua crſpa. 7. R. ramis aculeatis, bacc. glabris, pedicellis bractea monophylla.
cynosbati. 8. R. aculeis ſubaxillaribus, bacc. aculeatis racemoſis.

279. GRONOVIA. *Petala* 5 et ſtamina calyci campanulato inſerta. *Bacca* ſicca, monoſperma, infera.
292.

ſcandens. 1. GRONOVIA.

280. HEDERA. *Petala* 5, oblonga. *Bacca* 5-ſperma, calyce cincta.
292.

Helix. 1. H. fol. ouatis lobatisque.
quinquef. 2. H. fol. quinatis ouatis ſerratis.

281. VITIS. *Petala* apice cohaerentia, emarcida. *Bacca* 5-ſperma, ſupera.
293.

viuifera. 1. V. fol. lobatis ſinuatis nudis.
indica. 2. V. fol. cordatis dentatis ſubtus villoſis, cirrhis racemiferis. *Plum. ic. 59. f. 2. Ciſſi ſpecies Iacq.*
Labruſc. 3. V. fol. cordatis ſubtrilobis dentatis ſubtus tomentoſis.
vulpena. 4. V. fol. cordatis dentato-ſerratis vtrinque nudis.
trifolia. 5. V. fol. ternatis; foliolis ſubrotundis ſerratis.

laci-

laciniosa. 6. V. fol. quinatis: foliolis multifidis.
arborea. 7. V. fol. supradecompositis: foliolis lateralibus pinnatis.

282. LAGOECIA. *Involucr.* vniuersale, et partiale. *Petala* 2-fida. *Sem.* solitaria, infera.
294.

Cuminoid. 1. LAGOECIA.

1234. RORIDVLA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus, *Capsf.* 3-valuis. *Antherae* basi scrotiformes.

dentata. 1. RORIDVLA.

293. SAVVAGESIA. *Cor.* 5-petala, fimbriata. *Cal.* 5-phyllus. *Nectar.* 5-phyllum, cum petalis alternans, *Capsf.* 1-locularis.
294.

erecta. 1. SAVVAGESIA. *Iacq. amer. 77. t. 51. f. 3. Pedunculi laterales, vniflori: floriferi erecti; fructiferi deflexi. Flores albi. Stipulis ciliatis distinctissima.*

284. CLAYTONIA. *Cal.* 2-valuis. *Cor.* 5-petala. *Stigma* 3-fidum. *Capsf.* 3-valuis, 1-locularis, 3-sperma.
294.

virginic. 1. C. fol, linearibus.
sibirica. 2. C. fol. ouatis. *Folia Radicalia petiolata, ouata, neruosa, glaberrima. Scapus declinatus. Foliis Caulinis duobus, oppositis, sessilibus, ouatis, intra quae Racemi duo secundi; tenelli adhuc reuoluti; altero diphyllo. Flores rubri.*

285. ACHYRANTHES. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. 294. *Stigma* 2-fidum. *Semina* ſolitaria.

ſanguinolenta. 1. A. caul. proſtrato ramoſiſſimo, ſpic. compoſitis congeſtis. *Spicae confertae, tomentoſae, congeſtae ex pluribus alternis ſeſſilibus, laxis. Flores affines Illecebrae procumbenti. Calyx viridis, pubeſcens. Antherae luteae. Piſtillum purpureum. Folia vtrinque rubra : ſupra obſcuriora.*

aſpera. 3. A. caule fruticoſo erecto, calyc. reflexis ſpicae adpreſſis. Arabica *varietas Foliis vtrinque glabris, viridibus, ſimilibus Plumbaginis zeylanicae, quam ficula latioribus, ſubtus punctatis.*

lappacea. 4. A. caule fruticoſo diffuſo, ſpica interrupta, floſculis lateralibus vtrinque faſciculo ſetarum vncinato.

alternifolia. 9. A. caule herbaceo erecto, fol. alternis, flor. ſpicatis remotis, calyc. ſquarroſo-patulis. *Mant. 50.*

muricata. 2. A. caule fruticoſo patulo, fol. alternis, flor. ſpicatis remotis ouatis, calycibus ſquarroſis.

corymboſ. 7. A. fol. quaternis linearibus, panicul. dichotomo-corymboſa. *Cal. 5-phyllus. Petala 5. Stam. 5? Stylus 1. capitatus.*

dichotoma. 10. A. caul. ſuffruticoſis, fol. oppoſitis linearibus planis acutis, cyma dichotoma. *Mant. 51.*

proſtrata. 5. A. caul. proſtratis fruticoſis, ſpic. oblongis : floſculis binnatis vtrinque faſciculo vncinato.

brachiata. 8. A. caule herbaceo brachiato, fol. oppoſitis ouato-lanceolatis glabris, ſpic. tomentoſis lateralibus. *Mant. 50.*

lanata. 6. A. caule erecto ſimplici, baſi ſubramoſo, fol. alternis obouatis, ſpicis tomentoſis lateralibus. *Caulis erectus, rigidulus, ſubpiloſus, baſi tantum ramoſus. Folia petiolata, integerrima, acutiuſcula, nuda, ſubtus pubeſcentia. Pedunculi laterales, axillares, breuiſſimi, Spicis 3 ſ. 4, ſeſſilibus, inaequalibus cum foliolo. Calyces 5-partiti, campanulati, mutici, extus albo-villoſi. Stamina 5, baſi connexa mediante corona 5-dentata, vt in Illecebris. Semen 1, reniforme. Pl. Achyr. ſanguinolenta, proſtrata, brachiata, Celoſiaque lanata ſunt mediae inter Achyranthes et Illecebra.*

286.

286. CELOSIA. *Cal.* 3-phyllus, corollae 5-petalae facie. *Stam.* basi nectario plicato coniuncta. *Caps.* horizontaliter dehiscens.

256.

argentea. 1. C. fol. lanceolatis, stipulis subfalcatis, pedunc. angulatis, spic. scariosis.

margaritacea. 2. C. fol. ouatis, stipulis falcatis, pedunc. angulatis, spic. scariosis.

cristata. 2. C. fol. oblongo-ouatis, pedunc. teretibus substriatis spic. oblongis. *Variat foliis angustis et latis.*

paniculata. 6. C. fol. ouato-oblongis, caul. assurgente paniculato spic. alternis terminalibus remotis.

coccinea. 5. C. fol. ouatis strictis inauriculatis, caul. sulcato, spic. multiplicibus cristatis.

castrensis. 4. C. fol. lanceolato-ouatis lineatis acuminatissimis, stip. falcatis, spic. cristatis.

lanata. 7. C. fol. lanceolatis tomentosis obtusis, spic. confertis, stam. lanatis. *Nimis affinis Illecebris et Achyr. lanatae. Herba annua, mihi fere florens. Folia Mercurialis tomentosa, obouato-lanceolata, in petiolos desinentia, obtusa, nutantia, fragilia, subtus, vti caulis ipse, albo-tomentosa, supra canescentia. Rami ex singulis alis. Spica composita, terminalis.*

nodiflora. 8. C. fol. cuneiformibus acutiusculis, spic. globosis lateralibus.

287. ILLECEBRVM. *Cal.* 5-phyllus, cartilagineus. *Cor.* nulla. *Stigma* simplex. *Caps.* 5-valuis, monosperma.

298.

verticill. 1. I. flor. verticillatis nudis, caul. procumbentibus.

suffrutic. 2. I. flor. lateralibus solitariis, caul. suffruticosis.

cymosum. 3. I. spic. cymosis secundis, caul. diffuso. *Morif. hist. 2. s. 5. t. 29. f. Ger. prou. 337.*

Paronychia. 4. I. flor. bracteis nitidis obuallatis, caulib. procumbentibus, fol. laeuibus.

capitatum. 5. I. flor. bracteis nitidis occultantibus; capitula terminalia, caulibus erectiusculis, fol. ciliatis, subtus villosis.

arabi-

arabicum. 11. I. flor. ſparſis congeſtis, bracteis nitidis aequantibus, caul. procumbentibus. *Mant. 51.*

Achyrantha. 6. I. caul. repentibus piloſis, fol. ouatis mucronatis oppoſito minore, capit. ſubgloboſis ſubſpinoſis.

polygonoides. 7. I. caul. repentibus hirtis, fol. lato-lanceolatis petiolatis, capitul. orbiculatis nudis.

ficoideum. 8. I. caul. repentibus glabris, fol. lato-lanceolatis petiolatis, capitul. orbiculatis pubeſcentibus. *Nectarium radiis 5, apice laceris.*

ſeſſile. 9. I. caul. repentibus glabris, fol. lanceolatis ſubſeſſilibus, capit. oblongis glabris. Olus ſquillarum. *Rumph. amb. 6. p. 37. t. 15. f. 1.*

vermiculatum. 10. I. caul. repentibus glabris, fol. ſubteretibus carnoſis, capit. oblongis glabris terminalibus.

alſineſolium. 12. I. caul. diffuſis, fol. ouatis, flor. congeſtis bracteatis nitidis. *Mant. 51.*

288. GLAVX. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* nulla. *Capſ.* 1-locularis, 5-valuis, 5-ſperma. 301.

maritim. 1. GLAVX.

289. THESIVM. *Cal.* 1-phyllus, cui ſtamina inſerta. *Sem.* 1, inferum. 301.

Linophyll. 1. T. panicula foliacea, fol. linearibus.

alpinum. 2. T. racemo foliato, fol. linearibus. *Iacq. vind. 215. Ger. prou. 442. t. 17. f. 1.*

funale. 5. T. flor. ſpicatis, coroll. ciliatis, caule ſuffruticoſo, fol. ſubulatis breuiſſimis.

capitat. 3. T. flor. capitatis, fol. triquetris marginibus carinaque ciliato-ſpinuloſis.

vmbellat. 6. T. flor. vmbellatis, fol. oblongis.

ſcabrum. 4. T. capitulis pedunculatis, fol. triquetris margine ſcaberrimis.

paniculatum. 7. T. totum paniculatum. *Mant. 51.*

290. RAVVOLFIA. Contorta, *Bacca* ſucculenta, diſperma. 303.

nitida. 1. R. glaberrima nitidiſſima.

caneſcens. 2. R. ſubpubeſcens. *Iacq. amer. 47.*

tomentoſa. 3. R. tomentoſa. *Iacq. obſ. 2. t. 35.*

1252. PAEDERIA. Contorta. *Bacca* vacua, fragilis, diſperma. *Stylus* 2-fidus.

foetida. 1. PAEDERIA. *Mant.* 52.

1251. CARISSA. Contorta. *Baccae* 2, polyſpermae.

Carandas. 1. CARISSA. *Mant.* 52.

291. CERBERA. Contorta. *Drupa* monoſperma. 302.

Ahouai. 1. C. fol. ouatis.
Manghas. 2. C. fol. lanceolatis: neruis transuerſalibus.
Theuetia. 3. C. fol. linearibus longiſſimis conſertis.

292. GARDENIA. Contorta. *Bacca* infera, polyſperma. *Stylus* eleuatus, bilobus. *Cal.* laciniis verticalibus. 305.

florida. 1. GARDENIA. Iaſminum ramo vnifloro pleno, petalis coriaceis. *Ehret. pict. t. 15. optime. E. N. C. 1761. p. 333.*

293. VINCA. Contorta, *Folliculi* 2, erecti. *Semina* nuda. 304.

minor. 1. V. caul. procumbentibus, fol. lanceolato-ouatis, flor. pedunculatis.
maior. 2. V. caul. erectis, fol. ouatis, flor. pedunculatis.
lutea. 3. V. caule volubili, fol. oblongis.
roſea. 4. V. caule fruteſcente erecto, flor. geminis ſeſſilibus ouato-oblongis, petiolis baſi bidentatis.

294. NERIVM. Contorta. *Folliculi* 2, erecti. *Sem.* plumoſa. *Cor.* tubus terminatus, corona lacera. 305.

Oleander. 1. N. fol. linear-lanceolatis ternis, coroll. coronatis.
Zeylanic. 4. N. fol. lanceolatis oppoſitis, ramis rectis. *Gent. 132.*

diua-

diuaric. 2. N. fol. lanceolato-ouatis, ramis diuaricatis.
antidyſ. 3. N. fol. ouatis acuminatis petiolatis.

295. ECHITES. Contorta. *Folliculi* 2, longi, recti. *Sem.* pappoſa. *Cor.* infundibuliformis, fauce nuda.
307.

biflora. 1. E. pedunculis bifloris.
5-angularis. 2. E. pedunc. racemoſis, fol. obouatis acuminatis.
ſuberecta. 3. E. pedunc. racemoſis, fol. ſubouatis obtuſis mucronatis. *Corollae tubus hirſutus.*
agglutinata. 8. E. pedunc. racemoſis, fol. ouatis emarginatis acuminatis.
toruloſa. 4. E. pedunc. ſubracemoſis, fol. lanceolatis acuminatis.
vmbellata. 5. E. pedunc. vmbellatis, fol. ouatis obtuſis mucronatis, caul. volubili
trifida. 6. E. pedunc. trifidis multifloris, fol. ouato-oblongis acuminatis.
corymboſa. 7. E. racem. corymboſis, ſtam. eminentibus, fol. lanceolato-ouatis.
ſpicata. 9. E. ſpicis axillaribus breuibus, ſtam. eminentibus, fol. ſubouatis.
caudata. 10. E. coroll. infundibuliformibus: apicibus linearibus longiſſimis. *Mant. 52.*
ſcholaris. 11. E. fol. ſubuerticillatis oblongis, folliculis filiformibus longiſſimis, vmbellis compoſitis. *Mant. 53.*

296. PLVMERIA. Contorta. *Folliculi* 2, reflexi. *Semina* membranae propriae inſerta.
206.

rubra. 1. P. fol. ouato-oblongis, petiolis biglanduloſis. *Iacq. amer. 35.*
alba. 2. P. fol. lanceolatis reuolutis, pedunculis ſuperne tuberoſis. *Iacq. amer. t. 174.*
obtuſa. 3. P. fol. lanceolatis petiolatis obtuſis.

297. CA-

297. CAMERARIA. Contorta. *Folliculi* 2, horizontales. *Sem.* membranae propriae inserta.
308.

latifolia. 1. C. fol. ouatis vtrinque acutis transuerse striatis. *Iacq. amer. 37. t. 182. f. 86.*
angustif. 2. C. fol. linearibus.

298. TABERNEMONTANA. Contorta. *Folliculi* 2, horizontales. *Sem.* pulpae immersa.
308.

citrifol. 1. T. fol. oppositis ouatis, flor. lateralibus glomerato-vmbellatis.
laurifol. 2. T. fol. oppositis oualibus obtusiusculis.
grandiflora. 5. T. fol. oppositis, caul. dichotomo, calyc. inaequalibus laxissimis. *Mant. 53.*
cymosa. 6. T. fol. oppositis, flor. cymosis. *Mant. 53.*
alternif. 3. T. fol. alternis, caul. arboreseente.
Amsonia. 4. T. fol. alternis, caul. subherbaceis. Apocynum virginianum, asclepiadis folio, floribus pallide caeruleis, radice crassa. *Pluk. phyt. t. 115. f. 3.*

299. CEROPEGIA. Contorta. *Folliculi* 2, erecti. *Semina* plumosa. *Corollae* limbus conniuens.
309.

candelab. 1. C. vmbellis pendulis, flor. erectis.
biflora. 2. C. pedunculis bifloris.

DIGYNIA.

1253. PERGVLARIA. Contorta. *Nectarium* ambiens genitalia cuspidibus 5 sagittatis. *Cor.* hypocrateriformis.

glabra. 1. P. fol. ouatis glabris. *Mant. 53.*
tomentosa. 2. P. fol. cordatis tomentosis. *Mant. 53.*

300. PE-

300. PERIPLOCA. Contorta. *Nectarium* ambiens
309. genitalia, filamenta 5 exſerens.

graeca. 1. P. flor. interne hirſutis.
indica. 2. P. ſpicis imbricatis.
africana. 3. P. caule hirſuto.
tenuiſol. 4. P. fol. lineari-lanceolatis.

301. CYNANCHVM. Contorta. *Nectarium* cylin-
310. dricum, 5-dentatum.

acutum. 1. C. caule volubili verbaceo, fol. cordato-oblongis glabris.
planifolium. 6. C. caule volubili, fol. cordatis glabris, ſubtus tomentoſis pedunc. ſubracemoſis.
racemoſum. 7. C. caule volubili, fol. cordatis glabris acutis, racemis ſimplicibus.
maritimum. 8. C. caule volubili, fol. cordatis hirſutis ſubtus tomentoſis, pedunc. aggregatis. *Mant.* 54.
ſuberoſum. 2. C. caule volubili inferne ſuberoſo fiſſo, fol. cordatis acuminatis.
hirtum. 3. C. caule volubili fruticoſo inferne ſuberoſo fiſſo, fol. ouato-cordatis.
monſpeliacum. 4. C. caule volubili herbaceo: fol. reniformi-cordatis acutis.
vndulatum. 9. C. caule volubili, fol. lanceolato-ouatis glabris, vmbellis globoſis. *Mant.* 54.
erectum. 5. C. caule erecto diuaricato, fol. cordatis glabris.

302. APOCYNVM. *Cor.* campanulata. *Filamenta*
311. 5, cum ſtaminibus alterna.

androſaemifol. 1. A. caule rectiuſculo herbaceo, fol. ouatis vtrinque glabris, cymis terminalibus. *Dod. mem. 39. t. 59.*
cannabinum. 2. A. caule rectiuſculo herbaceo, fol. oblongis, panic. terminalibus.
venetum. 3. A. caule rectiuſculo herbaceo, fol. ouato-lanceolatis.
fruteſc. 4. A. caule erecto fruteſcente, fol. lanceolato-oualibus, corollis acutis: fauce villoſis.

reti-

reticulatum. 5. A. caul. volubili perenni, fol. ouatis venosis. Olus crudum. *Rumph. amb. 5. p. 75. t. 40.*

303. ASCLEPIAS. Contorta. *Nectaria* 5, ouata, concaua, corniculum exserentia. 312.

* *Foliis oppositis planis.*

vndulata. 1. A. fol. sessilibus oblongis lanceolatis vndulatis, petalis ciliatis.

gigantea. 2. A. fol. amplexicaulibus oblongo-oualibus. Zia-raek. *Brun. it. 315. t. 184. Iacq. obs. 3. t. 69.*

syriaca. 4. A. fol. oualibus subtus tomentosis, caule simplicissimo, vmbellis nutantibus.

amoena. 6. A. fol. ouatis subtus pilosiusculis, caule simplici, vmbell. nectariisque erectis.

purpurascens. 5. A. fol. ouatis subtus villosis, caule simplici, vmbell. erectis, nectariis resupinatis.

variegata. 3. A. fol. ouatis rugosis nudis, caule simplici, vmbell. subsessilibus: pedicellis tomentosis.

curassauica. 9. A. fol. lanceolatis glabris nitidis, caule simplici, vmbell. erectis solitariis lateralibus. *Foliculi ad latera denticulati. Simillima A. niuea.*

niuea. 7. A. fol. ouato-lanceolatis glabriusculis, caule simplici, vmbell. erectis lateralibus solitariis. *Corollae virides nectariis niueis. Differt. ab A. curassauica foliis minime nitidis parumque scabris, sed basi magis rotundatis, nec perfecte lanceolatis.*

incarnat. 8. A. fol. lanceolatis, caule superne diuiso, vmbell. erectis geminis.

decumb- 10. A. fol. villosis, caule decumbente.

lactifera. 11. A. fol. ouatis, caule erecto, vmbell. proliferis breuissimis.

Vincetoxicum. 12. A. fol. ouatis basi barbatis, caule erecto, vmbell. proliferis.

nigra. 13. A. fol. ouatis basi barbatis, caule superne subuolubili.

** *Foliis lateribus reuolutis.*

fruticoſa. 14. A. fol. reuolutis lanceolatis, caule fruticoſo. β. craſſifolia *huius affinis, ſoror aut filia, conuenit caule fruticoſo, foliis reuolutis, folliculis dentatis; differt latitudine foliorum et hirſutie; ex priori ortam arguit ſtructura.*

vndulata. 19. A. fol. reuoluto-repandis piloſis. Apocynum erectum africanum ſubhirſutum, fol. vndulatis. *Herm. par. 25. Comm. rar. 17. t. 17.*

ſibirica. 15. A. fol. reuolutis lineari-lanceolatis oppoſitis ternisque, caule decumbente.

verticill. 16. A. fol. reuolutis linearibus verticillatis, caule erecto.

*** *Foliis alternis.*

rubra. 17. A. fol. alternis ouatis, vmbellis ex eodem pedunculo communi pluribus.

tuberoſa. 18. A. fol. alternis lanceolatis, caule diuaricato piloſo.

304. STAPELIA. 316.

Contorta. *Nectarium* duplici ſtellula tegente genitalia.

variegat. 1. S. denticulis ramorum patentibus.

hirſuta. 2. S. denticulis ramorum erectis. *Mill. ic. 258.*

305. HERNIARIA. 317.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 0. *Stamina* 5-ſterilia. *Capſ.* 1-ſperma.

glabra. 1. H. glabra.

hirſuta. 2. H. hirſuta.

fruticoſa. 3. H. caulibus fruticoſis, flor. quadrifidis. *Cent. 21. Loeſl. hiſp. 128.*

lenticul. 4. H. quae Polygonum lenticulatum. *Obſcura.*

306. CHENOPODIVM. 318.

Cal. 5-phyllus, 5-gonus. *Cor.* 0. *Sem.* 1-lenticulare, ſuperum.

* *Folils anguloſis.*

Bon. Henr. 1. C. fol. triangulari-ſagittatis integerrimis, ſpic. compoſitis aphyllis axillaribus.

vrbi-

vrbicum. 2. C. fol. triangularibus ſubdentatis, racem. confertis ſtrictiſſimis cauli approximatis longiſſimis.

rubrum. 3. C. fol. cordato-triangularibus obtuſiuſculis dentatis, racem. erectis compoſitis ſubfolioſis caule breuioribus.

murale. 4. C. fol. ouatis nitidis dentatis acutis, racem. ramoſis nudis.

ſerotinum. 5. C. fol. deltoideis ſinuato-dentatis rugoſis glabris vniformibus, racemis terminalibus.

album. 6. C. fol. rhomboideo-triangularibus eroſis poſtice integris: ſummis oblongis, racem. erectis.

viride. 7. C. fol. rhomboideis dentato-ſinuatis, racem. ramoſis ſubfoliatis.

hybridum. 8. C. fol. cordatis angulato-acuminatis, racem. ramoſis nudis.

Botrys. 9. C. fol. oblongis ſinuatis, racem. nudis multifidis.

ambroſ. 10. C. fol. lanceolatis dentatis, racem. foliatis ſimplicibus.

multifidum. 11. C. fol. multifidis: ſegmentis linearibus, flor. axillaribus ſeſſilibus.

anthelmintic. 12. C. fol. ouato-oblongis dentatis, racem. aphyllis.

glaucum. 13. C. fol. ouato-oblongis repandis, racem. nudis ſimplicibus glomeratis.

* * *Foliis integris.*

Vuluaria. 14. C. fol. integerrimis rhomboideo-ouatis, flor. conglomeratis axillaribus.

polyſpermum. 15. C. fol. integerrimis ouatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus.

Scoparia. 16. C. fol. lineari-lanceolatis planis integerrimis.

maritim. 17. C. fol. ſubulatis ſemicylindricis.

ariſtatum. 18. C. fol. lanceolatis ſubcarnoſis integerrimis, corymbis dichotomis: ariſtatis axillaribus.

307. BETA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0. *Sem.* reniforme, 322. intra ſubſtantiam baſeos calycis.

vulgaris. 2. B. flor. congeſtis: *Calycis foliola baſi dentata.*

Cicla. 3. B. flor. ternis. *Calycis foliola baſi inermia. Synonyma ad Betam vulgarem ζη.* Cicla: *huius ſunt.*

maritima. 1. B. flor. geminis. *Differt a B. vulgari; quod primo anno floreat; quod folia obliqua ſ. verticalia, quod Calycis foliola, ſua carina aequalia, nec vnidentata.*

308. SALSOLA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. *Capſ.* 1-ſperma. *Sem.* cochleatum. 322.

Kali. 1. S. herbacea decumbens, fol. ſubulatis ſpinoſis ſcabris, calycibus marginatis axillaribus.

Tragus. 2. S. herbacea erecta, fol. ſubulatis ſpinoſis laeuibus, calycibus ouatis.

roſacea. 3. S. herbacea, fol. ſubulatis mucronatis, calycibus explanatis.

Soda. 6. S. herbacea patula, fol. inermibus.

ſatiua. 7. S. herbacea diffuſa, fol. teretibus glabris, flor. conglomeratis.

altiſſima. 10. S. herbacea erecta ramoſiſſima, fol. filiformibus acutiuſculis baſi pedunculiferis. *Pedunculi 3-flori, lateralibus ad baſin intermedii enatis.*

ſalſa. 9. S. herbacea erectiuſcula, fol. linearibus ſubcarnoſis muticis, calyc. ſucculentis diaphanis. *Caules herbacei, pedales, paniculati, laeues, purpuraſcentes, ſubſtriati. Folia ſupra plana. Flores axillares, ſeſſiles, terni. Calycis foliola maxime fornicata, conuexa, clauſa, in fructu hyalina. Styli 3, apice bifidi.*

hirſuta. 8. S. herbacea diffuſa, fol. teretibus obtuſis tomentoſis.

polyclonos. 12. S. ſublignoſa diffuſa, fol. oblongis, calyc. marginatis glomeratis coloratis. *Mant. 54.*

proſtrata. 3. S. fruteſcens, fol. linearibus piloſis inermibus.

vermicul. 4. S. fruteſcens, fol. ouatis acutis carnoſis.

fruticoſa. 11. S. fruticoſa erecta, fol. filiformibus obtuſiuſculis.

muricata. 13. S. fruticoſa patula, ramulis hirſutis, calyc. ſpinoſis *Mant. 54.*

309. ANABASIS. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* 1-ſperma, calyce cincta. 324.

aphylla. 1. A. aphylla, articulis emarginatis.

folio-

folioſa. 2. A. foliis ſubclauatis.
tamariſc. 1. A. foliis ſubulatis, pericarpiis exſuccis.

310. CRESSA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* hypocrateriformis. *Filamenta* tubo inſidentia. *Capſ.* 2-valuis, 1-ſperma.
325.

cretica. 1. CRESSA.

1254. STERIS. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* rotata. *Bacca* 1-locularis, polyſperma.

iauana. 1. STERIS. *Mant. 54. Facies Capſici minoris.*

311. GOMPHRENA. *Cal.* coloratus: exterior 3-phyllus: foliol. 2 conniuentibus carinatis. *Nectarium* cylindricum, 10-dentatum. *Capſ.* 1-ſperma.
326.

globoſa. 1. G. caule erecto, fol. ouato-lanceolatis, capitul. ſolitariis, pedunc. diphyllis. *Rumph. amb. 5. t. 100.*
perennis. 2. G. fol. lanceolatis, capitul. diphyllis, floſculis perianthio proprio diſtinctis.
hiſpida. 3. G. caul. erecto, capitul. diphyllis fol. crenatis.
braſilienſis. 4. G. fol. ouato-oblongis, caule erecto, capitul. pedunculatis globoſis aphyllis.
ſerrata. 5. G. caule erecto brachiato, capitul. ſolitariis terminalibus ſeſſilibus, calycibus ſerratis.
interrupt. 6. G. caule erecto, ſpica interrupta.
flaua. 7. G. pedunc. oppoſitis bifidis tricapitatis, capitulo intermedio ſeſſili.

312. BOSEA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0. *Bacca* 1-ſperma.
326.

yeruamor. 1. BOSEA. Arbuſcula baccifera canarienſis, ſyringae caeruleae foliis. *Pluk. alm. 42.*

313. VLMVS. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* o. *Bacca* exſucca, 327. compreſſo-membranacea.

campeſtr, 1. U. fol. duplicato-ſerratis: baſi inaequalibus.
americana. 2. U. fol. aequaliter ſerratis: baſi inaequalibus.
pumila. 3. U. fol. aequaliter ſerratis: baſi aequalibus.

314. NAMA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-partita. *Capſ.* 327. 1-locularis, 2-valuis.

zeylanic, 1. N. caule erecto glabro, fol. linearibus, flor. racemoſis.
iamaic. 2. N. caul. decumbente, fol. ouatis, flor. ſolitariis.

315. HYDROLEA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* rotata *Fi-* 328. *lament.* baſi cordata. *Capſ.* 2-locularis, 2-valuis.

ſpinoſa. 1. HYDROLEA.

316. SCHREBERA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* infundi- 1662. bulif. *Filament.* in fauce corollae ſquamis totidem baſeos.

ſchinoides. 1. SCHREBERA. *Sp. pl.* 1662.

317. HEVCHERA. *Petala* 5. *Capſ.* 2-roſtris, 2- 328. locularis.

americana. 1. HEVCHERA.

447. VELEZIA. *Cor.* 5-petala, parua. *Cal.* filifor- 474. mis, 5-dentatus. *Capſ.* 1-locularis. *Sem.* plurima ſerie ſimplici.

rigida. 1. VELEZIA. *Caulis ramoſiſſimus. Calyces ſeſſiles, cylindrici, anguſtiſſimi. Petalorum limbus minimus, ad baſin notatus lunula purpurea, vt in Caryophyllaeis. Stamina ſaepe 6, ſed naturalis ſtatus 5, vti poſteriores obſeruationes demonſtrarunt.*

318.

318. SWERTIA. *Cor.* rorata. *Nectariferi* pori ad 328. basin laciniarum corollae. *Capſ.* 1-locularis, 2-valuis.

perennis. 1. S. corollis quinquefidis, fol. radicalibus oualibus.
differmis. 2. S. coroll. quinquefidis : terminali ſexfida, pedunc. longiſſimis, fol. linearibus.
rotata. 3. S. coroll. quinquefidis, fol. lanceolato-linearibus. *Etiam in Islandia.*
cornicul. 4. S. coroll. quadrifidis quadricornibus.
dichotom. 5. S. coroll. quadrifidis ecornibus.

319. GENTIANA. *Cor.* monopetala. *Capſ.* 2-valuis, 1-locularis. *Receptaculis* 329. 2-longitudinalibus.

* *Corollis quinquefidis ſubcampaniformibus.*

lutea. 1. G. coroll. ſubquinquefidis rotatis verticillatis, calyc. ſpathaceis. *Petala punctis ſparſis flaua; ſequentibus duabus nimis affinis.*
purpur. 2. G. coroll. ſubquinquefidis campanulatis verticillatis, calyc. ſubſpathaceis. *Petala punctis ſecundum lineas, purpurea.*
punctata. 3. G. corollis ſubquinquefidis campanulatis punctatis, calyc. quinquedentatis. *Petala punctis ſparſis, purpurea. Iacq. obſ. p. 2. t. 39.*
aſclepiadea. 4. G. coroll. quinquefidis campanulatis oppoſitis ſeſſilibus, fol. amplexicaulibus.
Pneumonanthe. 5. G. coroll. quinquefidis campanulatis oppoſitis pedunculatis, fol. linearibus.
Saponaria. 6. G. coroll. quinquefidis campanulatis ventricoſis verticillatis, fol. trineruiis.
villoſa. 7. G. coroll. quinquefidis campanulatis ventricoſis, fol. villoſis.
acaulis. 8. G. coroll. quinquefida campanulata caulem excedente.
exaltata. 9. G. coroll. quinquefidis coronatis crenatis, pedunc. longiſſimo dichotomo terminali.

* * *Corollis quinquefidis infundibuliformibus.*

verna. 10. G. corolla quinquefida infundibuliformi caulem excedente, fol. radicalibus confertis maiorſbus.

pyrenaica. 29. G. corolla decemfida infundibuliformi aequali: laciniis exterioribus rudioribus. *Mant. 55.*

pumila. G. corolla quinquefida infundibuliformi ſubſerrata, fol. lanceolato-linearibus. *Iacq. vind. 215.*

bauarica. 11. G. corolla quinquefida infundibuliformi ſerrata, fol. ouatis obtuſis. *Iacq. obſ. 2. t. 71.*

aurea. 12. G. coroll. quinquefidis infundibuliformibus acuminatiſſimis: fauce imberbi muticaque, ramis oppoſitis.

niualis. 13. G. coroll. quinquefidis infundibuliformibus, ram. vnifloris alternis. *Iacq. vind. 215.* *

aquatica. 14. G. coroll. quinquefidis infundibuliformibus terminalibus ſeſſilibus, fol. margine membranaceis.

vtricoloſ. 15. G. coroll. quinquefidis hypocrateriformibus, calyc. plicato-carinatis.

exacoides. 16. G. coroll. quinquefidis hypocrateriformibus, calyc. membranaceo-carinatis, caul. dichotomo, fol. cordatis.

Centaurium. 17. G. coroll. quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, piſtilo ſimplici *β.* Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule breuiſſimo ramoſiſſimo. *Ger. prou. 311.*

mariti.ma. 30. G. coroll. quinquefidis infundibuliformibus, ſtylis geminis, caule dichotomo paucifloro. *Mant. 55.*

ſpicata. 15. G. coroll. quinquefidis infundibuliformibus, flor. alternis ſeſſilibus.

verticillata. B. G. coroll. quinquefidis infundibuliformibus, flor. verticillatis, caule ſimpliciſſimo. *Planta indiae orientalis vix diuerſa. Radix perennis. Caules plures, palmares, articulati. Folia lanceolata. Flores verticillati, ſeſſiles, lutei: limbo 5-fido, acuto. Nectarium e ſquama ſubrotunda baſi ſinguli filamenti, intra tubum corollae annexa. Stylus ſtigmate capitato. Capſula ſemibilocularis.*

quinquefolia. 16. G. coroll. quinquefidis infundibuliformibus, caule acutangulo, fol. ouatis amplexicaulibus.

Amarell. 17. G. coroll. quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis.

* * * *Corollis non quinquefidis.*

campeſtr. 18. G. coroll. quadrifidis fauce barbatis. Gentianella alpina vnicaulis, bellidis folio. *Bocc. muſ. 114. t. 101.*

cilia-

ciliata. 19. G. coroll. quadrifidis margine ciliatis.
Cruciata. 20. G. coroll. quadrifidis imberbibus, flor. verticillatis ſeſſilibus.
ſeſſilis. 21. G. coroll. quadrifidis floribus acaulibus, fol. ouatis.
filiformis. 22. G. coroll. quadrifidis imberbibus, caule dichotomo filiformi.

320. PHYLLIS. *Stigmata* hiſpida. *Fructif* ſparſae. 335.

Nobla 1. P. ſtipulis dentatis.

* VMBELLATAE.

321. ERYNGIVM. *Flores* capitati. *Receptaculo* paleaceo. 336.

foetidum. 1. E. fol. radicalibus lanceolatis ſerratis, floralibus multifidis, caule dichotomo. Radix *annua ſ. biennis.* Folia radicalia *obtuſiuſcula : ſerraturis ſpinoſis, innocuis.* Caulis *pedalis, viridis, ſubangulatus, dichotomus, patens : ramis vltimis flexuoſis.* Folia Ramea *oppoſita, amplexicaulia, cuneata, ſubconnata, margine dentata, ſemitriſida laciniis lanceolatis. angulis omnibus terminatis ſpina purpuraſcente.* Pedunculus *e dichotomiis, rectus, articulis breuior, triangulus, lateribus ſtriatis. Inuolucra ſubhexaphylla, horizontalia, flore longiora : foliolis lanceolatis, nervoſis, ſpinoſis apice et vna alterave ſerratura.* Receptaculum *commune cylindricum, vnde flos cylindricus. Floſculorum* Calyx *5-dentatus, longitudine corollulae.* Petala 5, *exalbida, inuoluta.* Filamenta *capillaria, petalis duplo longiora, alba.* Antherae *teſtaceae.* Stylus *bipartitus, perſiſtens.* Semina *tecta vndique punctis haemiſphaericis.* Paleae *lineares, acutae, longitudine floſculorum.* Odor *totius eximie teter.*

aquaticum. 2. E. fol. gladiatis ſerrato-ſpinoſis : floralibus indiuiſis.
planum. 3. E. fol. radicalibus ouatibus planis crenatis, capitul. pedunculatis.
puſillum. 4. E. fol. radicalibus oblongis inciſis, caule dichotomo, capitul. ſeſſilibus.

tricuſpidatum. 7. E. fol. radicalibus cordatis, caulinis palmatis auriculis retroflexis, paleis tricuſpidatis.
maritim. 5. E fol. radicalibus ſubrotundis plicatis ſpinoſis, capitul. pedunculatis, paleis tricuſpidatis.
alpinum. 6. E. fol. radicalibus cordatis oblongis; caulinis pinnatifidis, capitul. ſubcylindrico.
campeſtre. 8. E. fol. radicalibus amplexicaulibus pinnato-lanceolatis. *Inuolucra ſubulata capitulo longiora. Gouan.*
amethyſt. 9. E. fol. radicalibus trifidis baſi ſubpinnatis. *Inuolucra lanceolata, capitulo longiora. Gouan.*

322. HYDROCOTYLAE. 338.

Vmbella ſimplex: *Inuolucro* 4-phyllo. *Petala* integra. *Sem.* ſemiorbiculato - compreſſa.

vulgaris. 1. H. fol. peltatis, vmbell. quinquefloris.
vmbellat. 2. H. fol. peltatis, vmbell. multifloris.
americana. 3. H. fol. reniformibus ſublobatis crenatis. *Et in Ind. orient.*
aſiatica. 4. H. fol. reniformibus aequaliter crenatis. *Et in Iamaica.*
chinenſis. 5. H. fol. linearibus, vmbell. multifloris.

323. SANICVLA. 339.

Vmbellae confertae, ſubcapitatae. *Fructus* ſcaber. *Flores* diſci abortientes.

europaea. 1. S. fol. radicalibus ſimplicibus, floſculis omnibus ſeſſilibus.
canaden. 2. S. fol. radicalibus compoſitis: foliolis ouatis.
mariland. 3. S. floſculis maſculis pedunculatis: hermaphroditis ſeſſilibus.

324. ASTRANTIA. *Inuolucra partialia* lanceolata, 339. patentia, aequalia, longiora, colorata. *Flores* plurimi abortientes.

maior. 1. A. fol. quinquelobis; lobis trifidis.
minor. 2. A. fol. digitatis ſerratis.

325. BVPLEVRVM. *Inuolucra* vmbellulae maiora, 5-phylla. 340. *Pet.* inuoluta. *Fructus* ſubrotundus, compreſſus, ſtriatus.

* *Herbacea.*

rotundif. 1. B. inuolucris vniuerſalibus nullis, fol. perfoliatis.
ſtellatum. 2. B. inuolucellis coadunatis: vniuerſali triphyllo. *Inuolucella octofida Hall. emend. 120.* *
petraeum. 3. B. inuollucellis coadunatis: vniuerſali pentaphyllo.
anguloſum. 4. B. inuolucellis pentaphyllis orbiculatis: vniuerſali triphyllo ouato, fol. amplexicaulibus cordato-lanceolatis.
longifolium. 5. B. inuolucellis pentaphyllis ouatis: vniuerſali ſubpentaphyllo, fol. amplexicaulibus.
falcatum. 6. B. inuolucellis pentaphyllis acutis: vniuerſali ſubpentaphyllo, fol. lanceolatis, caule flexuoſo. *Caulis purpuraſcens, totus paniculatus. Vmbellae ſaturate luteae. Vmbellulae ſaepius 7.*
odontites. 7. B. inuolucellis pentaphyllis acutis: vniuerſali triphyllo, floſculo centrali altiore, ramis diuaricatis.
ſemicompoſitum. 8. B. vmbellis compoſitis ſimulque ſimplicibus.
ranunculoides. 9. B. inuollucellis pentaphyllis lanceolatis longioribus: vniuerſali triphyllo, fol. caulinis lanceolatis.
rigidum. 10. B. caule dichotomo ſubnudo, inuolucris minimis acutis. *Folia omnia lanceolata, neruoſa, rigida, petiolata. Inuolucrum 3-phyllum, ſubulatum, breuiſſimum. Inuolucella ſetacea, breuia.*
tenuiſſimum. 11. B. vmbell. ſimplicibus alternis pentaphyllis ſubtrifloris. *Inuolucrum 3-phyllum, breue. Inuolucella ſetacea, breuia.*

iun-

iunceum. 12. B. caul. erecto paniculato. fol. linearibus, inuolucris triphyllis, inuolucellis pentaphyllis. Bupleurum inuolucris et inuolucellis pentaphyllis, fol. lineari-subulatis. *Ger. prou. 233. t. 9.*

* * *Frutescentia.*

villosum. 13. B. frutescens, fol. amplexicaulibus dentatis subtus villosis.

fruticos. 14. B. frutescens, fol. obouatis integerrimis.

fruticescens. B. B. frutescens, fol. linearibus, inuolucro vniuersali partialibusque.

difforme. 15. B. frutescens, fol. vernalibus decompositis planis incisis: aestiualibus filiformibus angulatis trifidis.

326. ECHINOPHORA. 344. *Flores laterales* masculi; *centrali* hermaphrodito *Sem.* 1, inuollucello immersum.

spinosa. 1. E. foliolis subulato-spinosis integerrimis. *Turr. farset. 7.*

tenuifol. 2. E. foliolis incisis inermibus.

327. TORDYLIVM. 345. *Cor.* radiatae omnes hermaphroditae. *Fructus* suborbiculatus, margine crenatus. *Inuolucra* longa, indiuisa.

syriacum. 1. T. inuolucris vmbella longioribus.

officinale. 2. T. inuoluc. partialibus longitudine florum, foliolis ouatis laciniatis.

peregrinum. 8. T. seminibus sulcatis rugosis plicatis, inuolucro vniuersali monophyllo subtrifido. *Mant. 55.*

apulum. 3. T. vmbell. remotis, fol. pinnatis: pinnis subrotundis laciniatis.

maximum. 4. T. vmbell. confertis radiatis, foliolis lanceolatis inciso-serratis.

latifolium. 5. T. vmbella conferta nudiuscula, fol. pinnatis: foliolis lanceolatis inciso-serratis. *Rescissis synonymis*

Anthri-

Anthriſcus. 6. T. vmbellis confertis, foliolis ouato-lanceolatis pinnatifidis.

nodoſum. 7. T. vmbell. ſimplicibus ſeſſilibus, ſemin. exterioribus hiſpidis.

428. CAVCALIS. *Cor.* radiatae; diſci maſculae. *Pet.* inflexo-emarginata. *Fructus* ſetis hiſpidus. *Inuolucra* integra.

346.

grandiflora. 1. C. inuolucr. ſingulis pentaphyllis: foliolo vnico duplo maiore. Caucalis vmbella conferta petalis exterioribus inuolucello longioribus. *Ger. prou. 237.*

daucoides. 2. C. vmbellis trifidis aphyllis, vmbellatis triſpermis triphyllis. *Hort. cliff. 91. Hort. vpſ. 58. Ger. prou. 236.* Echinophora 3 leptophylla purpurea. *Col. ecph. 1. p. 96. t. 87. Deſcriptio Cauc. platycarpi eſt.*

latifolia. 7. C. vmbella vniuerſali trifida partialibus pentaſpermis, fol. pinnatis ſerratis. *Hort. cliff. 91.* Caucalis inuolucris et inuolucellis pentaphyllis, foliis pinnatis. *Ger. prou. 237.* Caucalis aruenſis echinata latifolia. *Bauh. pin. 152.* Lappula canaria latifolia. *Bauh. hiſt. 1. p. 81.*

mauritanica. 3. C. inuolucro vniuerſali monophyllo; partialibus triphyllis.

platycarpos. 4. C. inuolucro multifido, vmbella conferta, petal. exterioribus maioribus longitudine inuolucelli. *Ger. prou. 238.*

orientalis. 5. C. vmbell. patentibus, foliolis partialibus ſupradecompoſitis laciniatis: lacinulis linearibus.

leptophylla. 6. C. inuolucro vniuerſali ſubnullo, vmbella bifida, inuolucellis pentaphyllis. *Ger. prou. 236. excluſa Columna.*

329. ARTEDIA. *Inuolucra* pinnatifida. *Floſculi* diſci maſculi. *Fructus* ſquamis hiſpidus.

347.

ſquamata. 1. A. ſeminibus ſquamatis.

330.

330. DAVCVS. *Corollae* ſubradiatae, omnes hermaphroditae. *Fructus* pilis hiſpidus
348.

Carota. 1. D. ſemin. hiſpidis, petiolis ſubtus neruoſis.
mauritanicus. 2. D. ſemin. hiſpidis, floſculo centrali ſterili, carnoſo, receptaculo communi hemiſphaerico. Paſtinaca tenuifolia, radice et vmbella lutea. *Morif. hiſt. 3. p. 306. ſ. 9. t. 13. f. 5.* Paſtinaca tenuifolia ſicula hirſuta criſpa. *Morif. hiſt. 3. p. 305. ſ. 9. t. 13. f. 3.*
Viſnaga. 3. D. ſemin. laeuibus. *Vmbella ampla. Inuolucella ſimplicia. Petala aequalia.*
Gingidium. 4. D. radiis inuolucri planis: laciniis recuruis. †
muricatus. 5. D. ſemin. aculeatis. *β.* Caucalis vmbella bifida, vmbellulis diſpermis, inuolucris ſemine breuioribus linearibus. *Gouan. monſp. 135.* Caucalis inuolucro vniuerſali diphyllo, partialibus pentaphyllis. *Ger. prou. 237. t. 10.*

331. AMMI. *Inuolucra* pinnatifida. *Corollae* radiatae.
349. omnes hermaphroditae. *Fructus* laeuis.

maius. 1. A. fol. inferioribus pinnatis lanceolatis ſerratis; ſuperioribus multifidis linearibus.
coptieum. 3. A. fol. ſupradecompoſitis linearibus, ſem. muricatis. *Mant. 56.*
glaucifol. 2. A. foliorum omnium lacinulis lanceolatis.

332. BVNIVM. *Corolla* vniformis. *Vmbella* confer-
349. ta. *Fructus* ouati.

Bulbocaſt. 1. BVNIVM.

333. CONIVM. *Inuolucella* dimidiata, ſubtriphylla,
349. *Fructus* ſubgloboſus, 5-ſtriatus, vtrinque crenatus.

maculat. 1. C. ſeminibus ſtriatis.
ringens. 2. C. ſem. ſubmuricatis, pedunc. ſulcatis, foliolis canaliculatis obtuſis.

afri-

african. 2. C. seminibus muricatis, petiolis pedunculisque laeuibus. *Pedunculi oppositifolii, non sulcati. Flosculi plures steriles. Fructus centralis sessilis. Foliola planiuscula.*

Royeni. 3. O. seminibus radiato-spinosis. Caucalis orientalis aruensis tenuifolia, flore purpureo, magno fructu. *Buxb. cent. 3. p. 16. t. 28. Habitat in* Aegypto. *Notante Dav. Royeno.*

334. SELINVM. *Fructus* ouali-oblongus, compresso-planus, in medio striatus. *Involucr.* reflexum. *Petala* cordata, aequalia. 350.

sylueſtre. 1. S. radice fusiformi multiplici. *Foliola linearia. Vmbella patula; vmbellulae remotae. Semina ouali-oblonga: sulcis* 3, *eleuatis, obtusis, approximatis.*

palustre. 2. S. subolacteſcens, radice vnica.

Caruifolia. 3. S. caule sulcato acutangulo, inuolucro vniuersali caduco, pistillis fructus reflexis. Ligusticum alpinum perenne, ferulae folio, floribus albis. *Segu. ver. 2. p. 41. t. 13. an* Ligusticum alpinum, foliis cicutae tenuioribus et glabris, radice breuiore. *Till. pis. 98. t. 39. f. 2. (sed paulo minor foliolis fere latioribus). Semina ouata sulcis eleuatis,* 3, *compressis, vti Laserpitiis; lateribus semina a se inuicem hiant. Foliola omnia apice s. mucrone albo.*

Monnieri. 4. S. vmbella conferta, inuolucro vniuersali reflexo, sem. costis quinque membranaceis.

335. ATHAMANTA. *Fructus* ouato-oblongus, striatus. *Pet.* inflexa emarginata. 351.

Libanotis. 1. A. fol. bipinnatis planis, vmbell. hemisphaerica, semin. hirsutis. *Styli fructus purpurascentes.*

Ceruaria. 3. A. fol. pinnatis decussatis inciso-angulatis, sem. nudis.

sibirica. A. fol. pinnatis inciso-angulatis. *Mant. 56. Hort. Vpf. 60. sub selino. Flores subtus rubri.*

condensata. 2. A. fol. subbipinatis, foliolis deorsum imbricatis, vmbella lentiformi. *Inuolucella longitudine vmbellulae.*

Oreo-

Oreoſelin. 4. A. foliolis diuaricatis.
ſicula. 5. A. fol. inferioribus nitidis, vmbell. primordialibus ſubſeſſilibus, ſemin. piloſis.
cretenſis. 6. A. foliolis linearibus planis hirſutis, petal. bipartitis, ſemin. oblongis hirſutis. *Iacq. vind. 218. Caulis ſtriatus, pubeſcens. Folia ſubhirſuta, laciniis vltimis linearibus, planiuſculis, at in culta ſucculentis fragilibus, nitidiſſimis. Semina oblonga, hirſuta.*
annua. 7. A. fol. multipartitis: laciniis linearibus teretiuſculis acuminatis.
chinenſis. 8. A. ſemin. membranaceo-ſtriatis, fol. ſupradecompoſitis laeuibus multifidis.
Meum. 9. A. foliolis capillaribus, ſemin. glabris ſtriatis.

336. PEVCEDANVM. *Fructus* ouatus, vtrinque
353. ſtriatus, ala cinctus. *Inuolucra* breuiſſima.

officinale. 1. P. fol. quinquies tripartitis filiformibus linearibus. Peucedanum minus. *Bauh. pin. 149.*
alpeſtre. 2. P. foliolis linearibus ramoſis.
Silaus. 3. P. fol. pinnatifidis: laciniis oppoſitis, inuoluc. vniuerſali diphyllo.
alſaticum. 4. P. fol. pinnatifidis: laciniis trifidis obtuſiuſculis.
nodoſum. 5. P. foliolis alternatim multifidis.

337. CRITHMVM. *Fructus* oualis compreſſus.
354. *Floſculi* aequales.

maritim. 1. C. foliolis lanceolatis carnoſis.
pyrenaic. 2. C. foliolis lateralibus bis trifidis.

338. CACHRYS. *Fructus* ſubouatus, angulatus,
355. ſuberoſo-corticatus.

Libanotis. 1. C. fol. bipinnatis: foliol. acutis multifidis, ſem. ſulcatis laeuibus.
ſicula. 2. C. fol. bipinnatis: foliol. linearibus acutis, ſem. ſulcatis hiſpidis.

339. HASSELQVISTIA. *Fructus* glabri. *Sem. Radii* oualia, plana, marginata, medio conuexa, *Diſci* hemiſphærica, urceolata.
355.

aegyptiac. A. HASSELQVISTIA. *Cent.* 24.

340. FERVLA. *Fructus* oualis, compreſſo-planus, ſtriis vtrinque 3.
355.

commun. 1. F. foliolis linearibus longiſſimis ſimplicibus.
glauca. 2. F. foliis ſupradecompoſitis: foliolis lanceolato-linearibus planis.
tingitana. 3. F. foliolis laciniatis: lacinulis tridentatis inæqualibus nitidis.
Ferulago. 4. F. foliis pinnatifidis: pinnis linearibus planis trifidis.
orientalis. 5. F. foliorum pinnis baſi nudis: foliolis ſetaceis.
meoides. 6. F. foliorum pinnis utrinque appendiculatis: foliolis ſetaceis.
nodiflora. 7. F. foliolis appendiculatis, umbell. ſeſſilibus.
canadenſ. 8. F. lucida canadenſis.
Aſſa fæt. 9. F. foliis alternatim ſinuatis obtuſis.

341. LASERPITIVM. *Fructus* oblongus: angulis 8 membranaceis. *Pet.* inflexa, emarginata, patentia.
356.

latifolium. 1. L. foliol. cordatis inciſo-ſerratis.
trilobum. 2. L. foliol. trilobis inciſis.
gallicum. 3. L. foliol. cuneiformibus furcatis.
anguſtif. 4. L. foliol. lanceolatis integerrimis ſeſſilibus.
prutenic. 5. L. foliol. lanceolatis integerrimis: extimis coalitis. *Caulis hirſutus pilis albis, praeſertim verſus baſin. Folia facie Cicutæ viroſæ, hirſuta petiolis & coſtis: Foliola cuneiformi-lanceolata, pinnatifida, non rigida. Umbellae radii, involucra & Flores albi. Semina pubeſcentia, acri-aromatica.*

peucedanoides. 7. L. foliol. lineari-lanceolatis venoſo-ſtriatis diſtinctis.
Siler. 6. L. foliol. ovali-lanceolatis integerimis petiolatis.
Chironium. 7. L. foliol. oblique cordatis, petiolis hirſutis.
ferulaceum. 8. L. foliolis linearibus.
ſimplex. 10. L. ſcapo nudo aphyllo ſimplici, fol. pinnatis multifidis acutis linearibus, umbella ſemigloboſa. *Mant. 56.*

342. HERACLEVM. *Fructus* ellipticus, emarginatus, compreſſus, ſtriatus, marginatus. *Cor.* difformis. inflexo-emarginata. *Involucr.* caducum.
358.

Sphondyl. 1. H. foliolis pinnatifidis laevibus, flor. radiatis.
anguſtifolium. 6. H. fol. cruciato-pinnatis: foliol. linearibus, coroll. floſculoſis, *Mant. 57. Flores in hoc, ut in antecedenti, vniformes, virides, albi.*
ſibiricum. 2. H. fol. pinnatis: foliol. quinis: intermediis ſeſſilibus, corollulis vniformibus. *Foliorum vaginae baſis barba alba denſa.*
Panaces. 3. H. fol. pinnatis: foliol. quinis: intermediis ſeſſilibus, flor. radiatis. *Folia ſubtus tomentoſa.*
auſtriac. 4. H. fol. pinnatis vtrinque rugoſis ſcabris, flor. ſubradiatis. *Jacq. vind. 216. Differt ab H. Panace Foliis vtrinque ſcabris, venoſo-rugoſiſſimis viridibusque, nec mollibus; ſubtomentoſis, ſubtusve pallidis. Pedunculi ſcabri, in Panace laeves.*
alpinum. 5. H. fol. ſimplicibus, flor. radiatis. Heracleum foliis pinnatifidis. *Ger. prov. 246. Hanc cum praecedenti coniungit Segu, ver. 3. p. 224. cum H. auſtriacum ſpontaneum foliis ſcabris, alpinum ſatum foliis ſupra laevibus evadat.*

343. LIGVSTICVM. *Fructus* oblongus, 5 ſulcatus vtrinque *Corollae* aequales. *Petalis* involutis, integris.
359.

Leviſtic. 1. L. fol. multiplicibus: foliol. ſuperne inciſis.
ſcoticum. 2. L. fol. biternatis.

pelo-

pelopon. 4. L. fol. multiplicato-pinnatis: foliol. pinnatim inciſis.
auſtriacum. 5. L. fol. bipinatis: foliol. confluentibus inciſis integerrimis. *Jacq. vind. 221. Segu. veron. 3. p. 226.* Liguſticum alterum lobelii, *Dalech. hiſt. 744.*
cornubienſe. 3. L. fol. decompoſitis inciſis: radicalibus ternatis lanceolatis integerrimis.
peregrinum. 6. L. vmbellae primariae inuolucro ſubnullo; lateralium baſi membranacea: radiis ſubramoſis. Petroſelinum hortenſe latifolium. *Bauh. pin.* 153. Apium hortenſe magnum, petroſelini ſapore. *Bauh. hiſt. 3. p. 99. Simile Petroſelino etiam ſapore & odore, ſed craſſiora rigidioraque omnia.*

344. ANGELICA. 360.

Fructus ſubrotundus, angulatus, ſolidus, ſtylis reflexis. *Corollae* aequales: petalis incuruis.

Archang. 1. A. foliorum impari lobato.
ſylveſtris. 2. A. fol. aequalibus ovato-lanceolatis ſerratis.
atropurpurea 3. A. foliorum extimi pari coadunato; folio terminali petiolato.
lucida. 4. A. fol. aequalibus ovatis inciſo-ſerratis.

345. SIVM. 361.

Fructus ſubouatus, ſtriatus. *Inuolucrum* polyphyllum. *Petala* cordata.

latifol. 1. S. fol. pinnatis, vmbell. terminali.
anguſtifolium. 9. S. fol pinnatis, vmbell. axillaribus pedunculatis, inuolucro vniuerſali pinnatifido. *Sp. pl. 1672.* Sium Berula. *Gouan, mon p. 218. Foliorum pinnarum par ſecundum ita diſtat a primo, vt deficere videatur. Vmbellae oppoſitifoliae G.*
nodiflor. 2. S. fol. pinnatis, vmbell. axillaribus ſeſſilibus.
Siſarum. 3. S. fol. pinnatis; floralibus ternatis.
Ninſi. 4. S. fol. ſerratis pinnatis; rameis ternatis.
rigidius. 5. S. fol. pinnatis: foliolis lanceolatis ſubintegerrimis.
Falcaria. 6. S. foliol. linearibus decurrentibus connatis.
graecum. 7. S. fol. omnibus bipinnatis.
ſiculum. 8. S. fol. radicalibus ternatis; caulinis bipinnatis.

346. SISON. *Fructus* ovatus, striatus. *Involucr.* sub 4-phylla. 362.

Amomum. 1. S. foliis pinnatis, vmbellis erectis.
segetum. 2. S. foliis pinnatis, vmbellis cernuis.
canadens. 3. S. foliis ternatis.
Ammi. 4. S. fol. tripinatis: radicalibus linearibus; caulinis setaceis; stipularibus longioribus.
inundatum. 5. S. repens, vmbellis bifidis. *Oed. dan. t. 89.*
verticill. 6. S. foliolis verticillatis capillaribus.

347. BVBON. *Fructus* ovatus, striatus, villosus. 364.

macedonicum. 1. B. foliol. rhombeo-ovatis crenatis, vmbell. numerosissimis.
Galbanum. 2. B. foliol. rhombeis dentatis striatis glabris, vmbell. paucis.
gummiferum. 3. B. foliol. glabris: inferioribus rhombeis serratis; superioribus pinnatifidis tridentatis.
rigidius. 4. B. foliolis linearibus.

348. CVMINVM. *Fructus* ovatus, striatus. *Vmbellulæ* 4: *Involucra* 4-fida. 365.

Cyminum. 1. CVMINVM.

349. OENANTHE. *Flosculi* difformes: in disco sessiles, steriles. *Fructus* calyce coronatus. 365.

fistulosa. 1. OE. stolonifera, fol. caulinis pinnatis filiformibus fistulosis.
crocata. 2. OE. fol. Omnibus multifidis obtusis subaequalibus. *Caulis rufus. Folia alia pinnata, alia sed saepius bipinnata. Foliola cuneata, incisa, laevia, lineata. Pedunculi angulati, striati. Involcur. vniuersale nullum. Petala alba, inflexa, tamen acuta. Antherae fuscae.*
prolifera. 3. OE. vmbellarum pedunculis marginalibus longioribus ramosis masculis.

globu-

globulosa. 4. OE. fructibus globosis.
pimpinel. 5. OE. foliol. radicalibus cuneatis fissis; caulinis integris
loides. linearibus longissimis canaliculatis.

350. PHELLANDRIVM. *Flosculi* disci minores. *Fructus* ouatus, laevis, coronatus perianthio & pistillo.
366.

aquaticum. 1. P. foliorum ramificationibus divaricatis.
Mutellin. 2. P. caule subnudo, foliis pinnatis.

351. CICVTA. *Fructus* subouatus, sulcatus.
366.

virosa. 1. C. vmbell. oppositifoliis, petiol. marginatis obtusis.
bulbifera. 2. C. ramis bulbiferis.
maculata. 3. C. foliorum serraturis mucronatis, petiol. membranaceis apice bilobis. Myrrha. *Mitch. gen. 18.*

352. AETHVSA. *Inuolucella* dimidiata, 3-phylla, pendula. *Fructus* striatus.
367.

Cynapium. 1. AETHVSA.

353. CORIANDRVM. *Cor.* radiata: *Pet.* inflexo-emarginata. *Inuolucr. vniuersale* 1-phyllum: *Partialia* dimidiata. *Fructus* sphaericus.
367.

sativum. 1. C. fructibus globosis.
testiculat. 2. C. fructibus didymis.

354. SCANDIX. *Cor.* radiata. *Fructus* subulatus. *Petala* emarginata. *Flosculi* disci saepe masculi.
368.

odorata. 1. S. seminibus sulcatis angulatis.
Pecten. 2. S. semin. rostro longissimo.

Cerefolium. 3. S. semin. nitidis ovato-subulatis, vmbellis sessilibus lateralibus.

Anthriscus 4. S. semin. ovatis hispidis, coroll. vniformibus, caule laevi.

australis. 5. S. Semin. subulatis hispidis, flor. radiatis, caul. laevibus.

nodosa. 6. S. semin. subcylindricis hispidis, caule hispido: geniculis tumidis.

trichosperma. 9. S. semin. hirsutissimis pilis semine duplo longioribus. *Mant. 57.*

grandist. 7. S. semin pedunculo villoso breuioribus.

procumb. 8. S. semin. nitidis ovato-subulatis, fol. decompositis.

355. CHAEROPHYLLVM. *Inuolucr.* reflexum, concauum. *Petala* inflexo-cordata. *Fructus* oblongus, laeuis.
369.

sylueſtre. 1. C. caul. laeui striato, geniculis tumidiusculis

bulbosum. 2. C. caule geniculis tumido, basi hirto.

temulum. 3. C. caule scabro: geniculis tumidis.

hirsutum. 5. C. caule aequali: foliol. incisis acutis, fruct. biaristatis. *Planta pubescens (Folia punctis albis supra serraturas. Gouan.). Fructus subcylindrici, laeviter striati, terminati aristis 2, distinctis, rectis, apice obtusatis, magis rigidis quam in C. aromatico. Caulis fistulosus.*

aromatic. 6. C. caule aequali, foliol. serratis integris, fruct. biaristatis. *Caulis petiolique hirti.*

coloratum. 8. C. caule aequali, fol. supradecompositis, inuolucellis colloratis. *Mant. 57.*

aureum. 4. C. caule aequali, foliol incisis, sem. coloratis sulcatis muticis. Myrrhis minor. *Bauh. pin. 160.* Myrrhis perennis alba minor, fol. hirsutis, sem. striato aureo. *Morisſ. hist. 3. p. 301. Planta pubescens. Folia supra glabra. Fructus fusiformi-cylindrici. Sem. sulcis 4, obtusis, remotis. Caulis farctus.*

arboresc. 7. C. fruticosum.

356. IMPERATORIA. *Fructus* ſubrotundus, compreſſus, medio gibbus, margine cinctus. *Petala* inflexo-emarginata.
371.

Oſtruth. 1. IMPERATORIA.

357. SESELI. *Vmbellae* globoſae. *Inuolucr.* foliolo vno alteroue. *Fructus* ouatus, ſtriatus.
372.

Pimpinel. 1. S. caule declinato, vmbell. nubilibus nutantibus.
montanum. 2. S. petiol. ramiferis membranaceis oblongis integris, fol. caulinis anguſtiſſimis.
glaucum. 3. S. petiol. ramiferis membranaceis oblongis integris: foliol. ſingularibus binatisque canaliculatis laeuibus petiolo longioribus. Seſeli petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliolis filiformibus petiolo longioribus. *Ger. prov.* 253.
pumilum. 6. S. vmbellis numeroſiſſimis compoſitis ſimplicibusque. *Ger. prov.* 253. Pimpinella pumila - - *Jacq. vind.* 227. Foeniculum montanum pumilum. *Cluſ. hiſt.* 2. p. 200. *Petala longius lanceolata, nec incurvato-emarginata; an planta dioica? Inuolucella in hac nulla.* (*Jacquin*); *minuta caduca. Gerard.*
annuum. 4. S. petiol. rameis membrenaceis ventricoſis emarginatis. *Jacq. vind.* 225.
Ammoid. 5. S. petiol. membrana deſtitutis.
tortuoſum. 7. S. caule alto rigido, foliol. linearibus faſciculatis.
Turbith. 8. S. inuolucro vniuerſali monophyllo, ſemin. ſtriatis villoſis ſtylatis.
Hippomarathrum. 9. S. involucelis connato-monophyllis. *Jacq. vind.* 224. Hippomarathrum. *Hall. emend.* 115.
pyrenaeum. 10. S. fol. duplicato-pinnatis: foliolis inciſis acutis, involucr. ſetaceis vmbellula longioribus.
ſaxifragum. 11. S. caule filiformi divaricato, fol. duplicato-ternatis linearibus, vmbell. ſubſexfidis.
elatum. 12. S. caule elongato geniculis calloſis, fol. bipinnatis: pinnis linearibus diſtantibus.

358. THAPSIA. *Fructus* oblongus, membrana
375. cinctus.

villoſa. 1. T. foliol- dentatis villoſis baſi coadunatis.
foetida. 2. T. foliol. multifidis baſi anguſtatis.
Aſclepium. 3. T. fol. digitatis: foliol. bipinnatis ſetaceo-multifidis.
garganica. 5. T. fol. pinnatis: foliolis pinnatifidis: laciniis lanceolatis. *Mant. 57.*
trifoliata. 4. T. fol. ternatis ovatis. *Semina Selini carvifoliae ſ. monieri, ſed inuolucra nulla.*

359. PASTINACA. *Fructus* elipticus, compreſſo-
376. planus. *Petala* inuoluta, integra.

lucida. 3. P. fol. ſimplicibus cordatis lobatis lucidis acute crenatis. *Mant. 58.*
ſativa. 1. P. fol. ſimpliciter pinnatis.
Opopanax. 2. P. fol. bipinnatis.

360. SMYRNIVM. *Fructus* oblongus, ſtriatus. *Pe-*
376. *tala* acuminata, carinata.

perfoliat. 1. S. fol. caulinis ſimplicibus amplexicaulibus.
aegyptiacum. 2. S. fol. floralibus binis ſimplicibus cordatis integerrimis. *Cent. 25.*
Oluſatrum 3. S. fol. caulinis ternatis petiolatis crenatis.
aureum. 4. S. fol. pinnatis ſerratis: poſticis ternatis, floſcul. omnibus fertilibus.
integerr. 5. S. fol. caulinis duplicato-ternatis integerrimis.

361. ANETHVM. *Fructus* ſubouatus, compreſ-
377. ſus, ſtriatus. *Petala* involuta, integra.

graveol. 1. A. fructibus compreſſis.
Foeniculum. 2. A. fructibus ovatis.

362. CARVM. *Fructus* ouato-oblongus, ſtriatus.
378. *Inuolucr.* 1-phyllum. *Petala* carinata, inflexo-emarginata.

Carui. 1. CARVM.

363. PIM-

363. PIMPINELLA. *Fructus* ouato-oblongus. *Petala* inflexa. *Stigm.* ſubgloboſa.
378.

ſaxifraga. 1. P. fol. pinnatis : foliol. radicalibus ſubrotundis ; ſummis linearibus.
glauca 2. P. fol. ſupradecompoſitis, caule angulato ramoſiſſimo.
peregrina. 3. P. fol. radicalibus pinnatis crenatis ; ſummis cuneiformibus inciſis, vmbell. nubilibus nutantibus.
Aniſum. 4. P. fol. radicalibus trifidis inciſis. *Involucella depauperata.*
dichotoma: 5. P. pedunc. oppoſitifoliis , fol. floriferis bitrifidis , petiol. alato-membranaceis. *Mant. 58.*

364. APIVM. *Fructus* ouatus , ſtriatus. *Involucr.* 1-phyllum. *Petala* aequalia.
379.

Petroſel. 1. A. fol. caulinis linearibus , involucell. minutis.
graveol. 2. A. fol. caulinis cuneiformibus.

365. ÆGOPODIVM. *Fructus* ouato - oblongus , ſtriatus.
379.

Podagrar. 1. Ae- fol. caulinis ſummis ternatis.

TRIGYNIA.

366. RHVS. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Bacca* 1-ſperma.
379.

Coriaria. 1. R. fol. pinnatis obtuſiuſcule crenatis ovalibus, ſubtus villoſis.
typhina. 2. R. fol. pinnatis argute ſerratis lanceolatis , ſubtus tomentoſis. *Cent. 139.*
javaniea. 3. R. fol. pinnatis ovatis acuminatis ſerratis, ſubtus tomentoſis.
glabra. 4. R. fol. pinnatis ſerratis lanceolatis, vtrinque nudis.
Vernix. 5. R. fol. pinnatis integerrimis , petiolo integro aequali.

Copallium. 6. R. fol. pinnatis integerrimis, petiolo membranaceo articulato.
Metopium. 7. R. fol. pinnatis quinatis integerrimis ſubrotundis glabris.
radicans. 8. R. fol. ternatis: foliol. petiolatis ovatis nudis integerrimis, caul. radicante.
Toxicodendr. 9. R. fol. ternatis: foliol. petiolatis angulatis pubeſcentibus, caul. radicante.
Cominia. 10. R. fol. ternatis; foliol. petiolatis ovatis. ſubtus tomentoſis, remotiſſime ſerratis.
Cobbe. 12. R. fol. ternatis: foliolis ovatis acuminatis ſerratis, pedunc. tomentoſis.
tomentoſum. 11. R. fol. ternatis: foliol. ſubpetiolatis rhombeis angulatis, ſubtus tomentoſis.
anguſtifolium. 13. R. fol. ternatis: foliol. petiolatis lineari-lanceolatis integerrimis, ſubtus tomentoſis.
laevigatum 16. R. fol. ternatis: foliol. ſeſſilibus lanceolatis laevibus. *Sp. pl. 1672.*
lucidum. 14. R. fol. ternatis: foliol. ſeſſilibus cuneiformibus laevibus.
Cotinus. 15. R. foliis ſimplicibus obovatis.

367. VIBVRNVM. *Cal.* 5-partitus, ſuperus. *Cor.* 5-fida. *Bacca* 1-ſperma.
383.

Tinus. 1. V. fol. integerrimis ovatis: ramificationibus venarum ſubtus villoſo-glandulofis.
nudum. 2. V. fol. integerrimis lanceolato-ovatis. *Mill. ic. 183, t. 274.*
prunifol. 3. V. fol. ſubrotundis crenato-ſerratis glabris.
dentatum. 4. V. fol ovatis dentato-ſerratis plicatis.
Lantana. 5. V. fol. cordatis ſerratis venoſis, ſubtus tomentoſis.
acerifol. 6. V. fol. lobatis, petiolis laevibus.
Opulus. 7. V. fol. lobatis, petiolis glandulofis.
Lentago. 8. V. fol. ovatis ſerrulatis acuminatis glabris, petiol. marginatis vndulatis.

Caſſinoides. 9. V. fol. ovatis crenatis glabris, petiolis carinatis eglandulatis.

368. CASSINE. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Bacca* 3-ſperma.
384.

Peragua, 1. C. foliis oblongis ſerratis. *In hortis europaeorum ſunt Folia oblonga, viridia, ſerrata, minora, acutiuſcula; ad Cap. b. ſpei Folia ovata, glauca, ſubdentata, obtuſa. Baccae ſaepius diſpermae.*
Mauroc. 2. C. foliis obouatis integerrimis.

369. SAMBVCVS. *Cal.* 5-partitus. *Cor* 5-fida. *Bacca* 3-ſperma.
385.

Ebulus. 1. S. cymis tripartitis, ſtipul. foliaceis, caul. herbaceo.
canadenſ. 2. S. cymis quinquepartitis, fol. ſubbipinnatis, caul. fruteſcente.
nigra. 3 S. cymis quinquepartitis, caule arboreo.
racemoſa. 4. S. racem compoſitis ovatis, caule arboreo.

370. SPATHELIA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Capſ.* 3-gona, 3-locularis. *Sem.* ſolitaria.
386.

ſimplex. 1. SPATHELIA.

371. STAPHYLEA. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Capſ.* inflatæ, connatæ. *Sem.* 2, globoſa cum cicatrice.
386.

pinnata. 1. S. foliis pinnatis.
trifolia. 2. S. foliis ternatis.

372. TAMARIX. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Capſ.* 1-locularis, 3-valvis. *Semina* pappoſa.
386.

gallica. 1. T. floribus pentandris. *Mill. ic. t. 262. f. 1.*
germanic. 2. T. floribus decandris. *Mill. ic. t. 262. f. 2.*

373.

373. TVRNERA. *Cal.* 5-fidus, infundibulif. exterior 2-phyllus. *Petala* 5, calyci inſerta. *Stigmata* multifida. *Capſ.* 1-locularis, 3-ualuis.
387.

ulmifolia. 1. T. flor. ſeſſilibus petiolaribus, fol. baſi biglanduloſis
ß. Corolla minor petalis mucronatis. Bracteae absque glandulis. Folia obtuſiora. Antherae fulvae, nec flavae. Mill. ic. t. 268. f. 2.
Pumilea. 2. T. flor. ſeſſilibus petiolaribus, fol. eglanduloſis.
ſidoides. 4. T. pedunc. axilaribus biſetis, fol. obovato-cuneatis ſerratis, *Mant. 58.*
ciſtoides. 3. pedunc. axilaribus aphyllis, fol. apice ſerratis.

374. TELEPHIVM. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, receptáculo inſerta. *Capſ.* 1-locularis, 3-ualuis.
388.

imperati. 1. T. fol. alternis.
oppoſitifol. 2. T. fol. oppoſitis. †.

375. CORRIGIOLA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Semen* 1, triquetrum.
388.

litoralis. 1. CORRIGIOLA.

376. PHARNACEVM. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* O. *Capſ.* 3-locularis, polyſperma.
388.

Ceruiana. 1. P. peduncul. ſubumbellatis lateralibus, foliâ linearia aequantibus.
Mollugo. 3. P. peduncul. vnifloris lateralibus, fol. linearibus.
incanum. 2. P. pedunc communibus longiſſimis, fol. linearibus.
cordifolium. 4. P. racemis bipartitis terminalibus, fol. obcordatis. Spergula e cap. b. ſp. foliis portulacae minoribus ſtellatis. *Pet. muſ. 478.*

377. ALSINE. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, aequalia.
389. *Capſ.* 1-locularis, 3-valuis.

media. 1. A. petal. bipartitis, fol. ovato-cordatis.
ſegetalis. 2. A. petal. integris, fol. ſubulatis.
mucronata. 3. A. petal. integris brevibus, fol. ſetaceis, calyc. ariſtatis.

378. DRYPIS. *Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Caps.*
390. circumſciſſa, monoſperma.

ſpinoſa. 1. DRIPIS. *Rami vltimi floriferi. Pedunculi flore breuiores. Calyx ſemiquinquefidus, erectus. Petala alba, anguſtiſſima, patentia. Stamina erecta.*

379. BASELLA. *Cal.* o. *Cor.* 7-fida: laciniis 2 oppoſitis latioribus, tandem baccata. *Sem.* 1.
390.

rubra. 1. B. fol. planis, pedunculis ſimplicibus. *Rumph. amb. 5. t. 154.*
alba. 2. B. fol. undatis ovatis, pedunculis ſimplicibus folio longioribus.
lucida. 3. B. fol. ſubcordatis, pedunculis confertis ramoſis.

380. SAROTHRA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala.
391. *Capſ.* 1-locularis, 3-valvis colorata.

Gentian. 1. SAROTHRA.

TETRAGYNIA.

381. PARNASSIA. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Nectaria* 5, cordata, ciliata apicibus globoſis. *Capſ.* 4-
391. valuis.

paluſtris. 1. PARNASSIA.

382. EVOLVULUS. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-fida, rotata. *Capſ.* 3-locularis. *Sem.* ſolitaria.
391.

nummularius. 1. E. fol. ſubrotundis, caul. repente, flor. ſubſeſſilibus.
gangeticus. 2. E. fol. cordatis obtuſis mucronatis villoſis petiolatis caul. diffuſo, pedunc. vnifloris.
alſinoides. 3. E. fol. obcordatis obtuſis piloſis petiolatis, caul. diffuſo, pedunc. trifloris.
linifolius. 4. E. fol. lanceolatis villoſis ſeſſilibus, caul. erecto, pedunc. trifloris longis.
tridentatus 5. E. fol. lineari-cuneiformibus tricuſpidatis baſi dilatata dentatis, pedunc. vnifloris. *Burm. ind. t. 16. f. 3.*

PENTAGYNIA.

383. ARALIA. *Involucr.* vmbellulæ. *Cal.* 5-dentatus, ſuperus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* 5-ſperma.
392.

arborea. 1. A. arborea, fol. ſimplicibus, vmbellae vniuerſalis radiis vniglanduloſis.
ſpinoſa. 2. A. arboreſcens, caule foliisque aculeata.
chinenſis. 3. A. caule petiolisque aculeatis, foliol. inermibus villoſis.
racemoſa. 3. A. caule folioſo herbaceo laevi.
nudicaul. 4. A. caule ſubnudo, foliis binis ternatis.

384. STATICE. *Cal.* 1-phyllus, integer, plicatus, ſcarioſus. *Petala* 5. *Sem.* 1, ſuperum.
394.

Armeria. 1. S. ſcapo ſimplici capitato, fol. linearibus.
Limonium. 2. S. ſcapo paniculato tereti, fol. laeuibus enerviis, ſubtus mucronatis.
incana. 14. S. ſcapo paniculato, fol. lanceolatis trineruiis ſubundulatis apice mucronatis, paniculae ramis triquetris. *Mant. 59.*

corda-

cordata. 3. S. ſcapo paniculato, fol. ſpathulatis retuſis. *an varietas S. Limonii.*

reticulat. 5. S. ſcapo paniculato proſtrato, ram. ſterilibus retroflexis nudis, fol. cuneiformibus muticis.

echioides. 4. S. ſcapo paniculato tereti articulato, fol. ſcabris. *Folia lingulato-cuneiformia, obtuſiuſcula, non perfecte laevia. Scapi panicula articulata articulis divaricatis ſubtuberculatis, bifaria: ramulis dichotomis. Calyces parvi., acuti.* Petala *emarginata, pallide caerulea ſtria purpurea.*

ſpecioſa. 6. S. ſcapo dichotomo ancipiti, fol. ovatis mucronatis, florib. aggregatis.

tatarica. 7. S. ſcapo dichotomo, fol. lanceolatis mucronatis, flor. alternis diſtantibus.

Echinus. 8. S. ſcapo paniculato, fol. ſubulatis mucronatis.

flexuoſa. 9. S. ſcapo ramoſo flexuoſo, corymb. terminalibus, fol. neruoſis.

purpurata. 16. S. caule ſubfoliato, fol. obovato-cuneatis trinerviis mucronatis. *Mant. 59.*

minuta. 15. S. caule ſuffruticoſo folioſo, fol. confertis cuneatis glabris muticis, ſcapis paucifloris. *Mant. 59.*

ſuffruticoſa. 10. S. caule fruticoſo: ſuperne nudo ramoſo, capitul. ſeſſilibus, fol. lanceolatis vaginantibus.

monopetala. 11. S. caule fruticoſo folioſo, flor. ſolitariis, fol. lanceolatis vaginantibus.

aurea, 13. S. caule fruticoſo folioſo ramoſo, fol. ſubulatis.

ferulacea. 12. S. caule fruticoſo ramoſo, ramulis imbricatis, paleis apice pilo terminatis.

pruinoſa. 17. S. caule flexuoſo ramoſo furfuraceo. *Mant. 59.*

ſinuata. 14. S. caule herbaceo fol. radicalibus alternatim pinnato-ſinuatis: caulinis ternis triquetris ſubulatis decurrentibus.

385. LINUM. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Capſ.* 5-valvis, 10-locularis. *Sem.* ſolitaria. 397.

* *Foliis alternis.*

vſitatiſſimum. 1. L. calycibus capſulisque mucronatis, petal. crenatis, fol. lanceolatis alternis, caule ſubſolitario.

pere-

perenne. 2. L. calycibus capſulisque obtuſis, fol. alternis lanceolatis integerrimis.

viſcoſum. 3. L. fol. lanceolatis piloſis quinquenerviis.

hirſutum. 3. L. calycibus hirſutis acuminatis ſeſſilibus alternis, fol. alternis: rameis oppoſitis.

narbonenſe. 4. L. calycibus acuminatis, fol. lanceolatis ſparſis ſtrictis ſcabris acuminatis, caule tereti baſi ramoſo.

tenuifol. 5. L. calycibus acuminatis, fol. ſparſis lineari-ſetaceis retrorſum ſcabris.

gallicum. 15. L. calycibus ſubulatis acutis, fol. lineari-lanceolatis alternis, paniculae pedunculis bifloris, flor. ſubſeſſilibus. *Ger. prou. 421. t. 16. f. 1.*

alpinum. 22. L. calycibus rotundatis obtuſis, fol. linearibus acutiuſculis, caulibus declinatis. *Sp. pl. 1672.* Linum tenuifolium. *β. Sp. pl. 398.* Linum ſylveſtre caeruleum perenne (noſtras. *Rai. hiſt.* 1073.) procumbens, flore & capitulo minore. *Rai. angl. 3. p. 362.* Linum perenne minus caeruleum, capitulo minore. *Moriſ hiſt. 3. p. 573. n. 4.* Linum ſylv. 5 anguſtifolium alterius generis. *Cluſ. hiſt. 1. p. 318. Planta tota laevis: Caules teretes, inclinati, vt fere proſtrati, ſimplices. Folia adſcendentia. Flores caerulei, non parvi.*

auſtriac. 6. L. calycibus rotundatis obtuſis, fol. linearibus acutis rectiuſculis.

virginianum. 7. L. calycibus acutis alternis, capſul. muticis, paniculа filiform. fol. alternis lanceolatis: radicalibus ovatis.

flauum. 9. L. calycibus ſubſerrato-ſcabris lanceolatis ſubſeſſilibus, panicula ramis dichotomis.

ſtrictum. 10. L. calycibus ſubulatis, fol. lanceolatis ſtrictis mucronatis: margine ſcabris.

ſuffrutic. 11. L. fol. linearibus acutis ſcabris, caul. ſuffruticoſis.

arboreum. 12. L. fol. cuneiformibus, caul. arboreſcentibus.

campanul. 13. L. foliorum baſi vtrinque punctata glanduloſa.

maritimum. 14. L. calycibus ovatis acutis muticis, fol. lanceolatis: inferioribus oppoſitis.

* * *Foliis oppoſitis.*

africanum. 15. L. fol. oppoſitis lineari-lanceolatis, flor. terminalibus pedunculatis.

nodiflor. 16. L. fol. floriferis oppoſitis lanceolatis, flor. alternis ſeſſilibus, calycibus longitudine foliorum.

cathar-

cathartic. 17. L. fol. oppositis ouato-lanceolatis, caule dichotomo, coroll. acutis.
Radiola. 18. L. foliis oppositis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis.
quadrif. 19. L. foliis quaternis.
verticill. 20. L. foliis verticillatis.

386. ALDROVANDA. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. 402. *Capſ.* 5-valuis, 1-locularis, 10-ſperma.

veſiculoſ. 1. ALDROVANDA. *Vtriculos gerit fere vt Vtricularia.*

387. DROSERA. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Capſ.* 1-402. locularis apice 5-valuis. *Sem.* plurima.

rotundif. 1. D. ſcap. radicatis, fol. orbiculatis.
longifolia. 2. D. ſcap. radicatis, fol. oblongis.
luſitanica. 3. D. ſcap. radicatis, fol. ſubulatis ſubtus conuexis, flor. decandris.
capenſis. 4. D. ſcap. radicatis, fol. lanceolatis.
ciſtiflora. 5. D. caule ſimplici folioſo, fol. lanceolatis. *Florum fundus ater. Stamina* 5, *nigra, longitudine calycis. Antherae luteae, cordatae. Piſtillum nigrum: Germen ouatum, cui circum apicem, nec in ipſo apice, inſident Styli* 5, *nigri, longitudine corollae, apice dichotomi vsque in capillos.*
indica. 6. D. caule ramoſo folioſo, fol. linearibus.
* *Roridula. Xandr. Igyn.*

388. CRASSVLA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Squa-*404. *mae* 5 nectariferae ad baſin germinis. *Capſ.* 5.

coccinea. 1. C. fol. planis cartilagineo-ciliatis baſi connato-vaginantibus.
flaua. 19. C. fol. planis connato perfoliatis laeuibus, flor. corymboſo-paniculatis. *Mant.* 60.

perfoliat. 2. C. fol. lanceolato-ſubulatis ſeſſilibus connatis canaliculatis: ſubtus conuexis. *Mill. fig. t.* 108.

fruticuloſa. 20. C. fol. oppoſitis ſubulatis acutis patentibus ſubrecuruatis, caul. fruticoſo. *Mant.* 61.

tetragona. 4. C. fol. ſubulatis obſolete tetragonis patentibus, caul. erecto radicante.

ſubulata. 3. C. fol. ſubulatis teretibus patentibus, caule herbaceo.

obuallata. 21. C. fol. oppoſitis ſublanceolatis cultratis approximatis. *Mant.* 61. *Flores omnino ſequentis.*

cultrata. 9. C. fol. oppoſitis obtuſe ouatis integerrimis ſubcultratis obliquis: paribus remotis.

centauroides. 5. C. caule herbaceo dichotomo, fol. cordatis ſeſſilibus, pedunc. vnifloris.

dichotomo. 6. C. caule herbaceo dichotomo, fol. ouato-lanceolatis, pedunc. vnifloris.

glomerata. 21. C. caule herbaceo dichotomo ſcabro, fol. lanceolatis, floribus vltimis faſciculatis. *Mant.* 60.

ſtrigoſa. 7. C. caule herbaceo erecto dichotomo, fol. obouatis ſtrigoſis, pedunc. vnifloris.

muſcoſa. 8. C. caule herbaceo proſtrato, fol. oppoſitis ouatis gibbis imbricatis, flor. ſeſſilibus ſolitariis.

pruinoſa. 20. C. caule fruticoſo dichotomo, fol. ſubulatis pruinoſo-ſcabris, flor. corymboſis. *Mant.* 60.

ciliata. 10. C. fol. oppoſitis oualibus planiuſculis diſtinctis ciliatis, corymb. terminalibus.

punctata. 14. C. fol. oppoſitis ouatis punctatis ciliatis: inferioribus oblongis.

ſcabra. 11. C. fol. oppoſitis patentibus connatis ſcabris ciliatis, caul. retrorſum ſcabro.

alternifolia. 12. C. fol. ſerrato-dentatis planis alternis, caule ſimpliciſſimo, flor. pendulis.

rubens. 18. C. fol. fuſiformibus ſubdepreſſis, cyma quadrifida folioſa, flor. ſeſſilibus, ſtaminibus reflexis. *Sedum rubens. Spec. plant.* 619. *vtraque genera connectens. Deſcriptio et Synonyma β in Speciebus data, ad hanc ſpeciem pertinent.*

nudicaul. 13. C. fol. ſublatis radicalibus, caule nudo.

orbicularis. 15. C. caule flaccido prolifero determinato-folioſo, fol. patentiſſimis imbricatis.

pellucid. 16. C. caule flaccido repente, fol. oppoſitis.

2255. MAHERNIA. *Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Nectaria* 5, obcordata, filamentis ſuppoſita. *Capſ.* 5-locularis.

verticill. 1. M. fol. verticillatis linearibus. *Mant.* 59.
pinnata. 2. M. fol, tripartito-pinnatifidis. Hermannia pinnata, *Sp. pl* 943.

389. SIBBALDIA. *Cal.* 10-fidus. *Petala* 5, calyci
406. inſerta *Styli* e latere germinis. *Sem.* 5.

procumb. 1. S. foliolis tridentatis.
erecta. 2. S. foliolis linearibus multifidis.

POLYGYNIA.

390. MYOSVRVS. *Cal.* 5-phyllus, baſi adnatus.
407. *Nectaria* 5, ſubulata, petaliform. *Sem.* numeroſa.

minimus. 1. MYOSVRVS.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Fl. Calyculati calyce corollaque inſtructi.*

395. BROMELIA. *Cor.* 3-partita. *Cal.* 3-partitus, ſuperus. *Bacca.*

396. TILLANDSIA. *Cor.* 3-petala. *Cal.* 3-partitus, inferus.

397. BVRMANNIA. *Cor.* 3-petala. *Cal.* 1-phyllus, inferus, triquetro-alatus, coloratus.

398. TRADESCANTIA. *Cor.* 3-petala. *Cal.* 3-phyllus, inferus. *Filamenta* barbata.

440. BVRSERA. *Cor.* 3-petala. *Cal.* 3-phyllus, inferus. *Capſ.* baccata, monoſperma.

445. FRANKENIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 1-phyllus, inferus. *Capſ.* 1-locularis, polyſperma.

443. LORANTHVS. *Cor.* 6-partita. *Cal.* margo ſuperus. *Bacca* 1-ſperma.

444. HILLIA. *Cor.* 6-fida. *Cal.* 6-phyllus, ſuperus. *Fructus* 2-locularis, polyſpermus.

439. RICHARDIA. *Cor.* 6-fida *Cal.* 6-fidus, ſuperus. *Sem.* 3, nuda.

442. BERBERIS. *Cor.* 6-petala. *Cal.* 6-phyllus, inferus. *Bacca* 2-ſperma.

423. LEONTICE. *Cor.* 6-petala. *Cal.* 6-phyllus, inferus. *Bacca* inflata.

441. PRINOS. *Cor.* 6-fida. *Cal.* 6-fidus, inferus. *Bacca* 6-ſperma.

438. ACHRAS. *Cor.* 12-fida. *Cal.* 6-phyllus, inferus. *Bacca* 12-ſperma.

* *Portlandia hexandra.*

* *Fl. Spathacei. ſ. Glumacei.*

400. HAEMANTHVS. *Cor.* ſupera, 6-partita. *Inuoluerum* 6-phyllum, maximum.

402. LEVCOJVM. *Cor.* ſupera, 6-petala, campanulata. *Stam.* aequalia.

401. GALANTHVS. *Cor.* ſupera. 6-petala: Petalis 3 interioribus breuioribus, emarginatis.

403. NAR-

403. NARCISSVS. *Cor.* ſupera, 6-petala. *Nectarium* campanulatum, extra ſtamina.

404. PANCRATIVM. *Cor.* ſupera, 6-petala. *Nectarium* campanulatum, ſtaminibus terminatum.

406. AMARYLLIS. *Cor.* ſupera, 6-petala, campanulata. *Stam.* inaequalia.

405. CRINVM. *Cor.* ſupera, 6-fida, baſi tubuloſa. *Stam.* diſtantia.

399. PONTEDERIA. *Cor.* ſupera, 6-fida, ringens.

407. BVLBOCODIVM. *Cor.* infera, 6-petala: vnguibus longiſſimis ſtaminiferis.

409. ALLIVM. *Cor.* infera, 6-petala. *Pet.* ouata, ſeſſilia.

408. APHYLLANTHES. *Cor.* infera, 6-petala. *Spathae* dimidiatae, glumoſae.

431. HYPOXIS. *Cor.* ſupera, 6-petala. *Spathae* glumaceae.

* *Fl. nudi.*

432. ALSTROEMERIA. *Cor.* ſupera, 6-petala, vnguibus 2 tubuloſis.

433. HEMEROCALLIS. *Cor.* infera, 6-partita. *Stam.* declinata.

431. AGAVE. *Cor.* ſupera, 6-fida, limbo erecto, Filamentis breuior.

430. ALOE. *Cor.* infera, 6-fida. *Filam.* receptaculo inſerta!

428. ALETRIS. *Cor.* infera, 6-fida, rugoſa.

426. POLIANTHES. *Cor.* infera, 6-fida: Tubo curuato.

425. CONVALLARIA. *Cor.* infera, 6-fida. *Bacca* 3-ſperma.

427. HYACINTHVS. *Cor.* infera, 6-fida. *Germinis* ad apicem pori 3-melliferi.

421. ASPHODELVS. *Cor.* infera, 6-partita: nectarii valuulis 6-ſtaminiferis.

422. ANTHERICVM. *Cor.* infera, 6-petala, plana.

418. ORNITHOGALVM. *Cor.* infera, 6-petala. *Filam.* alternis baſi dilatatis.

419. SCILLA. *Cor.* infera, 6-petala, decidua. *Filam.* ſiliformia.

420. CYANELLA. *Cor.* infera, 6-petala: petalis exterioribus propendentibus.

1256. DRACAENA. *Cor.* infera, 6-petala. *Bacca* 3-ſperma.

424. ASPARAGVS. *Cor.* infera, 6-petala. *Bacca* 6-ſperma.

413. GLORIOSA. *Cor.* infera, 6-petala, reflexa, caudata.

414. ERYTHRONIVM. *Cor.* infera, 6-petala, reflexa petalis baſi 2-callis.

412. VVULARIA. *Cor.* infera, 6-petala, basi fouea nectarifera, erecta.
411. FRITILLARIA. *Cor.* infera, 6-petala, basi fouea nectarifera, ouata.
410. LILIVM. *Cor.* infera, 6-petala: petalis basi canaliculato-tubulosis.
415. TVLIPA. *Cor.* infera, 6-petala campanulata. *Stylus* o.
429. YVCCA. *Cor.* infera, 6-petala, patens. *Stylus.* o.
416. ALBVCA. *Cor.* infera, 6-petala. *Stamin.* sterilia 3. *Stigm.* cinctum cuspidibus 3.

* *Fl. incompleti.*

435. ORONTIVM. *Spadix* multiflorus. *Follic.* 1-spermus.
434. ACORVS. *Spadix* multiflorus. *Capsul.* 3-locularis.
436. CALAMVS. *Cal.* 6-phyllus. *Peric.* retrorsum imbricatum, 1-spermum.
437. IVNCVS. *Cal.* 6-phyllus. *Capsul.* 1-locularis.
446. PEPLIS. *Cal.* 12-fidus. *Capsul.* 2-locularis.

DIGYNIA.

449. ATRAPHAXIS. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 2-petala. *Sem.* 1, compressum.
448. ORYZA. *Glum.* 1-flora. *Cor.* 2-glumis. *Sem.* 1, oblongum.

TRIGYNIA.

* *Fl. inferi.*

457. COLCHICVM. *Cal.* spatha. *Cor.* 6-petaloidea.
454. MELANTHIVM. *Cal.* o. *Cor.* 6-petala: petalis staminiferis.
455. MEDEOLA. *Cal.* o. *Cor.* 6-petala. *Bacca* 3-cocca.
458. HELONIAS. *Cal.* o. *Cor.* 6-petala. *Capsul.* 3-locularis.
456. TRILLIVM. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 3-locularis.
453. TRIGLOCHIN. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Capsul.* basi dehiscens.
451. RVMEX. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Sem.* 1, triquetrum,

452. SCHEVCHZERIA. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* o. *Capſ.* 3, 1-ſpermae.

* *Fl. ſuperi.*

450. FLAGELLARIA. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* o. *Pericarp.* 1-ſpermum.

TETRAGYNIA.

459. PETIVERIA. *Cal.* 4-phyllus, *Cor.* o. *Sem.* 1, ariſtis vncinatis.

POLYGYNIA.

460. ALISMA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Pericarp.* plura.

MONOGYNIA.

291. BROMELIA. *Cal.* 3-fidus, ſuperus. *Petala* 3: *Squama* nectarifera ad baſin petali. *Bacca* 3-locularis.
408.

Ananas. 1. B. fol. ciliato-ſpinoſis mucronatis, ſpica comoſa.
Pinguin. 2. B. fol. ciliato-ſpinoſis mucronatis, racemo terminali. *Iacq. amer. 91. Trew. ehr. t. 51.*
Karatas. 3. B. fol. erectis, floribus acaulibus ſeſſilibus aggregatis. *Iacq. amer. 90.*
lingulata. 4. B. fol. ſerrato-ſpinoſis obtuſis, ſpicis alternis.
nudicaulis. 5. B. fol. radicalibus dentato-ſpinoſis; caulinis integerrimis.
humilis. 6. B. ſubacaulis, floribus aggregatis ſeſſilibus, axillis ſtoloniferis. *Iacq. vind. 306.* *
Acanga. 7. B. panicula diffuſa, fol. ciliato-ſpinoſis mucronatis curuatis. *Sp. plant. 1. p. 285.* Bromelia foliis ſpinoſis oblique recuruis, fructibus diſperſis racemoſis. *Hort. vpſ. 73.* Caraguata. *Piſ. braſ. 90. t. 91.* Mexocotl. ſ. Manguel. *Hern. mex. 272. Moriſ. hiſt. 2. ſ. 4. t. 22. f. 7. diſtinguenda itaque a Br. karatas.*

392. TILLANDSIA. *Cal.* 3-fidus, perſiſtens. *Cor.* 3-fida, campanulata. *Capſ.* 1-locularis. *Sem.* pappoſa.
409.

vtriculat. 1. T. culmo paniculato.
ſerrata. 2. T. fol. ſuperne ſerrato-ſpinoſis, ſpica comoſa.
lingulata. 3. T. fol. lanceolato-lingulatis integerrimis baſi ventricoſis. *Iacq. amer. 91. t. 62.*
tenuifol. 4. T, fol. filiformibus integerrimis, ſpica ſimplici laxa.
paniculat. 5. T. fol. radicalibus breuiſſimis, caule ſubnudo, ram. ſubdiuiſis aſcendentibus.
polyſtach. 6. T. culmo ſpicis imbricatis lateralibus.
monoſtachya. 7. T. fol. linearibus canaliculatis reclinatis, culmo ſimplici imbricato, ſpica ſimplici.

recur-

recuruata. 8. T. fol. ſubulatis ſcabris reclinatis, culmis vnifloris, gluma biflora.
vſneoides. 9. T. filiformis ramoſa intorta ſcabra.

393. BVRMANNIA. *Cal.* priſmaticus, coloratus, 3-fidus: angulis membranaceis *Petala* 3. *Capſ.* 3-locularis, recta. *Sem.* minuta.
411.

diſticha. 1. B. ſpica gemina.
biflora. 2. B. flore gemino.

394. TRADESCANTIA. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3. *Filamenta* villoſa. *Capſ.* 3-locularis.
411.

virginica. 1. T. erecta laeuis, floribus congeſtis. *Stigma eſſe tubuloſum, Filamenta piloſa pilis articulatis, in genere obſeruetur.*
malalarica. 2. T. erecta laeuis, pedunc. ſolitariis longiſſimis.
geniculat. 3. T. procumbens hirſuta. Tradeſcentia caule geniculato, baſi repente. *Iacq. amer. 94. t. 64.*
criſtata. 4. T. repens laeuis, ſpathis diphillis imbricatis. Commelina criſtata. *Sp. pl. 64.*
Radix *annua.* Caules *teretes, laeues, ramoſi, diffuſi, repentes.* Folia *lanceolata, recuruata, laeuia, baſi vaginantia, vaginis ſtriatis.* Spathae *imbricatae, diphyllae, biflorae floribus ſeſſilibus, luniatae, ſex parium, ſecundae.* Cal. *corolla breuior.* Petala 3, *ouata, ſeſſilia, caerulea.* Filamenta *piloſa extus: pilis caeruleis articulatis.* Stylus *clauatus.* Stigma *tubuloſum, crenatum.*
papiliona-cea. 5. T. repens laeuis, ſpathis triphyllis imbricatis. *Mant. 61.*

395. PONTEDERIA. *Cor.* 1-petala, 6-fida, bilabiata. *Stamina* 3 apici, 3 tubo corollae inferta. *Capſ.* 3-locularis.
412.

ouata. 1. P. fol. ouatis, flor. capitatis.

cordata. 2. P. fol. cordatis, flor. ſpicatis. *Loeſl. it.* 54. *
haſtata. 3. P. fol. haſtatis, flor. vmbellatis. Olus paluſtre. *Rumph. amb. 6. p. 178. t. 75. f. 1. huic Germen ſuperum, ouatum. Corolla 6-partita aequalis.*

396. HAEMANTHVS. *Involucr.* 6-phyllum, multiflorum *Cor.* 6-partita, ſupera. *Bacca* 3-locularis.
412.

coccineus. 1. H. fol. linguiformibus planis laeuibus.
ciliaris. 2. H. fol. linguiformibus ciliatis.
puniceus. 3. H. fol. lanceolato-ouatis vndulatis erectis.
carinatus. 4. H. fol. linearibus carinatis.

397. GALANTHVS. *Petala* 3, concaua. *Nectarium* ex petalis 3, paruis, emarginatis. *Stigma* ſimplex.
413.

niualis. 1. GALANTHVS.

398. LEVCOJVM. *Cor.* campaniformis, 6-partita, apicibus incraſſata. *Stigma* ſimplex.
414.

vernum. 1. L. ſpatha vniflora, ſtylo clauato.
aeſtiuum. A. L. ſpatha multiflora, ſtylo clauato.
autumn. 2. L. ſpatha multiflora, ſtylo filiformi.

399. NARCISSVS. *Petala* 6: *Nectario* infundibuliformi, 1-phyllo. *Stam.* intra nectarium.
414.

poeticus. 1. N. ſpatha vniflora, nectario rotato breuiſſimo ſcarioſo crennulato.
Pſeudo-Narciſſus. 2. N. ſpatha vniflora, nectario campanulato erecto criſpo, aequante petala ouata.
bicolor. 3. N. ſpatha vniflora, nectario campanulato, margine patulo criſpo aequante petala.

minor.

minor. 4. N. ſpatha vniflora, nectario obconico erecto criſpo ſexfido, aequante petala lanceolata.

moſchatus. 5. N. ſpatha vniflora, nectario cylindrico truncato ſubrepando, aequante petala oblonga.

triandrus. 9. N. ſpatha ſubuniflora, nectario campanulato crenato dimidio petalis breuiore, ſtamin. ternis.

orientalis. N. ſpatha ſubbiflora, nectario campanulato trifido emarginato petalis triplo breuiore. *Mant. 62.*

odorus. 8. N. ſpatha ſubbiflora, nectario campanulato ſexfido laeui dimidio petalis breuiore.

calathinus. 6. N. ſpatha multiflora, nectario campanulato ſubaequante petala, fol. planis.

Tazetta. 7. N. ſpatha multiflora, nectario campanulato truncato breuiore petalis, fol. planis.

Bulbocodium, 13. N. ſpatha vniflora, nectar. turbinato petalis maiore, genitalibus declinatis.

ſerotinus. 12. N. ſpatha vniflora, nectar. ſexpartito breuiſſimo.

Ionquilla. 11. N. ſpatha multiflora, nectar. campanulato breui, fol. ſubulatis.

trilobus. 10. N. ſpatha ſubmultiflora, nectario campanulato ſubtrifido integerrimo petalis dimidio breuiore.

400. PANCRATIVM. *Petala* 6: *Nectario* 12-fido. 417. *Stam.* nectario impoſita.

Zeylanic. 1. P. ſpatha vniflora, petal. reflexis.

mexican. 2. P. ſpatha biflora.

caribaeum. 3. P. ſpatha multiflora, fol. lanceolatis.

maritim. 4. P. ſpatha multiflora, petalis planis, fol. lingulatis. Petala *lanceolata, ſubtus linea viridi: exteriora* 3 *apice introrſum vncinata.* Nectarium *angulis bipartitis, acuminatis, longitudine filamentorum, et diuaricatis ad latitudinem petalorum.* Germina *media vmbellae ſeſſilia.* Stylus *declinatus.* Filamenta *inflexa.*

carolinianum. 5. P. ſpatha multiflora, fol. linearibus, ſtamin. nectarii longitudine.

illyricum. 6. P. ſpatha multiflora, fol. enſiformibus, ſtamin. nectario longioribus.

amboi-

amboinen-se. 7. P. ſpatha multiflora, fol. ouatis neruoſis petiolatis. *Stamina in α petalis breuiora, in β longiora; hinc diſtincta Millero.*

401. CRINVM. *Cor.* infundibulif. monopetala, 6-partita: laciniis 3 alternis vncinatis. *Germen* fundo corollae tectum. *Stamina* diſtantia.

419.

latifolium. 1. C. fol. ouato-lanceolatis acuminatis ſeſſilibus planis.
aſiaticum. 2. C. fol. carinatis.
zeylanicum. 4. C. foliis ſcabro-dentatis, ſcapo compreſſiuſculo.

Amaryllis zeyllanica. *Sp. pl. 321.*
Amaryllis ſpatha multiflora, corollis campanulatis aequalibus, ſcapo tereti ancipiti. *Mill. dict.*
Lilio Narciſſus africanus, ſcillae foliis, flore niueo linea purpurea ſtriato. *Ehret. pict. 5. f. 2. Trew. ehret. t. 13.*
Lilio Narciſſus zeylanicus latifolius, flore niueo externe linea purpurea ſtriato. *Comm. hort. 1. p. 73. t. 37. Rudh. elyſ. 2. p. 181. f. 9.*
Habitat in India orientali.
Statura *Crini americani.* Folia *Scillae officinalis, carnoſa, margine denticulato-ſcabra.* Spatha *binaluis, praeter ramenta aliquot interiora.* Germina *ſeſſilia.* Corollae *tubus ſcapo concolor, rufeſcens.* Limbus *albus petalis lanceolatis, recuruis, ſubtus rubro-carinatis.* Filamenta *et* ſtylus *ſanguinea.*

american. 3. C. corollarum apicibus introrſum vncinatis.
african. 4. C. fol. ſublanceolatis planis, corollis obtuſis.

402. AMARYLLIS. *Cor.* 6-petala, campanulata. *Stigma* 3-fidum.

420.

capenſis. 1. A. ſpatha vniflora remotiſſima, corolla aequali, ſtaminibus piſtilloque rectis.
lutea. 2. A. ſpatha vniflora, coroll. aequali, ſtamin. ſtrictis.
Atamaſc. 3. A. ſpatha vniflora, coroll. aquali, piſtillo declinato.
formoſiſſima. 3. A. ſpatha vniflora, coroll. inaequali, petalis tribus genitalibusque declinatis. *Raro biflora euadit.*

Bella-

Belladonna. 6. A. ſpatha multiflora, coroll. campanulatis aequalibus vngue reflexis, genitalibus declinatis.

reginae. 5. A. ſpatha multiflora, coroll. campanulatis aequalibus vndulatis: genitalibus declinatis.

vndulata. A. ſpatha multiflora, corollis patulis, petalis vndulatis mucronatis baſi dilatatis. *Habitat* - - 24. *Dau. Royen.* Scapus *cum* vmbella *magnitudine vmbellae cum pedunculo Geranii zonalis.* Spatha *profert circiter* 12. *flores purpureos petalis anguſto-lanceolatis, apice valde mucronatis; baſi ipſa ouata.* Stamina *declinata.*

ſarnienſis. 7. A. ſpatha multiflora, coroll. reuolutis, genitalibus erectis.

longifol. 9. A. ſpatha multiflora, coroll. campanulatis aequalibus, genitalibus declinatis, ſcapo compreſſo longitudine vmbellae.

orientalis. 10. A. ſpatha multiflora, coroll. inaequalibus, foliis linguiformibus.

guttata. 11. A. ſpatha multiflora, fol. ciliatis.

403. BVLBOCODIVM. *Cor.* infundibulif. hexapetala: vnguibus anguſtis ſtaminiferis. *Capſ.* ſupera. 422.

vernum. 1. B. foliis lanceolatis.

404. APHYLLANTHES. *Cor.* hexapetala *Filamenta* fauci corollae inſerta. *Capſ.* ſupera. *Glumae* calycinae vnialues imbricatae. 422.

monſpel. 1. APHYLLANTHES.

405. ALLIVM, *Cor.* 6-partita, patens. *Spatha* multiflora. *Vmbella* congeſta. *Capſ.* ſupera. 423.

* *Fol. caulina plana. Vmbell. capſulifera.*

Ampelopraſum. 1. A. caule planifolio vmbellifero, vmbella globoſa, ſtamin. tricuſpidatis, petal. carina ſcabris.

Por-

Porrum. 2. A. caule planifolio vmbellifero, ſtamin. tricuſpidatis, radice tunicata.

lineare. 3. A. caule planifolio vmbellifero, vmbell. globoſa, ſtam. tricuſpidatis corolla duplo longioribus.

rotundum. 4. A. caule planifolio vmbellifero, ſtamin. tricuſpidatis, vmbella ſubgloboſa, flor. lateralibus nutantibus.

Victoriales. 5. A. caule planifolio vmbellifero, vmbell. rotundata, ſtamin. lanceolatis corolla longioribus, fol. ellipticis.

ſubhirſutum. 6. A. caule planifolio vmbellifero, fol. inferioribus hirſutis, ſtamin. ſubulatis. *Osbeck. it. 49.*

magicum. 7. A. caule planifolio vmbellifero, ramulo bulbifero, ſtamin. ſimplicibus.

obliquum. 8. A. caule planifolio vmbelifero, ſtamin. filiformibus flore triplo longioribus, fol. obliquis.

ramoſum. 9. A. caule planifolio vmbellifero, ſtamin. ſubulatis longioribus, vmbella globoſa, fol. linearibus ſubconuexis.

roſeum. 33. A. caule planifolio vmbellifero, vmbella faſtigiata, petal. emarginatis, ſtamin. breuiſſimis ſimplicibus. Allium caule planifolio vmbellifero, vmbella faſtigiata, filamentis ſimplicibus baſi dilatatis. *Ger. prou. 150.* * *Gouan. monſp. 166.*

* * *Fol. caulin. plana. Vmbella bulbifera.*

ſatiuum. 10. A. caule planifolio bulbifero, bulbo compoſito, ſtamin. tricuſpidatis.

ſcorodoprafum. 11. A. caule planifolio bulbifero, fol. crenulatis: vaginis ancipitibus, ſtamin. tricuſpidatis.

arenarium. 12. A. caule planifolio bulbifero, vaginis teretibus, ſpatha mutica, ſtamin. tricuſpidatis.

carinat. 13. A. caule planifolio bulbifero, ſtamin. ſubulatis.

* * * *Folia caulina teretia. Vmbella capſulifera.*

ſphaerocephalon. 14. A. caule teretifolio vmbellifero, fol. ſemiteretibus, ſtamin. tricuſpidatis corolla longioribus.

paruiflorum. 15. A. caule ſubteretifolio vmbellifero, vmbell. globoſa, ſtamin. ſimplicibus corolla longioribus, ſpatha ſubulata.

deſcendens. 16. A. caule ſubteretifolio vmbellifero, pedunc. exterioribus breuioribus, ſtamin. tricuſpidatis.

moſcha-

moſchatum. 17. A. caule teretifolio vmbellifero, vmbella faſtigiata ſubſexflora, petal. acutis, ſtamin. ſimplicibus, fol. ſetaceis.

flauum. 19. A. caule teretifolio vmbellifero, flor. pendulis, petal. ouatis, ſtamin. corolla longioribus. *Varietas 18. Gouan. Gerard.*

pallens. 18. A. caule ſubteretifolio vmbellifero, flor. pendulis truncatis, ſtamin. ſimplicibus corollam aequantibus. Allium montanum bicorne, flore obſoletiore. *Bauh. pin 75.*

paniculatum. 20. A. caule ſubteretifolio vmbellifero, pedunc. capillaribus effuſis, ſtamin. ſubulatis, ſpatha longiſſima. *Cum praecedente coniungit Gerard.*

vineale. 21. A. caule teretifolio bulbifero, ſtamin. tricuſpidatis.

oleraceum. 22. A. caule teretifolio bulbifero, fol. ſcabris ſemiteretibus ſubtus ſulcatis, ſtamin. ſimplicibus.

* * * * *Folia radicalia. Scapus nudus.*

nutans. 23. A. ſcapo nudo ancipiti, fol. linearibus planis, ſtamin. tricuſpidatis.

aſcalonicum. 24. A. ſcapo nudo tereti, fol. ſubulatis, vmbella globoſa, ſtamin. tricuſpidatis.

ſeneſcens. 25. A. ſcapo nudo ancipiti, fol. linearibus ſubtus conuexis laeuibus, vmbella ſubrotunda, ſtamin. ſubulatis.

anguloſum. 27. A. ſcapo nudo ancipiti, fol. linearibus canaliculatis ſubtus ſubangulatis, vmbella faſtigiata.

odorum. 38. A. ſcapo nudo teretiuſculo, fol. linearibus canaliculatis ſubtus angulatis, vmbella faſtigiata. *Mant. 62.*

nigrum. 26. A. ſcapo nudo tereti, fol. linearibus vmbella erecta, petalis erectis, ſpatha mucronata bifida. *Folia radicalia, plana, quaterna, lanceolato-linearia. Gouan.*

canadenſ. 28. A. ſcapo nudo tereti, fol. linearibus, capitulo bulbifero. Allium bulbiferum virginianum. *Boerh. lugdb. 2. p. 146.*

vrſinum. 29. A. ſcapo nudo ſemicylindrico, fol. lanceolatis petiolatis, vmbella faſtigiata.

triquetrum. 30. A. ſcapo nudo, foliisque triquetris, ſtamin. ſimplicibus. *Sp. plant. 1680.*

Cepa. 31. A. ſcapo nudo inferne ventricoſo longiore foliis teretibus.

Moly. 32. A. ſcapo nudo ſubcylindrico, fol. lanceolatis ſeſſilibus, vmbella faſtigiata.

fiſtuloſum. 34. A. ſcapo nudo adaequante folia teretia ventricoſa.

Schoenoprafum. 35. A. ſcapo nudo adaequante folia teretia ſubulato-filiformia.

tenuiſſimum. 36. A. ſcapo nudo tereti inani, fol. ſubulatis filiformibus, capitul. laxis paucifloris.

Chamaemoly. 37. A. ſcapo nudo ſubnullo, capſ. cernuis, fol. planis ciliatis.

406. LILIVM, *Cor.* 6-petala, campanulata: *linea* 433. longitudinali nectarifera. *Capſ.* valuulis pilo cancellato connexis.

candidum. 1. L. fol. ſparſis, coroll. campanulatis: intus glabris.

bulbifer. 2. L. fol. ſparſis, coroll. campanulatis erectis: intus ſcabris.

pomponium. 3. L. fol. ſparſis ſubulatis, flor. reflexis, coroll. reuolutis.

chalcedonicum. 4. L. fol. ſparſis lanceolatis, flor. reflexis, coroll. reuolutis.

ſuperbum. 5. L. fol. ſparſis lanceolatis, flor. reflexis ramoſo-pyramidatis, coroll. reuolutis.

Martag. 6. L. fol. verticillatis, flor. reflexis, coroll. reuolutis.

canadenſ. 7. L. fol. verticillatis, flor. reflexis, coroll. campanulatis.

camſcatcenſe. 9. L. fol. verticillatis, flor. erecto, coroll. campanulata, petalis ſeſſilibus.

philadelphicum. 8. L. fol. verticillatis, flor. erectis, coroll. campanulata, petalis vnguiculatis. *Catesb. carol. 2. p. 58. t. 58.*

407. FRITILLARIA. *Cor.* 6-petal. campanulata, 435. ſupra vngues cauitate nectarifera. *Stam.* longitudine corollae.

imperial. 1. F. racemo comoſo inferne nudo, fol. integerrimis.

regia. 2. F. racemo comoſo inferne nudo, fol. crenatis.

perſi-

perſica. 3. F. racemo nudiuſculo, fol. obliquis.
pyrenaic. 4. F. fol. infimis oppoſitis, floribus nonnullis folio interiectis.
Meleagr. 5. F. fol. omnibus alternis, caule vnifloro.

408. UVULARIA, *Cor.* 6-petala, erecta: *Nectarii* 436. fouea baſeos petali, *Filamenta* breuiſſima.

amplexif. 1. V. fol. amplexicaulibus.
perfoliat. 2. V. fol. perfoliatis.
ſeſſilifol. 3. V. fol. ſeſſilibus.

409. GLORIOSA. *Cor.* 6-petala, vndulata, reflexa. 437. *Stylus* obliquus.

ſuperba. 1. G. fol. cirriferis.
ſimplex. 2. G. fol. acuminatis. *Mant. 62. f.*

410. ERYTHRONIVM. *Cor.* 6-petala. campanu- 437. lata: *Nectario* tuberculis 2 petalorum alternorum baſi adnatis.

Dens can. 1. ERYTRONIVM.

411. TVLIPA. *Cor.* 6-petala, campanulata. *Sty-* 438. *lus* nullus.

ſylueſtris. 1. T. flore ſubnutante. fol. lanceolatis.
geſnerian. 2. T. flore erecto, fol. ouato-lanceolatis.
breynian. 3. T. caule multifloro polyphyllo, fol. linearibus.

412. ALBVCA. *Cor.* 6-petala: interioribus diffor- 438. mibus. *Stam.* 6: tribus caſtratis. *Stigma* cinctum cuſpidibus tribus.

maior. 1. A. fol. lanceolatis.
minor. 2. A. fol. ſubulatis.

413. HYPOXIS, *Cor.* 6-partita, perſiſtens, ſuperà. 439. *Capſ.* baſi anguſtior. *Cal.* gluma 2-valuis.

erecta. 1. H. piloſa, capſ. ovatis. *Folia Caricis ſ. Junci piloſi. Scapus foliis breuior, erectus, piloſus. Bracteae 2 ſubulatae erectae, inter quas flos. 1. ſ. 2, ſeſſilis, longitudine bracteārum.*

decumbens. 2. H. piloſa, capſ. clauatis.

faſcicular. 3. H. tubis florum longiſſimis.

ſeſſilis. 4. H. piloſa acaulis, fructificationibus ſubradicalibus.

414. ORNITHOGALVM. *Cor.* 6-petala, erecta, 439. perſiſtens, ſupra medium patens. *Filamenta* alterna baſi dilatata.

* *Staminibus omnibus ſubulatis,*

vniflorum. O. ſcapo diphyllo, pedunculo vnifloro, *Mant. 62.*

luteum. 1. O. ſcapo anguloſo diphyllo, pedunc. vmbellatis ſimplicibus.

minim. 2. O. ſcapo angulato diphyllo, pedunc vmbellatis ramoſis.

pyrenaicum. 3. O. racemo longiſſimo, filamentis lanceolatis, pedunc. floriferis patentibus aequalibus; fructiferis ſcapo approximatis.

narbonenſe. 4. O. racemo oblongo, filam. lanceolatis membranaceis, pedunc. floribusque patentibus. *Minus quam O. pyrenaicum.*

latifol. 6. O. racemo longiſſimo, fol. lanceolato-enſiformibus.

comoſum. 5. O. racemo breuiſſimo, bracteis lanceolatis longitudine florum, petalis obtuſis, filam. ſubulatis.

pyramyd. 7. O. racemo conico, floribus numeroſis adſcendentibus.

* * *Staminibus alternis emarginatis.*

arabicum. 8. O. flor. corymboſis, pedunc. ſcapo humilioribus, filam. ſubemarginatis. *Bractaae amplexicaules, cordatae.*

vmbel

vmbellatum. 9. O. flor. corymbosis, pedunc. scapo altioribus, filam. emarginatis.
nutans. 10. O. flor. secundis pendulis, nectario staminео campaniformi.
capense. 11. O. fol. cordato-ouatis.

415. SCILLA. *Cor.* 6-petala. patens, decidua, *Filamenta* filiformia.
442.

maritim. 1. S. nudiflora, bracteis refractis.
Lil. hyac. 2. S. radice squamata.
italica. 3. S. corymbo conferto hemisphaerico.
peruuian. 4. S. corymbo conferto conico.
amaena. 5. S. flor. lateralibus alternis subnutantibus, scapo angulato. *Germen flauum.*
bifolia. 6. S. flor. erectiusculis paucioribus.
lusitanica. 9. S. racemo oblongo conico, petalis lineatis. Hyacinthus stellaris caeruleus, staminibus e viridi luteis: *Baub. pin. 46. Rudb. elys. 2. p. 34. f. 4. Habitat in* Lusitania. *Similis Sc. amoenae.* Scapus *teres* Racemus *oblongus, subconicus*, Foribus *distantibus, petiolo fere breuioribus.* Petala *elliptica, obtusiuscula, sulcato-lineata, patentia.* Stamina *petalis paulo breuiora*: *Antheris flauis.*
hyacinthoides. 10. S. racemo longissimo, floribus pedunculo colorato breuioribus. *Gouan.* Ornithogalum eriophorum orientale. *Tournef. cor.* Flores *caerulei, numerosi, parui.* Pedicelli *sparsi, siliformes, caerulei, floribus triplo longiores.*
autumnalis 7. S. fol. filiformibus linearibus, flor. corymbosis, pedunc. nudis adscendentibus longitudine floris. *Corolla magnitudine pisi, longitudine pedicelli.*
vnifolia. 8. S. folio teretiusculo latere subspicato.

416. CYANELLA. *Cor.* hexapetala: petalis 3 in-
443. ferioribus propendentibus. *Stamen* infimum declinatum, longius.

capensis. 1. CYANELLA.

417. ASPHODELVS. *Cor.* 6-partita. *Nectarium* ex valuulis 6 germen tegentibus.
443.

luteus. 1. A. caule folioso, fol. triquetris striatis.
fistulosus. 2. A. caule nudo, fol. strictis subulatis striatis subfistulosis.
ramosus. 3. A, caule nudo, fol. ensiformibus carinatis laeuibus.

418. ANTHERICVM. *Cor.* 6-petala, patens *Capsula* ouata.
444.

* Phalangium *foliis canaliculatis. Filamentis glabris.*

serotinum. 1. A. fol. planiusculis, scapo vnifloro.
graecum. 2. A. fol. planis, scapo simplici, flor. corymbosis.
reuolut. 3. A. fol planis, scapo ramoso, coroll. reuolutis. Phalangium aethiopicum ramosum, floribus albis, petalis reflexis. *Comm. hort. 1. p. 67. t. 34.*
ramosum. 4. A. fol. planis, scapo ramoso, coroll. planis, pistillo recto.
Liliago. 5. A. fol. planis, scapo simpliciſſimo: coroll. planis, pistilo declinato.
Liliastrum. 6. A. fol. planis, scapo simpliciſſimo, coroll. campanulatis, stamin. declinatis.

** Bulbine *foliis carnosis. Filamentis barbatis.*

fruteſc. 7. A. fol. carnosis teretibus, caule fruticoso.
aloo des. 8. A. fol. carnosis subulatis planiusculis.
Asphodel. 9. A. fol. carnosis subulatis semiteribus strictis.
annum. 10. A. fol. carnosis subulatis teretiusculis, scapo subracemoso.
hispidum. 11. A. fol. carnosis compressis hispidis.

*** Narthecium *foliis ensiformibus.*

ossifragum. 8. A. fol. ensiformibus, filament. lanatis.
calyculatum. 9. A. fol. ensiformibus, perianthiis trilobis, filament. glabris, flor. trigynis. Anthericum Pseudo Asphodelus. *Jacq. vind. 283.* *

419. LEONTICE. *Cor.* 6-petala. *Nectarium* 6-phyllum, vnguibus corollae insidens, limbo patens. *Cal.* 6-phyllus, deciduus.
447.

Chrysog. 1. L. fol. pinnatis: petiolo communi simplici.
Leontop. 2. L. fol. decompositis: petiolo communi trifido.
Thalictr. 3. L. folio caulino triternato, florali biternato.
Leontopetaloid. 4. L. fol. simplicibus tripartito-multifidis, coroll. monopetalis calyculatis. *An huius generis?*

420. ASPARAGVS. *Cor.* 6-partita, erecta: petalis 3-bus interioribus apice reflexis. *Bacca* 3-locularis: 2-sperma.
448.

officinalis. 1. A. caule herbaceo tereti erecto, fol. setaceis, stipulis paribus,
declinat. 2. A. caule inermi tereti, ram. declinatis, fol. setaceis. *Similis A. officinali, sed altior. Foliis pluribus, duploque longioribus. Caulis annuus. Stipulae solitariae, lanceolato-subulatae, basi deorsum mucrone membranaceo. Folia 7. s. 10., filiformia, patentia mea mas est e cap. b. sp.*
falcatus. 3. A. aculeis solitariis reuersis, ramis teretibus, foliis ensiformibus falcatis.
retrofractus. 4. A. aculeis solitariis, ram. teretibus reflexis retrofractisque, fol. setaceis fasciculatis. *Rami teretes, dichotomi dichotomiis verrucosis aculeo minuto nutante.*
aethiopicus. 11. A. aculeis solitariis reuersis, ramis angulatis, fol. lanceolato-linearibus. *Mant. 63.*
asiaticus. 5. A. aculeis solitariis, caule erecto, ram. filiformibus, fol. fasciculatis setaceis.
alius. 6. A. aculeis solitariis, ram. angulatis flexuosis, fol. fasciculatis triquetris muticis deciduis. *Caulis albus. Spinae rectae patentes s. reflexae.*
acutifol. 7. A. caule inermi angulato fruticoso, fol. aciformibus. rigidulis perennantibus mucronatis aequalibus, *Similis A. aphyllo, sed Folia septena saepius, filo vix crassiora; at illi saepius terna triplo crassiora valdeque subulata.*

aphyllus. 8. A. cale inermi angulato fruticoſo, fol. ſubulatis ſtriatis inaequalibus diuergentibus,

capenſis. 9. A. ſpinis quaternis, ramis aggregatis teretibus fol. ſetaceis. *Pluk. alm. t. 78. f. 3. melius.* Corruda africana, ſpinis breuibus aduncis. *Rai. ſuppl. 359. Radix tuberoſa. Caules fruticoſi, filiformes, flexuoſi. Spinae 4, patentes, ſubrecuruae; acutiſſimae. Ramuli ex axillis ſpinarum filiformes, laxi, inermes, decidui, Foliolis ſetaceis, acutis, inermibus, breuibus. Rami, inter ramulos, ſolitarii, rigidi.*

ſarmentoſus. 10. A. foliis ſolitariis lineari-lanceolatis, caule flexuoſo, aculeis recuruis.

verticillatus. 11. A. fol. verticillatis. †.

1256. DRACAENA, *Cor.* 6-partita, erecta. *Filam.* 450. medio ſubcraſſiora. *Bacca* 3-locularis, 1-ſperma.

Draco. 1. D. arborea, fol. ſubcarnoſis apice ſpinoſo. Aſparagus Draco. *Sp. pl. 451.*

ferrea. 2. D. arborea, fol. lanceolatis acutis. Conuallaria fruticoſa. *Syſt. nat. 10. p. 984.* Arbor ferrea. *Oſb. it. 251. habitat in* China.

terminalis. 3. D. herbacea cauleſcens, fol. lanceolatis. Aſparagus terminalis. *Sp. plant. 450.*

enſifolia. 4. D. herbacea ſubcauleſcens, fol. enſiformibus. *Mant. 63.*

graminifolia. 5. D. herbacea acaulis, fol. linearibus. Aſparagus graminifolius. *Sp. plant. 450.*

421. CONVALLARIA. *Cor.* ſexfida. *Bacca* 451. maculoſa, 3-locularis.

* Lilium conuallium T. *corollis campanulatis.*

maialis. 1. C. ſcapo nudo.

** Polygonatum T. *corollis infundibuliformibus.*

verticill. 2. C. foliis verticillatis.

Polygonatum. 3. C. fol. alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunc. axillaribus ſubunifloris.

multi-

multiflor. 4. C. fol alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunc. axillaribus multifloris.

* * * Smilaces T. *corollis rotatis.*

racemoſa. 5. C fol. ſeſſilibus, racemo terminali compoſito.
ſtellata. 6. C. fol. amplexicaulibus plurimis.
trifolia. 7. C. fol. amplexicaulibus ternis, racemo terminali ſimplici.
bifolia. 8. C. foliis cordatis, flor. tetrandris.

422. POLIANTHES. *Cor.* infundibuliform. incurva, aequalis. *Filamenta* corollae fauci inſerta. *Germen* in fundo corollae.
453.

tuberoſa. 1. POLIANTHES.

423. HYACINTHVS. *Cor.* campanulata: pori 3 melliferi *germinis.*
453.

nonſcript. 1. H. coroll. campanulatis ſexpartitis apice reuolutis.
cernuus. 2. H. coroll. campanulatis ſexpartitis, racemo cernuo. *Corolla huic baſi ventricoſior, praecedenti vero minime.*
ſerotinus. 3. H. petalis exterioribus ſubdiſtinctis, interioribus coadunatis.
viridis. 4. H. corollarum exterioribus laciniis ſubulatis longiſſimis. *Burmannus.*
amethyſt. 5. H. coroll. campannulatis ſemiſexfidis: baſi cylindricis.
orientalis. 6. H. coroll. infundibuliformibus ſemiſexfidis: baſi ventricoſis.
Muſcari. 7. H. coroll. ouatis; omnibus aequalibus.
monſtroſ. 8. H. coroll. ſubouatis.
comoſus. 9. H. coroll. angulato-cylindricis: ſummis ſterilibus longius pedicellatis.
botryoides. 10. H. coroll globoſis vniformibus, fol. canaliculato-cylindricis ſtrictis. *Flores inodori.*
racemoſ. 11. H. coroll. ouatis: ſummis ſeſſilibus, fol. laxis. *Flores odori. Folia carinata.*

Orchioid. 12. H. coroll. ſexpartitis : petalis tribus exterioribus breuioribus.

lanatus. 13. H. coroll. lanatis, caule ramoſo. †

424. ALETRIS. 456.

Cor. infundibuliformis, rugoſa. *Stamina* inſerta laciniarum baſi. *Capſ.* 3-locularis.

capenſis. 2. A. acaulis, fol. lanceolatis vndulatis, ſpica ouata, flor. nutantibus.

Hyacinthoides. 3. A. aculis, fol. lanceolatis carnoſis, flor. geminatis.

fragrans. 4. A. cauleſcens, fol. lanceolatis laxis. *Jacq. vind. 309.*

425. YVCCA. 456.

Cor. campanulato-patens. *Stylus* nullus. *Capſ.* 3-locularis.

Glorioſa. 1. Y. foliis integerrimis.

aloiſolia. 2. Y. foliis crenulatis ſtrictis.

draconis. 3. Y. foliis crenatis nutantibus.

filament. 4. Y. foliis ſerrato-filiferis.

426. ALOE. 757.

Cor. erecta, ore patulo, fundo nectarifero. *Filamenta* receptaculo inſerta.

perfoliat. 1. A. flor. pedunculatis cernuis corymboſis ſubcylindricis.

A. fol. caulinis dentatis amplexicaulibus vaginantibus.

variegat. 2. A. flor. pedunculatis cernuis racemoſis ſubcylindricis, ore patulo aequali.

A. fol. caulinis trifariis imbricatis erectis: angulis ternis cartilagineis.

diſticha. 3. A. flor. pedunculatis pendulis ouato-cylindricis curuis.

A. fol. linguiformibus diſtichis patulis.

ſpiralis. 4. A. flor. ſeſſilibus ouatis crenatis: ſegmentis interioribus conniuentibus.

A. fol. caulinis quinquefariis ouatis acuminatis.

retuſa. 5. A. flor. ſeſſilibus triquetris bilabiatis: labio inferiore reuoluto. *Flores ſimillimi. A. pumilae.*

A. fol. caulinis quinquefariis rhomboidalibus ventricoſis, triquetro plano exſtantibus.

viſco-

viſcoſa. 6. A. flor. ſeſſilibus infundibuliformibus bilabiatis: laciniis quinque reuolutis: ſumma erecta.
A. fol. trifariis canaliculatis imbricatis: apice patulo.

pumila. 7. A. flor. ſeſſilibus bilabiatis: labio ſuperiore erectiore; inferiore recuruato.
A. fol. aggregatis radicalibus ouato-ſubulatis acuminatis muricatis.

Vuaria. 9. A. flor. ſeſſilibus reflexis imbricatis priſmaticis.
A. fol. radicalibus linearibus membranaceis longiſſimis.

427. AGAVE. *Cor.* erecta, ſupera. *Filamenta* corol-
461. la longiora, erecta.

americ. 1. A. fol. dentato-ſpinoſis, ſcapo ramoſo.
viuipara. 2. A. fol, dentatis, ſtamin. corollam aequantibus.
virginic. 3. A. fol. dentato-ſpinoſis, ſcapo ſimpliciſſimo. *Amoen. acad. 3. p. 22.*
foetida. 4. A. fol. integerrimis.

428. ALSTROEMERIA. *Cor.* 6-petala, ſubbilabia-
461. ta: petalis 2 inferioribus baſi tubuloſis. *Stam.* declinata.

pelegrina. 1. A. caule erecto.
Ligta. 2. A. caule adſcendente.
Salſilla- 3. A. caule volubili.

429. HEMEROCALIS. *Cor.* campanulata: tubo cy-
462. lindrico. *Stam.* declinata.

flaua. 1. H. corollis flauis.
fulua. 2. H. corollis fuluis.

430. ACORVS. *Spadix* cylindricus, tectus floſculis,
462. *Cor.* 6-petalae, nudae. *Stylus* nullus. *Capſ.* 3-locularis.

Calamus. 1. ACORVS.

431. ORONTIVM. *Spadix* cylindricus, tectus floſculis. *Cor.* 6-petalae, nudae. *Stylus* nullus. *Folliculi* 1-ſpermi.
463.

aquaticum. 1. ORONTIVM.

432. CALAMVS. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* o. *Bacca.* exarida, 1-ſperma, retrorſum imbricata.
463.

Rotang. 1. CALAMVS.

433. IVNCVS. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* o. *Capſ.* 1-locularis.
463.

* *Culmis nudis.*

acutus. 1. I. culmo ſubnudo tereti mucronato, panicula terminali, inuolucro diphyllo ſpinoſo.

conglom. 2. I. culmo nudo ſtricto, capitulo laterali.

effuſus. 3. I. culmo nudo ſtricto: panicula laterali.

inflexus. 4. I. culmo nudo: apice membranaceo incuruo, panicula laterali.

filiformis 5. I. culmo nudo filiformi nutante, panicula laterali.

trifidus. 6. I. culmo nudo, foliis floribusque tribus terminalibus. *Oed. dan. t. 107. Geſn. ſchmied. t. 4. f. 16.* Iuncus monanthos. *Jacq. vind.*

ſquarroſus. 7. I. culmo nudo, fol. ſetaceis, capitulis glomeratis aphyllis.

* * *Culmis folioſis.*

nodoſus. 9. I. fol. nodoſo-articulatis, petalis mucronatis.

articulat. 8. I. fol. nodoſo-articulatis, petalis obtuſis *huius α.* Aquaticus *foliis compreſſis β.* Syluaticus *foliis teretibus Hall.*

bulboſus. 10. I. fol. linearibus canaliculatis, capſ. obtuſis. *Geſn. ſchmied. 12. t. 5. f. 13.* Iuncus *compreſſus* foliis linearibus canaliculato-concauis, capſulis ouatis, culmo compreſſo. *Jacq. vind. 235.*

buſonius. 11. I. culmo dichotomo, fol. angulatis, flor. ſolitariis ſeſſilibus.

ſtygius. 12. I. fol. ſetaceis depreſſiuſculis, pedunc. geminis terminalibus, glumis ſolitariis ſubbifloris.

Jacq.

Jacquini. 19. I. fol. ſubulato, capitulo ſubquadrifloro terminali. *Mant. 63.*
biglumis. 13. I. fol. ſubulato, gluma biflora terminali.
triglumis. 14. I. fol planis, gluma triflora terminali. *Oed. dan. t. 120.*
piloſus. 15. I. fol. planis piloſis, corymbo ramoſo.
niueus. 16. I. fol. planis ſubpiloſis, corymbis folio breuioribus, flor. faſciculatis.
campeſtr. 17. I. fol. planis ſubpiloſis, ſpicis ſeſſilibus pedunculatisque.
ſpicatus. 18. I. fol. planis, ſpica racemoſa nutante.

434. RICHARDIA. *Cal.* 6-paritus. *Cor.* 1-petala, 470. ſubcylindrica. *Sem.* 3.

ſcabra. 1. RICHARDIA.

435. ACHRAS. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* ouata, 6-fida: 469. ſquamis totidem alternis interioribus, *Pomum* 10-loculare. *Sem.* ſolitaria hilo marginali, apiceque vnguiculato.

mammoſa. 1. A. flor. ſolitariis, fol. cuneiformi lanceolatis. Achras floribus pentandris. *Jacq. amer. 56. t. 182. f. 19.* Achras fructu maximo ouato. *Brown. iam. 201. (exclude Loeſl. Plum. Jacq. ſynonyma)t*
Sapota. 2. A. flor. ſolitariis, fol. lanceolato-ouatis. Achras floribus hexandris. *Jacq. amer. 57. t. 41.* Achras *Loeſl. it. 186.* Sapota fructu ouato maiore. *Plum. gen. 43.* Achras fructu elliptico ſcabro maiore. *Brown. iam. 200. t. 19. f. 3.*
ſaliciſolia. 3. A. flor. confertis, fol. lanceolato-ouatis.

436. PRINOS. *Cal.* 6-fidus. *Cor.* 1-petala, rotata. 471. *Bacca* 6-ſperma.

verticill. 1. P. foliis longitudinaliter ſerratis.
glaber. 2. P. foliis apice ſerratis.

437. BVRSERA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala.
471. *Capſ.* carnoſa, 3-valuis, 1ſperma.

gummifera. 1. BVRSERA. Terebinthus americana polyphylla. *Comm. hort. 1 p. 149. t. 77.* Betula arbor americana, ſeminibus lithoſpermi frumentacei aemulis. *Pluk. alm. 67. t. 151. f. 1. Variat Cal. 5-fido. Pet. 5. Stam. 8. Stigmate 3-fido: at Brown in dioecia Fl. Maſculos Cal. 5-dentato, Cor. 5 partita. Stam. 10. an itaque polygama?*

438. BERBERIS. *Cal.* 6-phyllus. *Petala* 6: ad vn-
471. gues glandulis 2. *Styllus* 0. *Bacca* 2-ſperma.

vulgaris. 1. B. pedunculis racemoſis.
cretica. 2. B. pedunculis vnifloris. *Folia integerrima. Racemi ſubumbellati. Sem. 3.*

439. LORANTHVS. *Germen.* inferum. *Cal.* 0. *Cor.*
472. 6-fida, reuoluta. *Stam.* ad apices petalorum. *Bacca* 1-ſperma.

Scurrula. 1. L. pedunc vnifloris congeſtis, fol. obouatis.
vniflorus. 6. L. racemis ſimpliciſſimis. *Sp. pl. 1672.*
europaeus. 7. L. racemis ſimplicibus terminalibus, flor. dioicis. *Sp. pl. 1672.*
americanus. 2. L. racemis ſubramoſis aequalibus, fol. ouatis. Loranthus cymis ramoſis. *Jacq. amer. 97. t. 67. Folia oppoſita avenia coriacea.*
occidental. 3. L. racemis ſimplicibus, flor. irregularibus.
lonniceroid. 4. L. flor. aggregato-capitatis.
Stelis. 5. L. racemis trichotomis, pedunc. trigonis, flor. aequalibus.
pentandrus. 8. L. racemis ſimplicibus, flor. quinquefidis, fol. alternis petiolatis. *Mant. 63.*
ſpicatus. 9. L. ſpicis quadrangularibus. *Mant. 63.*

440. HILLIA. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 6-fida, longissima. *Bacca* infera, 2-locularis, polyſperma.
1662.

paraſitica. 1. HILLIA. *Sp. pl, 1662. Frutex repens. Folia oppoſita, oualia. Flores ſemipedales.*

441. FRANKENIA. *Cal.* 5-fidus, infundibulif. *Petala 5. Stigma* 6-partitum. *Capſ.* 1-locularis, 3-valuis.
473.

laeuis. 1. F. fol. linearibus confertis baſi ciliatis.
hirſuta. 2. F. caul. hirſutis, flor. faſciculatis terminalibus.
pulueril. 3. F. foliis obouatis retuſis ſubtus pulueratis.

442. PEPLIS. *Perianth.* campanulatum: ore 12-fido. *Petala.* 6, calyci inſerta. *Capſ.* 2-locularis.
474.

portula. 1. P. flor. apetalis. *Oed. dan. t. 64. Petalis rarius inſtruitur.*
tetrandra. 2. P. flor. tetrandris monopetalis. *Cal. campanulatus: limbo 8-fido. Cor. tubuloſa: Limbo 4-partito. Stam. 4. Germen tubo calycis adnatum. Syli ſtigmata 2. Capſula infera, bilocularis, coronata.*

DYGYNIA.

443. ORYZA. *Cal.* gluma 2-valuis, 1-flora. *Cor.* 2-valuis, ſubaequalis, ſemini adnaſcens.
475.

ſatiua. 1. ORYZA.

444. ATRAPHAXIS. *Cal.* 2-phyllus. *Petala* 2, ſinuata. *Stigmata* capitata. *Sem.* 1.
475.

ſpinoſa. 1. A. ramis ſpinoſis.
vndulata. 2. A. inermis.

TRI-

TRYGINIA.

445. FLAGELLARIA. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* o. *Bacca* 1-sperma.
475.

indica. 1. FLAGELLARIA. *Folia terminata cirrho, vti Glorioſa.*

446. RVMEX. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3, conniuentia.
476. *Sem.* 1, triquetrum.

* *Hermaphroditi: valuulis granulo notatis.*

Patientia. 1. R. flor. hermaphroditis: valuulis integerrimis: vnica granifera, foliis cordato-lanceolatis.

ſanguineus. 2. R. flor. hermophroditis: valuulis integerrmis: vnica granifera, foliis cordato-lanceolatis.

verticil- 4. R. flor. hermaphroditis: valuulis integerrimis: omnibus graniferis, fol. lanceolatis: vaginis cylindricis.

Britanica. 5. R. flor. hermaphroditis: valuulis integerrimis: omnibus graniferis, fol lanceolatis: vaginis obſoletis.

criſpus. 3. R. flor. hermophroditis: valuulis integris graniferis, fol. lanceolatis vndulatis acutis.

perſicarioides. 8. R. flor. hermaphroditis: valuulis dentatis: omnibus graniferis, foliis lanceolatis.

aegyptius. 7. R. flor. hermaphroditis: valuulis trifido-ſetaceis: vnica granifera.

maritimus. 9. R. flor. hermaphroditis: valuulis dentatis graniferis, fol. linearibus. Lapathum minimum. *Bauh. pin. 115.*

diuaricatus. 10. R. flor, hermaphroditis: valuulis dentatis graniferis, fol. cordato-oblongis obtuſis pubeſcentibus.

acutus. 11. R. flor. hermaphroditis: valuulis dentatis graniferis; fol. cordato-oblongis acuminatis. Lapathum folio acuto *Bauh. pin. 115.*

obtuſifolius. 12. R. flor. hermaphroditis: valuulis dentatis graniferis, fol. cordato-oblongis obtuſiuſculis crenulatis.

pulcher. 6. R. flor. hermaphroditis: valuulis dentatis: ſubunica granifera, fol. radicalibus panduriformibus. *Hall. emend. 20.* *

** *Her-*

* * *Hermaphroditi : valuulis granulo deſtitutis. ſ. nudis.*

bucephalophorus. 13. R. flor. hermaphroditis : valuulis dentatis nudis, pedicellis planis reflexis.

aquatic. 14. R. flor. hermaphroditis : valuulis integerrimis nudis, fol. cordatis glabris acutis.

Lunaria 15. R. flor. hermaphroditis : valuulis laeuibus, caule arboreo, fol. cordatis.

veſicarius. 16. R. flor. hermaphroditis geminatis: valuulis omnibus maximis membranaceis reflexis; fol. indiviſis.

roſeus. 19. R. flor. hermaphroditis diſtinctis : valuulae alterius ala maxima membranacea reticulata, fol. eroſis.

tingitanus. 17. R. flor. hermaphroditis diſtinctis : valuulis cordatis obtuſis integerrimis, fol. haſtato-ouatis.

ſcutatus. 18. R. flor. hermaphroditis, fol. cordato-haſtatis, caul. tereti.

digynus. 19. R. flor. hermaphroditis digynis.

* * * *Floribus diclinis.*

alpinus. 22. R. flor. hermaphroditis ſterilibus femineisque: valuulis integerrimis nudis, fol. cordatis obtuſis rugoſis.

ſpinoſus. 22. R. flor. androgynis : calyc. femineis monophyllis: valuulis exterioribus reflexo-vncinatis.

tuberoſus. 23. R. flor. dioicis, fol. lanceolato-ſagittatis, ramis patentibus.

multifidus. 26. R. flor. dioicis, fol. haſtatis auriculis haſtatis.

Acetoſa. 24. R. flor. dioicis, fol. oblongis ſagittatis.

Acetoſel. 25. R. flor. dioicis, fol. lanceolato-haſtatis.

aculeata. 27, R. flor. dioicis, fol. lanceolatis petiolatis, fructibus reflexis : valuulis ciliatis.

luxurians. 28. R. flor. - - - fol. cordato-haſtatis, caul. decumbentibus angulatis. *Mant. 64.*

447. SCHEVCHZERIA. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* o. *Styli* o. *Capſ.* 3, inflatae, 1-ſpermae. 482.

paluſtris. 1. SCHEVCHZERIA.

448. TRIGLOCHIN. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3. calyciformia. *Stylus.* 0. *Capſ.* baſi dehiſcens.
482.

paluſtre. 1. T. capſul. trilocularibus ſublinearibus.
maritim. 2. T. capſul. ſexlocularibus ouatis.

449. MELANTHIVM. *Cor.* 6-petala. *Filamenta* ex elongatis vnguibus corollae.
483.

virginic. 1. M. petalis vnguiculatis.
ſibiricum. 2. M. petalis ſeſſilibus.
capenſe. 3. M. petalis punctatis, fol. cucullatis.

450. MEDEOLA. *Cal.* 0. *Cor.* 6-partita, reuoluta.
483. *Bacca.* 3-ſperma.

virgin. 2. M. fol. verticillatis, ramis inermibus.
aſparag. 3. M. fol. pinnatis: foliolis alternis.

451. TRILLIVM. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Bacca.*
484. 3-locularis.

cernuum. 1. T. flore pedunculato cernuo.
erectum. 2. T. flore pedunculato erecto.
ſeſſile. 3. T. flore. ſeſſili erecto.

452. COLCHICVM. *Spatha. Cor.* 6-partita: tubo
485. radicato. *Capſulae* 3 connexae, inflatae.

autumn. 1, C. foliis planis lanceolatis erectis.
montan. 2. C. foliis linearibus patentiſſimis.
variegat. 3. C. foliis vndulatis patentibus.

453. HELONIAS *Cor.* 6-petala. *Cal.* o *Capſ.* 3-locularis.
485.

bullata. 1. H. fol. lanceolatis. Veratrum racemo ſimpliciſſimo, corollis patentibus, ſtaminibus longioribus. *Mill. ic.* 181. *t.* 272.
aſphodeloides. 2. H. fol. caulinis ſetaceis.

TETRAGYNIA.

454. PETIVERIA. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Sem.* 1. apice ariſtis reflexis.
486.

alliacea. 1. P. flor. hexandris.
octandra. 2. P. flor. octandris.

POLYGINIA.

455. ALISMA. *Cal.* 3-phyllus. *Petala.* 3. *Sem.* plura.
486.

Plantago. 1. A. fol. ouatis acutis, fruct. obtuſe trigonis.
flaua. 2. A. fol. ouatis acutis, pedunc. vmbellatis, fruct. globoſis.
Damaſonium. 3. A. fol. cordato-oblongis, flor. hexagynis, capſ. ſubulatis.
cordifol. 4. A. fol. cordatis obtuſis, flor. dodecandris, fructibus vncinato-mucronatis.
natans. 5. A. fol. ouatis obtuſis, pedunc ſolitariis.
ranunc. 6. A. fol. lineari-lanceolatis, fruct. globoſo-ſquarroſis.
ſubulata. 7. A. foliis ſubulatis.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

461. TRIENTALIS. *Cal.* 7-phyllus. *Cor.* 7-partita, plana. *Bacca* 1-locularis, ficca.

462. AESCVLVS. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. inaequalis. *Capſ.* 3-locularis, 2-ſperma.

* *Gerania africana.*

DIGYNIA.

463. LIMEVM. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala, aequalis. *Capſ.* 2-locularis, polyſperma.

TETRAGYNIA.

464. SAVRVRVS. *Cal.* amentum. *Cor.* nulla. *Piſtill.* 4. *Baccae* 4, monoſpermae.

HEPTAGYNIA.

465. SEPTAS. *Cal.* 7-partitus. *Cor.* 7-petala. *Germina* 7. *Capſ.* 7, polyſpermae.

MONO-

Circumſciſſam *Capſulam diximus illam, quae maturo fructu horizontaliter diſcedit.*

Superus *Flos ſ. Calyx* cui *germen ſub receptaculo, vel cuius Calyx abit in fructum, ſecundum Tournefortium.*

Inferus *Flos ſ. Calyx cui germen ſub receptaculo, vel cuius Piſtillum abit in fructum, ex mente Tournefortii.*

Ergo *Fructus inferus et Flos ſuperus idem ſunt; vt ex oppoſito. Fructus ſuperus et Flos inferus.*

MONOGYNIA.

456. TRIENTALIS. *Cal.* 7-phyllus. *Cor.* 7-partita, aequalis, plana. *Bacca* exſucca.
488.

europaea. 1. T. fol. lanceolatis integerrimis. *Kalm. canad.* 2. *p.* 263.

457. AESCVLVS. *Cal.* 5-phyllus, dentatus, ventricoſus. *Cor.* 5-petala, inaequaliter colorata, calyci inſerta. *Capſ.* 3-locularis.
488.

Hippo Caſt. 1. AE. floribus heptandris.
Pauia. 2. AE. floribus octandris. *Flores in vtraque Hermaphroditos et Maſculos obſeruauit Dav. Royenus, Millerus.*

DIGYNIA.

458. LIMEVM. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, aequalia. *Capſ.* globoſa, bilocularis.
488.

africanum. A. LIMEVM. *Burmann.*

TETRAGYNIA.

459. SAVRVRVS. *Cal.* amentum ſquamis 1-floris. *Cor.* 0. *Germina* 4. *Baccae* 4, monoſpermae.
489.

cernuus. 1. SAVRVRVS.

HEPTAGYNIA.

460. SEPTAS. *Cal.* 7-partitus. *Petala* 7. *Germina* 7. *Capſulae* 7, polyſpermae.
489.

capenſis. SEPTAS. *Pluk. mant.* 66. *t.* 340. *f.* 9.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Flores completi.*

478. MIMVSOPS. *Cor.* 8-petala. *Cal.* 8-phyllus, inferus. *Drupa.*

466. TROPAEOLVM. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus, calcaratus. *Baccae* 3, 1-ſpermae.

491. BAECKEA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus, ſuperus *Capſ.* globoſa, 4-locularis. coronata.

481. MEMCYLON. *Cor.* 4-petala. *Cal.* integerrimus, ſuperus.

475. COMBRETVM. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 5-dentatus, ſuperus. *Sem.* 4.

471. EPILOBIVM. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus, ſuperus. *Capſ.* 4-locularis. *Sem.* pappoſa!

470. GAVRA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus, ſuperus. Nux 4-ſperma.

469. OENOTHERA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus, ſuperus. *Capſ.* 4-locularis. *Anther.* lineares.

468. RHEXIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus, medius. *Capſ.* 4-locul. *Anth.* arcuatae.

467. OSBECKIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus, medius. *Capſ.* 4-locul. *Anth.* roſtratae.

474. GRISLEA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus, inferus. *Capſ.* 1-locularis.

1257. ANTICHORVS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus, inferus. *Capſ.* 4-locul. 4-valuis, polyſperma.

479. ALLOPHYLVS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus, inferus. *Stylus* bifidus.

479. IAMBOLIFERA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus, inferus. *Filamenta* planiuſcula.

482. LAWSONIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus, inferus. *Bacca* 4-locularis.

372. MELICOCCA. *Cor.* 4-petala, refracta. *Cal.* 4-partitus. *Drupa* corticoſa. *Stig.* peltat. anceps.

473. AMYRIS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus, inferus. *Bacca* 1-ſperma.

1258. CHLORA. *Cor.* 8-fida. *Cal.* 8-phyllus, inferus. *Capſ.* 1-locul. 2-valuis, polyſperma.

480. SAN-

480. SANTALVM. *Cor.* 1-petala. *Cal.* 4-dentatus, ſuperus. *Filam.* corollae. *Bacca.*

483. VACCINIVM. *Cor.* 1-petala. *Cal.* 4-dentatus, ſuperus. *Filam.* receptaculi. *Bacca.*

484 ERICA. *Cor.* 1-petala. *Cal.* 4-phyllus, inferus. *Filam.* receptaculi. *Capſula.*

Aeſculus Pauia.
Monotropa Hypopithys.
Ruta graueolens.
Iuſſiaea erecta, ſuffruticoſa.
Ptelea viſcoſa.
Portulaca quadrifida.
Trichilia Guara.

* *Dais octandra.*
* *Fagara octandra.*
* *Melaſtoma octandra.*

* * *Flores incompleti.*

487. GNIDIA. *Cal.* 4-fidus, corollinus. *Pet.* 4, parua. *Stam.* exſerta.

490. LACHNAEA. *Cal.* 4-fidus, corollinus, inaequalis. *Stam.* exſerta.

486. DIRCA. *Cal.* elimbis, corollinus, inaequalis. *Stam.* exſerta.

485. DAPHNE. *Cal.* 4-fidus, corollinus, aequalis. *Stam.* incluſa. *Bacca* pulpoſa.

489. PASSERINA. *Cal.* 4-fidus, corollinus, aequalis. *Stam.* ſupra corollam.

488. STELLERA. *Cal.* 4-fidus, corollinus, aequalis. *Stam.* incluſa. *Sem.* vnicum.

* *Riuina octandra.*

DIGYNIA.

493. WEINMANNIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 2-locularis, 2-roſtris.

494. MOEHRINGIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 1-locularis.

1259. SCHMIDELIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Pericarp.* 2, pedicellata.

492. GALENIA. *Cor.* 0. *Cal.* 4-fidus. *Capſ.* 2-locul., 2-ſperma.

* * *Gentiana perfoliata. Chryſoſplenium.*

TRIGYNIA.

497. PAVLLINIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* 3-locul., 1-ſperma.

498. CARDIOSPERMVM. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 3-locul., 1-ſperma.

449. SAPINDVS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Bacca* 3-cocca, 1-ſperma.

496. COCCOLOBA. *Cor.* o. *Cal.* 5-partitus. *Bacca* calycina, 1-ſperma.

495. POLYGONVM. *Cor.* o. *Cal.* 5-partitus. *Sem.* 1, nudum.

TETRAGYNIA.

501. ADOXA. *Cor.* 4-f. 5-fida, ſupera. *Cal.* 2-phyllus. *Bacca* 4-f. 5-ſperma.

502. ELATINE. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 4-locularis.

500. PARIS. *Cor.* 4-petala, ſubulata. *Cal.* 4-phyllus. *Bacca* 4-locularis.

* *Cotyledon laciniata.*
* *Petiueria octandra.*

MONOGYNIA.

461. TROPAEOLVM. *Cal.* 1-phyllus, calcaratus 490. *Petala* 5, inaequalia. *Bacae* 3, ſiccae.

minus. 1. T. fol. peltatis repandis, petal. acuminato-ſetaceis.
maius. 2. T. fol. peltatis ſubquinquelobis, petal. obtuſis.
hybridum. 4. T. fol. ſubpeltatis quinquelobis integerrimis, petalis variantibus. *Mant. 64. Planta nouiter orta e praecedenti; Nectarium obtuſum. Corolla vix vnquam determinata. Semina vix producit, ramis multiplicanda.*
peregrinum. 3. T. fol. ſubpeltatis quinquelobis dentatis, petalis ciliato-laceris.

462. OSBECKIA. *Cal.* 4 fidus: *Lobis* ſquama ciliari 490. interſtinctis. *Cor.* 4-petala. *Antherae* roſtratae. *Capſ.* 4-locularis, calycis tubo truncato cincta.

chinenſis. 1. OSBECKIA.

463. RHEXIA. *Cal.* 4-fidus. *Petala* 4, calyci inſerta. 491. *Antherae* declinatae. *Capſ.* 4-locularis, intra ventrem calycis.

virginica. 1. R. fol. ſeſſilibus ſerratis, calyc. glabris.
mariana. 2. R. foliis ciliatis.
Aciſanthera. 3. R. flor. alternis axillaribus pedunculatis quinquefidis.

464. OENOTHERA. *Cal.* 4-fidus. *Petala* 4. *Capſ.* 491. cylindrica, infera. *Sem.* nuda.

biennis. 2. OE. fol. ouato-lanceolatis planis, caule muricato-villoſo.
paruiflor. 3. OE. fol. ouato-lanceolatis planis, caule laeui ſubvilloſo.
muricata. OE. fol. lanceolatis planis, caule purpuraſcente muricato. *Similis paruiflorae, ſed Fructus os non 8-fidum. Caulis puncta rubra ſparſa. Canada.*

octoualuis. 4. OE. fol. lanceolato-oblongis acuminatis planis glabris.
moliſſim. 2. OE. fol. lanceolatis vndulatis.
hirta. 1. OE. hirta, fol. ſupra glabris.
fruticoſa. 6. OE. fol. lanceolatis ſubdentatis, capſul. pedicellatis acutangulis, racemo pedunculato. Oenothera foliis lanceolatis, floribus terminalibus paniculatis. *Gouan. hort.* 193. *Flores parui albi.*
pumila. 7. OE. fol. lanceolatis obtuſis glabris ſubpetiolatis, caul. proſtratis, capſul. acutangulis.

465. GAVRA. *Cal.* 4-fidus, tubuloſus. *Cor.* 4-petala, adſcendens verſus latus ſuperius. *Nux* infera, 1-ſperma, 4-angula.
493.

biennis. 1. GAVRA.

466. EPILOBIVM. *Cal.* 4-fidus. *Petala* 4. *Capſ.* oblonga, infera. *Sem.* pappoſa.
493.

* *Staminibus declinatis.*

anguſtif. 1. E. fol. ſparſis lineari-lanceolatis, flor. inaequalibus.
latifolium. 2. E. fol. alternis lanceolato-ouatis, flor. inaequalibus.

** *Staminibus erectis regularibus, petalis bifidis.*

hirſutum, 3. E. fol. oppoſitis lanceolatis ſerratis decurrenti-amplexicaulibus.
montanum. 4. E. fol. oppoſitis ouatis dentatis.
tetragonum. 5. E. fol. lanceolatis denticulatis: imis oppoſitis, caule tetragono.
paluſtre. 6. E. fol. oppoſitis lanceolatis integerrimis, petal. emarginatis, caule erecto.
alpinum. 7. E. fol. oppoſitis ouato-lanceolatis integerrimis, ſiliquis ſeſſilibus, caule repente.

1257. ANTICHORVS. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Capſ.* ſupera, ſubulata, 4-locularis, 4-ualuis. *Sem.* plurima.

depreſſus. 1. ANTICHORVS. *Mant.* 64. *

467. COM-

467. COMBRETVM. *Cal.* 4-dentatus, campanulatus, ſuperus. *Cor.* 4-petala, calyci inſerta. *Stam.* longiſſima. *Sem.* 1, quadrangulare: angulis membranaceis.
496.

laxum. 1. C. ſpicis laxis.
ſecundum. 2. C. ſpicis ſecundis.

468. GRISLEA. *Cal.* 4-fidus. *Petala* 4 ex inciſuris calycis. *Filamenta* longiſſima, adſcendentia. *Capſ.* globoſa, ſupera, 1-locularis, polyſperma.
496.

ſecunda. 1. GRISLEA.

469. ALLOPHYLVS. *Cal.* 4-phyllus: foliolis orbiculatis: oppoſitis minoribus. *Petala* 4, calyce minora. *Germen* didymum. *Stigm.* 4-fidum.
496.

zeylanic. 1. ALLOPHYLVS.

470. XIMENIA. *Cal.* 4-fidus. *Petala* 4, piloſa, reuoluta. *Drupa* monoſperma.
497.

american. 1. X. fol. oblongis, pedunc. multifloris.
inermis. 2. X. fol. ouatis, pedunc. vnifloris.

471. MIMVSOPS. *Cal.* 8-phyllus. *Petala* 16. *Drupa* acuminata.
497.

Elengi. 1. M. fol. alternis remotis. *Rumph. amb.* 3. *t.* 63.
Kauki. 2. M. fol. confertis. *Rumph. amb.* 3. *t.* 8.

472. IAMBOLIFERA. *Cal.* 4. dentatus. *Cor.* 4-pe-
497. tala, infundibulif. *Filamenta* planiuſcula. *Stigm.* ſimplex.

peduncul. 1. IAMBOLIFERA.

473. MELICOCCA. *Cal.* 4-partitus. *Petala* 4, re-
495. flexa infra calycem. *Stigm.* ſubpeltatum. *Drupa* coriacea.

biiuga. 1. MELICOCCA. *Iacq. amer.* 108. *t.* 72.

474. AMYRIS. *Cal.* 4-dentatus. *Petala* 4, oblonga.
495. *Stigma* tetragonum. *Bacca* drupacea.

Elemifera. 8. A. fol. ternatis quinato-pinnatisque ſubtus tomentoſis. Cornus racemoſa trifolia & quinquefolia. *Plum. ic.* 100. Iccariba. *Margr. braſ.* 98. *diſtinguenda a ſequenti.*

ſyluatica. 1. A. fol. ternatis crenatis acutis. *Iacq. amer.* 107.

maritima. 2. A. fol. ternatis crenulatis obtuſis. *an varietas praecedentis?*

gileadenſis. 5. A. fol. ternatis integerrimis, pedunc. vnifloris lateralibus. *Mant.* 65.

Opobalſamum. 6. A. fol. pinnatis: foliolis ſeſſilibus. *Mant.* 65.

toxifera. 3. A. fol. pinnatis: foliolis petiolatis planis.

Protium. 7. A. fol. pinnatis: foliolis petiolatis vndulatis. *Mant.* 65.

balſamifera. 4. A. fol. biiugis.

475. SANTALVM. *Cal.* ſuperus. *Cor.* 1-petala. *Sta-*
497. *mina* tubo impoſita. *Stigma* ſimplex. *Bacca.*

album. 1. SANTALVM.

476. MEMECYLON. *Cal.* ſuperus margine integerrimo. *Cor.* 1-petala. *Bacca* calyce cylindrico coronata.
197.

capitellat. 1. M. foliis ouatis.

1258. CHLORA. *Cal.* 8-phyllus. *Cor.* 1-petala, 8-fida. *Capſ.* 1-locularis, 2-valuis, polyſperma.

perfoliata. 1. C. fol. perfoliatis. Gentiana perfoliata. *Sp. pl.* 1671.
quadrifol. 2. C. fol. quaternis. Gentiana quadrifolia. *Sp. pl.* 1671.
12-andra. 3. C. fol. oppoſitis. Chironia dodecandra. *Sp. pl.* 273.

477. LAWSONIA. *Cal.* 4-fidus. *Petala* 4. *Stamina* 4 parium. *Capſ* 4-locularis, polyſperma.
498.

inermis. 1. L. ramis inermibus.
ſpinoſa. 2. L. ramis ſpinoſis.

478. VACCINIVM. *Cal.* ſuperus. *Cor.* 1-petala. *Filamenta* receptaculo inſerta. *Bacca* 4-locularis, polyſperma.
498.

* *Foliis annotinis ſ. deciduis.*

Myrtillus. 1. V. pedunc. vnifloris, fol. ſerratis ouatis deciduis, caule angulato.
ſtamineum. 2. V. pedunc. ſolitariis vnifloris, antheris corolla longioribus, fol. oblongis integerrimis.
vliginoſum. 3. V. pedunc. vnifloris, fol. integerrimis oualibus obtuſis laeuibus.
album. 4. V. pedunc. ſimplicibus, fol. integerrimis ouatis ſubtus tomentoſis.
mucronatum. 5. V. pedunc. ſimpliciſſimis vnifloris, fol. ouatis mucronatis glabris integerrimis.
corymboſum. 6. V. flor. corymboſis ouatis, fol. oblongis acuminatis integerrimis.

fron-

frondoſum. 7. V. racemis filiformibus folioſis, fol. oblongis integerrimis.

liguſtrinum. 8. V. racem. nudis, caule fruticoſo, fol. crenulatis oblongis.

Arctoſtaphyllus. 9. V. flor. racemoſis, fol. crenulatis ouatis acutis, caule arboreo.

** *Foliis ſemperuirentibus.*

Vitis idea. 10. V. racem. terminalibus nutantibus, fol. obouatis reuolutis integerrimis ſubtus punctatis.

Oxycoccos. 11. V. fol. integerrimis reuolutis ouatis, caulib. repentibus filiformibus nudis,

hiſpidulum. 12. V. fol. integerrimis reuolutis ouatis, caulib. repentibus filiformibus hiſpidis.

479. ERICA. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-fida. *Filamenta* receptaculo inſerta. *Antherae* bifidae. *Capſ.* 4-locularis.

501.

*. *Antheris bicornibus.*

vulgaris. 1. E. antheris bicornibus incluſis, coroll. inaequalibus campanulatis mediocribus, fol. oppoſitis ſagittatis. *Folia oppoſita, ſubtrigona, carinâ canaliculata, ſupra baſin affixa, baſi acuta bifida. Corolla vltra medium 4-fida, magnitudine et facie calycis. Stylus adſcendens.*

vmbellat. 2. E. anth. bicornibus exſertis, coroll. globoſis vmbellatis, fol. ternis aceroſis glabris.

cinerea. 4. E. anth. bicornibus incluſis, coroll. ouatis racemoſis, fol. ternis glabris linearibus. *β.* Erica ternis per interualla ramulis. *Bauh. pin.* 486. Erica coris folio V. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 43.

ſcoparia. 5. E. anth. bicornibus incluſis, coroll. campanulatis longioribus. fol. ternis patentibus, ramis albis.

caffra. 6. E. anth. bicornibus incluſis, coroll. ſubouatis mediocribus ſolitariis, fol. ternis, caule arboreo.

viridi-purpurea. 7. E. anth. bicornibus incluſis, coroll. ouatis longioribus, racemis corymboſis ſecundis, fol. ternis.

Tetra-

Erica Daboeci *vide* Andromedam Daboeciam, *quae octandra flore quadrifido Ericae, ſed antheris et habitu Andromedae.*

Tetralix. 8. E. anth. bicornibus incluſis, coroll. ſubgloboſis aggregatis folio longioribus, fol. quaternis ciliatis patentibus.

arborea. 9. E. anth. bicornibus incluſis, coroll. campanulatis longioribus, fol. quaternis patentiſſimis, caule ſubarboreo tomentoſo.

purpurascens. 10. E. fol. in ſummitate quinis, caule procumbente.

ramentacea. 42. E. anth. bicornibus incluſis, coroll. globoſis laeuibus, fol. quaternis ſetaceis laeuibus. *Mant.* 65.

* * *Antheris ſimplicibus obtuſis emarginatis.*

tenuifol. 29. E. anth. bifidis incluſis, coroll. ouatis calyces coloratos aequantibus, fol. oppoſitis linearibus appreſſis.

paniculat. 36. E. anth. bifidis ſubincluſis, coroll. campanulatis ſubumbellatis, fol. quaternis linearibus laeuibus.

planifolia. 35. E. anth. bifidis incluſis, coroll. campanulatis, fol. quaternis ciliatis patentibus. *Rami procumbentes. Folia patentia, lanceolato-ouata, acuminata, remota. Calyces longitudine fere corollae.*

abſinthioides. 41. E. anth. bifidis incluſis. coroll. ſubrotundis, fol. ternis linearibus ſubpubeſcentibus. *Mant.* 66.

corifolia. 32. E. anth. bifidis incluſis, coroll. ouatis, calyc. planis, bracteis coloratis. fol. ternis glabris.

articularis. 44. E. anth. bifidis incluſis, coroll. campanulatis calyce colorato breuioribus, fol. ternis linearibus laeuibus appreſſis. *Mant.* 65.

ciliaris. 11. E. anth. ſimplicibus incluſis, coroll. ouatis irregularibus, flor. racemoſis, fol. ternis ciliatis patentibus.

paruiflor. 25. E. anth. bifidis incluſis, coroll. ſubrotundis longitudine calycis, fol. quaternis ciliatis hiſpidis.

triflora. 33. E. anth. bifidis incluſis, coroll. ſubgloboſis ſubuilloſis ternis, pedunc. triphyllis, fol. ternis.

imbricata. 12. E. anth. bifidis exſertis, calyc. duplicatis coloratis acutis corolla longioribus, fol. ternis laeuibus.

ſpumoſa. 37. E. anth. bifidis incluſis, calyc. trifloris: ſquamis inflatis inflexis, fol. ternis laeuibus. *β* Erica gnaphalodes. *Sp. pl.* 34. *Piſtill. longiſſimum.*

phyſodes. 26. E. anth. bifidis incluſis, coroll. ouatis inflatis glabris, fol. quaternis linearibus glabris obtuſis. *Calyx viſcoſus.*

halica-

halicacaba. 27. E. anth. bifidis incluſis, coroll. inflatis maximis, fol. ternis linearibus laeuibus.

faſtigiata. 40. E. antheris ſubbifidis incluſis, coroll. hypocrateriformibus faſtigiato-faſciculatis, fol. quaternis linearibus ſcabris. *Mant. 66.*

calycina. 28. E. anth. bifidis incluſis, coroll. ſubouatis calyces coloratos patentes aequantibus, fol. ternis laeuibus. *Folia linearia, triquetra. Flores corymboſi, magni. Pedunculi Bracteis 3, alternis. Calyx patens, obtuſiuſculus, purpureus. Corolla atro-purpurea, ore recto.*

pilulifera. 31. E. ant. bifidis incluſis. coroll. globoſis glabris quaternis, fol. linearibus patulis quaternis. *Rami virgati laeues. Folia ſubtus conuexa, vix pubeſcentia. Corollae terminales, purpureae. Calyces concolores, breuiores. Pedunculi uniflori, longiores.*

bruniades. 15. E. anth. bifidis exſertis, coroll. globoſis tectis calyce lanato, fol. ternis linearibus piloſis. *Corolla ouato-campanulata, quadrifida, fere truncata; ſequentis ſemiquadrifida laciniis ovatis. Antherae ſcabrae vtrisque, ſed huius exſertae, ſequentis corollâ non longiores.*

capitata. 16. E. anth. bifidis ſubexſertis, coroll. globoſis, calyc. lanatis coloratis, fol ternis hirtis.

carnea. 14. E. anth. bifidis ſimplicibus exſertis, coroll. ouatis ſublongioribus, fol. quaternis ſubtriquetris patentibus glabris.

herbacea. 3. E. anth. bifidis incluſis, coroll. campanulatis mediocribus ſecundis, fol. ternis triquetris patulis.

nigrita. 43. E. anth. - - ſubincluſis atris conniuentibus, coroll. campanulatis quadripartitis, fol. ternis. *Mant. 65.*

multiflor. 13. E. anth. bifidis ſimplicibus exſertis, coroll. cylindricis longioribus, fol. quinis linearibus patentibus.

coccinea. 18. E. anth. bifidis exſertis, coroll. clauatis, calycibus imbricatis. fol. ternis glabris.

curuiflora. 19. E. anth. bifidis exſertis, coroll. clauato-cylindricis curuis ſolitariis, fol. quaternis glabris. *Calyces lanceolato-ſubulati, craſſiuſculi, pubeſcentes.*

tubiflora. 20. E. anth. bifidis incluſis, coroll. clauato-cylindricis incuruatis pubeſcentibus acutis, fol. quaternis ciliatis.

Cerin-

cerinthoides. 21. E. anth. bifidis incluſis, corollis ſubclauatis hirtis, flor. aggregatis ſeſſilibus, fol. quaternis ciliatis.

abietina. 22. E. anth. bifidis incluſis, coroll. ventricoſo-cylindricis glabris, flor. lateralibus, fol. quaternis ciliatis.

pentaphylla. 23. E. anth. bifidis incluſis, coroll. ouatis acutis, fol. quinis laeuibus.

hiſpidula. 39. E. anth. bifidis incluſis, coroll. ſubgloboſis, fol. ternis ouato-lanceolatis, ramulis hiſpidis. *Sp. pl.* 1672.

pubeſcens. 25. E. anth. bifidis incluſis, coroll. ſubouatis pubeſcentibus, fol. quaternis linearibus ſcabris.

empetrifolia. 30. E. anth. bifidis incluſis, coroll. campanulatis, fol. ſenis ſubciliatis obtuſis.

Pluckenet. 17. E. anth. bifidis exſertis, coroll. ſubcylindricis ſub. truncatis longioribus, calyc. ſimplicibus, fol. linearibus ternis. *Daboeciam. vide Andromedam.*

480. DAPHNE. 509.

Cal. o *Cor.* 4-fida. corollacea, marceſcens, ſtamina includens. *Bacca* 1-ſperma.

* *Floribus lateralibus.*

Mezereum. 1. D. flor. ſeſſilibus ternis caulinis, fol. lanceolatis deciduis.

Thymelaea. 2. D. flor. ſeſſilibus axillaribus, fol. lanceolatis, caulibus ſimpliciſſimis. *Ger. prov. t.* 17. *f.* 2.

pubeſcens. 13. D. flor. ſeſſilibus lateralibus aggregatis, fol. lanceolato-linearibus, caule pubeſcente. *Mant.* 66.

villoſa. 3. D. flor. ſeſſilibus lateralibus ſolitariis, fol. lanceolatis planis ciliatis piloſis confertis.

Tartonraira. 4. D, flor. ſeſſilibus aggregatis axillaribus, fol. ouatis vtrinque pubeſcentibus neruoſis.

alpina. 5. D. flor. ſeſſilibus aggregatis lateralibus, fol. lanceolatis obtuſiuſculis, ſubtus tomentoſis. Chamaelea pumila ſaxatilis, flore pallido. *Barr. ic.* 234. Daphnoides foliis ſupinis hirſutis. *Geſn. faſc.* 6. *t.* 3. *f.* 7.

Lau-

Laureol. 6. D. racem. axillaribus quinquefloris, fol. lanceolatis glabris. *Racemi axillares, laterales, nutantes, bracteis concauis, alternis, abſque floribus in ſuis alis. Flores* 5, *terminales racemi, in vmbellulam congeſti. Flores triſtes colore, odore, tempore.*

pontica. 7. D. pedunc. lateralibus bifloris, fol. lanceolato-ouatis.

* * *Floribus terminalibus.*

indica. 8. D. capitulo terminali pedunculato, fol. oppoſitis oblongo-ouatis glabris.

Cneorum. 9. D. flor. faſciculatis terminalibus ſeſſilibus, fol. lanceolatis nudis. Thymelaea minor ſ. Daphnoides alpinum. *Geſn. faſc.* 5. *t.* 3. *f.* 6.

Gnidium. 10. D. panicula terminali, fol. lineari lanceolatis acuminatis.

ſquarroſa. 11. D. flor. terminalibus pedunculatis, fol. ſparſis linearibus patentibus mucronatis.

oleoides. 12. D. flor. geminis terminalibus ſeſſilibus, fol. elliptico-lanceolatis glabris. *Mant.* 66.

481 DIRCA. *Cal.* o. *Cor.* tubuloſa limbo obſoleto. 512. *Stam.* tubo longiora. *Bacca* 1-ſperma.

paluſtris. 1. DIRCA.

482. GNIDIA. *Cal.* infundibulif. 4-fidus. *Petala* 4, 512. calyci inſerta. *Sem.* 1. ſubbaccatum.

pinifolia. 1. G. fol. ſparſis lineari-ſubulatis: floralibus verticillatis.

radiata. 4. G. fol. ſubulatis triquetris acutis, capitul. terminalibus ſeſſilibus radiatis, bracteis lanceolatis. *Mant.* 67.

ſimplex. 5. G. fol. omnibus linearibus acutis, flor. terminalibus ſeſſilibus. *Mant.* 67.

tomentoſa. 2. G. fol. ſparſis ouato-oblongis glabris, margine ſcabris. *Ramulorum apices lanati vt congeneres. Folia ſuprema ſubpubeſcentia. Stamina* 4 *exſerta;* 4 *in fauce. Petala parua, emarginata.*

ſericea. 6. G. fol. ouatis tomentoſis: floralibus quaternis, caul. hirſuto, florum corona ſetis octo. Paſſerina ſericea. *Sp. pl.* 512. *Faux floris coronata filis* 8 *coloratis, longitudine corollae, extra petala. Stamin. in fauce* 4, *in tubo* 4.

oppo-

oppositif. 3. G. fol. oppositis lanceolatis, thymeleae africanae sanamundae prioris clusii facie. *Pluk. alm. 367. t. 323. f. 7.* β Passerina laeuigata. *Sp. pl. 513. Cultu in hortis Petala acquirit. Folia suprema apice sanguinea. Flores terminales, extus villosi. Stamina, praeter callos istos 4 supra faucem, sunt 4 sub fauce, 4 in medio tubi.*

483. STELLERA. *Cal.* o. *Cor.* 4-fida: *Stam.* breuissima. *Sem.* 1, rostratum.
512.

Passerin. 1. S. fol. linearibus, flor. quadrifidis.
Chamaeiasm. 2. S. fol. lanceolatis, coroll. quinquefidis.

484. PASSERINA. *Cal.* o. *Cor.* 4-fida. *Stam.* tubo impositа. *Sem.* 1, corticatum.
513.

filiformis. 1. P. fol. linearibus conuexis quadrifariam imbricatis, ramis tomentosis. *Corollae tubus longitudine germinis. Folia floralia basi margine lato membranaceo, quod non in reliquis.*
hirsuta. 2. P. fol. carnosis extus glabris, caul. tomentosis.
capitata. 7. P. fol. linearibus glabris, capitulis pedunculatis tomentosis. *Folia sparsa, linearia, laeuia. Capitula terminalia, globosa, pedunculata, tomentosa. Pedunculi tomentosi, inaequati. Flores multi, absque tubo, sessiles. Stamina supra faucem 16, quorum 8 interiora castrata.*
ciliata. 3. P. fol. lanceolatis subciliatis erectis, ramis nudis.
uniflora. 4. P. fol. linearibus oppositis, flor. terminalibus solitariis, ramis glabris. *Flores caerulei. Stamina* 8 *ad faucem floris. Antherarum rudimenta* 8 *latent in fundo floris.*

485. LACHNAEA. *Cal.* o. *Cor.* 4-fida limbo inaequali. *Sem.* 1, subbaccatum.
514.

eriocephala. 1. L. capitulis solitariis lanatis, fol. quodrifariam imbricatis.
conglom. 2. L. capitulis confertis, fol. laxis.

486. BAECKEA. *Cal.* infundibulif. 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* globoſa, 4-locularis, coronata.
514.

fruteſc. 1. BAECKEA.

DIGYNIA.

1259. SCHMIDELIA. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Germina* pedicellata, flore longiora.

racemoſa. SCHMIDELIA. *Mant. 67.*

487. GALENIA. *Cal.* 3-fidus. *Cor.* 0. *Capſ.* ſubrotunda, 2-ſperma.
515.

africana. 1. GALENIA. Frutex afric. folio roſmarini tenuiore, flore et fructu chenopodii. *Boerh. Lugd. 2. p. 267. Frutex ruſticus, habitu Tetragoniae, licet minuta omnia, et totus obſolete papilloſus. Caulis teres ſetulis raris reflexis. Folia oppoſita, linearia, ſeſſilia, perennia. Flores ſeſſiles, albi, in panicula dichotoma.*

488. WEINMANNIA. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Capſ.* 2-locularis, biroſtris.
515.

pinnata. WEINMANNIA. Arbuſcula *Ramis oppoſitis: vltimis ſubpubeſcentibus.* Folia *oppoſita, pinnata cum impari:* Petiolo communi *alato, articulis ſubouatis;* Foliola 11-13, *parua, nuda, obtuſa, oppoſita, ſeſſilia, obouata, latere interiore verſus baſin anguſtiora, ſerraturis vtrinque 3 ſ. 4.* Stipulae *ouatae, magnitudine foliorum, deciduae, inter paria petiolorum ſolitariae.* Racemi *terminales, ſolitarii, pedunculati, foliis longiores, erecti, ſimplices.* Floribus *numeroſis, albis, magnitudine Tiarellae.* Pedicellis *vniſloris, e ſingulis punctis pedunculi pluribus.* Calyx *foliolis oblongis, quatuor, patentibus, albis.* Petala 4, *lanceolata, calyce triplo longiora.* Stamina *capillaria, corolla duplo longiora.* Germen *ouatum, biſulcum.* Styli 2, *albi, filiformes.* Stigmata *capitata. Copioſe in Inſula S.* Crucis *a D. Browne.*

489.

489. MOEHRINGIA. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Capſ.* 1-locularis, 4-valuis.
515.

muſcoſa. 1, MOEHRINGIA.

TRIGYNIA.

490. POLYGONVM. *Cal.* o. *Cor.* 5-partita, calycina. *Sem.* 1, angulatum.
516.

* Atraphaxoides *caule fruteſcente.*

fruteſc. 1. P. caule fruticoſo, calycinis foliolis duobus reflexis.

** Biſtortae *ſpica vnica.*

Biſtorta. 2. P. caule ſimpliciſſimo monoſtachyo, fol. ouatis in petiolum decurrentibus.

viuiparum. 3. P. caule ſimpliciſſimo monoſtachio, fol. lanceolatis. *Spicae Flores inferiores in bulbos tranſeunt ſaepe viuiparos.*

*** Perſicariae *piſtillo bifido, aut ſtamina minus 8.*

virginianum. 4. P. flor. pentandris ſemidigynis, corollis quadrifidis inaequalibus, fol. ouatis.

lapathifolium. 5. P. flor. pentandris ſemidigynis, ſtamin. corollae regulari aequalibus. Caulis *erectus, firmus, laeuis.* Vaginae *pubeſcentes, ciliatae.* Folia *ouata, petiolata, magnitudine Phytolaccae.* Pedunculi *oppoſitifolii, longitudine foliorum, ſpicato racemoſi.*

amphibium. 6. P. flor. pentandris ſemidigynis, ſpica ouata. *Varietas Aquatica ſtaminibus flore breuioribus, Terreſtris longioribus. Iacq.*

ocreatum. 8. P. flor. pentandris trigynis, fol. lanceolatis.

Hydropiper. 9. P. flor. hexandris ſemidigynis, fol. lanceolatis, ſtipul. ſubmuticis.

Perſicaria. 10. P. flor. hexandris digynis, ſpicis ouato-oblongis, fol. lanceolatis, ſtipulis ciliatis.

barbatum. 14. P. flor. hexandris trigynis, ſpicis virgatis, ſtipul. truncatis ſetaceo-ciliatis, fol. lanceolatis. *Pluk phyt. 210. f. 7.*

orientale. 12. P. flor. heptandris digynis, fol. ouatis, caule erecto, ſtipul. hirtis hypocrateriformibus.

penſylua-nicum. 13. P. flor. octandris digynis, pedunc. hiſpidis, fol. lanceolatis, ſtipul. muticis.

**** Polygona *foliis indiuiſis, floribus octandris.*

maritim. 14. P. fol. octandris trigynis axillaribus, fol. ouali lanceolatis ſemperuirentibus, caul. ſuffruteſcente.

auicula-re. 15. P. flor. octandris trigynis axillaribus, fol. lanceolatis, caule procumbente herbaceo.

erectum. 16. P. flor. octandris trigynis axillaribus, fol. oualibus, caule erecto herbaceo.

articula-tum. 17. P. flor. octandris trigynis, ſpicis articulatis paniculatis, ſtipul. vaginalibus truncatis.

diuarica-tum. 18. P. flor. octandris trigynis racemoſis, fol. lanceolatis, caule diuaricato patulo.

ſerratum. 7. P. foliis crenatis. *

***** Helxine *foliis ſubcordatis.*

chinenſe. 19. P. flor. octandris trigynis, pedunc. ſcabris, fol. ouatis.

ſagittatum. 21. P. fol. ſagittatis, caule aculeato.

arifolium. 22. P. fol. haſtatis, caule aculeato.

perfolia-tum. 20. P fol. triangularibus, caule aculeato, ſtipul. perfoliato-folioſis patentibus ſubrotundis. *Burm. ind. t. 29. f. 2.*

tataricum. 23. P. fol. cordato-ſagittatis, caule inermi erecto, ſemin. ſubdentatis.

Fagopy-rum. 24. P. fol. cordato-ſagittatis, caule erectiuſculo inermi, ſemnum angulis aequalibus.

Conuoluu-lus. 25. P. fol. cordatis, caule volubili angulato, flor. obtuſatis. *Antherae violaceae.*

dumeto-rum. 26. P. fol. cordatis, caule volubili laeui, flor. carinato-alatis. *Antherae albae.*

ſcandens. 27. P. fol. cordatis, caule erecto ſcandente. *Petiolorum baſis ſubtus poro perforata in P. ſcandenti, dumetorum, conuoluulo.*

491. COCCOLOBA. *Cal.* 5-partitus, coloratus. *Cor.* 523. o. *Bacca* calycina, monoſperma.

Vuifera. 1. C. fol. cordato-ſubrotundis nitidis. *Plum. t. 145.*

pube-

pubeſcens. 2. C. fol. orbiculatis pubeſcentibus.
excoriat. 4. C. fol. ouatis, ramis quaſi excorticatis. *Iacq. amer.* 115. *t.* 78.
punctata. 3. C. fol. lanceolato-ouatis. *Iacq. amer. t.* 114. *t.* 77.
emargi-nata. 5. C. fol. coriaceis ſubrotundis exciſo-emarginatis. *Iacq. amer. 37. obſ. 18. t. 9. in America calidiore.* ♄
barbaden-ſis. 6. C. fol. cordato-ouatis vndulatis. *Iacq. obſ. t. 8. in Barbados.* ♄.
tenuifol. 4. G. fol. ouatis membranaceis.

492. PAVLLINIA. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Nectar.* 4-phyllum, inaequale. *Capſ.* 3, compreſſae, membranaceae, connatae.
524.

aſiatica. 1. P. fol. ternatis, caule aculeato, cirrhis nullis.
Seriana. 2. P. fol ternatis: foliol. ouato oblongis, petiolis teretiuſculis.
Cururu. 3. P. fol. ternatis: foliolis cuneiformibus obtuſis ſubdentatis, petiolis marginatis.
mexicana. 4. P. fol. biternatis: foliol. ouatis integris, petiolis marginatis.
curaſſauica. 5. P. fol. biternatis, foliol. ouatis ſubſinuatis.
polyphyll. 6. P. fol. triternatis.
pinnata. 7. P. fol. pinnatis: foliolis inciſis, petiolis marginatis.

493. CARDIOSPERMVM. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Nectarium*, 4-phyllum, inaequale. *Capſ.* 3, connatae, inflatae.
525.

Halicacab. 1. C. fol. laeuibus.
Corindum. 2. C. fol. ſubtus tomentoſis.

494. SAPINDVS. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Capſ.* carnoſae, connatae, ventricoſae.
526.

Saponar. 1. S. fol. impari-pinnatis, caul. inermi.

trifoliatus. 2. S. fol. ternatis. *Fl. zeyl.* 603.
ſpinoſus. 3. S. fol. abrupte pinnatis, caul. ſpinoſiſſimo

TETRAGYNIA.

495. PARIS. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4, anguſtiora.
526. *Bacca* 4-locularis.

quadrifol. 1. PARIS.

496. ADOXA, *Cal.* 2-fidus, inferus. *Cor.* 4-ſ. 5-fi-
527. da, ſupera. *Bacca* 4-ſ. 5-locularis, calyce coalita,

Moſchatel- 1. ADOXA. (*Flores laterales 5-fidi, partium numero quinario.*)
lina.

497. ELATINE. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Capſ.*
527. 4-locularis, 4-valuis, depreſſa.

Hydrop. 1. E. foliis oppoſitis. *Oed. dan. t.* 156.
Alſinaſt. 2. E. foliis verticillatis.

CLAS-

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

504. TINVS. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* 3-locularis. *Sem.* 1.

503. LAVRVS. *Cal.* o. *Cor.* 6-petala, calycina. *Bacca* 1-ſperma. *Nectarii* glandulae 2-ſetae.

505. CASSYTA. *Cal.* o. *Cor.* 6-partita, calycina. *Bacca* 1-ſperma. *Nectarii* glandulae truncatae.

* *Anacardium* 520 *ſtamine decimo caſtrato.*

TRIGYNIA.

506. RHEVM. *Cal.* o. *Cor.* 6-fida. *Sem.* 1, triquetrum.

HEXAGYNIA.

507. BVTOMVS. *Cal.* o. *Cor.* 6-petala. *Capſ.* 6, polyſpermae.

MONOGYNIA.

498. LAVRVS. *Cal.* o. *Cor.* calycina, 6-partita. 528. *Nectarium* glandulis 3, biſetis, germen cingentibus. *Filamenta* interiora glandulifera. *Drupa* 1-ſperma.

Cinnamomum. 1. L. fol. trineruiis ouato-oblongis: neruis versus apicem euaneſcentibus. *Iacq. amer.* 117.

Caſſia. 2. L. fol. triplineruiis lanceolatis.

Camphor. 3. L. fol. triplineruiis lanceolato-ouatis.

Chloroxylon. 4. L. fol. trineruiis ouatis coriaceis: neruis apicem attingentibus.

nobilis. 5. L. fol. lanceolatis, venoſis perennantibus, flor. quadrifidis.

indica. 6. L. fol. lanceolatis perennantibus planis, ramulis tuberculatis cicatricibus, flor. racemoſis.

Perſea. 7. L. fol. ouatis coriaceis transuerſe venoſis perennantibus, flor. corymboſis. *Iacq. obſ.* 37. Laurus foliis oblongo-ouatis, fructu obouato pericarpio butyraceo. *Brown. iam.* 214. *Stamina huic 6 Miller, Fructus gratiſſimus.*

Borbonia. 8. L. fol. lanceolatis perennantibus, calyc. fructus baccatis. Laurus foliis lanceolatis perennantibus, marginibus reflexis, transuerſe venoſis, floribus racemoſis. *Mi l. dict. 5. Stamina 5: antheris fuſcis. Germen globoſum. Stylus breuis. Stigma tuberculatum. Baccae purpureae. Pedunculis longis rubris. Fabr. helmſt.* 389. *Mihi vero viſa.* Cal. 3-*phyllus, breuiſſimus.* Petala 3, *lanceolata.* Stamina 9: *tribus interioribus vtrinque glandula ad baſin.* Antherae *vtroque latere polliniferae et apice biualues introrſum deorſum. Staminis decimi rudimentum.* Stylus *ſtigmate craſſiuſculo.*

aeſtiualis. 9. L. fol. venoſis oblongis acuminatis annuis, ſubtus rugoſis ramis ſupra-axillaribus.

Benzoin. 10. L. fol. eneruiis ouatis vtrinque acutis integris annuis.

Saſſafras. 11. L. fol. trilobis integrisque. *calm. canad. 2. p. 270. 434.*

499. TINVS. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-partita. *Nectarium*
530. vrceolatum, includens germen. *Bacca* 3-locularis. *Sem.* ſolitaria.

occident. A, TINVS.

500. CASSYTA. *Cor.* calycina 6-partita. *Nectarium*
530. glandulis 3, truncatis, germen cingentibus. *Filamenta* interiora glandulifera. *Drupa* 1-ſperma.

filiformis. 1. CASSYTA. *Herba Cuſcutae: Fructificatio Lauri.*

TRIGYNIA.

501. RHEVM. *Cal.* o. *Cor.* 6-fida, perſiſtens. *Sem.*
531. 1, triquetrum.

Rhapont. 1. R. fol. glabris, petiolis ſubſulcatis.
Rhabarb. 2. R. fol. ſubuilloſis, petiolis aequalibus.
palmatum. 3. R. fol. palmatis acuminatis. *Act. angl.* 1765. *p.* 292. *t.* 12. Rhabarbare. *Brun. orient.* 192. *t.* 73. *Rheum officinale genuinum.*
compactum. 4. R. fol. ſublobatis obtuſiſſimis glaberrimis lucidis denticulatis.
Ribes. 5. R. fol. granulatis, petiolis aequalibus.

HEXAGYNIA.

502. BVTOMVS. *Cal.* o. *Petala* 6. *Capſ.* 6, poly-
532. ſpermae.

umbellat. 1. BVTOMVS.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Fl. Polypetali irregulares.*

508. SOPHORA. *Cor.* papilion: Vexillo adſcendente. *Legum.* torulis remotis.

509. ANAGYRIS. *Cor.* papilion: Vexillo breui recto. *Carina* alis longiore.

510. CERCIS. *Cor.* papilion: Alis vexilliformibus. *Nectar.* gland. ſtyliformis, ſub germine.

511. BAVHINIA. *Cor.* patens, vnguiculata, adſcendens. *Petala* lanceolata.

512. HYMENAEA. *Cor.* ſubaequalis. *Legum.* lignoſum pulpa farinoſa.

515. POINCIANA. *Cor.* petalo ſummo maiore. *Legum.* compreſſum.

513. PARKINSONIA. *Cor.* petalo infimo reniformi. *Legum.* teres, tortuoſum.

516. CAESALPINIA. *Cor.* petalo infimo pulchriore. *Legum.* rhombeum. *Sem.* rhombea.

524. TOLVIFERA. *Cor.* petalo infimo maiore. *Cal.* campanulatus.

514. CASSIA. *Cor.* inaequal. *Anth.* roſtratae. *Legum.* iſthmis interceptum.

517. GVILANDINA. *Cor.* ſubaequal. calyci inſidens. *Legum.* rhombeum. *Sem.* oſſea.

522. DICTAMNVS. *Cor.* patula. *Filam.* puluerulacea. *Capſ.* 5, connexae. *Sem.* arillata.

* * *Fl. Polypetali aequales.*

519. CYNOMETRA. *Cal.* 4-partitus: lacin. oppoſ. maior. *Legum.* 1-ſpermum, carnoſum.

1260. PROSOPIS. *Cal.* hemiſphaericus. *Legum.* polyſpermum.

526. ADENANTHERA. *Antheris* glandula inſidens. *Legum.* compreſſum membranaceum.

525. HAEMATOXYLON. *Piſtilli* ſtigma emarginatum. *Siliqu.* valuis nauicularibus.

528. TRICHILIA. *Nectar.* tubuloſum, 5-dentatum. *Capſ.* 3-locularis, 3-valuis. *Sem.* baccata.

527.

527. MELIA. *Nectar.* tubulosum, 10-dentatum. *Drupa* Nucleo, 5-loculari,

521. SWIETENIA. *Nectar.* tubulosum, 10-dentatum. *Capſ.* lignosa, 5-valuis. *Sem.* imbricata, margine membranaceo.

520. ANACARDIVM. *Petala* reflexa. *Drupa* nucleo supero, nudo.

518. GVAIACVM. *Cal.* lacin. 2 exteriores minores. *Capſ.* carnosa, 3-ſ. 5-locularis, angulata.

523. RVTA. *Germen* punctis 10-melliferis. *Capſ.* 5-fida, 5-locularis, polyſperma.

532. TRIBVLVS. *Piſtilli* ſtylius nullus. *Capſ.* 5, connexae, polyſpermae.

531. FAGONIA. *Cor.* vngues calyci inſertae. *Capſ.* 5-locularis, 10-valuis, 1-ſperma.

530. ZYGOPHYLLVM. *Nectar.* ſquamae 10 baſeos ſtamin. *Capſ.* 5-locul. polyſperma.

529. QVASSIA. *Capſ.* 5, biualues, 1-ſpermae, inſertae receptaculo carnoſo.

433. THRYALLIS. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* tricocca.

534. LIMONIA. *Cor.* 5-petala. *Bacca.* 3-ſperma.

535. HEISTERIA. *Cor.* 5-petala. *Drupa.* inſidens calyci colorato grandefacto.

539. QVISQVALIS. *Cor.* 5-petala, calyci inſidens filiformi. *Drupa* ſicca.

536. MONOTROPA. *Cal.* corollinus, baſi gibbus. *Capſ.* 5-locul. polyſperma.

553. CLETHRA. *Piſtilli* ſtigmata tria. *Capſ.* 3-locul. polyſperma.

554. PYROLA. *Antherae* ſurſum bicornes. *Capſ.* 5-locul. polyſperma.

546. LEDVM. *Cor.* plana, 5-partita. *Capſ.* 5-locul. polyſperma.

537. TRIANTHEMA. *Capſ.* circumſciſſa.

1261. CHALCAS. *Bacca* 2-ſperma. *Cor.* campanulata.

544. MELASTOMA. *Cor.* calyci inſid. *Anth.* refractae. *Bacca* 5-locul. calyce veſtita.

538. IVSSIEA. *Cor.* 4-ſ. 5-petala. *Capſ.* infera.

* *Rhexia Aciſanthera.*

Gerania. Conocarpus racemoſa.

*** *Fl.*

* * * *Fl. Monopetali aequales.*

1285. CODON. *Cor.* campanulata, 10-fida. *Cal.* 10-partitus. *Capſ.* polyſperma.

549. ANDROMEDA. *Cor.* campanulata rotundata. *Capſ.* 5-locularis.

548. RHODODENDRON *Cor.* infundibulif. *Stamina* declinata. *Capſ.* 5-locularis.

545. KALMIA. *Cor.* limbo ſubtus 5-corniculato. *Capſ.* 5-locularis.

550. EPIGAEA. *Cal.* exter. 3-phyllus; inter. 5-phyllus. *Capſ.* 5-locularis.

551. GUALTERIA. *Cal.* exter. 2-phyllus; inter. 5-fidus. *Capſ.* 5-locul. calyce baccato.

552. ARBVTVS. *Cor.* ouata, baſi diaphana. *Bacca* 5-locularis.

595. STYRAX. *Cor.* infundibulif. *Drupa* diſperma.

520. ANACARDIVM. *Cor.* laciniis reflexis. *Drupa* nucleo ſupero, nudo.

* *Vaccinia nonnulla.*

* * * *Fl. Apetali ſ. incompleti.*

540. DAIS. *Cor.* monopetala. *Involucr.* 4-phyllum, multiflorum.

543. SAMYDA. *Cal.* 5-partitus. *Nectar.* 10-fidum cingens. germen. *Capſ.* baccata, 3-locul.

541. BVCIDA. *Cal.* 5-partitus. *Bacca* 1-ſperma.

542. COPAIFERA. *Cal.* o. *Cor.* 4-petala.

* *Stellera Chamaeiaſme.*

DIGYNIA.

562. SCLERANTHVS. *Cor.* nulla. *Cal.* 5-fidus, ſuperus. *Sem.* 2.

558. CHRYSOSPLEN. *Cor.* nulla. *Cal.* ſuperus. *Capſ.* 2-locularis, 2-roſtris.

555. ROYENA. *Cor.* 1-petala. *Cal.* ventricoſus. *Capſ.* 4-ſperma, 4-valuis.

557. HYDRANGEA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus, ſuperus. *Capſ.* bilocularis, 2-roſtris, circumſciſſa.

559. SAXIFRAGA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-partitus. *Capſ.* 1-locularis, 2-roſtris.

560. TIARELLA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* corolliferus. *Capſ.* biualuis: altera maiore.

561. MITELLA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* corolliferus. *Capſ.* biualuis. *Petala* pectinata.

556. CVNONIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* bilocularis, acuta.

563. GYPSOPHILA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5 part. campanulatus. *Capſ.* 1-locul. globoſa.

564. SAPONARIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* tubuloſus, baſi nudus. *Capſ.* 1-locularis oblonga.

565. DIANTHVS. *Cor.* 5-petala. *Cal.* tubuloſus, baſi ſquamoſus. *Capſ.* 1-locul. oblonga.
* *Trianthema decandra.*

TRIGYNIA.

569. ARENARIA. *Capſ.* 1-locularis. *Pet.* integra, patentia.

568. STELLARIA. *Capſ.* 1-locularis. *Pet.* bipartita, patentia.

566. CVCVBALVS. *Capſ.* 3-locularis. *Pet.* bifida fauce nuda.

567. SILENE. *Capſ.* 3-locularis. *Pet.* bifida fauce coronata.

570. CHERLERIA. *Capſ.* 3.locularis. *Nectar.* petaloidea calyce minora.

571. GARIDELLA. *Capſ.* 3-diſtinctae. *Pet.* calycina. *Nectar.* 5, bilabiata.

575. ERYTHROXYLON. *Drupa* 1-ſperma. *Pet.* baſi ſquama inſtructa.

572. MALPIGHIA. *Bacca* 3-ſperma. *Pet.* vnguiculata. *Cal.* glanduloſus.

573. BANISTERIA. *Sem.* 3, vnialata. *Pet.* vnguiculata. *Cal.* glanduloſus.

574. TRIOPTERIS. *Sem.* 3, alata. *Pet.* 6? *Cal.* 5-partitus.
* *Tamarix germanica.*

PENTAGYNIA.

578. COTYLEDON. *Capſ.* 5 ad nectaria. *Cor.* 1-petala.

579. SEDVM. *Capſ.* 5 ad nectaria. *Cor.* 5-petala.

580. PENTHORVM. *Capſ.* 5-loba. *Cor.* petala rariora.

586. SPERGVLA. *Capſ.* 1-locul. *Petala.* integra. *Cal.* 5-phyllus.

585. CERASTIVM. *Capſ.* 1-locul. *Petala.* 2-fida. *Cal.* 5-phyllus.

583. AGROSTEMMA. *Capſ.* 1-locularis, oblonga. *Cal.* tubuloſus, coriaceus.

584. LYCHNIS. *Capſ.* 3-locularis, oblonga. *Cal.* tubuloſus, membranaceus.

482. OXALIS. *Capſ.* 5-locularis, angulata. *Cor.* baſi ſubcohaerens.

577. SPONDIAS. *Drupa* nucleo 5-loculari. *Cal.* 1-phyllus.

576. AVERRHOA. *Pomum* 5-loculare. *Cal.* 5-phyllus.

1235. GRIELVM. *Sem.* 5, diſtincta, mutica. *Cor.* 5-petala. *Styli* nulli.

581. SVRIANA. *Sem.* 5, ſubrotunda. *Cor.* 5-petala. *Styli* filiformes, laterales.

1262. FORSKOHLEA. *Sem.* 5, lana inuoluta. *Cor.* 10-petala.

* *Adoxa.* *Geranium.*
Coriaria. *Droſera luſitanica.*

DECAGYNIA.

587. NEVRADA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 10-cocca.

588. PHYTOLACCA. *Cal.* 5-phyllus corollinus. *Cor.* nulla. *Bacca* 10-cocca.

MO-

MONOGYNIA.

503. SOPHORA. *Cal.* 5-dentatus, ſuperne gibbus. 533. *Cor.* papilionacea: alis longitudine vexilli. *Legumen.*

alopecuroides. 1. S. fol. pinnatis: foliol. numeroſis villoſis oblongis, caul. herbaceo.
tomentoſ. 2. S. fol. pinnatis: foliol. numeroſis ſubrotundis tomentoſis.
occidentalis. 3. S. fol. pinnatis: foliol. numeroſis ſubrotundis. *Trew. ehret. 27. t. 59.*
capenſis. 9. S. fol. pinnatis: foliolis numeroſis lanceolatis ſubtus tomentoſis: caule fruticoſo. *Mant. 67.*
japonica. 10. S. fol. pinnatis: foliolis pluribus ouatis glabris, caule arboreo. *Mant. 68.*
heptaph. 4. S. fol. pinnatis: foliol. ſeptenis glabris.
Geniſtoid. 5. S. fol. ternatis ſeſſilibus: foliol. linearibus.
auſtralis. 12. S. fol. ternatis ſubſeſſilibus glabris, ſtipul. enſiformibus. *C. B. S.* 24.
tinctoria. 6. S. fol. ternatis ſubſeſſilibus: foliol. obouatis glabris, ſtipul. minutis.
alba. 11. S. fol. ternatis petiolatis: fol. ellipticis glabris, ſtipulis ſubſubulatis breuibus. Crotalaria alba. *Sp. plant.* 1006. *Filamenta omnino diſtincta. Vexillum corolla breuius.*
lupinoid. 7. S. fol. ternatis petiolatis: foliol. oualibus piloſis.
biflora. 8. S. fol. ſimplicibus obouatis ſubtomentoſis, pedunculis bifloris.

504. ANAGYRIS. *Vexillum* alaeque carina breuiores in corolla papilionacea. 534. *Legumen.*

foetida. ANAGYRIS. *Haſſelqu. iter. 466.*

505. CERCIS. *Cal.* 5-dentatus, inferne gibus. *Cor.* papilionacea: vexillo ſub alis breui. 534. *Legumen.*

Siliquaſt. 1. C. fol. cordato-orbiculatis glabris.
canadenſ. 2. C. fol. cordatis pubeſcentibus.

506. BAVHINIA. *Cal.* 5-fidus, deciduus. *Petala* patula, oblonga, vnguiculata: superiore magis diſtante, omnia calyci inſerta. *Legumen.*
535.

ſcandens. 1. B. caule cirrhifero.
aculeata. 2. B. caule aculeato. *Iacq. amer.* 119.
diuaric. 3. B. fol. ouatis: lobis diuaricatis.
vngulata. 4. B. fol. ouatis: lobis parallelis.
variegat. 5. B. fol. cordatis: lobis coadunatis obtuſis.
purpur. 6. B. fol. ſubcordatis bipartitis rotundatis, ſubtus tomentoſis.
tomentoſ. 7. B. fol. cordatis: lobis ſemiorbiculatis tomentoſis
acumin. 8. B. fol. ouatis: lobis acuminatis ſemiouatis.

507. HYMENAEA. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5, ſubaequalia. *Stylus* intortus. *Legumen* repletum pulpa farinacea.
536.

Courbar. 1. HYMENAEA.

508. PARKINSONIA. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5, ouata, infimo reniformi. *Stylus* nullus. *Legumen* moniliforme.
537.

aculeata. 1. PARKINSONIA.

509. CASSIA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Antherae* ſupernae 3 ſteriles; infimae 3 roſtratae. *Legumen.*
537.

* *Sennae.*

diphylla. 1. C. fol. coniugatis ſtipulis cordato-lanceolatis.
Abſus. 2. C. fol. biiugis ſubouatis: glandulis duabus ſubulatis inter infima.
viminea. 3. C. fol. biiugis ouato-oblongis acuminatis: glandula oblonga inter infima, ſpinis ſubpetiolaribus obſoletis tridentatis.

Tage-

Tagera. 4. C. fol. triiugis: glandula petiolari, ſtipulis ciliatis cordatis acuminatis.

Tora, 5. C. fol. triiugis obouatis: exterioribus maioribus, glandula ſubulata inter inferiora.

bicapſularis. 6. C. fol. triiugis obouatis glabris: interioribus rotundioribus minoribus: glandula interiecta globoſa.

emargin. 7. C. fol. triiugis ouatis rotundatis emarginatis aequalibus.

obtuſifol. 8. C. fol. triiugis ouatis obtuſiuſculis.

falcata. 10. C. fol. quadriiugis ouato-lanceolatis retro-falcatis: glandula baſeos petiolorum.

occidentalis. 11. C. fol. quinqueiugis ouato-lanceolatis margine ſcabris: exterioribus maioribus, glandula baſeos petiolorum.

planiſiliqua. 13. C. fol. quinqueiugis ouato-lanceolatis glabris, glandula baſeos petiolorum. *Plum. ic. 77.*

Fiſtula. 14. C. fol. quinqueiugis ouatis acuminatis glabris, petiolis eglandulatis. *Rumph. amb. 2. t. 21.*

atomaria. 31. C. fol. quinqueiugis ouatis ſubtomentoſis, petiolis teretibus eglandulatis. *Mant. 68.*

piloſa. 12. C. fol. quinqueiugis eglandulatis, ſtipulis ſemicordatis acuminatis, caule ſtricto piloſo. *Pentandra.*

Senna. 9. C. fol. ſeiugis ſubouatis, petiolis eglandulatis. *Stipulae patentes. Petioluli luteo colorati. Legumina ouali-oblonga, refalcata.*

biflora. 15. C. fol. ſeiugis oblongiuſculis glabris: inferioribus minoribus, glandula ſubulata inter infima, pedicellis bifloris.

hirſuta. 16. C. fol. ſeiugis ouatis acuminatis lanatis.

ſerpens. 17. C. fol. ſeptemiugis, flor. pentandris, caul. filiformibus proſtratis herbaceis.

liguſtrina. 18. C. fol. ſeptemiugis lanceolatis: extimis minoribus, glandula baſeos petiolorum. *Foliola margine piloſa.*

ciliata. 19. C. fol. octoiugis ouali-oblongis: exterioribus minoribus, petiolis eglandulatis, ſtipulis patulis.

marilandica. 20. C. fol. octoiugis ouato-oblongis aequalibus, glandula baſeos petiolorum.

tenuiſſima. 21. C. fol. nouemiugis oblongis, glandula ſubulata inter infima.

Sophera. 22. C. fol. decemiugis lanceolatis, glandula baſeos oblonga.

articulata. 23. C. fol. duodecimiugis obtuſis mucronatis, glandulis ſubulatis pluribus, ſtipul. reniformibus barbatis.

iauanica. 24. C. fol. duodecimiugis oblongis obtuſis glabris, glandula nulla.

* * Chamaecriſtae *foliolis numeroſis.*

Chamaecriſta. 25. C. fol. multiiugis, glandula petiolari pedicellata, ſtipul. enſiformibus.

glandulosa. 26. C. fol. multiiugis multiglandulatis, ſtipulis ſubulatis. *Hexandra: antheris 2 longiſſimis.*

mimoſoides. 27. C. fol. multiiugis lincaribus, glandula baſeos petiolorum obſoleta, ſtipul. ſetaceis.

flexuoſa. 28. C. fol. mutiiugis, ſtipul dimidiato-cordatis.

nictitans. 25. C. fol. multiiugis flor. pentandris, caule erectiuſculo.

procumb. 30. C. fol. multiiugis eglandulatis, caule procumbente.

510. POINCIANA. 544.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5: ſummo maiore. *Stam.* longa: omnia foecunda. *Legumen.*

biiuga. 2. P. aculeis ſolitariis, foliol. emarginatis.

pulcherrima. 3. P. aculeis geminis. Senna ſpuria arborea ſpinoſa, fol. decompoſitis. *Sloan hiſt. 2. p. 49. Petiolus Communis Glandula vna ad baſin & alia ad ſupremum par; Partialis petiolus ſupra baſin mucronibus duobus.*

elata. A. P. caule inermi. *Cent. 146.*

511. CAESALPINIA. 544.

Cal. 5fidus: lacinia infima maiori. *Petala* 5: infimo pulchriore. *Legumen.*

veſicaria. 3. C. caul. aculeato, foliol. obcordatis ſubrotundis.

Sappan. 4. C. caul. aculeato, foliol. oblongis inaequilateralibus emarginatis.

Criſta. 2. C. caul. arboreo, foliolis ouatis integris, flor. pentandris.

512. GVILANDINA. *Cal.* 1-phyllus, hypocrateriformis. *Petala* calycis collo inserta, subaequalia. *Legumen.*
545.

Bonduc. 1. G. aculeata, pinnis ouatis, foliol. aculeis solitariis.
Bonduccella. 2. G. aculeata, pinnis oblongo-ouatis, foliolis aculeis geminis.
Nuga. 3. G. caule inermi, foliis petiolo primario subtus aculeis geminis.
Moringa. 2. G. inermis, fol. subbipinnatis: foliol. inferioribus ternatis. *Polygama ex Hermaphroditis duobus. Legumen longum. Semina triquetra.*
dioica. 4. G. inermis, fol. bipinnatis: basi apiceque simpliciter pinnatis. *Duham. arb. 1. t. 103.*

513. GVAIACVM. *Cal.* 5-fidus, inaequalis. *Petala* 5, calyci inserta. *Capſ.* angulata, 3-s. 5-locularis.
546.

officinale. 1. G. foliolis biiugis obtusis.
sanctum. 2. G. foliolis multiiugis obtusis.
asrum. 3. G. foliolis multiiugis acutis. *Rami rigidi. Folia alterna, pinnata, octoiuga. Petiolus communis marginatus, articulatus, canaliculatus. Foliola ouato-oblonga, oppoſita, integerrima, mucronata, glabra, rigidula, perennia, baſi interiore laeuiſſime abbreuiata. Stipulae ramis appreſſae, ſubulatae, minimae.*

514. CYNOMETRA. *Cal.* 4-phyllus: *Antherae* apice bifidae. *Legum.* carnosum, lunatum, 1-ſpermum.
547.

cauliflor. 1. C. trunco florifero. *Rumph. amb. 1. t. 62.*
ramiflor. 2. C. ramis floriferis. *Rumph. amb. 1. t. 63.*

515. ANACARDIVM. *Cal.* 5-partitus. *Petal.* 5, reflexa. *Nux* reniformis, receptaculo carnoso insidens.
548.

occident. 1. ANACARDIVM. *Filamentum vnum castratum, lauris affine.*

1285. CODON *authore Cl. Dav.* Royeno.

CAL. *Perianthium* monophyllum, decempartitum: foliolis subulatis, persistentibus, erectiusculis: alternis breuioribus.

COR. monopetala, campanulata, basi toruloſa: Limbo decempartito, aequali.
Nectarium decem loculare, ex squamis 10, vnguibus staminum insertis, conniuentibus, receptaculum tegentibus.

STAM. *Filamenta* decem, longitudine corollae. *Antherae* crassae.

PIST. *Germen* superum, conicum. *Stylus* simplex, longitudine staminum. *Stigmata* duo, longa, setacea, diuergentia.

PER. biloculare.

SEM. plura, subrotunda, hirta, in pulpa exsucca colorata.

royeni. 1. CODON. *Roy mss.*
Habitat - - - - ⊙.
Caulis *herbaceus, firmus, cubitalis, teres ramis assurgentibus.* Folia *alterna, petiolata, cordato-ouata, subrepanda, indiuisa: acuminata, subcoriacea, glabra, supra auenia.* Flores *supra-axilares, solitarii, pedunculati, facie corollae Atropae Belladonnae, albidi, extus notati striis 10 purpurascentibus.* Herba *tota adspersa striis. Royen.*

516. DICTAMNVS. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, patula. *Filamenta* punctis glandulosis adsperſa. *Capſ.* 5, coalitae.
548.

albus. 1. DICTAMNVS.

517. RVTA. *Cal.* 5-partitus. *Petala* concaua. *Receptac.* punctis meliferis decem cinctum. *Capſ.* lobata. *Quinta pars numeri in quibusdam excluditur.*
548.

graueol. 1. R. fol. decompoſitis, flor. lateralibus quadrifidis.
ß. montana varietas, fol. linearibus nec lanceolatis.
chalepenſis. 4. R. fol. ſupradecompoſitis, petalis ciliatis. *Mant. 69.*
patauina. 2. R. fol. ternatis ſeſſilibus. *Petala plana, integra.*
linifolia. 3. R. fol. lanceolatis indiuiſis. *Petala plana, integra.*

518. TOLVIFERA. *Cal.* 5-dentatus, campanulatus. *Petala* 5, infimo maximo, obcordato. *Styllus* nullus.
549.

Balſamum. 1. TOLVIFERA.

519. HAEMATOXYLVM. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Capſ.* lanceolata 1-locularis, 2-valuis: valuis nauicularibus.
549.

Campech. 1. HAEMATOXYLVM. *Jacq. obſ. 20.*

1260. PROSOPIS. *Cal.* hemiſphaericus, 4-dentatus. *Stigm.* ſimplex. *Legum.* inflatum, polyſpermum.

ſpicigera. 1. PROSOPIS. *Mant. 68.*

1261. CHALCAS. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* campanulata petalis unguiculatis. *Stigma* capitato-verrucoſum.

paniculat. 1. CHALCAS. *Mant. 68.*

520. ADENANTHERA. *Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Antheris* apice exteriore glandulae globosae affixae. *Legumen* menbranaceum.
550.

pauonina. 1. A. fol. vtrinque glabris. *Rumph. amb. 3. t. 109.*
falcata. 2. A. fol. subtus tomentosis. *Rumph. amb. 3. t. 112.*

521. TRICHILIA. *Cal.* sub 5-dentatus. *Petala* 5. *Nectarium* cylindricum e filamentis approximatis longitudine corollae, ore Antheras gerens. *Capſ.* 3-locularis 3-valuis. *Sem.* baccata.
550.

hirta. 1. T. fol. pinnatis subhirsutus. Trichilia *spondioides* racemis axillaribus foliolis intermediis maioribus. *Jac. amer. 128.*
glabra. 2. T. fol. pinnatis glabris, foliolis extimis maioribus. *Jacq. amer. 129. t. 175. f. 38.*
trifolia. 3. T. fol. ternatis.
Guara. 4. T. fol. pinnatis glabris, flor. octandris. Fructus 4-spermus.

522. SWIETENIA. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Nectarium* cylindricum ore antheras gerens. *Capſ.* 5-locularis, lignosa, basi dehiscens. *Sem.* imbricata, alata.
548.

Mahagoni. SWIETENIA. *Jacq.*

523. MELIA. *Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Nectarium* cylindraceum, longitudine corollae: ore 10-dentato. *Drupa* nucleo quinqueloculari.
550.

Azedar. 1. M. foliis bipinnatis.
Azadir. 2. M. foliis pinnatis.

524. ZY-

524 ZYGOPHYLIVM. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Nectarium* 10-phyllum, germen tegens. *Capſula* 5-locularis.
551.

ſimplex. 9. *Z.* fol. ſimplicibus ſeſſilibus cylindricis. *Mant. 68.*
Fabago. 1. *Z.* fol. coniugatis petiolatis: foliol. obouatis, caule herbaceo.
coccineum. 2. *Z.* fol. coniugatis petiolatis: foliol. cylindricis carnoſis laeuibus.
album. 3. *Z.* fol. coniugatis petiolatis: foliol. clauatis carnoſis arachnoideo-incanis
Morgſan. 4. *Z.* fol. coniugatis ſubpetiolatis: foliol. obouatis, caule fruticoſo.
ſeſſilifolium. 5. *Z.* fol. coniugatis ſeſſilibus: foliol. lanceolato-oualibus margine ſcabris, caule fruticoſo.
ſpinoſum. 6. *Z.* fol. coniugatis ſeſſilibus: foliol. linearibus, caule fruticoſo.
aeſtuans. 7. *Z.* fol. coniugatis ſeſſilibus, foliol. obouatis retuſis.
arboreum. 8. *Z.* fol. pinnatis, caule arboreo. *Sp. pl. 1673.*

525. QVASSIA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Nectarium* 5-phyllum. *Pericarpia* 5, diſtantia, 1 ſperma.
553.

amara. 1. QVASSIA. *Amoen. acad. 6. p. 421. t. 429. Sp. pl. 1679.*

526. FAGONIA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, cordata *Capſ.* 5-locularis, 10-valuis: loculis 1-ſpermis.
553.

cretica. 1. F. ſpinoſa, foliol. lanceolatis planis laeuibus. *Caulis pentagonus, depreſſus, patens, dichotomus, Folia oppoſita, ternata, lanceolata, ſubcarnoſa. Stipulae 4. ſpineſcentes, recuruatae: affinis Zygophyllo.*
hiſpanic. 2. F. inermis.
arabica. 3. F. ſpinoſa, foliol. linearibus conuexis.

527. TRIBVLVS. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5, patentia. *Stylus* 0. *Caps.* 5, gibbae, ſpinoſae, polyſpermae.
553.

maximus. 1. T. fol. ſubquadriiugis: exterioribus maioribus, perica piis decaſpermis muticis.

lanuginoſus. 2. T. fol ſubquinqueiugis ſubaequalibus, ſeminibus bicornibus. *Caules adſcendentes, longi. teretes, piloſi, articulati. Folia oppoſita (ſuprema alterna), petiolata altero minore: Foliola ouali-oblonga, acutiuſcula, vtrinque piloſa. Petioli piloſi. Stipula ad quoduis folium, lanceolata, marceſcens. Pedunculus ex alis alternis, ſ. minoris folii (vna cum ramulo), vniflorus, piloſus, foliis breuior. Fructus angulatus, piloſus.*

terreſtris. 3. T. foliis ſubſexiugis ſubaequalibus, ſeminibus quadricornibus.

Ciſtoides. 4. T. fol. octoiugis ſubaequalibus.

528. THRYALLIS. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Capſ.* 3-cocca.
554.

braſilienſis. 1. THRYALLIS.

529. LIMONIA. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Bacca* 3-locularis. *Sem.* ſolitaria.
554.

acidiſſima. 1. LIMONIA.

530. MONOTROPA. *Cal.* 0. *Petala* 10; horum 5 exteriora baſi excauato-mellifera. *Capſ.* 5-valuis. *Quinta pars numeri quibusdam excluditur.*
555.

Hypopith. 1. M. flor. lateralibus octandris: terminali decandro.

vniflora. 2. M. caule vnifloro, flore decandro.

531. TRI-

531. TRIANTHEMA. *Cal.* ſub apice mucronatus. *Cor.* o. *Germen* retuſum. *Capſ.* circumſciſſa.
523.

monogyna. 1. T. flor. monogynis. Trianthema Portulacaſtrum. *Sp. pl. 925. Mant. 69.* *
pentandr. 2. T. flor. pentandris digynis. *Mant. 70.* *
Decandr. 3. T. flor. ſubdecandris digynis. *Mant. 70.*

532. JVSSIAEA. *Cal.* 4 ſ. 5-partitus, ſuperus. *Petala* 4-ſ. 5. *Capſ.* 4-ſ. 5-locularis, oblonga, angulis dehiſcens. *Sem.* numeroſa, minuta.
555.

repens. 1. I. repens, flor. pentapetalis decandris, pedunc. folio longioribus.
adſcendens. I. adſcendens, flor. pentapetalis decandris, fol. ouato-oblongis glabris, pedunc. folio breuioribus. *Mant. 69.*
peruuian. 2. I. erecta, flor. pentapetalis, pedunc. folioſis.
ſuffruticoſa. 3. I. erecta villoſa, flor. tetrapetalis, octandris pedunculatis. *Rumph. amb. 6. t. 41.*
erecta. 4. I. erecta glabra, flor. tetrapetalis octandris ſeſſilibus. *Plum. ic. 175.*

533. HEISTERIA. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Drupa* calyce colorato maximo.
1663.

Coccinea. 1. HEISTERIA. *Sp. pl. 1663. Lauro affinis.*

534. QVISQVALIS. *Cal.* 5-fidus, filiformis. *Petala* 5. *Drupa* 5-angularis.
556.

indica. 1. QVISQVALIS. *Burm. ind. t. 32. f. 2.*

535. DAIS. *Involucr.* 4-phyllum. *Cor.* 4-ſ. 5-fida. *Bacca* 1-ſperma.
556.

cotinifol. 1. D. flor. quinquefidis.
octandra. 2. D. flor. quadrifidis octandris. *Mant. 69.*

536. MELASTOMA. *Cal.* 5-fidus, campanulatus. 558. *Petala* 5, calyci inſerta. *Bacca* 5-locularis, calyce obuoluta.

Acinodend. 1. M. fol. denticulatis ſubtrinerviis ouatis acutis.
Groſſularioides. 2. M. fol. denticulatis triplinerviis ouatis acuminatis.
ſcabroſa. 3. M. fol. denticulatis quinquenerviis cordatis ſcabris. ſubtus tomentoſis, ramis tomentoſo-villoſis.
hirta. 5. M. foliis denticulatis quinqueneruiis ouato-lanceolatis, caule hiſpido.
aſpera. 10. M. fol. integerrimis trineruiis lanceolatis ſcabris. *Rumph. amb. 4. t. 71.*
octandra. 11. M. fol. integerrimis trineruiis ouatis glabris margine hiſpidis.
holoſericea. 6. M. fol. integerrimis trineruiis oblongo-ouatis, ſubtus tomentoſis, racem. brachiatis, ſpicis bipartitis.
ſeſſilifol. 4. M. fol. integerrimis triplineruiis ſpatulatis ſeſſilibus ſubtus tomentoſis.
Malabathrica. 7. M. fol. integerrimis quinqueneruiis lanceolato-ouatis ſcabris.
laeuigata. 8. M. foliis integerrimis quinqueneruiis ouato-oblongis laeuiuſculis acuminatis margine laeuibus.
diſcolor. 9. M. fol. integerrimis quinqueneruiis oblongo-ouatis glabris margine laeuibus. Melaſtoma floribus octandris, fol. quinqueneruiis. *Jacq. amer. 130. t. 84.*
criſpata. 12. M. fol. integerrimis quinqueneruiis quaternis, ramis criſpatis.

537. KALMIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* hypocrateriformis: limbo ſubtus quinquecorni *Capſ.* 5-locularis. 560.

latifolia. 1. K fol. ouatis, corymb. terminalibus.
anguſtifolia. 2. K. fol. lanceolatis, corymb, lateralibus.

538. LEDVM. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* plana, 5-partita.
561. *Caps.* 5-locularis, basi dehiscens.

palustre. 1. LEDVM.

539. RHODODENDRON. *Cal.* 5-partitus. *Cor.*
562. subinfundibulif. *Stamm.* declinata. *Caps.* 5-locularis.

ferrugineum. 1. R. fol. glabris subtus leprosis, coroll. infundibuliformibus. *Jacq. obs. 26. t. 16. Corolla declinata, inaequalis.*

dauricum. 2. R. fol. glabris vtrinque nudis, coroll. rotatis. *Caulis nudus, proliferus, apice foliosus. Folia petiolata, oblonga, supra nuda, confertim punctata, subtus confertissime ferrugineo-punctata. Corollae violaceae, foliis ampliores. Stamina patentia, longitudine corollae. Stylus sanguineus.*

hirsutum. 3. R. fol. ciliatis nudis, coroll. infundibuliformibus.

Chamaecistus. 4. R. fol. ciliatis, coroll. rotatis.

ponticum. 5. R. fol. nitidis lanceolatis vtrinque glabris, racem. terminalibus.

maximum. 6. R. fol. nitidis oualibus obtusis venosis margine acuto reflexo, pedunc. vnifloris.

540. ANDROMEDA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* ouata:
563. ore 5-fido. *Caps.* 5-locularis.

tetragona. 1. A. pedunc. solitariis lateralibus, coroll. campanulatis, fol. oppositis imbricatis obtusis reuolutis.

hypnoides. 2. A. pedunc. solitariis terminalibus, coroll. campanulatis, fol. confertis subulatis.

caerulea. 3. A. pedunc. aggregatis, coroll. ouatis, fol. sparsis linearibus obtusis planis.

mariana. 4. A. pedunc. aggregatis, coroll. cylindricis, fol. alternis ouatis integerrimis.

Polyso-

Polifolia. 5. A. pedunc. aggregatis, coroll. ouatis, fol. alternis lanceolatis reuolutis.

Daboecia. 10. A. racemis ſecundis, flor. quadrifidis ouatis, fol. alternis lanceolatis reuolutis. Erica daboecii. *Sp. pl. 509. Racemus terminalis, ſimplex: Floribus alternis, ſecundis: Pedicellis vniſloris, ſubuiſcidis, ſubtus Bractea lineari.* Cal. *4-phyllus, ſubulatus, erectus, purpuraſcens, corolla quadruplo breuior, deciduus.* Corolla *violacea, cylindrico-oualis, A. polifoliae duplo maior, ore parum coarctato 4-fido; laciniis reflexis.* Stamina 8, *filamentis albis. Antherae longitudine filamentorum, vix corolla breuiores, ſuſcae, ſagittatae, apice truncatae foraminibus 2.* Stylus *filiformis, longitudine corollae. Stigma obtuſum, ſubquadrifidum. Facies tota Andromedae, Numerus Ericae eſt. Fructus eſt Capſula quadrilocularis quadrivalvis. miſit P. Collinſon.*

paniculata. 6. A. racem. ſecundis nudis paniculatis, coroll. ſubcylindricis, fol. alternis oblongis crenulatis.

racemoſa. 7. A. racem. ſecundis bracteatis, coroll. gibboſo-cylindricis, fol. alternis oblongis ſerratis.

arborea. 8. A. racem. ſecundis nudis, coroll. rotundo ouatis.

calyculata. 9. A. racem. ſecundis foliaceis, coroll. ſubcylindricis, fol. alternis lanceolatis obtuſis punctatis.

541. EPIGAEA. *Cal. exterior* 3-phyllus; *interior* 5-partitus. *Cor.* hypocrateriformis. *Capſ.* 5-locularis.
565.

repens. 1. EPIGAEA.

542. GAVLTHERIA. *Cal. exterior* 2-phyllus; *interior* 5-fidus. *Cor.* ouata. *Nectarium* mucronibus 10. *Capſ.* 5-locularis, veſtita calyce interiore baccato.
565.

procumbens. 1. GAVLTHERIA.

543. ARBVTVS. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* ouata: ore baſi pellucida. *Bacca* 5-locularis.
566.

Vnedo. 1. A. caul. arboreo. fol. glabris ſerratis, bacc. polyſpermis.

Andrach.

Andrach-ne. A. A. caule arboreo, fol. glabris ſubintegerrimis, bacc. polyſpermis.
acadienſis. 2. A. caul. procumbentibus, fol. ouatis ſubſerratis, flor. ſparſis, bacc. polyſpermis.
alpina. 3. A. caul. procumbentibus, fol. rugoſis ſerratis.
Vua vrſi. 4. A. caul. procumbentibus, fol. integerrimis.

544. CLETHRA. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Stigma* 566. 3-fidum. *Capſ.* 3-locularis, 3-valuis.

alnifolia. 1. CLETHRA. *Mill. ic. 181.*

545. PYROLA. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Capſ.* 5-567. locularis, angulis dehiſcens.

rotundif. 1. P. ſtamin. adſcendentibus, piſtillo declinato.
minor. 2. P. flor. racemoſis diſperſis, ſtaminibus piſtilisque rectis,
ſecunda. 3. P. racemo vnilaterali.
vmbellat. 4. P. pedunculis ſubumbellatis.
maculat. 5. P. pedunculis bifloris.
vniflora. 6. P. ſcapo vnifloro.

546. STYRAX. *Cal.* inferus. *Cor.* infundibuliformis. 635. *Drupa* 2-ſperma.

officinale. STYRAX. *Mill. ic. t. 260. Germen omnino ſuperum, nec inferum eſt, & Staminum numerus naturalis 10.*

547. SAMYDA. *Cal.* 5-partitus, coloratus. *Cor.* nul-557. la. *Capſ.* intus baccata, 3-valuis, 1-locularis. *Sem.* nidulantia.

paruiflora. 1. S. flor. decandris, fol. ouato-oblongis vtrinque glabris.
nitida. 2. S. flor. octandris, fol. cordatis glabris.
pinoſa. 3. S. flor. octandris, ramis ſpinoſis.
pubeſcens. 4. S. flor. dodecandris, fol. ouatis ſubtus tomentoſis.
ſerrulata. 5. S. flor. dodecandris, fol. ouato-oblongis ſerrulatis.

548. COPAIFERA. *Cal.* o. *Petala* 4. *Legum.* ouatum. *Sem.* 1, arillo baccato.
557.

officinalis. 1. COPAIFERA. Copaiba *Marcgr. braſ. 130. Folia alterna, pinnata, quadriiuga: foliolis altero latere anguſtioribus, alternis, exceptis vltimis.*

549. BVCIDA. *Cal.* 5-dentatus, ſuperus. *Cor.* o. *Bacca* monoſperma.
556.

Buceras. A. BVCIDA.

DIGYNIA.

550. ROYENA. *Cal.* urceolatus. *Cor.* 1-petala, limbo reuoluta. *Capſ.* 1-locularis, 4-valuis.
568.

lucida. 1. R. fol. ouatis ſcabriuſculis.
villoſa. 4. R. fol. cordatis oblongis ſubtus tomentoſis. *Habitat ad* Cap. b. ſpei. *Dau. Royen.* ♄. Similis *Royenae lucidae, ſed* Rami *villoſi.* Folia *elliptica ſ. oblonga, baſi cordata, ſubtus tomentoſa, obtuſiuſcula, breuiter petiolata petiolis villoſis.* Flores *axillares, nutantes, ſolitarii: pedunculis villoſis longitudine florum.* Bracteae 2, *oppoſitae, ouatae, acutae, pubeſcentes, calyce maiores eoque ſubiectae, deciduae.*
glabra. 2. R. foliis lanceolatis glabris.
hirſuta. 3. R. foliis lanceolatis hirſutis.

551. HYDRANGEA. *Capſ.* 2-locularis, 2-roſtris, circumſciſſa.
568.

arboreſc. 1. HYDRANGEA. *Mill. ic. t. 251.*

552. CVNONIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* bilocularis, acuminata, polyſperma. *Styli* flore longiores.
569.

capenſis. A. CYNONIA. *Glandulaeſpatiformes, axillares, petiolatae.*
553.

553. 569. CHRYSOSPLENIVM. *Cal.* 4-f. 5-fidus, coloratus. *Cor.* o. *Capſ.* 2-roſtris, 1-locularis, polyſperma.

alternif. 1. C. foliis alternis.
oppoſitif. 2. C. foliis oppoſitis.

554. 570. SAXIFRAGA *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 2-roſtris, 1-locularis, polyſperma.

* *Foliis indiuiſis, caule ſubnudo.*

Cotyledon. 1. S. fol. radicatis aggregatis lingulatis cartilagineo-ſerratis, caul. paniculato.
mutata. 2. S. fol. radicalibus aggregatis lingulatis cartilagineo-ſerratis, caule racemoſo.
penſylua-nica. 3. S. fol. lanceolatis denticulatis, caul. nudo paniculato, flor. ſubcapitatis.
androſac. 4. S. fol. lanceolatis obtuſis piloſis, caule nudo bifloro.
caeſia. 5. S. fol. linearibus perforato-punctatis aggregatis recuruatis, caul. multifloro. Sedi ſpecies minima. *Geſn faſc. 24. t. 11. f. 30. Foliorum baſis ciliata. Schmied.*
burſeriana. 6. S. fol. aggregatis impricatis triquetris ſubulatis laeuibus, caule ſubnudo vnifloro. *Varietatem huius caulibus 5-floris: floribus faſtigiatis e monte Canzo Italiae. Vandelli.*
ſedoides. 7. S. fol. aggregatis alternis oppoſitisque ſublanceolatis, flor. pedunculato. *Caulis ramoſiſſimus, filiformis, depreſſus, apicibus terminatis foliis aggregatis, linearibus, laeuibus. Pedunculus ſaepe vniflorus, rarius 2-ſ- 3-florus. Flos ſuperus.*
bryoides. 8. S. fol. ciliatis inflexis imbricatis, caul. nudiuſculo vnifloro,
bronchialis. 9. S. fol. imbricatis ſubulatis ciliatis ſpinoſis, caul. ſubnudo multifloro.
ſtellaris. 10. S. fol. ſerratis, caul nudo ramoſo, petal. acuminatis.
craſſifol. 11. S. fol. oualibus retuſis obſolete ſerratis petiolatis, caul. nudo, panic. conglomerata. *Linn. dec. 2. p. 27. t. 14.*

niualis. 12. S. fol. obouatis crenatis ſubſeſſilibus, caul. nudo, flor. congeſtis.

punctata. 13. S. fol. ſubrotundis dentatis longius petiolatis, caule nudo.

umbroſa. 14. S. fol. obouatis ſubretuſis cartilagineo-crenatis, caul. nudo paniculato.

hirſuta. 16. S. fol. cordato-oualibus retuſis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato.

cuneifolia. 15. S. fol. cuneiformibus obtuſiſſimis repandis, caul. nudo paniculato.

Geum. 17. S. fol. reniformibus dentatis, caule nudo paniculato

* * *Foliis indiuiſis, caule folioſo.*

oppoſitifolia. 18. S. fol. caulinis ouatis oppoſitis imbricatis: ſummis ciliatis. *varietas ſterilis. Geſn. faſc. 26. t. 9. f. 3.*

aſpera. 19. S. fol. caulinis lanceolatis alternis ciliatis, caul. procumbentibus. *Ger. prou. 423.*

autumnalis. 20. S. fol. caulinis linearibus alternis ciliatis: radicalibus aggregatis.

Hirculus. 21. S. fol. caulinis lanceolatis alternis nudis inermibus, caul. erecto. *Caulis ſimplex, ſaepe biflorus. Calix reflexus. Petala neruoſa. Flor. dan. t. 200.*

aizoides. 22. S. fol. caulinis lineari-ſubulatis ſparſis nudis inermibus, caul. decumbentibus. *Oed. dan. t. 72.*

rotundif. 23. S. fol. caulinis reniformibus dentatis petiolatis, caul. paniculato.

granulata. 20. S. fol. caulinis reniformibus lobatis, caul. ramoſo, radice granulata.

* * * *Foliis lobatis, Caulibus erectis.*

bulbifera. 25. S. fol. palmato-lobatis: caulinis ſeſſilibus, caul. ramoſo bulbifero.

cernua. 26. S. fol. caulinis palmatis petiolatis, caul. ſimpliciſſimo vnifloro bulbifero. *Oed. dan. t. 22.*

riuularis. 28. S. fol. caulinis palmatis: ſummo florali ouato, caul. ſimplici ſubbifloro. *Oed. dan. t. 118.*

geranioides. 30. S. fol. radicalibus reniformibus quinquelobis multifidis, caulinis linearibus, caul. ſubnudo ramoſo.

aiugifol. 31. S. fol. radicalibus palmato-quinquepartitis, caulinis linearibus indiuiſis, caul. adſcendentibus multifloris.

Saxifraga. groen-

graenlandica. 29. S. fol. caulinis palmato-multifidis ſparſis : laciniis acutis, caule erecto.

ſibirica. 27. S. fol. caulinis reniformibus palmatis piloſis, caul. pedunculisque filiformibus.

tridactylites. 32. S. fol. caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoſo.

petraea. 33. S. fol. caulinis palmato-tripartitis, laciniis ſubtrifidis, caule ramoſiſſimo laxo.

caeſpitoſa. 34. S. fol. radicatis aggregatis linearibus integris trifidisque, caul. erecto ſubnudo ſubbifloro. *Oed. dan. t.* 71. *Planta glabra: Ramulis ſummis viſcidis. Corolla flaua, lineata.*

* * * * *Foliis lobatis, Caulibus procumbentibus.*

cymbalaria. 35. S. fol. caulinis cordatis trilobis integrisque, caul. procumbentibus.

hederac. 36. S. fol. caulinis ouatis lobatis, caul. filiformi flaccido.

hypnoides. 30. S. fol. caulinis linearibus integris trifidisue, ſtolonib. procumbentibus, caul. erecto nudiuſculo. *Planta viſcoſa. Folia longius petiolata.*

adſcendens. 31. S. fol. caulinis cuneiformibus apice dentatis, caul. adſcendente ſubuilloſo.

555. TIARELLA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala, calyci inſerta: petalis integris. *Capſ.* 1-locularis, 2-ualuis: valuula altera maiore. 580.

cordifol. 1. T. foliis cordatis.

trifoliata. 2. T. foliis ternatis.

556. MITELLA. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala, calyci inſerta: petalis pinnatifidis. *Capſ.* 1-locularis, 2-valuis, valuulis aequalibus. 580.

dyphylla. 1. M. ſcapo diphyllo.

nuda. 2. M. ſcapo nudo.

557. SCLERANTHUS. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* nulla. *Sem.* 2, calyce incluſa.
580.

annuus. 1. S. calyc. fructus patulis.
perennis. 2. S. calyc. fructus clauſis.
polycarpos. 3. S. calyc. fructus patentiſſimis ſpinoſis, caul. ſubuilloſo.

558. GYPSOPHILA. *Cal.* 1-phyllus, campanulatus, angulatus. *Petala* 5, ouata, ſeſſilia. *Capſ.* globoſa, 1-locularis.
581.

repens. 2. G. fol. lanceolatis, ſtamin. corolla emarginata breuioribus. *Ger. prov.* 409. *t.* 15. *f.* 2. (*excluſo Plukenetii ſynonymo.*)
proſtrata. 3. G. fol. lanceolatis laeuibus, caul. diffuſis, piſtil. corolla campanulata longioribus. Alſine anguſtifolia caryophylloides multiflora glabra purpuraſcens, radice aſtragaliti. *Pluk. alm.* 22. *t.* 75. *f.* 2.
paniculata. 8. G. fol. lanceolatis ſcabris, coroll. reuolutis, flor. dioicis.
tomentoſa. 7. G. fol. lanceolatis ſubtrineruiis tomentoſis, caul. pubeſcente.
altiſſima. 5. G. fol. lanceolatis ſubtrineruiis, caulibus rectis.
Struthium. 6. G. fol. linearibus: axillaribus confertis teretibus.
faſtigiata. 4. G. fol. lanceolato-linearibus obſolete triquetris laeuibus obtuſis ſecundis.
perfoliat. 9. G. fol. ouato-lanceolatis ſemiamplexicaulibus.
muralis. 11. G. fol. linearibus planis, calycibus aphyllis, caul. dichotomo, petalis crenatis.
rigida. 10. G. fol. lineari-lanceolatis planis. caule dichotomo, pedunc bifloris, petal. emarginatis.
ſaxifraga. 12. G. fol. linearibus, calyc. angulatis ſquamis quatuor, coroll. emarginatis. *Caulis palmaris, erectus, filiformis, dichotomus. Folia linearia, acuta. Calyx cinctus foliolis* 4, *tubo dimidio breuioribus. Petala integerrima, emarginata, incarnato-pallida, baſi ſtriis* 3 *purpureis obſoletis.*

559. SAPONARIA. *Cal.* 1-phyllus, nudus. *Petala* 5, vnguiculata. *Capſ.* oblonga, 1-locularis.
584.

officinalis. 1. S. calyc. cylindricis, fol. ouato-lanceolatis.
Vaccaria. 3. S. calyc. pyramidatis quinquangularibus, fol. ouatis acuminatis ſeſſilibus.
cretica. 2. S. calyc. quinquangularibus ſtriatis, caul. erecto ſubdichotomo, fol. ſubulatis.
illyrica. 7. S. calyc. ſubcylindricis, caul. erecto viſcido-purpuraſcente: ramis alternis, coroll. punctatis. *Mant.* 70.
Ocymoides. 4. S. calyc. cylindricis villoſis, caul. dichotomis procumbentibus.
orientalis. 5. S. calyc. cylindricis villoſis, caule dichotomo erecto patulo.
lutea. 6. S. calyc. teretibus, coroll. coronatis, flor. ſubumbellatis, fol. ſublinearibus canaliculatis.

560. DIANTHUS. *Cal.* cylindricus, 1-phyllus: baſi ſquamis 4. *Petala* 5, vnguiculata. *Capſ.* cylindrica, 1-locularis.
589.

* *Flores aggregati.*

barbatus. 1. D. flor. aggregatis faſciculatis, ſquamis calycinis ouato-ſubulatis tubum aequantibus, fol. lanceolatis.
carthuſianorum. 2. D. flor. ſubaggregatis, ſquamis calycinis ouatis ariſtatis tubum ſubaequantibus, fol. trineruiis.
Armeria. 3. D. flor. aggregatis faſciculatis, ſquamis calycinis lanceolatis villoſis tubum aequantibus.
prolifer. 4. D. flor. aggregatis capitatis, ſquamis calycinis ouatis obtuſis muticis tubum ſuperantibus.

* * *Flores ſolitarii, plures in eodem caule.*

diminutus. 5. D. flor. ſolitariis: ſquamis calycinis octonis florem ſuperantibus. *Nimis affinis D. prolifero.*
Caryophyllus. 6. D. flor. ſolitariis, ſquamis calycinis ſubouatis breuiſſimis, corollis crenatis.

pomeridianus. 18. D. flor. ſolitariis : ſquamis calycinis binis cordatis breviſſimis, coroll. emarginatis ſubintegerrimis. *Sp. pl.* 1673.

deltoides. 7. D. flor. ſolitariis, ſquamis calycinis lanceolatis binis, coroll. crenatis.

glaucus. 8. D. flor. ſubſolitariis, ſquamis calycinis lanceolatis quaternis breuibus, coroll. crenatis.

chinenſis. 9. D. flor. ſolitariis, ſquamis calycinis ſubulatis patulis tubum aequantibus, coroll. crenatis.

monſpeliacus. 10. D. flor. ſolitariis, ſquamis calycinis ſubulatis longitudine tubi, coroll. multifidis, caule erecto.

plumarius. 12. D. flor. ſolitariis, ſquamis calycinis ſubouatis breuiſſimis, coroll. multifidis fauce pubeſcentibus. Caryophyllus ſylueſtris flore laciniato ſine corniculis odoro. *Bauh. pin.* 210.

ſuperbus. 11. D. flor. paniculatis, ſquamis calycinis breuibus acuminatis, coroll. multifido-capillaribus, caul. erecto. *Iacq. obſ.* 40. *t.* 25.

* * * *Caule vnifloro herbaceo.*

arenarius. 13. D. caul. ſubunifloris, ſquamis calycinis ouatis obtuſis, petalis multifidis, fol. linearibus.

alpinus. 14. D. caule vnifloro, coroll. crenatis, ſquamis calycinis exterioribus tubum aequantibus, fol. linearibus obuſis.

virgineus. 15. D. caul. ſubunifloro, coroll. crenatis, ſquamis calycinis breuiſſimis, fol. ſubulatis.

* * * * *Fruteſcentes.*

arboreus. 16. D. caule fruticoſo, foliis ſubulatis.

fruticoſ. 17. D. caule fruticoſo, foliis lanceolatis.

TRIGYNIA.

561. CUCUBALUS. *Cal.* inflatus. *Petala* 5, vnguiculata, abſque corona ad faucem. *Caps.* 3-locularis. 591.

baccifer. 1. C. calyc. campanulatis. petal. diſtantibus, pericarpiis coloratis, ram. diuaricatis.

Behen.

Behen. 2. C. calyc. ſubgloboſis glabris reticulato-venoſis, capſ. trilocularibus, coroll. ſubnudis.

ſabarius. 3. C. fol. obouatis carnoſis.

viſcoſus. 4. C. flor. lateralibus vndique decumbentibus, caul. indiuiſo, fol. baſi reflexis.

ſtellatus. 5. C. foliis quaternis.

aegyptiacus. 7. C. flor. erectis, petal. emarginatis retroflexis: vtrinque denticulo notatis.

italicus. 9. C. petal. ſemibifidis, calycibus clauatis, panicula dichotoma erecta, genitalibus declinatis, caul. erecto.

tataricus. 8. C. petal. bipartitis, flor. ſecundis decumbentibus, pedunc. oppoſitis ſolitariis erectis, caule ſimpliciſſimo.

ſibiricus. 7. C. petal. emarginatis, flor. ſubuerticillatis: verticillis umbellatis aphyllis.

catholicus. 10. C. petal. bipartitis, flor. paniculatis, ſtamin. longis, fol. lanceolato-ouatis.

molliſſimus. 11. C. petalis ſemibifidis, panicula dichotoma, caule foliisque holoſericeis: radicalibus ſpatulatis.

Otites. 12. C. flor. dioicis, petal. linearibus indiuiſis.

reflexus. 13. C. flor. ſpicatis alternis ſecundis ſubſeſſilibus, petalis ſubbipartitis obſoletis. Lychnis meridionalium annua hirſuta, floribus vno verſu diſpoſitis. *Moriſ. hiſt. 2. p. 544. Rai. hiſt. 996.*

ſaxifragus. 14. C. petal. bifidis, calyc. ſtriatis: terminalibus ſubſeſſilibus; lateralibus pedunculatis. *Mant. 71.*

pumilio. 15. C. caul. vnifloris flore breuioribus. *Mant. 71.*

562. SILENE. *Cal.* ventricoſus. *Petala* 5, vnguiculata: coronata ad faucem. *Capſ.* 3-locularis.
594.

* *Floribus ſolitariis lateralibus.*

anglica. 1. S. hirſuta, petal. emarginatis, flor. erectis, fruct. reflexis pedunculatis alternis.

luſitanica. 2. S. hirſuta, petal. dentatis indiuiſis, flor. erectis, fructibus diuaricato-reflexis alternis.

quinquev. 3. S. petal. integerrimis ſubrotundis, fruct. erectis alternis.

nocturna. 4. S. flor. ſpicatis alternis ſecundis ſeſſilibus, petalis bifidis.

gallica. 5. S. flor. ſubſpicatis alternis ſecundis, petal. indiuiſis, fruct. erectis.

ceraſtoides. 6. S. hirſuta, petal. emarginatis, fructific. erectis, calyc. ſubſeſſilibus ſubpiloſis.

** *Floribus lateralibus confertis.*

mutabilis. 7. S. petal. bifidis, calyc. angulatis pedunculatis, fol. lanceolato-linearibus.

nutans. 8. S. petal. bifidis, flor. lateralibus ſecundis cernuis, panicula nutante.

amoena. 9. S. petal. bifidis: coronula ſubcoadunata, flor. ſecundis, pedunc. oppoſitis trifloris, ramis alternis.

paradoxa. 35. S. flor. racemoſis, calyc. decem-ſulcatis viſcidis, floribus aliis, ſtaminibus exſertis, aliis incluſis. *Sp. pl.* 1673. Lychnis viſcoſa peregrina noctiflora odorata. *Zanon. hiſt. t.* 109. *Petala bifida ſunt.*

fruticoſa. 10. S. petal. bifidis, caule fruticoſo, fol. lato-lanceolatis, panic. trichotoma.

bupleuroides. 14. S. petal. bifidis, flor. pedunculatis oppoſitis bractea breuioribus, fol. lanceolatis acutis glabris.

gigantea. 13. S. petal. bifidis, fol. radicalibus cochleariformibus obtuſiſſimis, flor. ſubuerticillatis.

craſſifolia. 11. S. petal. emarginatis, fol. ſuborbiculatis carnoſis hirſutis, racemo ſecundo.

viridiflora. 12. S. petalis ſemibifidis, fol. ouatis ſcabriuſculis acutis, panicula elongata ſubaphylla.

*** *Floribus ex dichotomia caulis.*

conoidea. 15. S. calyc. fructus globoſis acuminatis ſtriis triginta, fol. glabris, petal. integris.

conica. 16. S. calyc. fructus conicis ſtriis triginta, fol. mollibus, petal. bifidis.

Behen. 17. S. calyc. glabris ouatis venoſo-reticulatis.

ſtricta. 18. S. petal. emarginatis, calyc. glabris reticulato-venoſis acuminatis pedunculo longioribus, caule dichotomo ſtricto.

pendula. 19. S. calyc. fructiferis pendulis inflatis: angulis decem ſcabris.

noctiflor. 20. S. calyc. decemangularibus : dentibus tubum aequantibus, caul. dichotomo, petal. bifidis.
virginic. 21. S. calyc. floris cylindricis, panic. dichotoma.
antirrhina. 22. S. petal. emarginatis, calyc. ouatis, pedunc. trifidis, fol. lanceolatis ſubciliatis.
rubella. 23. S. erecta laeuis, calyc. ſubgloboſis glabris venoſis, coroll. inapertis.
inaperta. 24. S. caule dichotomo paniculato, calyc. laeuibus, petal. breuiſſimis emarginatis, fol. glabris lanceolatis. *Sp. pl.* 19. 21.
portenſis. 25. S. caul. dichotomo paniculato, calyc. ſtriatis, petal. bifidis, fol. linearibus.
cretica. 26. S. erecta laeuis, calyc. erectis decemangularibus, petalis bifidis.
Muſcipula. 27. S. petal. bifidis, caule dichotomo, flor. axillaribus ſeſſilibus, fol. glabris.
polyphyll. 28. S. fol. faſciculatis ſetaceis : ramorum florentium oppoſitis.
Armeria. 29. S. flor. faſciculatis faſtigiatis, fol. ſuperioribus cordatis glabris, petal. integris.
quadrifida. 30. S. petal. quadrilobis, caul. dichotomo, flor. pedunculatis, fol. glabris recuruis.
rupeſtris. 31. S. flor. erectis, petal. emarginatis, calyc. toretibus, fol. lanceolatis.
Saxifraga. 32. S. caul. ſubunifloris, pedunc. longitudine caulis, floribus hermaphroditis femineisque, petal. bifidis.
valleſia. 33. S. caul. ſubunifloris decumbentibus, fol. lanceolatis tomentoſis longitudine calycis.
acaulis. 34. S. acaulis depreſſa, petal. emarginatis.

563. STELLARIA. *Cal.* 5-phyllus, patens. *Petala* 5, bipartita. *Capſ.* 1-locularis, polyſperma.

603.

nemorum. 1. S. fol. cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramoſis.
dichotoma. 2. S. fol. ouatis ſeſſilibus, caule dichotomo, flor. ſolitariis, pedunc. fructiferis reflexis.
radians. 3. S. fol. lanceolatis ſerrulatis, petal. quinque partitis.
Holoſtea. 4. S. fol. lanceolatis ſerrulatis, petal. bifidis.

graminea. 5. S. fol. linearibus integerrimis, flor. paniculatis.
Ceraſtoid. 6. S. fol. oblongis, pedunc. ſubbifloris.
biflora. 7. S. fol. ſubulatis, ſcap. ſubbifloris, petal. emarginatis, germin. oblongis, calyc. ſtriatis.
arenaria. 8. S. fol. ſpatulatis, caul. erecto bifido, ramis alternis, petal. emarginatis.

564. ARENARIA. *Cal.* 5-phyllns, patens. *Petala* 5, integra. *Capſ.* 1-locularis, polyſperma.

605.

peploides. 1. A. fol. ouatis acutis carnoſis.
tetraquet. 2. A. fol. ouatis carinatis recuruis quadrifariam imbricatis. Caryophyllus ſaxatilis ericaefolius ramoſus repens. *Bauh. pin.* 211. *prodr.* 125. *Burſ. XI.* 135. *ß.* Gypſophila aggregata. *Sp. pl.* 581. *Caules digitales, plures, ſimpliciſſimi. Folia linearia, carinata, recuruata, canaliculata, mucronata, ſtriata, glabra, breuiſſima, approximata, baſi ſubciliata et connata. Capitulum florum pedunculatum, faſtigiatum, ſubquinqueflorum floribus ſeſſilibus. Calyx 5-phyllus, foliolis lanceolatis: exterioribus maioribus. Petala 5, ſeſſilia, lanceolata. Styli 3. Capſula 1-locularis, 5-valuis. Semina plura. D. Schreber.*
biflora. 17. A. fol. obouatis obtuſis, caul. procumbentibus, pedunc. bifloris lateralibus. *Mant.* 71.
lateriflor. 3. A. fol. ouatis obtuſis, pedunc. laterali bifloro.
triineruia. 4. A. fol. ouatis acutis petiolatis neruoſis.
ciliata. 15. A. fol. ouatis neruoſis ciliatis acutis.
multicaulis. 5. A. fol. ouatis enerviis ſeſſilibus acutis: coroll. calyce maioribus. *Folia magis minusue ciliata. Flos maximus. Iacq.*
ſerpylli folia. 6. A. fol. ſubouatis acutis ſeſſilibus, coroll. calyce breuioribus.
montana. 7. A. fol. lineari-lanceolatis ſcabris, caulibus ſterilibus longiſſimis procumbentibus.
rubra. 8. A. fol. filiformibus, ſtipul. membranaceis vaginantibus.
media. 9. A. fol. linearibus carnoſis, ſtipulis membranaceis, caul. pubeſcentibus.

bauarica. 10. A. fol. ſemicylindricis carnoſis obtuſis, petal. lanceolatis, pedunc. terminalibus ſubbinatis.

gypſophiloides. 18. A. fol. linearibus: radicalibus ſetaceis, panicula ſubpubeſcente, petalis lanceolatis. *Mant.* 71.

ſaxatilis. 11. A. fol. ſubulatis, caul. paniculatis, calyc. foliolis ouatis obtuſis.

verna. 19. A. fol. ſubulatis, caul. paniculatis, calyc. acuminatis ſtriatis. *Mant.* 72.

iuniperina. 20. A. fol. ſubulatis ſpinoſis, caul. erectis, calyc. ſtriatis, capſul. oblongis. *Mant.* 72.

tenuifol. 12. A. fol. ſubulatis, caul. panic. lato, capſ. erectis, petalis calyce breuioribus lanceolatis. *Calycis foliola multum acuminata ſ. criſtata, ſubtus lineis 2 viridibus picta. Petala lato-lanceolata, calyce ½ breuioria. Folia ſubulata, baſi connata.*

laricifol. 13. A. fol. ſetaceis, caule ſuperne nudiuſculo, calyc. ſubhirſutis. *Magn. hort. t.* 11.

ſtriata. 14. A. fol, linearibus erectis appreſſis, calyc. oblongis ſtriatis.

grandiflora. 17. A. fol. ſubulatis ſtrictis: radicalibus confertis, caulib. vnifloris. *Calycis foliola caulinis latiora, ſtriata, rigida. Capſulae oblongae, longitudine calycis. Varietas caule trifloro miſſa a D. Turra.*

565. CHERLERIA. 605.

Cal. 5-phyllus. *Nectaria* 5-bifida, petaloidea. *Antherae* alternae ſteriles. *Capſ.* 3-locularis, 3-valuis.

Sedoides. 1. CHERLERIA. *Folia oppoſita, linearia, margine ſcabra, baſi connata in vaginam; a caſu foliorum remanent vaginae cum carina foliorum, quibus caulis inferne obuestitur; hinc affinitas Caryophyllorum.*

566. GARIDELLA. 608.

Cal. 5-phyllus, petaloideus. *Nectaria* 5, bilabiata, bifida. *Capſ.* 2, connexae, polyſpermae.

Nigellaſt. 1. GARIDELLA.

567. MALPIGHIA. *Cal.* 5-phyllus basi extus poris melliferis. *Petala* 5, subrotunda, vnguiculata. *Bacca* 1-locularis, 3-sperma.
609.

glabra. 1. M. fol. ouatis integerrimis glabris, pedunc vmbellatis.
punicifol. 2. M. fol. ouatis integerrimis glabris, pedunc vnifloris.
nitida. 3. M. fol. lanceolatis integerrimis glabris, spicis lateralibus.
vrens. 4. M. fol. oblongo-ouatis: setis subtus decumbentibus rigidis, pedunc. vnifloris aggregatis. *Mill. fig.* 181. *f.* 1. *Plum. ic.* 167. *f.* 1.
angustifolia. 4. M, fol. lineari-lanceolatis: setis vtrinque decumbentibus rigidis, pedunc. vmbellatis.
crassifolia. 6. M. fol. ouatis integerrimis subtus tomentosis, racem. terminalibus.
verbascifolia. 7. M. fol. lanceolato-ouatis tomentosis integerrimis, racem. terminalibus.
aquifolia. 8. M. fol. lanceolatis dentato-spinosis subtus hispidis.
coccigera. 9. M. fol. subouatis dentato-spinosis.

568. BANISTERIA. *Cal.* 5-partitus basi extus poris melliferis. *Petala* subrotunda, vnguiculata. *Sem.* 3, membranaceo-alata.
611.

angulosa. 1. B. fol. sinuato-angulosis.
purpurea. 2. B. fol. ouatis, spicis lateralibus, semin. erectis.
laurifolia. 3. B. fol. ouato-oblongis rigidis, racemis terminalibus.
benghalensis. 4. B. fol. ouato-oblongis acuminatis, racem. lateralibus, semin. patentibus.
dichotom. 5. B. fol. ouatis, ramis dichotomis.
fulgens. 6. B. fol. subouatis subtus tomentosis, racem. brachiatis, pedunc. vmbellatis.
brachiata. 7. B. fol. subouatis, ramis brachiatis, semin. introrsum. angustioribus.

569. HIRAEA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* ſubrotunda, vnguiculata. *Sem.* 3, bialata. *Gen. plant. edit.* 6. *n.* 574.

reclinata. 1. HIRAEA. *Iacq. amer.* 137. *Habitat in* Carthagena ♄. *diſtinguenda a Triopteride.*

570. TRIOPTERIS. *Cal.* 5-partitus. *Petala* mentiuntur germinis alae 6. *Sem.* 3, bialata. *Gen. plant. edit.* 5. *n.* 510.

jamaicenſis. 1. TRIOPTERIS.

571. ERYTHROXYLON. 612. *Cal.* turbinatus. *Cor.* petalis baſi ſquamula nectarifera emarginata. *Stam.* baſi connexa. *Drupa* 1-locularis.

areolatum. 1. E. fol. obouatis. *Iacq. amer.* 134. *t.* 87. *f.* 1.
hauanenſe. 2. E. fol. ouatis. *Iacq. amer.* 135. *t.* 87. *f.* 2.

PENTAGYNIA.

572. AVERRHOA. 613. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, ſuperne patentia. *Pomum* 5-gonum, 5-loculare.

Bilimbi. 1. A. caudice nudo fructificante, pomis oblongis obtuſ-angulis.
Carambola. 2. A. axillis foliorum fructificantibus, pomis oblongis acutangulis.
acida. 3. A. ramis nudis fructificantibus, pomis ſubrotundis.

573.

573. SPONDIAS. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. 613. *Drupa* nucleo 5-loculari.

Mombin. 1. S. foliis petiolo communi compreſſo. Spondias *Myrobalanus* racemis ſparſis, foliis multo breuioribus. *Iacq. amer.* 139. *t.* 88. Prunus americana oſſiculo magno ex filamentis lignoſis reticulatim conflato. *Pluk. alm.* 307. *t.* 218. *f.* 3.

Myrobalanus. 2. S. petiolis teretibus: foliolis nitidis acuminatis. Spondias. *Mombin* racemis terminalibus longitudine, folia aequantibus. *Iacq. amer.* 138. Arbor nuci iuglandi ſimilis 5. ſ. Hobos. *Bauh. pin.* 417.

574. COTYLEDON. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 1-petala. 614. *Squamae* nectariferae 5, ad baſin germinis. *Capſ.* 5.

orbiculat. 1. C. fol. orbiculatis carnoſis planis integerrimis.

ſpuria. 2. C. fol. ſpatulato-orbiculatis carnoſis integerrimis. *Folia naturaliter oppoſita; monſtroſa variant alterna.*

hemiſph. 3. C. fol. ſemiglobooſis.

ſerrata. 4. C. fol. oualibus crenatis, caule ſpicato.

ſpinoſa. 5. C. fol. oblongis ſpinoſo-mucronatis, caule ſpicato ſimpliciſſimo,

vmbilicus. 6. C. fol. cucullato-peltatis ſerrato-dentatis alternis, caule ramoſo, flor. erectis.

laciniata. 6. C. fol. laciniatis, flor. quadrifidis.

hiſpanica. 7. C. fol. oblongis ſubteretibus, flor. faſciculatis.

575. SEDVM. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Squamae* 616. nectariferae 5, ad baſin germinis. *Capſ.* 5.

* *planifolia.*

verticill. 1. S. foliis quaternis.

Telephium. 2. S. fol. planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto.

Anacampſeros. 3. S. fol. cuneiformibus integerrimis, caul. decumbentibus, flor. corymboſis. *Habitat in* Galloprouinciae *rupibus.*

Aizo-

Aizoon. 4. S. fol. lanceolatis ſerratis planis, caule erecto, cyma ſeſſili terminali.

hybridum. 5. S. fol. cuneiformibus concauis ſubdentatis aggregatis, ram. repentibus, cyma terminali.

ſtellatum. 7. S. fol. planiuſculis angulatis, flor. lateralibus ſeſſilibus ſolitariis.

Cepaea. 8. S. fol. planis, caule ramoſo, floribus paniculatis.

libanoticum. 6. S. fol. radicalibus faſciculatis ſpatulato-lanceolatis caule ſubnudo ſimpliciſſimo.

** *teretifolia.*

daſyphyllum. 9. S. fol. oppoſitis ouatis obtuſis carnoſis, caule infirmo, flor. ſparſis.

reflexum. 10. S. fol. ſubulatis ſparſis baſi ſolutis: inferioribus recuruatis.

rupeſtre. 11. S. fol. ſubulatis quinquefariis confertis baſi ſolutis, flor. cymoſis.

hiſpanicum. 12. S. fol. teretiuſculis acutis: radicalibus faſciculatis, cyma pubeſcente.

album. 13. S. fol. oblongis obtuſis teretiuſculis ſeſſilibus patentibus, cyma ramoſa.

acre. 15. S. fol. ſubouatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis alternis, cyma trifida.

ſexangulare. 16. S. fol. ſubouatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis ſexfariam imbricatis.

annuum. 17. S. caul. erecto ſolitario annuo, fol. ouatis ſeſſilibus gibbis alternis, cyma recurua.

villoſum. 18. S. caule erecto, fol. planiuſculis pedunculisque ſubpiloſis. *Oed. dan. t.* 24.

atratum. 19. S. caule erecto, florib. corymboſis faſtigiatis. *Sp. pl.* 1673. Sedum ſaxatile, atro-rubentibus floribus. *Bauh. pin.* 283.

* *Sedum rubens; vide Craſſul. rub.*

576. PENTHORUM. 620.

Cal. 5-fidus. *Petala* nulla ad quinque. *Capſ.* 5-cuſpidata, 5-locularis.

ſedoides. 1. PENTHORUM.

577. SURIANA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Styli* inſerti lateri interiori germinum. *Sem.* 5, nuda.
624.

maritima. 1. SURIANA. Thymelaeae facie frutex maritimus tetraſpermus. *Sloan. iam.* 2. *p.* 29. *t.* 162. *f.* 4.

1235. GRIELUM. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Filamenta* perſiſtentia. *Pericarpia* 5, monoſperma.

tenuifolium. 1. GRIELUM. *Gen. plant.* 578. Ranunculo-platycarpos. *Burm. afr.* 145. *t.* 53. *obſ. in Generibus plant. ſtamina (non* 5*) ſed decem eſſe.*

578. OXALIS. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* vnguibus connexa. *Capſ.* angulis dehiſcens, 5-gona.
620.

* *Scapo radicali.*

Acetoſella. 1. O. ſcapo vnifloro, fol. ternatis, radice ſquamoſa articulata.

purpurea. 2. O. ſcapo vnifloro, foliis ternatis emarginatis ciliatis. Petioli *piloſi.* Calyx *pubeſcens.* Corolla *purpuraſcens tubo flauo.* Filamenta 5 *exteriora breuiora baſi connata, dente diſtinguente ſingula interiora.* Stigmata *plumoſa, proſtantia, extra filamenta longiora.*

longiflor. 3. O. ſcapo vnifloro, fol. ternatis ſemibifidis: lobis lanceolatis.

flaua. 4. O. ſcapo vnifloro, fol. ternatis bipartitis.

violacea. 5. O. ſcapo vmbellifero, fol. ternatis obcordatis, calyc. apice calloſis.

Pes capr. 6. O. ſcapo vmbellifero, fol. ternatis ſubbipartitis: apice ſubtus calloſis.

ſenſitiua. 7. O. ſcapo vmbellifero, fol. pinnatis.

* * *Foliis caulinis alternis.*

verſicolor. 8. O. pedunc. vnifloris, caule ramoſo, fol. paſſim verticillatis linearibus emarginatis apice ſubtus barbatis.

incra-

incarnata. 9. O. pedunc. vnifloris, caule ramoſo bulbifero, fol. paſſim verticillatis: foliolis obcordatis.
hirta. 10. O. pedunc. vnifloris, caule ramoſo, fol. ſeſſilibus: foliolis lanceolatis.
cornicul. 11. O. pedunc. vmbelliferis, caule ramoſo diffuſo.
ſtricta. 12. O. pedunc. vmbelliferis, caule ramoſo erecto.
fruteſcens. 13. O. pedunc. vmbelliferis, caule fruticoſo, fol. ternatis ouatis: intermedio petiolato.
barrelieri. 14. O. pedunculis bifidis racemoſis, caule ramoſo erecto. *Fewill. peruv. 2. t. 23.*

579. AGROSTEMMA. *Cal.* 1-phyllus, coriaceus. 624. *Petala* 5, vnguiculata: *Limbo* obtuſo, indiuiſo. *Capſ.* 1-locularis.

Githago. 1. A. hirſuta, calyc. corollam aequantibus, petal. integris nudis.
Coeliroſa. 2. A. glabra, fol. lineari-lanceolatis, petal. emarginatis coronatis.
Coronar. 3. A. tomentoſa, fol. ouato-lanceolatis, petal. emarginatis coronatis ſerratis.
Flos iouis. 4. A. tomentoſa, petal. emarginatis.

580. LYCHNIS. *Cal.* 1-phyllus, oblongus, laeuis. 652. *Petala* 5, vnguiculata: *Limbo* ſubbifido. *Capſ.* 5-locularis.

chalced. 1. L. flor. faſciculatis faſtigiatis.
Flos. cuc. 2. L. petal. quadrifidis, fructu ſubrotundo.
Viſcaria. 3. L. petal. ſubintegris.
alpina. 4. L. petal. bifidis, floribus corymboſis. *Oed. dan. t. 65*
ſibirica. 5. L. petal. bifidis, caule dichotomo, foliis ſubhirtis
dioica. 6. L. floribus dioicis.
apetala. 7. L. calyce inflato, coroll. calyce breuiore, caul. ſubunifloro hermaphroditico.

581. CERASTIUM. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* bifida. *Capſ.* vnilocularis, apice dehiſcens.

627.

* *Capſulis oblongis.*

perfoliat. 1. C. foliis connatis.
vulgatum. 2. C. fol. ouatis, petal. calyci aequalibus, caul. diffuſis.
viſcoſum. 3. C. erectum villoſo-viſcoſum.
ſemidec. 4. C. flor. pentandris, petal. emarginatis.
pentandr. 5. C. flor. pentandris, petal. integris.
aruenſe. 6. C. fol. lineari-lanceolatis obtuſis glabris, coroll. calyce maioribus.
dichotomum. 7. C. fol. lanceolatis, caule dichotomo ramoſiſſimo, capſ. erectis.
alpinum. 8. C. fol. ouato-lanceolatis, caule diuiſo, capſ. oblongis.

* * *Capſulis ſubrotundis.*

repens. 9. C. fol. lanceolatis, pedunc. ramoſis, capſ. ſubrotundis.
ſtrictum. 10. C. fol. linearibus acuminatis glabris, pedunc. vnifloris ſubtomentoſis, capſ. globoſis.
ſuffruticoſum. 11. C. caule perenni procumbente, fol. lineari-lanceolatis ſubhirſutis.
maximum. 12. C. fol. lanceolatis ſcabris, petal. crenatis, capſulis globoſis.
aquaticum. 13. C. fol. cordatis ſeſſilibus, flor. ſolitariis, fruct. pendulis.
latifolium. 15. C. fol. ouatis ſubtomentoſis, ram. vnifloris, capſ. globoſis. *Caules proſtrati, ramoſi, ad angulos rectos diuaricati. Flores magni. Calyces campanulati G.*
tomentoſum. 16. C. fol. oblongis tomentoſis, peduncul. ramoſis, capſ. globoſis.
montanum. 14. C. glabrum, caule ſtriato, fol. lanceolatis, pedunc. longiſſimis, capſ. globoſis. *Caulis erectus, ſimplex, pedalis, paniculata trifida.*

582.

586. SPERGVLA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, integra. *Capſ.* ouata, 1-locularis, 5-valuis.
630.

aruenſis. 1. S. fol. verticillatis, flor. decandris. *Hamel. calt. 6. p. 149. t. 1.*
pentandr. 2. S. fol. verticillatis, flor. pentandris.
nodoſa. 3. S. fol. oppoſitis ſubulatis laeuibus, caul. ſimplicibus.
laricina: 4. S. fol. oppoſitis ſubulatis ciliatis faſciculatis.
ſaginoides. 5. S. fol. oppoſitis linearibus laeuibus, pedunc. ſolitariis longiſſimis, caul. repente. *Caulis procumbens, pollic. 2 altus. Folia linearia, oppoſita, ad genicula faſciculata. Pedunculi ſimpliſſimi, longiſſimi, laterales abſque bracteis. Flores cernui.*

1262. FORSKOHLEA. *Cal.* 5-phyllus, corolla longior. *Petala* 10. ſpatulata. *Perycarp.* nullum. *Sem.* 5, lana connexa.

tenaciſſima. 1. FORSKOHLEA. *Mant. 72.* *

DECAGYNIA.

587. NEVRADA. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Capſ.* infera, 10-locularis, 10-ſperma, aculeata.
631.

procumb. 1. NEVRADA. *(excluſo ſynonymo) Herba tota albicans, arachnoideo-tomentoſa. Cotyledones ſagittatae, Caules depreſſi, rigidi, teretes, palmares et vltra. Rami ex ſingulis alis inferioribus. Folia alterna, petiolata, ouata, plicata, eroſo-ſinuata, ſupra minus alba ſ. tomentoſa. Flores axillares, ſubſeſſiles. Serenda cum calyce fructuque integro in aridiſſimis.*

588. PHYTOLACCA. *Cal.* o. *Petala* 5, calycina.
631. *Bacca* ſupera, 10-locularis.
10-ſperma.

octandra. 1. P. flor. octandris octagynis.
decandra. 2. P. flor. decandris decagynis.
icoſandra. 3. P. flor. icoſandris decagynis.
dioica. 4. P. flor. dioicis.

CLAS-

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

591. BOCCONIA. *Cor.* 0. *Cal.* 2-phyllus, inferus. *Bacca* extus ficca, 2-ſperma.

1263. HVDSONIA. *Cor.* 0. *Cal.* 3-phyllus, inferus. *Capſ.* 1-locularis, 3-valuis, 3-ſperma.

589. ASARVM. *Cor.* 0. *Cal.* 3-fidus, ſuperus. *Capſ.* 6-locularis.

592. RHIZOPHORA. *Cor.* 4-partita. *Cal.* 4-partitus, inferus. *Sem.* 1, clauatum receptaculo carnoſo.

594. GARCINIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus, inferus. *Bacca* 8-ſperma, coronata.

599. CRATAEVA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus, inferus. *Bacca* 2-locularis, pedicellata.

596. HALESIA. *Cor.* ſub 4-fida. *Cal.* 4-dentatus, ſuperus. *Peric.* 4-ſpermum, 4-angulatum.

600. TRIVMFETTA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus, inferus. *Capſ.* 4-locularis, 2-ſperma, muricata.

601. PEGANVM. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus, inferus. *Capſ.* 3-locularis. *Stam.* 15.

602. NITRARIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus, inferus. *Drupa* 1-ſperma. *Stam.* 15.

598. WINTERANA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 3-lobus, inferus. *Bacca* 3-locularis, 2-ſperma. *Nectar.* antheriferum.

603. PORTVLACA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 2-fidus, inferus. *Capſ.* 1-locularis, circumſciſſa.

604. LYTHRVM. *Cor.* 6-petala. *Cal.* 12-fidus, inferus. *Capſ.* 2-locularis.

605. GINORA. *Cor.* 6-petala. *Cal.* 6-fidus, inferus. *Capſ.* 1-locularis, 4-valuis.

593. BLAKEA. *Cor.* 6-petala. *Cal.* fruct. 6-phyllus: Floris ſuperus indiuiſus. *Capſ.* 6-locularis. *Antherae* connexae.

597. DECVMARIA. *Cor.* 10-petala. *Cal.* 10-phyllus, ſuperus.

590. GETHYLLIS. *Cor.* 6-petaloidea. *Spatha* 1-phylla, ſupera. *Capſ.* 3-locularis.
* *Cleome viſcoſa, dodecandra.*
Riuina octandra.
Chironia dodecandra.

DIGYNIA.

606. HELIOCARPVS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 2-locul. 1-ſperma, compreſſo-radiata.
607. AGRIMONIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus. *Sem.* 1. f. 2.

TRIGYNIA.

608. RESEDA. *Cor.* petal. multifid. *Cal.* partitus. *Capſ.* 1-locularis, hians.
609. EVPHORBIA. *Cor.* petal. peltatis. *Cal.* ventricos. *Capſ.* 3-cocca.

TETRAGYNIA,

* *Tormentilla erecta.*
Reſedae aliquot.

PENTAGYNIA.

610. GLINVS. *Cor.* 0. niſi ſetulae. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* 5-loc.
Reſeda purpuraſc.

OCTAGYNIA.

611. ILLICIVM. *Cor.* 8-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 8, 1-ſperm.
* *Nectar.* 8, ſubulata.

DODECAGYNIA.

612. SEMPERVIVUM. *Cor.* 12-petala. *Cal.* 12-partit. *Capſ.* 12.

POLYGYNIA.

* *Aliſma cordifolia.*

MONO-

MONOGYNIA.

589. ASARVM. *Cal.* 3-s. 4-fidus, germini insidens.
633. *Cor.* o. *Caps.* coriacea, coronata.

europaeum. 1. A. fol. reniformibus obtusis binis.
canadens. 2. A. fol. reniformibus mucronatis.
virginic. 3. A. fol. cordatis obtusis glabris petiolatis.

591. BOCCONIA. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* o. *Stylus.*
634. bifidus. *Bacca* exarida, monosperma.

frutescens. 1. BOCCONIA.

590. GETHYLLIS. *Spatha. Cor.* 6-fida. *Stam.*
633. sexfariam inserta. *Caps.* 3-locularis.

afra 1. GETHYLLIS.

592. RHIZOPHORA. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-par-
634. tita. *Semen* 1, longissimum, basi carnosum.

coniugata. 1. R. fol. ouato-oblongis obtusiusculis integerrimis, calyc. sessilibus, fruct. cylindraceo-subulatis.
gymnorrhiza. 2. R. fol. ouato-lanceolatis integerrimis, radice terrae superimposita.
Candel. 3. R. fol. obtusis, pedunc. bigeminatis folio longioribus, fruct. subulatis.
corniculata. 4. R. fol. ouatis, flor. confertis, fruct. arcuatis acuminatis.
Mangle. 5. R. fol. acutis, fruct. subulato-clauatis. Rhizophora pedunc. bifidis trifidisque, fruct. subulato-clauatis. *Iacq. amer. 141. t. 89.* Rhizophora vtrinque brachiata, fol. elliptico-ouatis: summis ramis dispositis. *Brown. iam. 211.* Mangle arbor pyrifolia, fructu oblongo tereti, summis ramis radicosa. *Pluk. alm. 24. t. 204. f. 3.* Candela americana, foliis laurinis. *Catesb. car. 2. p. 63. t. 63. Calyx 4-fidus. Petala 4. Stamina 8.*

cylindric. 5. R. fruct. cylindricis obtusis.
caseolaris. 6. R. fol. ouatis obtusis, flor. solitariis, fructib. orbiculatis depressis mucronatis.

593. BLAKEA. *Cal.* inferus, 6-phyllus; superus integer. *Petala* 6. *Capsula* 6-locularis, polysperma.
635.

trinervia. 1. BLAKEA.

594. GARCINIA. *Cal.* 4-phyllus, inferus. *Petala* 4. *Bacca* 8-sperma, coronata *Stigmate* peltato.
635.

Mangost. 1. G. fol. ouatis, pedunc. vnifloris.
celebica. 2. G. fol. lanceolatis, pedunc. trifloris.

596. HALESIA. *Cal.* 4-dentatus, superus. *Cor.* 4-fida. *Nux.* 4-angularis, 2-sperma.
636.

tetraptera. 1. H. fol. lanceolato-ouatis, petiolis glandulosis.
diptera. 2. H. fol. ouatis, petiolis laeuibus.

597. DECVMARIA. *Cal.* 10-phyllus, superus. *Petala* 10. *Fructus* hodie ignotus.
1663.

barbara. 1. DECVMARIA. *An dioica?*

598. WINTERANIA. *Cal.* 3-lobus. *Pet.* 5. *Antherae* 16, adnatae nectario vrceolato. *Bacca* 3-locularis. *Sem.* 2.
636.

Canella. 1. WINTERANIA.

599. CRATAEVA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus, *Bacca* 1-locularis, polyspèrma.
636.

gynandra. 1. C. inermis fol. integerrimis, flor. gynandris.

Tapia.

Tapia. 2. C. inermis, fol. integerrimis; foliolis lateralibus basi antica breuioribus. *Calyx quadrifidus.*

Marmelos. 3. C. spinosa, fol. serratis. *Calyx quinquefidus. Petala nulla. Stam. 60.*

600. TRIVMFETTA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* hiſpida, in 4 diſſiliens.
637.

Lappula. 1. T. fol. basi emarginatis, flor. ecalyculatis. Triumfetta floribus calyce destitutis. *Iacq. amer. 146. (excluſo ſynonym. Brownii) ſingulare quod calyx nullus ſit.*

Bartram. A. T. fol. basi integris indiuiſis.

ſemitriloba. 2. T. fol. semitrilobis, flor. completis. *Mant. 73.*

annua. 3. T. fol. ouatis indiuiſis rariuſue lobatis. *Mant. 73.*

601. PEGANVM. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus ſ. 0. *Capſ.* 3-locularis, 3-valuis, polyſperma.
638.

Harmala. 1. P. fol. multifidis.

daurica. 2. P. fol. indiuiſis.

1263. HVDSONIA. *Cor.* nulla. *Cal.* 5-phyllus, tubuloſus. *Stam.* 15. *Capſ.* 1-locularis, 3-valvis, 3-ſperma.

ericoides. HVDSONIA. *Mant. 73.*

602. NITRARIA. *Cor.* 5-petala, petalis apice fornicatis. *Cal.* 5-fidus. *Stam.* 15. *Drupa* monoſperma.
638.

ſchoberi. A. NITRARIA. *Act. petrop. 7. ann. 1741. p. 315. t. 10.*

603. PORTVLACA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 2-fidus. *Capſ.* 1-locularis, circumſciſſa.

638.

oleracea. 1. P. fol. cuneiformibus, flor. ſeſſilibus.

piloſa. 2. P. fol. ſubulatis alternis: axillis piloſis, flor. ſeſſilibus terminalibus.

quadrifida. 7. P. bracteis quaternis, flor. quadrifidis, caule geniculis piloſis. *Mant. 73.*

halimoides. 3. P. fol. oblongis carnoſis, caul. corymboſo, flor. ſeſſilibus.

racemoſa. 5. P. fol. obouatis planiuſculis, racemo ſimplici triquetro. Portulaca triangularis. *Iacq. obſ. 35. t. 23. Capſ. triualuis.*

Anacampſeroſ. 4. P. fol. ouatis gibbis, pedunc. multifloro, caule fruticoſo. *Capſula triualuis.*

fruticoſa. 6. P. fol. obouatis planiuſculis, pedunc. racemoſis, caule fruticoſo. *Cal. 5-phyllus. Capſula 3-valuis.*

604. LYTHRVM. *Cal.* 12-fidus. *Petala* 6, calyci inſerta. *Capſ.* 2-locularis, polyſperma.

640.

Salicaria. 1. L. fol. oppoſitis cordato-lanceolatis, flor. ſpicatis dodecandris.

virgatum. 10. L. fol. oppoſitis lanceolatis, panic. virgata, flor. dodecandris ternis. Lythrum *auſtriacum* foliis oppoſitis lineari-lanceolatis ſubſeſſilibus nitidis. *Iacq. vind. 243.* Lyſimachia rubra non ſiliquoſa. *Bauh. pin. 246.* Lyſimachia purpurea 2 ſ. minor. *Cluſ. hiſt. 2. p. 51. Variat rarius foliis alternis.*

fruticoſum. 8. L. fol. oppoſitis ſubtus tomentoſis, flor. decandris, coroll. calyce, calyceque genitalibus breuioribus.

verticillatum. 4. L. fol. oppoſitis ſubtus tomentoſis ſubpetiolatis, flor. verticillatis lateralibus.

petiolatum. 5. L. fol. oppoſitis linearibus petiolatis, flor. dodecandris.

lineare. 6. L. fol. oppoſitis linearibus, flor. oppoſitis hexandris

Parſonſia. 3. L. fol. oppoſitis oualibus, flor. alternis hexandris ſeſſilibus, caule diffuſo.

Me-

Melanium. 7. L. fol. oppoſitis ouatis, flor. alternis ſubdecandris, caule proſtrato.
Hyſſopif. 8. L. fol. alternis linearibus, flor. hexandris.
thymifol. 9. L. fol. alternis linearibus, flor. tetrapetalis.

605. GINORA. *Cal.* 6-fidus. *Petala* 6. *Capſ.* 1-locularis, 4-valuis, colorata, polyſperma.
642.

americana. 1. GINORA. *Iacq. amer. 148. t. 91.*

DIGYNIA.

606. HELIOCARPVS. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Styli* ſimplices. *Capſ.* 2-locularis, compreſſa vtrinque longitudinaliter radiata.
643.

americ. 1. HELIOCARPVS.

607. AGRIMONIA. *Cal.* 5-dentatus, altero obuallatus. *Petala* 5. *Sem.* 2, in fundo calycis.
643.

Eupatoria. 1. A. fol. caulinis pinnatis: impari petiolato, fruct. hiſpidis
repens. 2. A. fol. caulinis pinnatis: impari ſeſſili, fruct. hiſpidis.
Agrimonioides. 3. A. fol. caulinis ternatis, fruct. glabris.

TRIGYNIA.

608. RESEDA. *Cal.* 1-phyllus, partitus. *Petala* laciniata. *Capſ.* ore dehiſcens, 1-locularis.
643.

Lutcola. 1. R. fol. lanceolatis integris baſi vtrinque vnidentatis, calyc. quadrifidis.

canescens. 2. R. fol. lanceolatis vndulatis pilosis. *Radix perennis. Caulis pedalis, erectiusculus, pilosus pilis albis. Rami ex alis superioribus seriores. Folia alterna, sessilia, lanceolata, carina pilosa, vix ciliata, integerrima absque dente, vndulata. Racemus terminalis. Floribus albis. Antherae luteae 11. Germina 6, insidentia stipiti communi.*

glauca. 3. R. fol. linearibus basi dentatis, flor. tetragynis.

purpurasc. 4. R. fol. linearibus obtusis, flor. pentagynis.

Sesamoid. 5. R. fol. lanceolatis integris, fruct. stellatis.

fruticulosa. 7. R. fol. pinnatis apice recuruatis, flor. tetragynis, calyc. patentibus quinquepartitis, caule basi fruticoso.

alba. 8. R. fol. pinnatis, flor. tetragynis, calyc. sexpartitis.

vndata. 6 R. fol. pinnatis vndulatis, flor. trigynis tetragynisue.

lutea. 9. R. fol. omnibus trifidis: inferioribus pinnatis.

Phyteum. 10. R. fol. integris trilobisque, cal. maximis sexpartis.

odorata. 11. R. fol. integris trilobisque, calyc. florem aequantibus.

609. EVPHORBIA. *Cor.* 4-s. 5-petala, calyci insidens. *Cal.* 1-phyllus, ventricosus. *Caps.* 3-cocca.
646.

* *Fruticosae, aculeatae.*

antiquorum. 1. E. aculeata subnuda triangularis articulata: ramis patentibus.

canariens. 2. E. aculeata nuda subquadrangularis: aculeis geminatis.

heptagona. 3. E. aculeata nuda septemangularis: spinis solitariis subulatis floriferis.

mammill. 4. E. aculeata nuda: angulis tuberosis: spinis interstinctis.

cereiform. 5. E. aculeata nuda multangularis: spinis solitariis subulatis.

officinarum 6. E. aculeata nuda multangularis: aculeis geminatis.

neriifol. 7. E. aculeata seminuda: angulis oblique tuberculatis.

* * *Fruticosae, inermes.*

(*Caulis nec dichotomus, nec vmbelliferus.*)

Caput medusae. 8. E. inermis imbricata tuberculis foliolo lineari instructis.

vimi-

viminal. 9. E. inermis nuda fruticoſa filiformis volubilis: cicatricibus oppoſitis.

mauritanica. 10. E. inermis ſeminuda fruticoſa filiformis flaccida, fol. alternis.

Tirucalli. 11. E. inermis ſeminuda fruticoſa filiformis erecta, ram. patulis determinate confertis.

Tithymaloides. 12. E. inermis fruticoſa, ſol. diſtiche alternis ouatis. *Iacq. amer. 149. t. 92.*

heterophylla. 13. E. inermis, fol. ſerratis petiolatis difformibus: ouatis lanceolatis panduriformibus.

cotinifol. 14. E. fol. oppoſitis ſubcordatis petiolatis emarginatis integerrimis, caule fruticoſo.

ocymoidea. 15. E. inermis herbacea ramoſa, fol. ſubcordatis integerrimis petiolo breuioribus, flor. ſolitariis.

* * * *Dichotomae (vmbella bifida aut nulla).*

origanoides. 16. E. dichotoma, fol. ſerrulatis ouatis obtuſis trineruiis, panicula terminali, caul. ſimplicibus.

hypericifolia. 17. E. dichotoma, fol. ſerratis, ouali-oblongis glabris, corymb. terminalibus, ramis diuaricatis.

hirta. 18. E. dichotoma, fol. ſerrulatis ouatis acuminatis, pedunc. capitatis axillaribus, caul. piloſis.

piluliſer. 19. E. dichotoma, fol. ſerratis ouali-oblongis, pedunc. bicapitatis axillaribus, caule erecto.

hyſſopifolia. 20. E. dichotoma, fol. ſubcrenatis linearibus, flor. faſciculatis terminalibus, caul. erecto.

thymifol. 21. E. dichotoma, fol. ſerratis ouali-oblongis, capitulis axillaribus glomeratis ſubſeſſilibus, caul. procumbentibus.

maculata. 22. E. dichotoma, fol. ſerratis oblongis piloſis, flor. axillaribus ſolitariis, ram. patulis.

paruiflora. 23. E. ſubdichotoma, fol. ſerratis oblongis glabris. flor. ſolitariis, caul. erectiuſculo alterne ramoſo. *Folia ſaepe macula fuſca. Calyces purpurei. Petala alba.*

canescens. 24. E. dichotoma, fol. integris ſubrotundis piloſis, flor. ſolitariis axillaribus, caul. procumbentibus.

Chamaeſyce. 25. E. dichotoma, fol. crenulatis ſubrotundis glabris, flor. ſolitariis axillaribus, caul. procumbentibus.

Peplis. 26. E. dichotoma, fol. integerrimis ſemicordatis, flor. ſolitariis axillaribus, caul. procumbentibus.

poly-

polygonifolia. 27. E. fol. oppositis integerrimis lanceolatis obtusis, flor. solitariis axillaribus, caul. procumcentibus.

graminea. 63. E. dichotoma, fol. lanceolato-ellipticis petiolatis integerrimis, caul. erecto, pedunc. dichotomis. *Iacq. amer.* 151. *Mant.* 74.

Ipecacuanhae. 28. E. dichotoma, fol. integerrimis lanceolatis, pedunc. axillaribus vnifloris folia aequantibus, caule erecto.

portulacoides. 29. E. dichotoma, fol. integerrimis oualibus retusis, pedunc. axillaribus vnifloris folia aequantibus, caule erecto.

myrtifolia. 30. E. dichotoma, fol. integerrimis subrotundis emarginatis subtus incanis, flor. solitariis, caul. erecto.

* *Vmbella trifida.*

Peplus. 31. E. vmbella trifida: dichotoma, involucellis ouatis, fol. integerrimis obouatis petiolatis.

falcata. 32. E. vmbella trifida: dichotoma, inuolucell. subcordatis mucronatis, fol. lanceolatis obtusiusculis. Tithymalus annuus supinus, fol. rotundiore acuminato. *Tournef. instit.* 87. Pithyusa minor subrotundis et acutis foliis. *Barr. ic.* 741.

exigua. 34. E. vmbella trifida: dichotoma, involucell. lanceolatis, fol. linearibus.

tuberosa. 35. E. vmbella trifida, inuolucro tetraphyllo, caule nudo, fol. oblongis emarginatis.

** *Vmbella quadrifida.*

Lathyris. 36. E. vmbella quadrifida: dichotoma, fol. oppositis integerrimis.

terracina. 33. E. vmbella quadrifida: dichotoma, fol. alternis lanceolatis retusis mucronatis. Euphorbia vmbella quadrifida: bifida, foliis cuneiformi-linearibus tridentatis. *Allion. corsic.* 209. *t.* 3 ?

Apios. 38. E. vmbella quadrifida: bifida inuolucellis reniformibus: primis obcordatis. *Rami steriles. Foliis lineari-lanceolatis, obtusis; Floriferi vero subrotundo-ouatis. Vmbella 4-fida, 2-fida, nec vltra. Inuolucrum vniuersale 4-phyllum: foliolis subrotundis, vix acutis. Inuolucella priora foliolis obcordatis; posteriora reniformibus, vix mucronatis.*

*** *Vm-*

* * * *Vmbella quinquefida.*

ſpinoſa. 37. E. vmbella ſubquinquefida : ſimplici, inuolucellis ouatis; primariis triphyllis, fol. oblongis integerrimis, caule fruticoſo. *Flores ſaepius ſolitarii. Capſulae verrucoſae.*

epithymoides. 30. E. vmbella quinquefida : bifida, inuolucellis ouatis, fol. lanceolatis obtuſis ſubtus villoſis.

dulcis. 40. E. vmbella quinquefida : bifida, inuolucell. ſubouatis, fol. lanceolatis obtuſis integerrimis. Tithymalus tuberoſus germanicus. *Bauh. pin.* 292. *Iuſſ. inuolucella ſubtilliſſime ſerrata. Fructus ruber.*

Pithyuſa. 41. E. vmbella quinquefida : bifida, inuolucell. ouatis mucronatis, fol. lanceolatis : infimis inuolutis retrorſum imbricatis.

portlandica. 42. E. vmbella quinquefida : dichotoma, inuolucell. ſubcordatis concauis, fol. lineari-lanceolatis glabris patentibus.

Paralias. 43. E. vmbella ſubquinquefida : bifida, inuolucell. cordato-reniformibus, fol. ſurſum imbricatis.

aleppica. 44. E. vmbella quinquefida : dichotoma, inuolucell. ouato-lanceolatis mucronatis, fol. inferioribus ſetaceis.

pinea. 64. E. vmbella quinquefida : dichotoma, inuolucell. cordatis, fol. linearibus acuminatis confertis, capſ. laeuiuſculis.

ſegetalis. 45. E. vmbella quinquefida : dichotoma, inuolucell. cordatis acutis, fol. lineari-lanceolatis : ſuperioribus latioribus. *Ger. prou.* 538.

helioſcopia. 46. E. vmbella quinquefida : trifida : dichotoma, inuolucell. obouatis, fol. cuneiformibus ſerratis.

ſerrata. 47. E. vmbella quinquefida : trifida : dichotoma, inuolucell. diphyllis reniformibus, fol. amplexicaulibus cordatis ſerratis.

verrucoſa. 48. E. vmbella quinquefida : ſubtifida : bifida, inuolucell. ouatis, fol. lanceolatis ſerratis villoſis, capſ. verrucoſis.

corollata. 49. E. vmbella quinquefida : trifida : dichotoma, inuolucell. foliisque oblongis obtuſis, petal. membranaceis.

coralloides. 50. E. vmbella quinquefida : trifida : dichotoma inuolucell. ouatis, fol. lanceolatis, capſ. lanatis.

pilo-

pilosa. 51. E. vmbella quinquefida: trifida: bifida, inuolucell. ouatis, petal. integris, fol. lanceolatis subpilosis apice serrulatis... *Similis E. palustri.*

orientalis. 52. E. vmbella quinquefida: quadrifida: dichotoma, inuolucell. subrotundis acutis, fol. lanceolatis.

plathyphyllos. 53. E. vmbell. quinquefida: trifida: dichotoma, inuolucell. carina pilosis, fol. serratis lanceolatis, capsf. verrucosis.

* * * * *Vmbella multifida.*

Esula. 54. E. vmbella multifida: bifida, inuolucell. subcordatis, petal. subbicornibus, ram. sterilibus, fol. vniformibus.

Cyparissias. 55. E. vmbella multifida: dichotoma, inuolucell. subcordatis, ramis sterilibus foliis setaceis; caulinis lanceolatis.

myrsinites. 56. E. vmbella suboctifida: bifida, inuollucell. subouatis, fol. spatulatis patentibus carnosis mucronatis margine scabris.

palustris. 57. E. vmbella multifida: subtrifida: bifida, inuolucell. ouatis, fol. lanceolatis, ramis sterilibus.

hyberna. 58. E. vmbella sexfida: dichotoma, inuolucell. oualibus, fol. integerrimis, ramis nullis, capsf. verrucosis.

dendroides. 59. E. vmbella multifida: dichotoma, inuolucell. subcordatis: primariis triphyllis, caule arboreo.

amygdaloides. 60. E. vmbella multifida: dichotoma, inuolucell. perfoliatis orbiculatis, fol. obtusis.

syluatica. 62. E. vmbella quinquefida: bifida, inuolucell. perfoliatis subcordatis, fol. lanceolatis integerrimis.

Characias. 61. E. vmbella multifida: bifida, inuolucell. perfoliatis emarginatis, fol. integerrimis, caule frutescente.

PENTAGYNIA.

610. GLINVS. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* nulla. *Nectaria* setis bifidis. *Capsf.* 5-angularis, 5-locularis, 5-valuis, polyspermа. 663.

lotoides. 1. GLINVS.

OCTA-

OCTAGYNIA.

611 ILLICIVM. *Cal.* 4-phyllus, deciduus. *Petala* 8. *Nectaria* 8, petaloidea, subulata. *Stam.* 16: antheris bifidis. *Capſ.* ouatae, compreſſae, monoſpermae.
664.

aniſatum. 1. ILLICIVM.

DODECAGYNIA.

612. SEMPERVIVUM. *Cal.* 12-partitus. *Petala* 12. *Capſ.* 12, polyſpermae.
694.

arboreum. 1. S. caule arboreſcente laeui ramoſo.
canarienſ. 2. S. caule foliorum ruderibus lacero, fol. retuſis.
tectorum. 3. S. fol. ciliatis, propaginibus patentibus.
globiferum. 4. S. fol. ciliatis, propaginibus globoſis. *Hexandra hexagyna. Iacq.*
arachnioideum. 7. S. fol. pilis intertextis, propaginibus globoſis. *Varietas S. montani. Hall.*
hirtum. 5. S. fol. caule petalorumque apicibus hirtis.
montanum. 6. S. fol. integerrimis, propaginibus patulis.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

613. CACTVS. *Cal.* ſuperus, 1-phyllus. *Cor.* multifida. *Bacca* 1-locularis, polyſperma.

616. EVGENIA. *Cal.* ſuperus, 4-partitus. *Cor.* 4-petala. *Drupa.* 1-locularis, 1-ſperma.

614. PHILADELPHVS. *Cal.* ſuperus, 5-f. 4-partitus. *Cor.* 5-f. 4-petala. *Capſ.* 5-f. 4-locularis, polyſperma.

615. PSIDIVM. *Cal.* ſuperus, 5 fidus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* 1-locularis, polyſperma.

617. MYRTVS. *Cal.* ſuperus, 5-fidus. *Cor.* ſub5-petala. *Bacca* 3-locularis, 1-ſperma.

618. PVNICA. *Cal.* ſuperus, 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Pomum* 10-loculare, polyſpermum.

619. AMYGDALVS. *Cal.* inferus, 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Drupa* nucleo foraminuloſo.

620. PRVNVS. *Cal.* inferus, 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Drupa* nucleo integro.

621. CHRYSOBALANVS. *Cal.* inferus, 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Drupa* nucleo ſulcato.

DIGYNIA.

622. CRATAEGVS. *Cal.* ſuperus, 5-fidus. *Cor.* 5-petala, *Bacca* 2-ſperma.

TRIGYNIA.

623. SORBVS. *Cal.* ſuperus, 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* 3-ſperma.

424. SESUVIVM. *Cal.* inferus, 5-fidus. *Cor.* nulla. *Capſ.* 3-locularis, circumſciſſa.

PENTAGYNIA.

627. TETRAGONIA. *Cal,* ſuperus, 5-f. 4-fidus. *Cor.* o. *Peric.* nucleo 5-f. 4-loculari.

625. MESPILVS. *Cal.* ſuperus, 5 fidus. *Cor.* 5-petala, *Bacca* 5-ſperma.

626. PYRVS. *Cal.* ſuperus, 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Pomum* 5-loculare, polyſpermum.

628. MESEMBRYANT. *Cal.* ſuperus, 5-fidus. *Cor.* multifida. *Capſ.* carnoſa, locularis, polyſperma.

629. AIZOON. *Cal.* inferus, 5-fidus. *Cor.* o. *Capſ.* 5-locularis, polyſperma.

630. SPIRAEA. *Cal.* inferus, 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* plures, congeſtae.

POLYGYNIA.

631. ROSA. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Cal.* baccatus, polyſpermus.

632. RVBVS. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* compoſita.

635. TORMENTILLA. *Cal.* 8-fidus. *Cor,* 4-petala. *Sem.* 8, mutica.

637. DRYAS. *Cal.* 8-fidus. *Cor.* 8.petala. *Sem.* plurima: ariſta lanata.

633. FRAGARIA. *Cal.* 10-fidus. *Cor.* 5-petala. *Sem.* plurima ſupra recept. baccatum, deciduа.

634. POTENTILLA. *Cal.* 10-fidus. *Cor.* 5-petala. *Sem.* plurima, mutica.

636. GEVM. *Cal.* 10-fidus. *Cor.* 5-petala. *Sem.* plurima: ariſta geniculata.

638. COMARVM. *Cal.* 10-fidus. *Cor.* 5-petala. *Sem.* plurima ſupra recept. carnoſum perſiſtens.

639. CALYCANTHVS. *Cal.* ſquamoſus, corollinus. *Cor.* o. *Sem.* caudata calyce ſucculento.

* *Spiraea Filipendula, Vlmaria. Phytolacca icoſandra.*

MONOGYNIA.

613. CACTVS. *Cal.* 1-phyllus, ſuperus, imbricatus. *Cor.* multiplex. *Bacca* 1-locularis, polyſperma.
666.

* Echinomelocacti *ſubrotundi.*

mammill. 1. C. ſubrotundus tectus tuberculis ouatis barbatis.
Melocact. 2. C. ſubrotundus quatuordecimangularis.
β. Cactus ſubrotundus 14-angularis: ſpinis longis recuruis albidis. *Mill. dict.*
γ. Cactus ſubrotundus 15-angularis: ſpinis latis recuruis creberrimis. *Mill. dict.*
δ. Cactus ſubrotundus 15-angularis, ſpinis rectis, angulis in ſpiram contortis. *Mill. dict.*

* * Cerei *erecti ſtantes per ſe.*

Pitaiaya. 24. C. erectus triangularis. *Iacq. amer.* 151. *e Carthagena.*
heptagon. 3. C. erectus oblongus ſeptemangularis.
tetragon. 4. C. erectus, quadrangularis longus angulis compreſſis.
hexagon. 5. C. erectus ſexangularis longus, angulis diſtantibus.
pentagon. 6. C. erectus ſubquinquangularis longius articulatus.
repandus. 7. C erectus longus octangularis: angulis compreſſis vndatis, ſpinis lana longioribus.
lanuginoſus. 8. C. erectus longus ſubnouemangularis: angulis obſoletis, ſpinis lana breuioribus.
peruuianus. 9. C. erectus longus ſuboctangularis: angulis obtuſis. *Anguli ſuperne inermes. Mill.*
Royeni. 10. C. erectus articulatus nouemangularis: articulis ſubouatis, ſpinis lanam aequantibus. Cereus erectus gracilis ſpinoſiſſimus: ſpinis flauis, polygonus, lanugine albo-palleſcente. *Boerrh. lugdb.* 1. *p.* 293. Cereus erectus, fructu rubro non ſpinoſo, lanuginoſus. *Herm. par.* 115.

* * * Cerei *repentes radiculis lateralibus.*

grandiſl. 11. C. repens ſubquinquangularis. *Herm. par.* 120.
flagellif. 12. C. repens decemangularis.
paraſitic. 13. C. repens teres ſtriatus muticus.

trian-

triangularis. 14. C. repens triangularis. *Iacq amer.* 152. *Act. helv* 5. *p.* 268. *t.* 2. Melocactus americanus repens trigonus, flore albo, fructu violaceo. *Plum. ic.* 199, 200?

* * * * Opuntiae *compressae articulis proliferis.*

moniliformis. 15. C. articulato-prolifer, articulis globosis spinosis glomeratis. *Plum. ic.* 198.

Opuntia. 16. C. articulato-prolifer laxus, articulis ouatis, spinis setaceis.

Ficus indica. 17. C. articulato-prolifer, articulis ouato-oblongis, spinis setaceis.

Tuna. 18. C. articulato-prolifer, articulis ouato-oblongis, spinis subulatis.

cochenillifer. 19. C. articulato-prolifer, articulis ouato-oblongis subinermibus.

curassauicus. 20. C. articulato-prolifer, articulis cylindrico-ventricosis compressis.

Phyllant. 21. C. prolifer ensiformis-compressus serrato-repandus.

Pereskia. 22. C. caule arboreo tereti: aculeis geminis recuruis, fol. lanceolato-ouatis.

portulacifolius. 23. C. caule tereti arboreo spinoso, fol. cuneiformibus retusis.

614. PHILADELPHVS. 671.

Cal. 4-f. 5-partitus, superus. *Petala* 4-f. 5. *Caps.* 4-f. 5-locularis, polysperma.

coronar. 1. P. foliis subdentatis.

inodorus. 2. P. foliis integerrimis.

615. PSIDIVM. 672.

Cal. 5-fidus, superus. *Petala* 5. *Bacca* 1-locularis, polysperma.

pyriferum. 1. P. fol. lineatis obtusiusculis, pedunc. vnifloris. Guajaua *vulgo.*

pomiferum. 2. P. fol. lineatis acuminatis, pedunc. trifloris. Cujauus *vulgo.*

616. EVGENIA. *Cal.* 4-partitus, ſuperus. *Petala* 4. *Drupa* 1-ſperma, 4-angularis.

672.

malaccenſis. 1. E. fol. integerrimis, pedunc. ramoſis lateralibus.

Iambos. 2. E. fol. integerrimis, pedunc. ramoſis terminalibus.

Pſeudopſidium. 6. E. fol. integerrimis, pedunc. vnifloris pluribus lateralibus terminalibusque. *Iacq. amer.* 152. *e Martinica.*

vniflora. 3. E. fol. integerrimis, pedunc. unifloris lateralibus.

acutangula. 4. E. fol. crenatis, pedunc. terminalibus, pomis oblongis acutangulis.

racemoſa. 5. E. fol. crenatis, racem. longiſſimis, pomis ouatis.

617. MYRTVS. *Cal.* 5-fidus, ſuperus. *Petala* 5. *Bacca* 2-ſ. 3-ſperma.

673.

commun. 1. M. flor. ſolitariis: inuolucro diphyllo.

braſilian. 2. M. flor. ſolitariis, pedunc. nudis, petal. ſubciliatis.

biflora. 3. M. pedunc. bifloris, fol. lanceolatis.

lucida. 4. M. pedunc. ſubtrifloris, fol. ſubſeſſilibus lanceolatis attenuatis.

cumini. 5. M. pedunc. multifloris. foliis lanceolato-ouatis.

dioica. 6. M. pedunc. trichotomo-paniculatis, fol. oblongis, flor. dioicis.

Chytraculia. 7. M. pedunc. dichotomis paniculatis tomentoſis, fol. terminalibus ſubouatis geminis.

Zuzygium. 8. M. pedunc. multifloris, ramis dichotomis, fol. geminis ſubouatis terminalibus.

Zeylanic. 9. M. pedunc. multifloris, fol. ouatis ſubpetiolatis.

androſaem. 10. M. pedunc. trifido-multifloris, fol. ſuboualibus ſeſſilibus.

caryoph. 11. M. pedunc. trifido-multifloris, fol. obouatis.

anguſtifolia. 14. M. pedunc. vmbellatis, fol. lineari-lanceolatis ſubſeſſilibus. *Mant.* 74.

Pimenta. 12. M. foliis alternis. *Calyx fructus inferus quadridentatus; floris vero ſuperus quadripartitus. Bacca 2-ſperma.*

618. PVNICA. *Cal.* 5-fidus, ſuperus. *Petala* 5.
676. *Pomum* multiloculare, polyſpermum.

Granatum. 1. P. fol. lanceolatis, caul. arboreo.
nana. 2. P. fol. linearibus. caul. fruticoſo. *Altitudo ped.* 5. *Folia breuiora, anguſtiora. Floret tota aeſtate.*

619. AMYGDALVS. *Cal.* 5-fidus, inferus. *Petala* 5. *Drupa* nuce poris perforata.
676.

Perſica. 1. A. fol. ſerraturis omnibus acutis, flor. ſeſſilibus ſolitariis.
communis. 2. A. fol. ſerraturis infimis glanduloſis, flor. ſeſſilibus geminis.
pumila. 3. A. fol. venoſo-rugoſis. *Mant.* 74.
nana. 4. A. fol. baſi attenuatis.

620. PRVNVS. *Cal.* 5-fidus, inferus. *Petala* 5.
677. *Drupae* nux ſuturis prominulis.

Padus. 1. P. flor. racemoſis, fol. deciduis baſi ſubtus biglanduloſis.
virginiana. 2. P. flor. racemoſis, fol. deciduis baſi antice glanduloſis.
canadenſis. 3. P. flor. racemoſis, fol. deciduis eglanduloſis lato-lanceolatis rugoſis vtrinque pubeſcentibus (*excluſo ſynonymo du Hamelii.*)
luſitanic. 4. P. flor. racemoſis, fol. ſemperuirentibus eglanduloſis.
Lauro-Ceraſus. 5. P. flor. racemoſis, fol. ſemperuirentibus dorſo biglanduloſis.
Mahaleb. 6. P. flor. corymboſis terminalibus, fol. ouatis.
Armen. 7. P. flor. ſeſſilibus, fol. ſubcordatis.
ſibirica. 8. P. flor. ſeſſilibus, fol. ouato-oblongis.
pumila. 14. P. flor. ſubumbellatis, fol. anguſto-lanceolatis. *Mant.* 75.

Cerasus. 9. P. vmbellis subpedunculatis, fol. ouato-lanceolatis glabris conduplicatis.

auium. 10. P. vmbellis sessilibus, fol. ouato-lanceolatis subtus pubescentibus conduplicatis. *Varietas Cerasi* ϰ. λ. *huc referatur.*

domestica. 11. P. pedunculis subsolitariis, fol. lanceolato-ouatis conuolutis, ramis muticis.

insititia. 12. P. pedunculis geminis, fol. ouatis subuillosis conuolutis, ramis spinescentibus.

spinosa. 13. P. pedunc. solitariis, fol. lanceolatis glabris, ramis spinosis.

621. CHRYSOBALANVS. 581.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Drupae* Nux 5-sulcata, 5-valuis.

Icaco. 1. CHRYSOBALANVS. Frutex folio cotini crasso in summitate deliquium patiente, fructu ouali caeruleo. *Catesb. car.* 1. *p.* 25. *t* 25. ? Guaieta *Maregr. bras. t.* 2. *c.* 4.

DIGYNIA.

622. CRATAEGVS. 681.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* infera, 2-sperma.

Aria. 1. C. fol. ouatis incisis serratis subtus tomentosis.

torminalis. 2. C. fol. cordatis septangulis: lobis infimis diuaricatis.

coccinea. 3. C. fol. cordatis repando-angulatis serratis glabris.

viridis. 6. C. fol. lanceolato-ouatis subtrilobis serratis glabris, caule inermi. *Varietas C. coccinea. Gron. virg.* 76.

Crusgalli. 4. C. fol. lanceolato-ouatis serratis glabris, ramis spinosis.

tomentosa. 5. C. fol. cuneiformi-ouatis serratis subangulatis, subtus villosis, ram. spinosis.

indica. 7. C. fol. lanceolatis serratis, caule inermi, corymb. squamosis.

Oxyacan. 8. C. fol. obtusis subtrifidis serratis.

Azarolus. 9. C. fol. obtusis subtrifidis subdentatis.

TRI-

TRIGYNIA.

623. SORBVS. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* infera, 3-ſperma. 683.

aucupar. 1. S. fol. pinnatis vtrinque glabris.
hybrida. 2. S. fol. ſemipinnatis ſubtus tomentoſis. *Flores, Corymbus et Piſtilla* 3 *S. aucupariae; Statura et foliatura aliquatenus Crat. Ariae.*
domeſtic. 3. S. fol. pinnatis ſubtus villoſis.

624. SESVVIVM. *Cal.* 5-partitus, coloratus. *Petala* nulla. *Capſ.* ouata, trilocularis, circumſciſſa, polyſperma. 684.

Portulacaſtrum. A. SESVVIVM.

PENTAGYNIA.

625. MESPILVS. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* infera, 5-ſperma. 684.

germanica. 1. M. inermis, fol. lanceolatis ſubtus tomentoſis, flor. ſolitariis ſeſſilibus.
Pyracantha. 2. M. ſpinoſa, fol: lanceolato-ouatis crenatis, calyc. fructus obtuſis.
arbutifolia. 3. M. inermis, fol. lanceolatis crenatis ſubtus tomentoſis.
Amelanchier. 4. M. inermis, fol. oualibus ſerratis, cauliculis hirſutis. Amelanchier galloprouinciae. *Barr. ic.* 527. *tenella lanata; adultior nuda.*
Chamae-Meſpilus. 6. M. inermis, fol. oualibus acute ſerratis glabris, flor. corymboſo-capitatis. *Iacq. vind.* 243. *Flos digynus viſus Hallero, Iacquinio.*
canadenſ. 5. M. inermis- fol. ouato-oblongis glabris ſerratis, acutiuſculis. *Tenera lanata; adultior nuda.*
Cotoneaſter. 7. M. inermis, fol. ouatis integerrimis: ſubtus tomentoſis.

626. PYRVS. *Cal.* 5-fidus. *Petala.* 5. *Pomum* infe-
686. rum, 5-loculare, polyſpermum.

commun. 1. P. fol. ſerratis, flor. corymboſis.
Malus. 2. P. fol. ſerratis, vmbellis ſeſſilibus.
baccata. 5. P. fol. ſerratis, pedunc. confertis, pomis baccatis. *Mant.* 75.
coronaria. 3. P. fol. ſerrato-angulosis, vmbellis pedunculatis.
Cydonia. 4. P. fol. integerrimis, flor. ſolitariis.

627. TETRAGONIA, *Cal.* 4-f. 5-partitus. *Peta-*
687. *la* 0. *Drupa* infera, 5-f. 4-gona, 5-f. 4-locularis.

fruticoſa. 1. T. foliis linearibus. *Mill. ic. t.* 263. *f.* 2.
herbacea. 2. T. foliis ouatis. *Mill. ic. t.* 263. *f.* 1.

628. MESEMBRYANTHEMVM. *Cal.* 5-fidus. *Pe-*
687. *tala* numeroſa, linearia. *Capſ.* carnoſa, infera, polyſperma.

* *Albis corollis.*

nodiflorum. 1. M. fol. alternis teretiuſculis obtuſis baſi ciliatis.
cryſtallin. 2. M. fol. alternis ouatis papuloſis vndatis.
copticum. 3. M. fol. ſemiteretibus papuloſis diſtinctis, flor. ſeſſilibus axillaribus, calyc. quinquefidis.
geniculiflorum. 4. M. fol. ſemiteretibus papuloſis diſtinctis, flor. ſeſſibus axillaribus, calyc. quadrifidis.
noctiflorum. 5. M. fol. ſemicylindricis impunctatis diſtinctis, flor. pedunculatis, calyc. quadrifidis. *Flores incarnato-albi, noctu fragrantes.*

ſplen-

Meſembryanthema *pleraque Pentagyna ſunt, ſed* Tetragyna *geniculiflorum, noctiflorum.* Dacagyna f. Polygyna *barbatum, linguiforme, acinaciforme, loreum, pugioniforme.*

splendens. 6. M. fol. subteretibus impunctatis recuruis distinctis congestis, cal. digitiformibus terminalibus.

vmbellatum. 7. M. fol. subulatis scabrido-punctatis connatis apice patulo, caule erecto, corymbo trichotomo.

expansum. 37. M. fol. planiusculis lanceolatis impunctatis patentibus distinctis oppositis alternisque remotis.

Tripolium. 9. M. fol. alternis lanceolatis planis impunctatis, caul. laxis simplicibus, calyc. pentagonis.

calamiforme. 8. M. acaule, fol. subteretibus adscendentibus impunctatis connatis, flor. octagynis.

* * *Rubicundis corollis.*

bellidifolium. 10. M. acaule, fol. triquetris linearibus impunctatis; apice trifariam dentatis.

deltoides. 11. M. fol. triquetris deltoidibus dentatis impunctatis distinctis.

barbatum. 12. M. fol. subouatis papulosis distinctis, apice barbatis.

hispidum. 13. M. fol. cylindricis papulosis distinctis: caul. hispido.

villosum. 14. M. fol. pubescentibus connatis impunctatis, caule piloso. (*Flos nobis non visus.*)

scabrum. 15. M. fol. subulatis distinctis: subtus vndique punctato-muricatis, calyc. muticis.

emarginatum. 16. M. fol. subulatis congestis subscabris, calyc. spinosis, petalis emarginatis.

vncinatum. 17. M. articulis caulinis terminatis foliis connatis acuminatis punctatis subtus dentatis.

spinosum. 18. M. fol. tereti-triquetris punctatis distinctis, spinis ramosis.

tuberosum. 19. M. fol. subulatis papulosis distinctis apice patulis, rad. capitata.

tenuifol. 20. M. subfiliformibus glabris distinctis internodio longioribus, caul. procumbentibus. *Caules lignosi. Rami ex singulis alis alterni; sed oppositi in alis superioribus. Flores speciosi multis petalis, medio die, sole illucente expansi, diutius durantes.*

stipulaceum. 21. M. fol. subtriquetris compressis incuruis punctatis distinctis congestis: basi marginatis.

crassifol. 22. M. fol. semicylindricis impunctatis connatis apice triquetris, caule repente semicylindrico.

glomeratum. 24. M. fol. teretiuſculis compreſſis punctatis diſtinctis, caul. paniculato multifloro.

loreum. 25. M. fol. ſemicylindricis recuruis congeſtis baſi interiore gibbis connatis, caul. pendulo.

filamentoſum. 26. M. fol. aequilateri-triquetris acutis ſubpunctatis connatis: angulis ſcabris, ramis hexagonis.

falcatum. 27. M. fol. acinaciformibus impunctatis connatis: angulo carinali ſcabris, petal. lanceolatis.

forficatum. 28. M. fol. acinaciformibus obtuſis impunctatis connatis: apice ſpinoſis, caule ancipiti.

* * * *Luteis corollis.*

edule. 29. M. fol. aequilateri-triquetris acutis ſtrictis impunctatis connatis: carina ſubſerratis, caul. ancipiti.

bicolorum. 30. M. fol. ſubulatis punctatis laeuibus diſtinctis, caule fruteſcente, corol. dicoloribus.

ſerratum. 31. M. fol. ſubulatis triquetris punctatis diſtinctis: angulo carinali retrorſum ſerratis.

micans. 32. M. fol. ſubcylindricis papuloſis diſtinctis, caule ſcabro.

glaucum. 35. M. fol. triquetris acutis punctatis diſtinctis, calycinis foliolis ouato-cordatis.

cornicula-tum. 36. M. fol. triquetro-ſemicylindricis ſcabrido-punctatis: ſupra baſin linea eleuata connatis.

tortuoſum. 38. M. fol. planiuſculis oblongo-ouatis ſubpapuloſis confertis connatis, calyc. triphyllis bicornibus.

pomeridianum. 39. M. fol. planiuſculis lato-lanceolatis laeuibus ſubciliatis diſtinctis, caule pedunculis germinibusque hirtis. *Linn. dec.* 25. *t.* 13. *Caulis ſubdichotomus. Folia prima terna; reliqua oppoſita.*

verucula-tum. 34. M. fol. triquetro-cylindricis acutis connatis arcuatis impunctatis diſtinctis.

roſtratum. 33. M. acaule, fol. ſemicylindricis externe tuberculatis connatis.

ringens. 40. M. acaule, fol. ciliato-dentatis punctatis.

dolabrif. 41. M. acaule, fol. dolabriformibus punctatis.

difforme. 42. M. acaule, fol. difformibus punctatis connatis.

albidum. 43. M. acaule, fol. triquetris integerrimis.

linguiforme. 44. M. acaule, fol. linguiformibus altero margine craſſioribus impunctatis.

pugio-

pugioni-formе. 45. M. fol. alternis confertis subulatis triquetris longissimis impunctatis.

629. AIZOON. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 0. *Capſ.* supera, 5 locularis, 5-valuis.
700.

canarienſ. 1. A. fol. cuneiformi-ouatis, flor. ſeſſilibus.
hiſpanic. 2. A. fol. lanceolatis, flor. ſeſſilibus.
paniculat. 3. A. fol. lanceolatis, flor. paniculatis.

630. SPIRAEA. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Capſ.* polyſpermae.
700.

ſalicifol. 1. S. fol. lanceolatis obtuſis ſerratis nudis, flor. duplicato-racemoſis.
tomentoſ. 2. S. fol. lanceolatis inaequaliter ſerratis ſubtus tomentoſis, flor. duplicato-racemoſis.
hypericif. 3. S. fol. obouatis integerrimis, vmbellis ſeſſilibus.
chamaedrifolia. 4. S. fol. ouatis inciſo-ſerratis glabris, vmbellis pedunculatis.
crenata. 5. S. fol. oblongiuſculis apice ſerratis, corymbis lateralibus.
opulifolia. 6. S. fol. lobatis ſerratis, corymbis terminalibus. *Trigyna.*
ſorbifolia. 7. S. fol. pinnatis: foliolis vniformibus ſerratis. caule fruticoſo, flor. paniculatis.
Aruncus. 8. S. fol. ſupradecompoſitis, ſpicis paniculatis, flor. dioicis. *Trigyna.*
Filipendula. 9. S. fol. pinnatis: foliolis vniformibus ſerratis, caule herbaceo, flor. cymoſis.
Vlmaria. 10. S. fol. pinnatis: impari maiore lobato, flor. cymoſis.
trifoliata. 11. S. fol. ternatis ſerratis ſubaequalibus, flor. ſubpaniculatis. *Mill. ic. t.* 256.

POLY-

POLOGYNIA.

631. ROSA. *Petala* 5. *Cal.* vrceolatus, 5-fidus, carnosus, collo coarctatus. *Sem.* plurima, hispida, calycis interiori lateri affixa.
703.

* *Germinibus subglobosis.*

Eglanteria. 3. R. germin. globosis pedunculisque glabris, caule aculeis sparsis rectis, petiol. scabris, foliol. acutis.

cinnamomea. 4. R. germin. globosis pedunculisque glabris, caule aculeis stipularibus, petiol. subinermibus.

pimpinellifolia. 2. R. germin. globosis pedunculisque glabris, caule aculeis sparsis rectis, petiol. scabris, foliol. obtusis.

spinosissima. 14. R. germin. globosis glabris, pedunc. hispidis, caule petiolisque aculeatissimis.

carolina. 5. R. germin. globosis hispidis, pedunc. subhispidis, caule aculeis stipularibus, petiol. aculeatis.

villosa. 6. R. germin. globosis pedunculisque hispidis, caule aculeis sparsis, petiol. aculeatis, fol. tomentosis.

semper-virens. 9. R. germin. globosis pedunculisque hispidis, caule petiolisque aculeatis, florib. subumbellatis.

* * *Germinibus ouatis.*

centifol. 7. R. germin. ouatis pedunculisque hispidis, caule hispido aculeato, petiol. inermibus.

gallica. 8. R. germin. ouatis pedunculisque hispidis, caule petiolisque hispido-aculeatis.

alpina. 1. R. germin. ouatis glabris, pedunculis petiolisque hispidis, caul. inermi. Rosa *inermis* germinibus ouatis, caule pedunculisque glabris inermibus, petiolis scabris. *Turr. diar. Act. p.* 128.

canina. 10. R. germin. ouatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Petala biloba. Bracteae 2 oppositae, ciliatae.*

indica. 11. R. germin. ouatis pedunculisque glabris, caule subinermi, petiol. aculeatis.

pendulina. 12. R. germin. ouatis glabris, pedunc. cauleque hispidis, petiol. inermibus, fructibus pendulis.

alba. 13. E. germin. ouatis glabris, pedunc. hispidis, caule petiolisque aculeatis.

631. Ru-

632. RVBVS. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* compoſita acinis monoſpermis. 706.

* *Fruteſcentes.*

idaeus. 1. R. fol. quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiol. canaliculatis.

occidentalis. 2. R. fol. ternis ſubtus tomentoſis, caule aculeato, petiol. teretibus.

hiſpidus. 3, R. fol. ternatis nudis, caulib. petiolisque hiſpidis.

paruifolius. 7. R. fol. ternatis ſubtus tomentoſis, caule hirto petiolisque aculeis recuruis.

jamaicenſis. 14. R. fol. ternatis ſubtus tomentoſis, caule petiolis foliisque pubeſcentibus recuruato-aculeatis. *Mant.* 75.

caeſius. 4. R. fol. ternatis ſubnudis: lateralibus bilobis, caule aculeato tereti.

fruticoſus. 5. R. fol. quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis.

canadenſ. 6. R. fol. digitatis denis quinis ternatisque, caule inermi.

odoratus. 9. R. fol. ſimplicibus palmatis, caule inermi multifolio multifloro.

moluccanus. 8. R. fol. ſimplicibus cordatis ſublobatis, caule aculeato decumbente.

* * *Herbacei.*

ſuxatilis. 10. R. fol. ternatis nudis, flagellis reptantibus herbaceis. *Iacq. vind.* 245.

arcticus. 11. R. fol. ternatis, caule inermi vnifloro.

Chamaemorus. 12. R. fol. ſimplicibus lobatis, caule inermi vnifloro. *Herba dioica: Radix v. Maris et feminae vnita ſub terra in monoicam, obſeruante D. C. Solandro.*

Dalibarda. 13. R. fol. ſimplicibus cordatis indiuiſis crenatis, ſcapo aphyllo vnifloro.

633. FRAGARIA. *Cal.* 10-fidus. *Petala* 5. *Receptaculum* ſeminum ouatum, baccatum, deciduum. 708.

veſca. 1. F. flagellis reptantibus.

monophylla. 4. F. fol. ſimplicibus. *Miſit D. Anton. Nic. Ducheſne. an varietas F. Veſcae; folium enim primum ternatum eſt, ſed ſcapus longior, petala minora, Calyces inciſi. Vide Ducheſne monogr. Fragariae.*

muri-

muricata. 2. F. caule erecto ſuffruticoſo, fol. hirſutis. Fragaria fructu ſpinoſo. *Barr. rar.* 591. *t.* 90. *Baccae niſi a ſeminibus denudatae vix deglutiendae.*

ſterilis. 3. F. caule decumbente, ramis floriferis laxis. *Surculi craſſi, depreſſi, tecti* Stipulis *lanceolatis, ferrugineis.* Folia *ternata, obouata, ſerrata, retuſa, laxiora, piloſa, ſubtus albida: petiolis valde piloſis.* Caules *floriferi filiformes, decumbentes, laxi, foliis raris minoribus.* Flores *ſolitarii, pedunculati, albi.*

634. POTENTILLA. *Cal.* 10-fidus. *Petala* 5. *Sem.* 709. ſubrotunda, nuda, receptaculo paruo exſucco affixa.

* *Foliis pinnatis.*

fruticoſa. 1. P. fol. pinnatis, caule fruticoſo.

Anſerina. 2. P. fol. pinnatis ſerratis, caule repente, pedunc. vnifloris.

ſericea. 3. P. fol. bipinnatis vtrinque tomentoſis: ſegmentis parallelis approximatis, caul. decumbentibus.

multifida. 4. P. fol. bipinnatis: ſegmentis integerrimis diſtantibus ſubtus tomentoſis, caule decumbente.

fragarioides. 5. P. fol. pinnatis ternatisque: extimis maioribus, flagellis reptantibus.

rupeſtris. 6. P. fol. pinnatis alternis: foliolis quinis ouatis crenatis, caule erecto.

bifurca. 7. P. fol. pinnatis ſubaequalibus: foliolis oblongis ſubbifidis: extimis confluentibus.

pimpinelloides. 8 P. fol. pinnatis: foliolis ſubrotundis dentatis aequalibus, caule erecto.

penſylvanica. 28. P. fol. inferioribus pinnatis, ſuperioribus ternatis: foliolis inciſo-ſerratis, caule erecto pubeſcente. *Mant.* 76.

ſupina. 9. P. fol. pinnatis, caule dichotomo decumbente.

** *Foliis digitatis.*

recta. 10. P. fol. ſeptenatis lanceolatis ſerratis vtrinque ſubpiloſis, caule erecto.

argentea. 11. P. fol. quinatis cuneiformibus inciſis ſubtus tomentoſis, caule erecto.

inter-

intermedia. 29. P. fol. radicalibus quinatis, caulinis ternatis, caul. erectiuſculo ramoſiſſimo. *Mant.* 76.

hirta. 12. P. fol. ſeptenatis quinatisque cuneiformibus inciſis piloſis, caule erecto hirto. Quinquefolium rectum minus, anguſtioribus foliis, monſpelienſe. *Raj eur.* 213. Quinquefolium montanum erectum hirſutum luteum. *Magn. monſp.* 216. (*non CB.*) *Folia radicalia* 5. *ſ.* 7; *Caulina* 5, *omnia alterna, ſublinearia, dentibus* 3. *ſ.* 5. *Caulis, pedunculi et Calyces valde piloſi.*

ſtipular. 13. P. fol. ſeptenatis ſeſſilibus ſtipulae dilatatae inſidentibus.

opaca. 16. P. fol. radicalibus quinatis cuneiformibus ſerratis, caulinis ſuboppoſitis, ramis filiformibus decumbentibus.

verna. 15. P. fol. radicalibus quinatis acute ſerratis retuſis, caulinis ternatis, caule declinato. *Variat macula ad baſin petalorum fulua et non fulua.*

aurea. 14. P. fol. radicalibus quinatis ſerratis acuminatis, caulinis ternatis, caule declinato. *Iacq. vind.* 245. Potentilla foliis margine fericeis acute ſerratis, radicalibus quinatis, caulinis ternatis, caule declinato. *Ger. prov.* 468. Quinquefolium 3, aureo flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 105.

canadenſ. 17. P. fol. quinatis villoſis, caule adſcendente hirſuto.

alba. 18. P. fol. quinatis apice conniuenti-ſerratis, caul. filiformibus procumbentibus, receptaculis hirſutis.

cauleſc. 19. P. fol. quinatis apice conniuenti-ſerratis, caul. mulmultifloris decumbentibus, receptaculis hirſutis. *Iacq. vind.* 246. *Calyces hirſuti, purpurei.*

nitida. 21. P. fol. ſubternatis tomentoſis conniuenti-tridentatis, caul. vnifloris, receptaculis lanatis. *Folia huius ternata eſſe monet D. Turre; habeo vnum alterumue exemplar ficcum foliis infimis tantum quinatis.*

valderia. 20. P. fol. ſeptenatis obouatis ſerratis tomentoſis, caule erecto, petalis calyce breuioribus, receptaculis lanatis.

reptans. 22. P. fol. quinatis, caule repente, pedunc. vnifloris.

* * * *Foliis ternatis.*

monſpelienſis. 23. P. fol. ternatis, caule ramoſo erecto, pedunc. ſupra genicula enatis.

nor-

noruegic. 24. P. fol. ternatis, caule dichotomo, pedunc. axillaribus. *Oed. dan. t.* 171.

niuea. 25. P. fol. ternatis incisis subtus tomentosis, caule adscendente.

grandiflora. 26. P. fol. ternatis dentatis vtrinque subpilosis, caule decumbente foliis longiore. Potentilla foliis ternatis dentatis, caule superne dichotomo, petalis calyce duplo longioribus. *Ger. prov.* 469.

subacaulis. 27. P. foliis ternatis dentatis vtrinque tomentosis, scapo decumbente. Potentilla foliis radicalibus ternatis dentatis, vtrinque tomentosis, caul. subfoliosis. *Ger. prov.* 469. *Garid. prov.* 190 *t.* 37.

635. TORMENTILLA. *Cal.* 8-fidus. *Petala* 4. *Sem* subrotunda, nuda, receptaculo paruo exsucco affixa.
716.

erecta. 1. T. caule erectiusculo, fol. sessilibus.

reptans. 2. T. caule repente, fol. petiolatis.

636. GEVM. *Cal.* 10-fidus. *Petala* 5. *Sem.* arista geniculata.
716.

virginianum. 1. G. flor. nutantibus, petalis calyce minoribus, fruct. globosis: aristis vncinatis nudis, foliis ternatis.

vrbanum. 2. G. flor. erectis, fruct. globosis villosis: aristis vncinatis nudis, foliis lyratis.

riuale. 3. G. flor. nutantibus, fruct. oblongo: aristis plumosis tortis.

montanum. 4. G. flor. inclinato solitario, fruct. oblongo: aristis villosis rectis.

reptans. 5. G. fol. vniformibus incisis: alternis minoribus, flagellis reptantibus,

637. DRYAS. *Cal.* 8-fidus. *Petala* 8. *Sem.* caudata, pilosa.
717.

pentapet. 1. D. pentapetala, fol. pinnatis.

octopetal. 2. D. octopetala, fol. simplicibus.

938. COMARVM. 718. *Cal.* 10-fidus. *Petala* 5, calyce minora. *Recept.* ſeminum ouatum, ſpongioſum, perſiſtens.

paluſtre. 1. COMARVM.

639. CALYCANTHVS. 718. *Cal.* 1-phyllus, vrceolatus, ſquarroſus foliolis coloratis. *Cor.* calycina. *Styli* plurimi ſtigmate glanduloſo. *Sem.* plurima, caudata, intra calycem ſucculentum.

floridus. 1. C. petalis interioribus longioribus.
praecox. 2. C. petalis interioribus minutis.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Monopetali.*

640. MARGGRAVIA. *Cal.* 6-phyllus, imbricatus. *Cor.* 1-petala, clauſa. *Bacca* multilocularis, multiualuis.

* *Tetrapetali.*

641. RHEEDIA. *Cal.* nullus. *Bacca* 3-ſperma.

656. MAMMEA. *Cal.* 2-phyllus *Bacca* 1-locularis. *Sem.* calloſa.

648. PAPAVER. *Cal.* 2-phyllus. *Capſula* 1-locularis, coronata.

647. CHELIDONIVM. *Cal.* 2-phyllus. *Siliqua.*

643. CAPPARIS. *Cal.* 4-phyllus. *Bacca* pedicellata, corticoſa.

644. ACTAEA. *Cal.* 4-phyllus. *Bacca* 1-locularis. *Sem.* gemino ordine.

650. CAMBOGIA. *Cal.* 4-phyllus. *Bacca* 8-ſperma, 8-angularis.

658. CALOPHYLLVM. *Cal.* 4-phyllus. *Drupa* globoſa. *Nucleus* ſubgloboſus.

659. GRIAS *Cal.* 4-fidus. *Drupa* 1-ſperma. *Nucleus* 8-ſulcatus.

669. CARYOPHYLLVS. *Cal.* ſuperus. *Bacca* 1-ſperma, coronata.

* *Pentapetali.*

1286. LOASA. *Capſ.* ſeminifera, 1-locularis, ſemitriualuis, polyſperma.

670. MENTZELIA. *Capſ.* inſera, 1-locularis, 3-valuis, polyſperma.

666. VATERIA. *Capſ.* 1-locularis, 3-valuis, 1-ſperma

655. SLOANEA. *Capſ.* echinata, intus baccata. *Stam.* exteriora ſterilia, foliacea.

673. CISTVS. *Capſ.* ſubrotunda. *Cal.* 5-phylli foliola 2 minora.

675. COR-

75. CORCHORVS. *Capſ.* ſub 5-locularis. *Cal.* 5-phyllus, longitudine corollae, deciduus.

52. SARRACENIA. *Capſ.* 5-locularis. *Stigma* clypeatum. *Cal.* exter. 3-phyll., ſuper. 5-phyllus.

50. TILIA. *Capſ.* 5-locularis, coriacea, 1-ſperma. *Cal.* deciduus.

57. OCHNA. *Baccae* 5 in receptaculo carnoſo. *Petala* vnguibus elongatis.

51. MVNTINGIA. *Bacca* 5-locularis, vmbillicata. *Cal.* 5-partitus.

53. ELAEOCARPVS. *Drupa* nucleo criſpo. *Petala* lacera.

71. PLINIA. *Drupa* ſtriata. *Calyx* corollaque 5-partitae, planae.

77. SYMPLOCOS. *Fructus* ignotus. *Cal.* 5-fidus. *Stamina* petalis inſerta.

* *Delphinium Conſolida, Aiacis, Aconiti.*

* *Hexapetali.*

49. ARGEMONE. *Cal.* 3-phyllus. *Capſ.* 1-locularis, ſemiualuis.

57. LAGERSTROEMIA. *Cal.* 6-fidus. *Stam.* 6 exteriora maiora. *Cor.* criſpa.

58. THEA. *Cal.* 5-f. 6-phyllus. *Petala* 6 f. 9. *Capſ.* 3-locularis. *Sem.* ſolitaria.

54. LECYTHIS. *Cal.* 6-phyllus. *Stam.* nectario lingulato co nata. *Capſ.* circumſciſſa.

* *Octopetali.*

45. SANGVINARIA. *Cal.* 2-phyllus. *Capſ.* 2-valuis, polyſperma.

* *Enneapetali.*

46. PODOPHYLLVM. *Cal.* 3-phyllus. *Bacca* 1-locularis, coronata.

* *Thea.*

* *Decapetala.*

54 BIXA. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-petala, 2-plex *Capſ.* 2-valuis.

* *Polypetali.*

53. NYMPHAEA. *Bacca* multiloc. corticoſa. *Cal.* magnus.

* *Apetali.*

39. TREWIA. *Cal.* 3-phyllus. *Per.* 3-coccum.

74. PROCKIA. *Cal.* 3-phyllus. *Peric.* 5-loculare.

661. LAETIA. *Cal.* 5-phyllus. *Peric.* 1-loculare, 3-value, polyſpermum.

676. SEGVIERIA. *Cal.* 5-phyllus. *Peric.* 1-ſpermum, alatum.

672. DELIMA. *Cal.* 5-phyllus. *Peric.* 2-ualue, 2-ſpermum.

DIGYNIA.

680. CALLIGONVM. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* nulla. *Peric.* echinato-vncinatum.

679. CVRATELLA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Capſ.* 2-partita, 2-ſperma.

678. PAEONIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* polyſperma. *Sem.* colorata.

TRIGYNIA.

681. DELPHINIVM. *Cal.* nullus. *Cor.* 5-petala : ſupremo cornuto. *Nectar.* 2-fidum, ſeſſile.

682. ACONITVM. *Cal.* nullus. *Cor.* 5-petala: ſupremo galeato. *Nectar.* 2, pediceliata.

* *Reſeda Luteola.*

TETRAGYNIA.

683. TETRACERA. *Cal.* 6-phyllus. *Capſ.* 4, monoſpermae.

PENTAGYNIA.

684. AQVILEGIA. *Cal.* nullus. *Cor.* 5-petala. *Nectaria* 5, inferne cornuta.

685. NIGELLA. *Cal.* nullus. *Cor.* 5-petala. *Nectaria* 8, ſuperne 2-labiata.

686. REAVMVRIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala: nectariis 10, adnatis, ciliatis. *Capſ.* 5-locularis, polyſperma.

* *Aconitum Anthora, variegatum.*

HEXAGYNIA.

687. STRATIOTES. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 6-locularis intra ſpatham.

POLYGYNIA.

704. HYDRASTIS. *Cal.* nullus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* compoſita acinis 1-ſpermis.

695. ATRAGENE. *Cal.* nullus. *Cor.* 4-petala maior: interius polypetala. *Sem.* plurima, aristata.

696. CLEMATIS. *Cal.* nullus. *Cor.* 4-petala. *Sem.* plurima, aristata.

697. THALICTRVM. *Cal.* nullus. *Cor.* 4-5-petala. *Sem.* plurima, submutica, nuda.

701. ISOPYRVM. *Cal.* nullus. *Cor.* 5-petala, decidua. *Nectaria* 5. *Capsf.* polyspermae.

702. HELLEBORVS. *Cal.* nullus. *Cor.* 5-petala, persistens. *Nectaria* plura. *Capsf.* polyspermae.

703. CALTHA. *Cal.* nullus. *Cor.* 5-petala. *Capsf.* plurimae. *Nectaria* nulla.

694. ANEMONE. *Cal.* nullus. *Cor.* 6-petala. *Sem.* plurima.

691. MICHELIA. *Cal.* truncatus. *Cor.* 8-petala. *Baccae* 4-spermae, glomeratae.

700. TROLLIVS. *Cal.* nullus. *Cor.* 14-petala. *Nectaria* linearia. *Capsulae* monospermae.

692. UVARIA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 6-petala. *Baccae* polysperm, Recept. longo affixae

693. ANNONA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 6-petala. *Bacca* cortice imbricato polysperma.

689. LIRIODENDRVM. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 6-petala. *Sem.* plurima, lanceolata, imbricata.

690. MAGNOLIA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 9-petala. *Capsf.* glomeratae, 2-valu. *Sem.* pendula.

688. DILLENIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Capsf.* plures connatae: *Recept.* carnoso.

699. RANVNCVLVS. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Sem.* plurim. *Petala.* vngue nectarifero.

698. ADONIS. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5. s. 10 petala. *Sem.* plurima, angulata, corticata.

* *Phytolacca icosandra.*
Nigellae nonnullae.

MONOGYNIA.

640. MARCGRAVIA. *Cor.* 1-petala, calyptriformis. *Cal.* 6-phyllus, imbricatus. *Bacca* multilocularis, polyſperma.
719.

vmbellata. 1. MARCGRAVIA.

641. RHEEDIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* nullus. *Bacca* 3-ſperma.
719.

lateriflora. 1. RHEEDIA. *Arbor ramis articulatis, compreſſis, læuibus, pubeſcentibus. Folia oppoſita, petiolata, lanceolata, integerrima, glabra: petiolis breuibus, pubeſcentibus. Pedunculi axilares, ſubterni, trifidi ſ. triflori.*

643. CAPPARIS. *Cal.* 4-phyllus, coriaceus. *Petala* 4. *Stam.* longa. *Bacca* corticoſa, vnilocularis, pedunculata.
720.

ſpinoſa. 1. C. pedunc. vnifloris ſolitariis, ſtipulis ſpinoſis, fol. annuis, capſ. oualibus,

zeylanica. 2. C. pedunc. vnifloris ſolitariis, ſtipulis ſpinoſis, fol. ouatis vtrinque acutis.

ſepiaria. 3. C. pedunc. vmbellatis, ſtipulis ſpinoſis, fol. annuis ouatis emarginatis.

frondoſa. 11. C. pedunc. vmbellatis, fol. paſſim confertis. *Sp. pl. 1674.*

ferruginea. 8. C. pedunc. vmbellatis, fol. perſiſtentibus lanceolatis ſubtus tomentoſis, flor. octandris.

Baducca. 4. C. pedunc. vnifloris, fol. perennantibus ouato-oblongis determinate confertis nudis.

cynophallophora. 5. C. pedunc. multifloris terminalibus, fol. oualibus obtuſis perennantibus, glandulis axillaribus. Capparis pedunc. multifloris, axillis glanduloſis, fol. oblongis vtrinque nitidis. *Iacq. amer. 158. t. 98.*

pulcherrima. 12. C. pedunc. racemoſis, fol. oblongis obtuſis, fruct. baccatis. *Sp. pl. 1674.*

linea-

linearis. 13. C. pedunc. ſubracemoſis, fol. linearibus, *Spec. Plant.* 1674.
Breynia. 7. C. pedunc. racemoſis, fol. perſiſtentibus oblongis, calycibus pedunculisque tomentoſis, flor. octandris.
haſtata. 10. C. pedunc. multifloris, fol. haſtato-lanceolatis nitidis.
flexuoſa. 9. C. pedunc. congeſtis terminalibus, fol. perſiſtentibus oblongis obtuſis glabris, ramis flexuoſis.
filiquoſa. 6. C. pedunc. multifloris compreſſis, fol. perſiſtentibus lanceolato-oblongis acuminatis ſubtus punctatis.

644. ACTAEA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Bacca* 1-locularis. *Sem.* ſemiorbiculata.
722.

ſpicata. 1. A. racemo ouato, fruct. baccatis.
racemoſa. 2. A. racemis longiſſimis, fruct. ſiccis.

645. SANGVINARIA. *Cor.* 8-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Siliqua* ouata, 1-locularis.
723.

canadenſ. 1. SANGVINARIA. *Folium rádicale tenerrime in ſinu fovet & amplectitur infantiam floris, more Oſmundae Lunariae, & eſt folium vnicum cucullatum & Scapus vniflorus e ſingula gemma radicis biualui. Stamina meae vix habuere Antheras polliniferas; an dioica? Lacteſcens ſucco fuluo Chelidonii.*

646. PODOPHYLLVM. *Cor.* 9-petala. *Cal.* 3-phyllus. *Bacca* vnilocularis, coronata ſtigmate.
723.

peltatum. 1. P. fol. peltatis lobatis.
diphyllum. 2. P. fol. binatis ſemicordatis. *an Sanguinariae ſpecies? cum Folium vnicum binnatum & Scapus aphyllus radicalis & Capſula oblonga; flores non vidi; ſub Podophylli ſpecie miſſum.*

547. CHELIDONIVM. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Siliqua* 1-locularis, linearis.
723.

maius. 1. C. pedunc. vmbellatis.

Glaucium. 2. C. pedunc. vnifloris, fol. amplexicaulibus ſinuatis, caule glabro;
cornicula-tum. 3. C. pedunc vnifloris, fol. ſeſſilibus pinnatifidis, caule hiſpido.
hybridum. 4. C. pedunc. vnifloris, fol. pinnatifidis linearibus, caule laeui, ſiliquis triualuibus.

648. PAPAVER. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Capſula* 1-locularis, ſub ſtigmate perſiſtente poris dehiſcens.

725.

* *Capſulis hiſpidis.*

hybridum. 1. P. capſ. ſubgloboſis toroſis hiſpidis, caule folioſo multifloro.
Argemon. 2. P. capſ. clauatis hiſpidis, caule folioſo multifloro.
alpinum. 3. P. capſ. hiſpida, ſcapo vnifloro nudo hiſpido, fol. bipinnatis. Papaver argemone fl. flavo, perpuſillum. *Pluk. alm. 179. t. 247. f. 3. Cipp. 2. t. 6. f. 4.*
nudicaule. 4. P. capſ. hiſpidis, ſcapo vnifloro nudo hiſpido, fol. ſimplicibus pinnato-ſinuatis.

* * *Capſulis glabris.*

Rhaeas. 6. P. capſ. glabris globoſis, caule piloſo multifloro, fol pinnatifidis inciſis.
dubium. 5. P. capſ. oblongis glabris, caule multifloro ſetis adpreſſis, fol. pinnatifidis inciſis.
ſomnifer- 7. P. calyc. capſulisque glabris, fol. amplexicaulibus inciſis.
cambri-cum. 8. P. capſ. glabris oblongis, caule multifloro laevi, fol. pinnatis inciſis.
orientale. 9. P. capſ. glabris, caulibus vnifloris ſcabris folioſis, fol pinnatis ſerratis.

649. ARGEMONE. *Cor.* 6-petala. *Cal.* 3-phyllus. *Capſ.* ſemi-valuis.

727.

mexican. 1. A. capſ. ſexualuibus, fol. ſpinoſis.
armeniac. 2. A. capſ. triualuibus.
pyrenaic. 3. A. capſ. quadriualuibus, caule nudo.

650. CAMBOGIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Pomum* 8-loculare. *Sem.* ſolitaria.
728.

Gutta. 1. CAMBOGIA.

651. MVNTINGIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-partitus. *Bacca* 5-locularis, polyſperma.
728.

Calabura. 1. MVNTINGIA. Malam-toddali. *Rheed. mal. 4. t. 40. Flores axillares, bini, albi.*

652. SARRACENIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* duplex, 3-phyllus. & 5-phyllus. *Capſula* 5-locularis, ſtyllo ſtigmate clypeato.
728.

flava. 2. S. foliis ſtrictis.

purpurea. 1. S. foliis gibbis. *Mill. ic. 161. t. 241. P. Collinſon.* Folia *ſeſſilia, cucullata : tubo ventricoſo, ſenſim ampliato : fauce contractiuſcula, margine antice dilatata.* Limbus *reniformis, patulus, emarginatus.* Venter *antice carina membranacea, ſemielliptica, binerui. Sic* metamorphoſis *folii* Nymphaeae *in folium Sarraceniae, vt ipſa aquam pluuialem excipiens & retinens extra aquas creſcat; mira naturae prouidentia!*

653. NYMPHAEA. *Cor.* polypetala. *Cal.* 4-5 phyllus. *Bacca* multilocularis, truncata.
729.

lutea. 1. N. fol. cordatis integerrimis, calyce pentaphyllo maiore.

alba. 2. N. fol cordatis integerrimis, calyce quadrifido.

Lotus. 3. N. fol cordatis dentatis.

Nelumbo. 4. N. fol. peltatis vndique integris. *Capſula dehiſcit ſtigmate variis poris perforato pro totidem ſeminibus; matura his tinnitat. Semina continent aliquot folia, antequam germinant, intra ſe perfecta.*

654. BIXA. *Cor.* 10-petala. *Cal.* 5-dentatus. *Capſ.* hiſpida, 2-valuis.
730.

Orellana. 1. BIXA.

655. SLOANEA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus, deciduus. *Stigma* perforatum. *Bacca* corticoſa, echinata, polyſperma, dehiſcens.
730.

dentata. 1. S. fol. cordato-ouatis denticulatis, ſtipulis ſerratis. *Deſcriptio Loeflingii quadrat.*
emargin. 2. S. fol. oblongis integerrimis emarginatis.

1239. TREWIA. *Cor.* o. *Cal.* 3-phyllus, ſuperus. *Capſ.* 3-cocca.
1661.

nudiflora. TREVIA.

656. MAMMEA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Bacca* maxima, 4-ſperma.
731.

americ. 1. M. ſtamin. flore breuioribus. *Jacq. amer. 268. Folia oppoſita.*
aſiatica. 2. M. ſtamin. flore longioribus.

657. OCHNA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Baccae* monoſpermae, receptaculo ſubrotundo magno affixae.
731.

ſquarroſa. 1. O. racemis lateralibus.
Jabotap. 2. O. racemis terminalibus.

659. GRIAS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus. *Stigma* ſeſſile, cruciatum. *Drupa* nucleo octoſulcato.
732.

cauliflora. 1. GRIAS. *Folia maxima.*

658. CA-

658. CALOPHYLLVM. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-
732. phyllus, coloratus. *Drupa* globoſa.

inophyllum. 1. C. foliis oualibus.
Calaba. 2. C. foliis ouatis obtuſis.

660. TILIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-partitus. *Bacca*
733. ſicca, globoſa, 5-locularis, 5-valuis, baſi dehiſcens.

europaea. 1. T. floribus nectario deſtitutis.
americ. 2. T. floribus nectario inſtructis.

661. LAETIA. *Cor.* 5-petala ſ. o. *Cal.* 5-phyllus.
733. *Fructus* 1-locularis, trigonus. *Semina* arillo pulpoſo,

apetala. 1. L. flor. apetalis.
completa. 2. L. flor. petaloideis completis.

663. ELAEOCARPVS. *Cor.* 5-petala, lacera. *Cal.*
734. 5-phyllus. *Drupa* nucleo criſpo.

ſerrata. 1. ELAEOCARPVS.

664. LECYTHIS. *Cor.* 6-petala. *Cal.* 6-phyllus.
734. *Nectarium* ligulatum, ſtaminiferum. *Pericarp.* circumſciſſum, polyſpermum.

Ollaria. 1. L. fol ſeſſilibus cordato-ouatis ſubintegerrimis. *Natura fructu ollas producit, vt in Cucurbita & Crescentia lagenas.*
minor. 2. L. fol. petiolatis lanceolatis ſerratis. *Jacq. amer. 168. t. 109. e Carthagena Americes.*

672. DELIMA. *Cor.* o. *Cal.* 5-phyllus. *Bacca* 2-
736. ſperma.

ſarment. A. DELIMA. Peripu. *Rheed. mal. 7. t. 34. Burm. ind. t. 35. f. 1.*

666. VATERIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus. *Capſ.*
734. 3-valuis, 1-locularis, 3-ſperma.

indica. 1. VATERIA.

670. MENTZELIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus.
735. *Capſ.* infera, cylindrica, poly-
ſperma.

aſpera, 1. MENTZELIA.

1286. LOASA. *Authore Cl.* Iacquinio.

CAL. *Perianthium.* pentaphyllum, ſuperum, perſiſtens: foliolis lanceolatis, patentiſſimis: lateribus reflexis.

COR. *Petala* quinque, obouata, cucullata, magna, patentiſſima, in vngues baſi attenuata.

Nectarium foliolis quinque, cum petalis alternantibus, conniuentibus in conum acutum, corolla paulo brevioribus, lanceolatis, rugoſis, ariſtatis duplici filamento.

STAM. *Filamenta* numeroſa, capillaria, nectario longiora, ad quodlibet petalum 15-17. *Antherae* incumbentes, ſubrotundae.

PIST. *Germen.* ſubouatum, feminiferum. *Stylus* filiformis, erectus, longitudine ſtaminum. *Stigma* ſimplex, obtuſum.

PER. *Capſula* turbinata, vnilocularis, apice triualuis: valuulis ſemiouatis, acutis- patulis.

SEM. plurima, ouata, parua. *Receptacula* tria, linearia, capſulae longitudinales.

hiſpida. 1. LOASA. *Jacq. obſ. 3. p. 15. t. 38.*
Ortiga chilenſis vrens, acanthi folio. *Feuill. peruu. 2. p. 757. t. 33 ?*
Habitat in Peru ☉.

Peta-

Petala *flaua*. Nectaria *alba punctis rubris viridibusque*. Filamenta *in quinque faſciculos interſtitia nectariorum occupantia*. Stamina *primum erecta, demum reflexa*. Affinitate Mentzeliae *accedit*. *Jacq*.

667. LAGERSTROEMIA. *Cor.* 6-petala, criſpa. *Cal.* 6-fidus, campanulatus. *Stam.* multa: horum 6 exteriora craſſiora, petalis longiora.
734.

indica. A. LAGERSTROEMIA.

668. THEA. *Cor.* 6-ſ. 9-petala. *Cal.* 5-ſ. 6-phyllus. *Capſ.* 3-cocca-
734.

bohea. 1, T. flor. hexapetalis. *Folia alterna, elliptica, conſiſtentia, laeuia. obtuſiuſcula, obtuſe ſerrata: Petiolis breuibus, ſubtus teretibus, gibbis. Stipulae nullae. Nobis attulit viuam primus Car. Guſt. Ekenberg, nauis ad chinenſes gubernator, d. 3. Octob. 1763.; obtinetur, ſi ſemina, ad nauis receſſum e China, in naue terrae mandentur, vt in itinere ſerius germinent.*

viridis. 2. T. flor. enneapetalis.

669. CARYOPHYLLVS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus, duplicatus. *Bacca* 1-ſperma, infera.
735.

aromatic. 1. CARYOPHYLLVS.

671. PLINIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus. *Bacca.* 1-ſperma, ſulcata.
735.

pinnata. 1. PLINIA.

673. CISTVS. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus: foliolis 736. duobus minoribus. *Capſula.*

* *Exſtipulati fruticoſi.*

capenſis. 1. C. arboreſcens exſtipulatus, fol. ouato-lanceolatis petiolatis trinerviis denticulatis vtrinque nudis.

villoſus. 2. C. arboreſcens exſtipulatus, fol. ouatis petiolatis hirtis.

populifol. 2. C. arboreſcens exſtipulatus, foliis cordatis laeuibus acuminatis petiolatis. *Adultior ramis & foliis nudus eſt. Petala alba.*

laurifol. 4. C. arboreſcens exſtipulatus, foliis oblongo-ouatis petiolatis trinerviis ſupra glabris: petiolis baſi connatis.

ladaniferus. 5. C. arboreſcens exſtipulatus, fol. lanceolatis ſupra laeuibus, petiolis baſi coalitis vaginantibus.

monſpelienſis. 6. C. arboreſcens exſtipulatus, fol. lineari-lanceolatis ſeſſilibus vtrinque villoſis trinerviis.

ſaluifol. 10. C. arboreſcens exſtipulatus, fol. ouatis petiolatis vtrinque hirſutis.

incanus. 7. C. arboreſcens exſtipulatus, fol. ſpatulatis tomentoſis rugoſis: inferioribus baſi connatis vaginantibus.

creticus. 6. C. arboreſcens exſtipulatus, fol. ſpatulato-ouatis petiolatis eneruiis ſcabris, calyc. lanceolatis.

albidus. 8. C. arboreſcens exſtipulatus, fol. ouato-lanceolatis tomentoſis incanis ſeſſilibus ſubtrineruiis.

criſpus. 11. C. arboreſcens exſtipulatus, fol. lanceolatis pubeſcentibus trineruiis vndulatis.

halimifolius. 12. C. arboreſcens exſtipulatus, foliolis duobus calycinis linearibus. γ. Ciſtus fruticoſus erectus, fol. oppoſitis ſeſſilibus vtrinque incanis. *Mill. ic. t. 290.*

libanotis. 13. C. arboreſcens exſtipulatus, fol. linearibus reuolutis, flor. vmbellatis.

* * *Exſtipulati ſuffruticoſi.*

vmbellatus. 14. C. ſuffruticoſus procumbens exſtipulatus, fol. oppoſitis, flor. vmbellatis.

laeui-

Ciſtus *Flore albo* 3, 4, 5, 6, 10.
flore purpureo 7, 11, 8, 9.
flore luteo 12, 13.

laeuipes. 15. C. ſuffruticoſus adſcendens exſtipulatus, fol. alternis faſciculatis filiformibus glabris, pedunc. racemoſis. Ciſtus ſuffruticoſus procumbens, fol. alternis confertis inaequalibus ſetaceis. *Ger. prou. 394. t. 14.* Ciſtus humilis maſſiliotica, camphoratae tenuiſſimis foliis glabris. *Pluk. alm. 107. t. 84. f. 6. (excluſis prioribus ſynonymis.)*

Fumana. 16. C. ſuffruticoſus procumbens exſtipulatus, fol. alternis linearibus margine ſcabris, pedunc. vnifloris. *β.* Chamae-Ciſtus, ericae folio, elatior luteus. *Bauh. pin. 466.* Helianthemum tenuifolium glabrum erectum, luteo flore. *Bauh. hiſt. 2. p. 18. Stamina circiter 16 antherifera & totidem exteriora caſtrata.*

canus. 18. C. ſuffruticoſus procumbens exſtipulatus, fol. oppoſitis obouatis villoſis ſubtus tomentoſis, flor. ſubumbellatis.

marifolius. 19. C. ſuffruticoſus exſtipulatus, fol. oppoſitis oblongis petiolatis planis ſubtus incanis.

indicus. 17. C. ſuffruticoſus exſtipulatus, fol. oppoſitis hiſpidis: inferioribus ouatis; ſuperioribus lanceolatis, ramis patentibus.

oelandicus. 20. C. ſuffruticoſus procumbens exſtipulatus, fol. oppoſitis oblongis vtrinque glabris, petiolis ciliatis, petalis emarginatis. Ciſtus ſuffruticoſus procumbens, foliis nudis oppoſitis viridibus, floribus. ſubumbellatis calycibus hirſutis. *Ger. prou. 396.* Ciſtus helianthemos, flore paruo luteo. *Bauh. hiſt. 2. p. 17.*

* * * *Exſtipulati herbacei.*

Tuberaria. 21. C. exſtipulatus perennis, fol. radicalibus ouatis trineruiis tomentoſis; caulinis glabris lanceolatis: ſummis alternis.

guttatus. 22. C. herbaceus exſtipulatus, fol. oppoſitis lanceolatis trinerviis, racemis ebracteatis.

canadenſis. 23. C. herbaceus exſtipulatus, fol. omnibus alternis lanceolatis, caule adſcendente.

* * * * *Stipulati herbacei.*

ledifolius. 24. C. herbaceus erectus glaber ſtipulatus, florib. ſolitariis ſubſeſſilibus folio ternato oppoſitis.

ſalici-

ſalicifolius. 25. C. herbaceus patulus villoſus ſtipulatus, flor. racemoſis erectis, pedicellis horizontalibus.

aegyptiacus. 26. C. herbaceus erectus ſtipulatus, fol. lineari-lanceolatis petiolatis, calyc. inflatis corolla maioribus.

* * * * * *Stipulati ſuffruticoſi.*

ſquamatus. 27. C. ſuffruticoſus ſtipulatus, fol. obtectis ſquamis orbiculatis.

ſurreianus. 28. C. ſuffruticoſus ſtipulatus, procumbens fol. ouato-oblongis ſubpiloſis, petalis lanceolatis.

nummularius. 29. C. ſuffruticoſus ſtipulatus, fol. inferioribus orbiculatis; ſuperioribus ouatis.

ſerpyllifolius. 30. C. ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis oblongis, calycibus laeuibus.

thymifolius. 31. C. ſuffruticoſus ſtipulatus procumbens, fol. ouali-linearibus oppoſitis breuiſſimis congeſtis,

piloſus. 32. C. ſuffruticoſus ſtipulatus erectiuſculus, fol. linearibus ſubtus biſulcatis incanis, calyc. laeuibus. *Flores albi.*

racemoſus. C. ſuffruticoſus ſtipitatus, fol. lanceolato-linearibus ſubtus tomentoſis. *Mant. 76,*

Helianthemum, 33. C. ſuffruticoſus procumbens, ſtipul. lanceolatis, foliis oblongis reuolutis ſubpiloſis.

hirtus. 34. C. ſuffruticoſus ſtipulatus patulus, foliis ouatis, calycibus hiſpidis.

apenninus, 35. C. ſuffruticoſus ſtipulatus patulus, foliis lanceolatis hirtis. *Flores albi. Frutex pedalis ramoſo-patulus.*

polifolius. 36. C. ſuffruticoſus ſtipulatus procumbens, fol. oblongo-ouatis incanis, calyc. laeuibus, petal. ſerratis.

arabicus. 37. C. ſuffruticoſus ſtipulatus, fol, alternis lanceolatis planis laeuibus. *Cent. 39.*

674. PROCKIA. *Cal.* 3-phyllus praeter foliola 2 baſeos. *Cor.* 0. *Bacca.* quinquangularis, polyſperma. 745.

Crucis. 1. PROCKIA.

675. CORCHORVS. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus, deciduus. *Capſ.* pluri-valuis, loculamentoſa.
746.

olitorius. 2. C. capſ. oblongis ventricoſis, fol. ſerraturis infimis ſetaceis.

trilocularis. 7. C. capſ. trilocularibus triualuibus triquetris: angulis bifidis ſcabris, fol. oblongis: ſerraturis infimis ſetaceis. *Mant.* 77. *Capſulae apex ſimplex eſt.*

aeſtuans. 3. C. capſ. oblongis trilocularibus triualuibus ſexſulcatis ſexcuſpidatis, fol. cordatis: ſerraturis infimis ſetaceis.

capſularis. 4. C. capſ. ſubrotundis depreſſis rugoſis, fol. ſerraturis infimis ſetaceis. Ganja ſatiua. *Rumph. amb.* 5. *p.* 212; *t.* 78. *f.* 1. Calyx *foliolis concauis, incuruatis, extus punctatis, corolla breuioribus.* Petala *emarginata.*

hirſutus. 4. C. capſ. ſubrotundis lanatis, fol. ouatis obtuſis tomentoſis aequaliter ſerratis.

hirtus. 5. C. capſ. oblongis cauleque piloſis, fol. oblongis aequaliter ſerratis.

ſiliquoſus. 1. C: capſ. linearibus compreſſis biualuibus, fol. lanceolatis aequaliter ſerratis. Flores *vernales apetali tetrandri, calyce 4-phyllo; autumnales 5-petali, polyandri, calyce 5-phyllo.*

676. SEGVIERIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. *Capſ.* monoſperma: ala magna terminata alulisque lateralibus.
747.

americana. 1. SEGVIERIA. *Iacq. amer.* 170. *Folia alterna, petiolata, elliptica, emarginata. Aculei, iuxta folium, recurui. Flores racemoſi, albi, foetidi.*

677. SYMPLOCOS. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Stamina* petalis inſerta.
747.

martinicenſis. 1. SYMPLOCOS. *Iacq. amer.* 166. *Folia ouata, petiolata, ſerrata, nitida. Flores albi.*

DIGYNIA.

678. PAEONIA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Styli* 0. *Capſ.* polyſpermae. 747.

officinalis. 1. P. foliolis oblongis.

tenuifol. 2. P. foliolis linearibus multipartitis. *Linn. dec. t.* 5. *Folia in caule plurima, nec* 3 *tantum, vt prioris. Germina pilis purpureis.*

679. CVRATELLA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 4. *Styli* 2. *Capſ.* 2-partita: loculis diſpermis. 748.

americ. A. CVRATELLA. *Statura Coccolobae.*

680. CALIGONVM. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 0. *Styli* 0. *Fructus* hiſpidus, 1-ſpermus. 748.

Polygonoides. CALLIGONVM. *Plantam habui a p. m. Gronouio, qui aſſeuerabat eſſe* Polygonoiden T; *figura minus quadrat; videant autoptae, vtrum ſit eadem, nec ne.*

TRIGYNIA.

681. DELPHINIVM. *Cal.* 0. *Petala* 5. *Nectarium* bifidum, poſtice cornutum. *Siliquae* 3 ſ. 1. 748.

* *Vnicapſulares.*

Conſolida. 1. D. nectariis monophyllis, caule ſubdiuiſo.

Ajacis. 2. D. nectariis monophyllis, caule ſimplici, *Dic quibus in terris inſcripti nomina Regum naſcantur flores, et phyllida ſolus habeto. Virg. ecclog. Ecce ſuos gemitus foliis inſeripſit et AIA.*

aconiti. D. nectariis monophyllis antice quadridentatis, capſ. ſolitariis, ramulis vnifloris. *Mant.* 77.

* * *Tri-*

* * *Tricapſulares.*

ambiguum. 3. D. nectariis monophyllis, corollis hexapetalis, fol. multipartitis.

peregrinum. 4. D. nectariis diphyllis, corollis enneapetalis, fol. multipartitis obtuſis.

grandiflorum. 5. D. nectariis diphyllis: labellis integris, flor. ſubſolitariis, fol. compoſitis lineari-multipartitis. *Mill. ic. t. 250. f. 1.*

elatum. 6. D. nectariis diphyllis, labellis bifidis apice barbatis, fol. inciſis, caule erecto. *Mill. ic. t. 250. f. 2.*

Staphiſagria. 7. D. nectariis tetraphyllis petalo breuioribus, fol. palmatis lobis obtuſis. *Varietas foliis albo-venoſis differt Foliis inciſis, 7-partitis, laciniis acuminatis; Corollae calcari non obſoleto, ſed longitudine pedicelli.*

682. ACONITVM. 750. *Cal.* 0. *Petala* 5: ſupremo fornicato. *Nectaria* 2, pedunculata, recurua. *Siliquae.* 3 ſ. 5.

* *Tricapſulares.*

lycoctonum. 1. A. fol. palmatis multifidis villoſis.

vncinatum. 2. A. fol. multilobis, corollarum galeis apice longiore ipſa baſi.

Napellus. 4. A. foliorum laciniis linearibus ſuperne latioribus linea exaratis.

pyraenaicum. 5. A. fol. multipartitis: laciniis linearibus incumbentibus ſquarroſis.

* * *Quinquecapſulares.*

Anthora. 6. A. flor. pentagynis, foliorum laciniis linearibus.

variegatum. 3. A. flor. pentagynis, fol. laciniis ſemipartitis ſuperne latioribus.

TETRAGYNIA.

683. TETRACERA. 751. *Cal.* 6-phyllus. *Capſulae* 4.

volubilis. 1. TETRACERA.

PENTAGYNIA.

684. AQVILEGIA. *Cal.* o. *Petala* 5. *Nectaria* 5. corniculata, inter petala. *Capſ.* 5, diſtinctae.
752.

viſcoſa. 4. A. nectariis . . . caul. ſubnudo ſubunifloro viſcoſo piloſo, fol. ſubtrilobis. *Mant.* 77. *t. Nectaria qualia?*
vulgaris. 1. A. nectariis incuruis. *Sibirica varietas conſtans, humilior, caerulea nectariorum oris albidis.*
alpina. 2. A. nectariis rectis, petalo lanceolato breuioribus.
canadenſ. 3. A. nectariis rectis, ſtaminibus corolla longioribus.

685. NIGELLA. *Cal.* o. *Petala* 5. *Nectaria* 5, trifida, intra corollam. *Capſulae* 5, connexae.
753.

* *Pentagynae.*

damaſcen. 1. N. flor. inuolucro folioſo cinctis.
ſatiua. 2. N. piſtillis quinis, capſulis muricatis ſubrotundis, foliis ſubpiloſis.
aruenſis. 3. N. piſtillis quinis, pet. integris, capſ. turbinatis.

* * *Decagynae.*

hiſpanica. 4. N. piſtillis denis corollam aequantibus.
orientalis. 7. N. piſtillis denis corolla longioribus.

686. REAUMURIA. *Cal.* 6-phyllus. *Petala* 5. *Capſ.* 1-locularis, 5-valuis, polyſperma.
754.

vermiculata. A. REAUMURIA. *Folia ſparſa, linearia, carnoſa, ſubtus conuexa, acuta, ſeſſilia, patentia.*

HE-

HEXAGYNIA.

687. STRATIOTES. *Spatha* diphylla. *Perianth.* 3-fidum. *Petala* 6. *Bacca* 6-locularis, infera. 754. 3.

Aloides. 1. S. fol. enſiformi-triangulis ciliato-aculeatis. *Flores nobis viſi omnes fuere hermaphroditi, at dioicos vidit in Germania Bergen, Zinn, Fabricius; inde etiam maſculum florem miſit Schreber, qui in hermaphrodito antheras ſteriles obſeruauit.*

Aliſmoid. 2. S. foliis cordatis.

POLYGYNIA.

688. DILLENIA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Capſulae* polyſpermae, connatae, pulpa repletae. 754.

indica. 1. DILLENIA.

689. LIRIODENDRON. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 9. *Sem.* imbricata in ſtrobilum. 755.

Tulipifera. 1. L. fol. lobatis. *Buttn. cun.* 229. *

Liliifera. 2. L. fol. lanceolatis.

690. MAGNOLIA. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 9. *Capſ.* 2-values, imbricatae. *Sem.* baccata, pendula. 755.

grandiflora. 1. M. fol. lanceolatis perennantibus.

glauca. 2. M. fol. ouato-oblongis ſubtus glaucis.

acuminata. 4. M. fol. ouato-oblongis acuminatis.

tripetala. 3. M. fol. lanceolatis, petalis exterioribus dependentibus.

691. MICHELIA. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 15. *Baccae* multae, 4-ſpermae.
756.

Champac. 1. M. fol. lanceolatis. *Flores lutei, ſuaueolentiſſimi.*
Tſiampaca. 2. M. fol. lanceolato-ouatis. *Mant.* 78.

692. UVARIA. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 6. *Baccae* numeroſae, pendulae, 4-ſpermae.
756.

zeylanic. 1. V. foliis integerrimis.
japonica. 2. V. foliis ſerratis.

693. ANNONA. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 6. *Bacca* polyſperma, ſubrotunda, cortice ſquamato.
756.

muricata. 1. A. fol. ouali-lanceolatis glabris nitidis planis, pomis muricatis. *Iacq. obſ.* 10. *t.* 5.
ſquamoſa. 2. A. fol. oblongis ſubundulatis, fruct. obtuſe ſubſquamatis. *Iacq. obſ.* 13. *t.* 6.
reticulata. 3. A. fol. lanceolatis, fruct. ouatis reticulato-areolatis. *Iacq. obſ.* 14. Anona-maram. *Rheed. mal.* 3. *p.* 23. *t.* 30, 31. (*non Catesbaei*).
paluſtris. 4. A. fol. oblongis obtuſiuſculis glabris, fruct. areolatis. Guanabanus paluſtris, fructu laeui viridi. *Plum. mſſ.*
glabra. 5. A. fol. lanceolato-ouatis, fruct. conoidibus glabris.
triloba. 6. A. fol. lanceolatis, fruct. trifidis.
aſiatica. 7. A. fol. lanceolatis glabris nitidis lineatis.
africana. 8. A. fol. lanceolatis pubeſcentibus.

694. ANEMONE. *Cal.* 0. *Petala* 6-9. *Sem.* plura.
758.

* Hepaticae *flore ſubcalyculato.*

Hepatica. 1. A. fol. trilobis integerrimis.

** Pulſatillae *pedunculo inuolucrato*, *Seminibus caudatis.*

patens. 3. A. pedunc inuolucrato, fol. digitatis multifidis.

ſulphu-

fulphurea. 23. A. pedunc. inuolucrato, fol. triplicato-pinnatis piloſis planis acute inciſis, ſem. caudatis. *Mant.* 78. Petala *ſupra lutea.*

baldenſis. 22. A. fol. biternatis hirſutis. *Mant.* 78.

vernalis. 4. A. pedunc. inuolucrato, fol. pinnatis, flore erecto. (*excluſa hortenſi CB.*).

Pulſatill. 5. A. pedunc. inuolucrato, pet. rectis, fol. bipinnatis.

pratenſis. 6. A. pedunc. inuolucrato, pet. apice reflexis, foliis bipinnatis.

* * * Anemones *caule folioſo, Seminibus caudatis.*

alpina. 7. A. fol. caulinis ternis connatis ſupradecompoſitis multifidis, ſeminibus hirſutis caudatis.

coronaria. 8. A fol. radicalibus ternato-decompoſitis, inuolucro folioſo.

hortenſis. 9. A. foliis digitatis. Anemone fol. digitatis: lobis inciſis, petalis lanceolatis numeroſis. *Ger. prov.* 380.

palmata. 2. A. fol. cordatis ſublobatis, calyce hexaphyllo colorato.

* * * * Anemonoidea *flore nudo, Seminibus ecaudatis.*

ſibirica. 18. A. caule vnifloro, inuolucro folioſo obtuſo. *Folia ſuborbiculata, ternata: foliola inciſo-palmata, ciliata, petiolis hirtis.*

ſylueſtris. 10. A. pedunc. nudo, ſem. ſubrotundis hirſutis.

virginiana. 11. A. pedunc. alternis longiſſimis, fruct. cylindricis, ſem. hirſutis muticis.

decapetala. 23. A. caule vnifloro, flor. decapetalo, fol. ternatis lobatis radicalibus. *Mant.* 79.

dichotoma. 12. A. caule dichotomo, fol. ſeſſilibus oppoſitis amplexicaulibus trifidis inciſis. *Linn. dec.* 29. *t.* 15.

trifolia. 13. A. fol. ternatis ouatis integris ſerratis, caule vnifloro.

quinquef. 14. A. fol. quinatis oualibus ſerratis, caule vnifloro.

nemoroſ. 15. A. ſem. acutis, foliol. inciſis, caule vnifloro.

apennina. 16. A. ſem. acutis, foliol. inciſis, petalis lanceolatis numeroſis.

ranunculoides. 17. A. ſem. acutis, foliol. inciſis, pet. ſubrotundis, caule ſub-bifloro.

narciſſifl. 19. A. flor. vmbellatis, ſem. depreſſo oualibus nudis.

fascicul. 20. A. flor. vmbellatis congestis, fol. multifidis.
Thalictroides. 21. A. flor. congestis, fol. caulinis simplicibus verticillatis, radicalibus biternatis.

695. ATRAGENE. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 12
764. *Sem.* caudata.

zeylanic. 1. A. cirrhis diphyllis.
alpina. 2. A. fol. duplicato-ternatis serratis, petal. exterioribus quaternis. Clematis fol. compositis & decompositis: foliolis ternatis serratis. *Mill. ic. t.* 284. *Plantam alpinam ab austriaca distinguendam monet. Iacq. vind.* 249.
capensis. 3. A. fol. ternatis: foliolis incisis dentatis, petalis exterioribus quinis.

696. CLEMATIS. *Cal.* o. *Petala* 4, rarius 5
765. *Sem.* caudata.

* *Scandentes.*

Viticella. 1. C. fol. compositis decompositisque: foliolis ouatis sublobatis integerrimis. *Folia floralia ouata. Petala deltoidea.*
Viorna. 2. C. fol. compositis decompositisque: foliolis quibusdam trifidis.
crispa. 3. C. fol. simplicibus ternatisque: foliolis integris trilobisue.
orientalis. 4. C. fol. compositis: foliolis incisis angulatis lobatis cuneiformibus, petalis internevillosis.
virginiana. 6. C. fol. ternatis: foliolis cordatis sublobato-angulatis scandentibus, flor. dioicis.
dioica. 5. C. fol. ternatis integerrimis, flor. dioicis.
Vitalba. 8. C. fol. pinnatis: foliolis cordatis scandentibus. *Variat Foliolis integris et incisis.*
cirrhosa. 7. C. cirrhis scandentibus.
Flammula. 9. C. fol. inferioribus pinnatis laciniatis: summis simplicibus integerrimis lanceolatis. Clematis foliis pinnatis: foliolis alternis: caulinis flexuosis scandentibus. *Ger. prov.* 382.

* * *Ere-*

* * *Erectae.*

mariti. 10. C. fol. pinnatis linearibus, caul. ſimplicibus hexagonis.
ma.
erecta. 8. C. fol. pinnatis: foliolis ouato-lanceolatis integerrimis, caule erecto, flor. pentapetalis tetrapetalisque.
integrif. 9. C. fol. ſimplicibus ouato-lanceolatis, flor. cernuis.

697. THALICTRVM. *Cal.* 0. *Petala* 4 ſ. 5. *Sem.* 767. ecaudata.

alpinum. 1. T. caule ſimpliciſſimo ſubnudo, racemo ſimplici terminali.
foetidum. 2. T. caule paniculato filiformi ramoſiſſimo folioſo.
tuberoſum. 3. T. flor. pentapetalis. radice tuberoſa. *Mill. ic. t. 265. f. 2.*
cornuti. 4. T. flor. pentapetalis, radice fibroſa.
dioicum. 5. T. floribus dioicis.
minus. 6. T. fol. ſexpartitis, flor. cernuis.
ſibiricum. 8. T. fol. tripartitis: foliolis ſubreflexis argute inciſis, flor. cernuis.
purpuraſcens. 7. T. fol. tripartitis, caule foliis duplo altiore, floribus cernuis.
anguſtif. 9. T. foliolis lanceolato-linearibus integerrimis.
flauum. 10. T. caule folioſo ſulcato, panic. multiplici erecta.
ſimplex. 14. T. caule folioſo ſimpliciſſimo angulato. *Mant.* 78.
lucidum. 11. T. caule folioſo ſulcato, fol. linearibus carnoſis.
aquil gif. 12. T. fruct. pendulis triangularibus rectis, caule tereti.
contortum. 13. T. fruct. pendulis triangularibus contortis, caule ſubancipiti. *Diſtinctum a T. aquilegifolio.*

698. ADONIS. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* quinis 771. plura absque nectario. *Sem.* nuda.

aeſtiualis. 1. A. floribus pentapetalis, fructibus ouatis.
autumn. 2. A. floribus octopetalis, fructibus ſubcylindricis.
vernalis. 3. A. flore dodecapetalo, fructu ouato.
apennina. 4. A. floribus pentdecapetalis.

capenſis. 5. A. floribus decapetalis, fructibus depreſſis, foliis duplicato-ternatis: foliolis ſerratis cordatis. *Folia biternata, radicalia: foliolis ſubcordatis, ſerratis, rigidis: Petiolis hirtis. Scapi aphylli, teretes, piloſi, terminati Vmbella compoſita. Inuolucra et Inuolucella hexaphylla, lanceolata. Pedunculi partiales tres exteriores; tres interiores et vnicus centralis vniflorus; reliqui quadriflori. Calyx 5-phyllus, ouato-oblongus, concauus, albidus. Petala* 10, *lanceolata, alba, calyce duplo longiora. Filamenta multa, linearia, petalis* ½ *breuiora. Antherae ouatae, paruae. Piſtilla multa, in capitulum congeſta. Styli extrorſum flexi, longitudine ſtaminum. Stigmata obtuſa. Foliatio iuuoluta.*

699. RANUNCULUS. 772.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5 intra vngues poro mellifero. *Sem.* nuda.

* *Foliis ſimplicibus.*

flammul. 1. R. fol. ouato-lanceolatis petiolatis, caule declinato.

reptans. 2. R. fol. linearibus, caule repente. *Oed. dan. t.* 108.

Li gua. 3. R. fol. lanceolatis, caule erecto.

nodiflor. 4. R. fol. ouatis petiolatis, flor. ſeſſilibus.

gramineus. 5. R. fol. lanceolato-linearibus ſtriatis ſeſſilibus, caule vnifloro, radice carnoſa. *Varietas α radice bulboſa, β tuberoſa eſt. Caulis foliis* 2 *alternis.*

parnaſſif. 6. R. fol ſubouatis neruoſis integerrimis petiolatis, flor. vmbellatis.

amplexicaulis. 7. R. fol. ouatis acuminatis amplexicaulibus, caule multifloro, radice faſciculata.

bullatus. 8. R. fol. ouatis ſerratis, ſcapo nudo vnifloro.

Ficaria. 9. R. fol. cordatis angulatis petiolatis, caul. vnifloro.

Thora. 10. R. fol. reniformibus ſubtrilobis crenatis: caulino ſeſſili: floribus lanceolatis, caule ſubbifloro. *Iacq. obſ.* 25. *t.* 13.

* * *Foliis diſſectis et diuiſis.*

creticus. 11. R. fol. radicalibus reniformibus crenatis ſublobatis: caulinis tripartitis lanceolatis integerrimis, caule multifloro.

caſſu-

caſſubicus. 12. R. fol. radicalibus ſubrotundo-cordatis crenatis, caulinis digitatis dentatis, caule multifloro.

auricomus. 13. R. fol. radicalibus reniformibus crenatis inciſis; caulinis digitatis linearibus, caule multifloro.

abortivus. 14. R. fol. radicalibus cordatis crenatis; caulinis ternatis angulatis, caule ſubtrifloro.

ſceleratus. 15. R. fol. inferioribus palmatis; ſummis digitatis, fructibus oblongis.

aconitifolius. 16. R. fol. omnibus quinatis lanceolatis inciſo-ſerratis. *Oed. dan. t.* 111.

platanifolius. R. fol. palmatis laeuibus inciſis, caule erecto, bracteis linearibus. *Mant.* 79.

illyricus. 17. R. fol. ternatis integerrimis lanceolatis.

aſiaticus. 18. R. fol. ternatis biternatisque: foliolis trifidis inciſis, caule inferne ramoſo.

rutaefol. 19. R. fol. ſupradecompoſitis, caule ſimpliciſſimo vnifolio vnifloro, radice tuberoſa.

glacialis. 20. R. calyc. hirſutis, caule bifloro, fol. multifidis.

niualis. 21. R. calyc. hirſuto, caule vnifloro, fol. radicalibus palmatis: caulinis multipartitis ſeſſilibus.

alpeſtris. 22. R. fol. radicalibus ſubcordatis obtuſis tripartitis: lobis trilobatis: caulino lanceolato integerrimo, caule ſubunifloro. *Folia ſimilia R. aquatilis natantibus. Calyx reflexus, glaber. Petala alba, biloba.*

lapponicus. 23. R. fol. tripartitis lobatis obtuſis, caule ſubnudo vnifloro.

monſpeliacus. 24. R. fol. tripartis crenatis, caule ſimplici villoſo ſubnudo vnifloro.

bulboſus. 25. R. calyc. retroflexis, pedunc. ſulcatis, caule erecto multifloro, fol. compoſitis.

repens. 26. R. calyc. patulis, pedunc. ſulcatis, ſtolonibus repentibus, fol. compoſitis. *An varietas prioris?*

polyanthemos. 27. R. calyc. patulis, pedunc. ſulcatis, caule erecto, fol. multipartitis.

acris. 28. R. calyc. patulis, pedunc teretibus, fol. tripartito-multifidis: ſummis linearibus.

lanuginoſus. 29. R. calyc. patulis, pedunc. teretibus, caule petiolisque hirſutis, fol. trifidis lobatis crenatis holoſericeis.

chaero-

choerophyllus. 30. R. calyc. retroflexis, pedunc. ſulcatis, caule erecto vnifloro, fol. compoſitis linear. multifidis.

paruulus. 39. R. hirtus, fol. trilobis inciſis, caul. erecto ſubunifloro. *Mant.* 79.

aruenſis. 31. R. ſem. aculeatis, ſol. ſuperioribus decompoſitis linearibus.

muricatus. 32. R. ſem. aculeatis, fol. ſimplicibus lobatis obtuſis glabris, caule diffuſo.

paruiflor. 33. R. ſem. muricatis, fol. ſimplicibus laciniatis acutis hirtis, caule diffuſo.

orientał. 34. R. ſem. ſpinoſo-ſubulatis recuruis, calyc. reflexis, fol. multifidis.

grandiflor. 35. R. caule erecto bifolio, fol. multifidis: caulinis alternis ſeſſilibus.

falcatus. 36. R. fol. filiformi-ramoſis, ſcapo nudo vnifloro, ſem. falcatis.

hederac- 37. R. fol. ſubrotundis trilobis integerrimis, caule repente.

aquatilis. 38. R. fol. ſubmerſis capillaceis, emerſis peltatis.

700. TROLLIVS *Cal.* o. *Petala* circiter 14. *Capſ.* plurimae, ouatae, monoſpermae.
782.

europaeus. 1. T. coroll. conniuentibus, nectariis longitudine ſtaminum.

aſiaticus. 2. T. coroll. patentibus, nectariis longitudine petalorum.

701. ISOPYRVM. *Cal.* o. *Petala* 5. *Nectaria* 3-fida, tubulata. *Capſ.* recurvae, polyſpermae.
783.

fumarioid. 1. I. ſtipulis ſubulatis, petalis acutis.

thalictroid. 2. I. ſtipulis ouatis, petalis obtuſis.

aquileg. 3. I. ſtipulis obſoletis.

702. HELLEBORVS. *Cal.* o *Petala* 5 ſ. plura. *Nectaria* bilabiata, tubulata. *Capſ.* polyſpermae, erectiuſculae.
783.

hyemalis. 1. H. flore folio inſidente.
niger. 2, H. ſcapo ſubbifloro ſubnudo, fol. pedatis.
viridis. 3. H. caule multifloro folioſo, fol. digitatis.
foetidus. 4. H. caule multifloro folioſo, fol- pedatis.
trifolius. 5. H. ſcapo vnifloro, fol. ternatis.

703. CALTHA. *Cal.* o. *Petala* 5 *Nectaria* o. *Capſ.* plures, polyſpermae.
784.

paluſtris. 1. CALTHA.

704. HYDRASTIS. *Cal.* o. *Petala* 3. *Nectaria.* o. *Bacca* compoſita acinis monoſpermis. *Elliſ.*
784.

canadenſ. 1. HYDRASTIS. Warneria. *Mill. ic.* 190. *t.* 285.

CLAS-

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

* *Calyces subquinquefidi.*

1236. PERILLA. *Styli* duo! *Stam.* distantia.
722. LEONVRVS. *Antherae* punctis osseis adspersae.
714. GLECOMA. *Antherarum* paria cruciata!
709. HYSSOPVS. *Filamenta* distantia recta! *Cor.* ringens.
713. MENTHA. *Filamenta* distantia, recta. *Cor* subaequalis.
712. SIDERITIS. *Stigma* alterum vaginans alterum!
711. LAVANDVLA. *Corolla* resupinata!
706. TEVCRIVM. *Corollae* lab. superius nullum, sed bipartitum!
705. AIVGA. *Corollae* lab. superius staminibus brevius!
723. PHLOMIS. *Corollae* lab. superius hirtum!
718. BETONICA. *Corollae* lab. superius planum, adscendens, tubo cylindrico. *Stam.* longitudine faucis.
716. LAMIVM. *Corollae* lab. inferius vtrinque dente setaceo!
717. GALEOPSIS. *Corollae* lab. inferius supra bidentatum!
719. STACHYS. *Corollae* lab. inferius lateribus reflexum. *Stam.* deflorata ad latera deflexa.
710. NEPETA. *Corollae* lab. inferius crenatum. *Faux* margine reflexo.
707. SATVREJA. *Corolla* laciniis subaequalibus. *Stamina* remota.
720. BALLOTA. *Calyx* 10 striatus. *Corollae* lab. superius fornicatum.
721. MARRVBIVM. *Cal.* 10-striatus. *Corollae* lab. superius rectum.
724. MOLVCCELLA. *Calyx* campanulatus, corolla amplior, dentibus spinosis.

* * *Calyces bilabiati.*

734. SCVTELLARIA. *Calyx* fructiferus operculatus!
727. THYMVS. *Calyx* fauce villis clausus.

732. OCY-

732. Ocymvm. *Corolla* reſupinata! *Filamenta* bina baſi proceſſu!
735. Prvnella. *Filamenta* omnia apice bifurca!
736. Cleonia. Stigmata 4!
733. Trichostema. *Filamenta* longiſſima!
729. Dracocephal- *Corollae* faux inflato-dilatata!
726. Origanvm. *Strobilus* calyces colligens!
725, Clinopodivm. *Inuolucrum* calyces colligens.
708. Thymbra. *Calyx* vtrinque linea ciliata carinatus. *Stylus* ſemibifidus. *Cor.* labia plana.
731. Melittis. *Cal.* tubo corollae amplior. *Corollae* lab. ſuperius planum, integrum. *Antherae* cruciatae.
728. Melissa. *Cal.* angulatus, ſcarioſus, labio ſuperiore adſcendente.
730. Horminvm. *Corollae* quatuor laciniae ſubaequales: quinta maiore emarginata.
737. Prasivm. *Semina* baccata!
738. Phryma. *Semen* vnicum!

ANGIOSPERMIA.

* *Calyces bifidi.*

778. Obolaria. *Capſ.* 1-locularis. *Cor.* campanulata, 4-fida, *Filamenta* ex diuiſuris corollae.
779. Orobanche. *Capſ.* 1-locularis. *Cor.* ſubaequalis, 4-fida. *Glandula* ſub baſi germinis.
770. Hebenstretia. *Capſ.* 2-ſperma. *Cor.* 1-labiata, 4-fida. *Stam.* margini laterali corollae inſerta.
754. Torenia. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* perſonata. *Filamenta* duo, bifida.
793. Acanthvs. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* 1-labiata, 3-fida *Antherae* villoſae.
762. Crescentia. *Bacca* 1-locularis. *Cor.* tubo campanulata. *Germen* pedicellatum. *Sem.* 2-locul

** *Calyces trifidi.*

761. Halleria. *Bacca* 2-locul. *Cor.* 4-fida: labio ſuperiore longiore.

*** *Calyces quadrifidi.*

769. Selago. *Semen* 1, inuolutum corolla inaequali.
781. Lippia. *Semen* 1, biloculare. *Cor.* hypocraterif. *Cal.* compreſſus.

743. LATHRAEA. *Capſ.* 1-locularis. *Cor.* perſonata. *Glandula* ſub germine.

739. BARTSIA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* perſonata. *Cal.* coloratior.

741. EVPHRASIA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* perſonata. *Antherae* inferiores hinc ſpinoſae.

740. RHINANTHVS. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* perſonata. *Capſ.* compreſſa.

742. MELAMPYRVM. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* perſonata. *Sem.* bina, gibboſa.

749. SCHWALBEA. *Capſ.* 2-locularis? *Cor.* perſonata. *Cal.* lacin. ſuperiores ſenſim minores.

785. BARLERIA. *Capſ.* 2. locularis. *Cor.* infundibuliformis. *Sem* bina. *Capſ.* elaſtica.

767. LOESELIA. *Capſ.* 3-locularis. *Cor.* laciniis ſecundis. *Stam.* petalo aduerſa.

763. GMELINA. *Drupa* nucleo 2-locul. *Cor.* bilabiata. *Anth.* binae craſſiores bipartitae.

765. LANTANA. *Drupa* nucleo 2-locul. *Cor.* hypocraterif. *Stigma* vncinatum.

* * * * *Calyces quinquefidi.*

1237. AVICENNIA. *Capſ.* 1-locularis, coriacea. *Cor.* labio ſuperiore quadrato. *Sem.* vnicum.

745. TOZZIA. *Capſ.* 1-locularis. *Cor.* hypocrateriformis. *Sem.* vnicum.

776. LIMOSELLA. *Capſ.* 1-locularis. *Cor.* campan. regular. *Sem.* plurima.

773. BROVALLIA. *Capſ.* 1-locularis. *Cor.* hypocrateriformis. *Sem.* numeroſa.

1265. VANDELLIA. *Capſ.* 1-locularis. *Cor.* ringens. *Stam.* 2-inferiora e diſco labii enata.

749. GESNERIA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* ſupera.

756. SCROPHVLARIA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* reſupinata. *Lab.* ſegmento intermedio interno.

777. STEMODIA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* inaequalis. *Stam.* bifida. *Anth.* geminae.

757. CELSIA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* rotata. *Filamenta* lanata.

775. SIBTHORPIA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* rotata. *Stam.* 2 et 2 approximata.

768. CAFRARIA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* campanulata. *Stigma* cordatum, biualve.

758. DIGITALIS. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* campan. ſubtus ventricoſa. *Stam.* declinata.

759. BIGNONIA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* campanulata. *Sem.* alata, imbricata.

784. RVELLIA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* campanulata. *Stam.* per paria approximata.

772. BVCHNERA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* hypocrateriformis. *Limbi* laciniis obcordatis aequalibus.

771. ERINVS. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* bilabiata: labio ſuperiore breuiſſimo reflexo.

764. PETRAEA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* rotata, calyce colorato minor. *Sem.* ſolitaria.

1264. MANVLEA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* limbus 5-partitus: lacinia infima profundiore reflexa.

750. ANTIRRHINVM. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* perſonata ſubtus Nectario prominente.

792. COLVMNEA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* ringens ſupra baſin gibba. *Anth.* connexae.

747. GERARDIA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* hypocrat. inaequal. *Capſ.* baſi dehiſcens. *Sem.* 1.

746. PEDICVLARIS. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* perſonata. *Sem.* tunicata.

783. MIMVLVS. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* perſonata. *Cal.* priſmaticus.

780. DODARTIA. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* perſonata: lab. ſuperiore breui, adſcendente.

748. CHELONE. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* perſonata, inflata, clauſa. *Rudim.* filamenti 5: ti.

782. SESAMVM. *Capſ.* 2-locularis. *Cor.* campanulata, inaequalis. *Rudim.* filamenti 5: ti.

753. MARTYNIA. *Capſ.* 5-locularis. *Cor.* campanulata. *Rudim.* filamenti 5: ti.

752. CRANIOLARIA. *Capſ.* 5-locularis. *Cor.* hypocraterif. *Tubo* filiformi longiſſimo.

794. PEDALIVM. *Nux.* bilocularis.

774. LINNAEA. *Bacca* 3-locul. ſicca. *Cor.* campanul. *Cal.* ſuperus!

791. BONTIA. *Bacca* 1-ſperma. *Cor.* lab. inf. reuolutum. *Sem.* plicatum.

766. CORNVTIA. *Bacca* 1-ſperma. *Cor.* ringens. *Stylus* longiſſimus.

789. CLERODENDRON. *Bacca* 1-ſperma. *Cor.* ringens: tub. anguſto. *Stam.* longiſſima.

788. VOLKAMERIA. *Bacca.* 2-ſperma. *Cor.* laciniis ſecundis. *Sem.* bilocularia.

760. CITHAREXYLON. *Bacca* 2-ſperma. *Cor.* ſubaequalis. *Sem.* 2-locularia.

787. OVIEDA. *Bacca* 2-ſperma. *Cor.* longiſſima: limbo 3-fido. *Cal.* fructiferus campanulatus.

790. VITEX. *Bacca* 4-ſperma. *Cor.* ringens: lab. ſuperiore trifido.

786. DVRANTA. *Bacca* 4-ſperma. *Cor.* ſubringens tubo curuo. *Sem.* bilocularia.

755. BESLERIA. *Bacca* polyſperma. *Cor.* inaequalis. *Bacca* 1-locularis.

** ** ** ** *Calyces multipartiti.*

751. CYMBARIA. *Capſ.* 1-locularis. *Cor.* ringens. *Cal.* multipartitus.

** ** ** ** ** *Polypetali.*

795. MELIANTHVS. *Capſ.* 4-locular. 4-loba. *Cor.* 4-petala. labium inferius conſtituens.

GYM-

Melianthus *tetrapetalus, reliqui omnes huius claſſis monopetali.*

GYMNOSPERMIA.

705. AJVGA. *Corollae* labium ſuperius minimum.
785. *Stamina* labio ſuperiore longiora.

orientalis. 1. A. flor. reſupinatis.
pyramidalis. 2. A. tetragono-pyramidalis villoſa, fol. radicalibus maximis.
alpina. 5. A. caule ſimplici, foliis caulinis radicalia aequantibus. *Mant. 80.*
geneuenſ. 3. A. fol. tomentoſis lineatis, calycibus hirſutis.
reptans. 4. A. glabra, ſtolonibus reptantibus.

706. TEVCRIVM. *Corollae* labium ſuperius (nullum) vltra baſin 2-partitum, diuaricatum vbi ſtamina.
786.

campanul. 1. T. fol. multifidis, flor. lateralibus ſolitariis.
orientale. 2. T. fol. multifidis, flor. racemoſis.
Botrys. 3. T. fol. multifidis, flor. lateralibus ternis pedunculatis.
Chamaepithys. 6. T. fol. trifidis linearibus integerrimis, flor. ſeſſilibus lateralibus ſolitariis, caule diffuſo.
niſſolianum. 4. T. fol. trifidis quinqueſidisque filiformibus, flor. pedunculatis ſolitariis oppoſitis, caul. decumbente.
pſeudo-pithys. 5. T. fol. tripartitis trifidis linearibus, flor. racemoſis, caul. hirto. *Ger. prou. 276. Calyces ariſtati.*
Iua. 7. T. fol. ſubtricuſpidatis linearibus: flor. ſeſſilibus lateralibus ſolitariis.
mauritanum. 8. T. fol. pinnato-multifidis, caule ſimpliciſſimo erecto, bracteis ſubulato-palmatis.
fruticans. 9. T. fol. integerrimis ellipticis ſubtus tomentoſis, flor. lateralibus ſolitariis pedunculatis. Teucrium fruticans bœticum. *Dill. elth. t. 284. f. 366 368.*
latifolium. 10. T. fol. integerrimis rhombeis acutis villoſis: ſubtus tomentoſis.
creticum. 11. T. fol. lanceolato-linearibus integerrimis, flor. racemoſis ternis.
Marum. 12. T. fol. integerrimis ouatis petiolatis: ſubtus tomentoſis, flor. racemoſis oppoſitis.

multiflor. 13. T. fol. ouatis: ſuperne glabris ſerrato-dentatis, flor. racemoſis: verticillis ſexfloris.

ſibiricum. 14. T. fol. ſerratis ouatis, pedunculis ſolitaris trifloris: intermedio ſeſſili, bracteis lineari-lanceolatis. *Folia vtrinque nuda, ouata, ſerrata.*

ſalicifolium. 34. T. fol. lanceolato-ellipticis obtuſiuſculis integerrimis, calyc. quadrifidis ſolitariis. *Mant. 80.*

aſiaticum. 33. T. fol. lanceolatis repando-ſerratis baſi rectangulis, flor. ſolitariis. *Mant. 80.*

cubenſe. 32. T. fol. obouatis ſerrato-inciſis glabris in petiolum attenuatis, flor. ſolitariis pedunculatis. *Iacq. obſ. 2. t. 29. e Cuba.*

arduini. 35. T. fol. ouatis ſerratis, racemo ſpicato tereti ſeſſili terminali. *Mant. 81.*

canadenſe. 15. T. fol. ouato-lanceolatis ſerratis, caule erecto, racemo tereti terminali, verticillis hexaphyllis.

virginicum. 17. T. fol. ouatis inaequaliter ſerratis, racemis terminalibus. *Caulis rubens, pubeſcens.*

hircanicum. 16. T. fol. cordato-oblongis obtuſis, caule brachiato dichotomo, ſpicis longiſſimis terminalibus ſeſſilibus ſpiralibus.

Scorodonia. 18. T. fol. cordatis ſerratis petiolatis, racemis lateralibus ſecundis, caule erecto.

paſſilienſe. 19. T. fol. ouatis rugoſis inciſo-crenatis incanis, caulibus erectis, racemis rectis ſecundis.

Scordium. 20. T. fol. oblongis ſeſſilibus dentato-ſerratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuſo.

Chamaedrys. 22. T. fol. cuneiformi-ouatis inciſis crenatis petiolatis, flor. ternis, caulibus procumbentibus ſubpiloſis.

lucidum. 21. T. fol. ouatis acute inciſo-ſerratis glabris, flor. axillaribus ternis, caule erecto laeui.

flauum. 23. T. fol. cordatis obtuſe ſerratis: bracteis integerrimis concauis, caule fruticoſo, flor. racemoſis ternis.

montanum. 24. T. corymbo terminali, fol. lanceolatis integerrimis: ſubtus tomentoſis.

ſupinum. 25. T. corymbo terminali, fol. linearibus: margine reuolutis.

pyrenaicum. 26. T. corymbo terminali, fol. cuneiformi-orbiculatis crenatis.

Polium. 27. T. ſpicis ſubrotundis, fol. oblongis obtuſis crenatis tomentoſis ſeſſilibus, caul. proſtrato.
capitatum. 29. T. capitulis pedunculatis, fol. lanceolatis crenatis tomentoſis, caule erecto.
pumilum. 28. T. capitulis terminalibus ſeſſilibus, foliis linearibus planis quadrifariam confertis, caule procumbente tomentoſo.
ſpinoſum. 30. T. ſpinoſum, calycib. labio ſuperiore ouato, coroll. reſupinatis, pedunc. geminis.
mucron. 31. T. fol. ſerratis, ſpinis terminalibus, coroll. rectis.

707. SATVREIA. 593.

Corollae laciniae ſubaequales, *Stamina* diſtantia.

virgin. 1. S. capitulis terminalibus, fol. lanceolatis.
iuliana. 2. S. verticillis faſtigiatis. fol. lineari-lanceolatis.
Thymbra. 3. S. flor. verticillatis hiſpidis, fol. oblongis acutis.
graeca. 4. S. pedunculis ſubtrifloris lateralibus, inuolucellis calyce breuioribus. *Adultior inſequentibus annis corymbis ſolitariis; primo geminis.*
montana. 6. S. pedunculis dichotomis lateralibus ſolitariis, fol. mucronatis lineari-lanceolatis.
hortenſis. 6. S. pedunculis bifloris.
capitata. 7. S. flor. ſpicatis, fol. carinatis punctatis ciliatis.
ſpinoſa. 8. S. ramis ſpinoſis, fol. hiſpidis.
viminea. 9. S. pedunc. axillaribus trifloris, inuolucris linearibus, fol. lanceolato-ouatis integerrimis.

708. THYMBRA. 795.

Calyx ſubcylindricus, bilabiatus, vtrinque linea villoſa exaratus. *Stylus* ſemibifidus.

ſpicata. 1. T. flor. ſpicatis.
verticill. 2. T. flor. verticillatis.

709. HYSSOPVS. 796.

Corollae labium inf. lacinula intermedia crenata. *Stamina* recta, diſtantia.

officinalis. 1. H. ſpicis ſecundis, fol. lanceolatis.

Leonurus. 2. H. coroll. reſupinatis, ſtaminibus inferioribus corolla breuioribus, fol. cordatis.
Nepetoid. 3. H. caule acuto quadrangulo.

710. NEPETA. 796.

Corollae labium inf. lacinula intermedia crenata: faux margine reflexo. *Stamina* approximata.

Cataria. 1. N. flor. ſpicatis: verticillis ſubpedicellatis, fol. petiolatis cordatis dentato-ſerratis.
pannonica. 2. N. flor. paniculatis, fol. cordatis petiolatis obſolete crenatis.
violacea. 3. N. verticillis pedunculatis corymboſis, fol. petiolatis cordato-oblongis dentatis.
veranica. 5. N. flor. paniculatis, fol. lanceolatis ſerratis ſeſſilibus nudis.
Nepetella. 4. N. flor. racemulis: raceminis 5-floris, fol. cordato-lanceolatis dentatis tomentoſis.
nuda. 6. N. flor. racemis verticillis nudis, fol. cordato-oblongis ſeſſilibus ſerratis.
hirſuta. 7. N. flor. ſeſſilibus verticillato-ſpicatis, verticillis tomento obuolutis.
italica. 8. N. flor. ſeſſilibus verticillato-ſpicatis, bracteis lanceolatis longitudine calycis, fol. petiolatis.
uberoſa. 10. N. ſpicis ſeſſilibus terminalibus, bracteis ouatis coloratis, fol. ſummis ſeſſilibus.
ſcordotis. 9. N. ſpicis terminalibus ſeſſilibus: bracteis ſubcordatis villoſis, fol. cordatis obtuſis.
virginica. 11. N. capitulis terminalibus, ſtaminibus flore longioribus, fol. lanceolatis.
indica, 12. N. corollarum labio ſuperiore integerrimo breuiſſimo.
multifid. 13. N. flor. ſpicatis, fol. pinnatifidis integerrimis.
pectinata. 14. N. flor. ſpicatis ſecundis, foliis cordatis nudis, caule fruteſcente, corollis minimis.

711. LAVANDVLA. 800.

Calyx ouatus, ſubdentatus, bracteis ſuffultus. *Corolla* reſupinata. *Stamina* intra tubum

Spica. 1. L. fol. lanceolatis integris, ſpicis nudis.

mul-

multifid. 2. L. fol. duplicato-pinnatifidis.
dentata. 3. L. fol. pinnato-dentatis, ſpic. comoſis.
Stoechas. 4. L. fol. lanceolato-linearibus integerrimis, ſpic. comoſis.

712. SIDERITIS. 881.

Stamina intra tubum corollae. *Stigma* breuius inuoluens alterum.

canarienſis. 1. S. fruticoſa villoſa, fol. cordato-oblongis acutis petiolatis, ſpic. verticillatis ante floreſcentiam mutantibus, ramis diuaricatis.
cretica. 2. S. fruticoſa tomentoſa, fol. cordato-oblongis obtuſis petiolatis, ramis diuaricatis, ſpic. verticillatis.
ſyriaca. 3. S. fruticoſa tomentoſo-lanata, fol. lanceolatis integerrimis, flor. verticillatis.
perfoliata. 4. S. herbacea hiſpido-piloſa, fol. ſuperioribus amplexicaulibus.
montana. 5. S. herbacea ebracteata, calycibus corolla maioribus ſpinoſis: labio ſuperiore trifido.
romana. 6. S. herbacea decumbens ebracteata, calycibus ſpinoſis labio ſuperiori ouato.
incana. 7. S. ſuffruticoſa tomentoſa, fol. lanceolato-linearibus integerrimis, flor. bracteisque dentatis.
hyſſopifolia. 8. S. fol. lanceolatis glabris integerrimis, bracteis cordatis dentato-ſpinoſis, calycibus aequalibus.
ſcordioides. 9. S. fol. lanceolatis ſubdentatis ſupra glabris, bracteis ouatis dentato-ſpinoſis, calycibus aequalibus.
hirſuta. 10. S. fol lanceolatis obtuſis dentatis piloſis, bracteis dentato-ſpinoſis, caul. hirtis decumbentibus.
lanata. 11. S. fol. cordatis obtuſis villoſis, calyc. muticis lanatis, ſpica oblonga, caule erecto.

713. MENTHA. 804.

Corolla ſubaequalis, 4-fida: laciniа latiore emarginata. *Stamina* erecta, diſtantia.

Auricularia. 16. M. ſpicis oblongis, fol. oblongis ſerratis piloſis ſeſſilibus, ſtam. corolla longioribus. *Mant. 81.*

ſylueſtris. 1. M. ſpic. oblongis, fol. oblongis tomentoſis ſerratis ſeſſilibus, ſtam. corolla longioribus.

viridis. 2. M. ſpic. oblongis, fol. lanceolatis nudis ſerratis ſeſſilibus, ſtam. corolla longioribus.

rotundifolia. 3. M. ſpic. oblongis, fol. ſubrotundis rugoſis crenatis ſeſſilibus.

criſpa. 4. M. flor. capitatis, fol. cordatis dentatis vndulatis ſeſſilibus, ſtam. corollam aequantibus.

hirſuta. 15. M. flor. capitatis, fol. ouatis ſerratis ſubſeſſilibus pubeſcentibus, ſtam. corolla longioribus *Mant.* 81.

aquatica. 5. M. flor. capitatis, fol. ouatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla longioribus.

piperita. 6. M. flor. capitatis, fol. ouatis petiolatis, ſtaminibus corolla breuioribus.

ſatiua. 7. M. flor. verticillatis, fol. ouatis acutiuſculis ſerratis, ſtam. corolla longioribus.

gentilis. 8. M. flor. verticillatis, fol. ouatis acutis ſerratis, ſtaminibus corolla breuioribus.

aruenſis. 9. M. flor. verticillatis, fol. ouatis acutis ſerratis, ſtaminibus corollam aequantibus.

exigua. 10. M. flor. verticillatis, fol. lanceolato-ouatis glabris acutis integerrimis.

canadens. 11. M. flor. verticillatis, fol. lanceolatis ſerratis petiolatis piloſis, ſtam. corollam aequantibus.

Pulegium. 12. M. flor. verticillatis, fol. ouatis obtuſis ſubcrenatis, caulibus ſubteretibus repentibus, ſtam. corolla longioribus.

ceruina. 13. M. flor. verticillatis, fol. linearibus, ſtam. corolla longioribus.

canarienſis. 14. M. flor. capitatis axillaribus dichotomis, fol. ouatis crenatis, caule arboreſcente, ſtam. corolla breuioribus.

1236. PERILLA. *Calycis* lacinia ſuprema breuiſſima. *Stamina* diſtantia. *Styli* duo connexi. *Arduin.*

ocymoides. 1. PERILLA. *Gen. plant.* 578. Ocymum fruteſcens. *Sp. plant.* 832. Meliſſa *maxima* foliis ouato-oblongis ſerratis vtrinque acutis baſibus mucronato-glanduloſis, ſpicis ſecundis. *Ard. ſpec.* 2. *p.* 28. *t.* 13.

714. GLECOMA. *Antherarum* ſingulum par in formam crucis conniuens, *Calyx* 5-fidus.
807.

hederac. 1. G. fol. reniformibus crenatis.

716. LAMIVM. *Corollae* lab. ſup. integrum, fornicatum; lab. inf. 2-lobum; faux vtrinque margine dentata.
808.

Oruala. 1. L fol. cordatis inaequaliter arguteque ſerratis, corollis fauce inflata, cal. coloratis. *ß.* Oruala garganica. *Sp. pl.* 807. *

garganicum. 2. L. fol. cordatis pubeſcentibus, corollis fauce inflata: tubo recto dente vtrinque gemino.

laeuigatum. 3. L. fol. cordatis rugoſis, caule laeui, calyc. glabris longitudine tubi corollae.

maculatum. 4. L. fol. cordatis acuminatis, verticillis decemfloris. *Macula alba foliorum aeſtate diſparet.*

album. 5. L. fol. cordatis acuminatis ſerratis petiolatis, verticillis vigintifloris.

purpureum. 6. L. fol. cordatis obtuſis petiolatis.

amplexic. 7. L. fol. floralibus ſeſſilibus amplexicaulibus obtuſis.

multifid. 8. L. fol. multipartitis.

771. GALEOPSIS. *Corollae* lab. ſup. ſubcrenatum, fornicatum; lab. inf. ſupra 2-dentatum.
810.

Ladanum. 1. G. internodiis caulinis aequalibus: verticillis omnibus remotis, cal. inertibus.

Tetrahit. 2. G. internodiis caulinis ſuperne incraſſatis, verticillis ſummis ſubcontiguis, cal. ſubpungentibus.

* PAPIAE (ORVALAE) *genus e Michelio conſtitutum, mihi dubium an tea viſum Sp. pl. 808, deleatur e re herbaria, vtpote mera varietas Lamii 1, ex loco vmbroſo rorido tecta, confirmante Horto Bononienſi litteris D. Baſſii.*

Galeobdolon. 4. G. verticillis ſexfloris: inuolucro tetraphyllo. *Genus obſcurum, cum corollae labium aequale, dentibus deſtitutum. Folia interdum albo-maculata.*

718, 810, BETONICA. *Cal.* ariſtatus. *Corollae* lab. ſuper adſcendens, planiuſculum; tubus cylindricus.

officinalis. 1. B. ſpic. interrupta, coroll. labii lacinia intermedia emarginata.

orientalis. 2. B. ſpic. integra, coroll. labii lacinia intermedia integerrima.

alopecuros. 3. B. ſpic. baſi folioſa, coroll. galea bifida. *Folia caulina duabus oppoſitionibus. Bracteae integerrimae. Corollae ochroleucae.*

heraclea. 4. B. ſpica calycibus lanatis: dentibus filiformibus, fol. lanceolatis nudis. *Mant. 83.*

719. 811. STACHYS. *Corollae* lab. ſuper. fornicatum: lab. inferius lateribus reflexum: intermedia maiore emarginata. *Stamina* deflorata verſus latera reflexa.

ſyluatica. 1. S. verticillis ſexfloris, fol. cordatis petiolatis.

paluſtris. 2. S. verticillis ſexfloris, fol. lineari-lanceolatis ſemiamplexicaulibus.

alpina. 3. S. verticillis multifloris, foliorum ſerraturis apice cartilagineis, corollis labio plano.

germanica. 4. S. verticillis multifloris: foliorum ſerraturis imbricatis, caule lanato.

cretica. 5. S. verticillis triginta-floris, calycibus pungentibus, caule hirto.

glutinoſa. 6. S. ramis ramoſiſſimis, fol. lanceolatis glabris.

ſpinoſa. 7. S. ramulis ſpina terminatis.

orientat. 8 S. fol. tomentoſis ouato-lanceolatis: floralibus verticillo breuioribus.

palae-

palaeſtina. 12. S. flor. ſubſpicatis, fol. lanceolatis ſeſſilibus tomentoſis rugoſis integerrimis, calyc. muticis. *Sp. pl.* 1674. Folia *tomentoſo-alba.* Calyx *ſubdecagonus.* Corollae *Lab. ſuperius concauum, integrum, purpuraſcens, margine laterali linea purpurea: L. inferius purpuraſcens: media maiore concaua. Fauce albo-maculata.*

maritima. 13. S. fol. cordatis obtuſis tomentoſis crenatis, bracteis oblongis integerrimis. *Mant. 82.*

aethiopica. 14. S. verticillis bifloris. *Mant. 82.*

hirta. 10. S, verticillis ſexfloris, caulibus proſtratis, coroll. labio ſuperiore bifido diuaricato reflexo.

recta. 15. S. verticillis ſubſpicatis, fol. cordato-ellipticis crenatis ſcabris, caul. adſcendentibus. *Mant. 82.*

annua. 9. S. verticillis ſexfloris, fol. ouato-lanceolatis trineruiis laeuibus petiolatis, caul. erecto.

aruenſis. 11. S. verticillis ſexfloris, fol. obtuſis nudiuſculis, corollis longitudine calycis, caul. debili-

720. BALLOTTA. *Cal.* hypocrateriformis, 5-dentatus, 10-ſtriatus. *Corollae* lab. ſup. crenatum, concauum.
814.

nigra. 1. B. fol. cordatis indiuiſis ſerratis, calycibus acuminatis.

alba. 2. B. fol. cordatis indiuiſis ſerratis, calycibus ſubtruncatis. *Fl. ſuec. 2. n. 540. an varietas praecedentis?*

lanata. 3. B. fol. palmatis dentatis, caule lanato.

ſuaueolens. 4. B. fol. cordatis, ſpicis foliоſis, calycibus truncatis: ariſtis linearibus. *Sem. 4. legit. Iacq. amer.* 172.

diſticha. 5. B. verticillis dimidiatis bipartitis ſemiſpicatis. *Mant. 82.*

721. MARRVBIVM. *Cal.* hypocrateriformis, rigidus. 10-ſtriatus. *Corollae* lab. ſup. 2-fidum, lineare, rectum.
815.

* *Calycibus 5-dentatis.*

Alyſſon. 1. M. fol. cuneiformibus quinquedentatis plicatis, verticillis inuolucro deſtitutis.

pere-

peregrinum. 2. M. fol. ouato-lanceolatis ſerratis, calycum denticulis ſetaceis. *Dill. elth. 219. t. 175. f. 214.*

candidiſſimum. 3. M. fol. ſubouatis lanatis ſuperne emarginato-crenatis, denticulis calycinis ſubulatis. *Dill. elth. 218. t. 174. t. 214.*

ſupinum. 4. M. dentibus calycinis ſetaceis rectis villoſis.

* * *Calycibus* 10-*dentatis.*

vulgare. 5. M. dentibus calycinis ſetaceis, vncinatis.

africanum. 6. M. fol. cordatis ſubrotundis emarginato-crenatis. *Coroll. galea emarginata, piloſa.*

criſpum. 10. M. fol. cordatis ſubrotundis crenato-ſubdentatis, calyc. decemdentatis muticis. *Sp. pl.* 1674. *Caulis ſuffruticoſus, erectus, hirtus. Folia petiolata, rugoſiſſima, crenata, ſubtomentoſa, ſubtus piloſa. Calyx infundibulif.* 10-*dentatus. Corolla purpuraſcens, non piloſa: Lab. ſuperiore ſubrotundo, obtuſo, integro; L. inferiore* 3-*fido: intermedia bifida; lateralibus porrectis. Antherae non vltra faucem, diuerſa ſpecies a Marrubio dictamni ſpurii foliis et facie. Herm. par. t. 200. cui Lab. ſuperius lanceolatum barbatum et ſtamina longitudine labii. Affine M. africano.*

hiſpanicum. 7. M. calycum limbis patentibus: denticulis acutis. *Coroll. Lab. ſuper.* 3. *f.* 4-*fidum.*

Pſeudodictamn. 8. M. calycum limbis planis villoſis, foliis cordatis concauis, caule fruticoſo.

acetabuloſum. 9. M. calycum limbis tubo longioribus membranaceis: angulis maioribus rotundatis.

722. LEONVRVS. 817.

Antherae punctis nitidis adſperſae.

Cardiaca. 1. L. fol. caulinis lanceolatis trilobis.

Marubiaſtrum. 3. L. fol. ouatis lanceolatisque ſerratis, calycibus ſeſſilibus ſpinoſis.

tataricus. 4. L. fol. tripartitis laciniatis, calycibus villoſis. *ex india orientali magis glabra.*

ſibiricus. 5. L. fol. tripartitis multifidis linearibus obtuſiuſculis.

723. PHLOMIS. *Cal.* angulatus. *Corollae* lab. fu-
818. perius incumbens, compreſſum, villoſum.

fruticoſa. 1. P. fol. ſubrotundis tomentoſis crenatis, inuolucris lanceolatis, caule fruticoſo.

purpurea. 1. P. inuolucris linearibus obtuſis calyce breuioribus, fol. cordatis oblongis tomentoſis, caul. ſuffruticoſo.

Niſſolii. 3. P. fol. radicalibus cordato-ſagittatis vtrinque tomentoſis villoſis.

Lychnitis. 4. P. fol. lanceolatis tomentoſis: floralibus ouatis, inuolucris ſetaceis lanatis.

laciniata. 5. P. fol. alternatim pinnatis: foliolis laciniatis, calycibus lanatis.

ſamia. 6. P. fol. ouatis ſubtus tomentoſis, inuolucris ſubulatis ſtrictis tripartitis.

Herba venti. 7. P. inuolucris ſetaceis hiſpidis, foliis ouato oblongis ſcabris, caule herbaceo.

tuberoſa. 8. P. inuolucris hiſpidis ſubulatis, foliis cordatis ſcabris, caule herbaceo.

zeilanica. 9. P. fol. lanceolatis ſubſerratis, capitulis terminalibus, calycibus octodentatis. Clinopodium hyſſopi latioribus foliis maderaſpat. *Pluk. phyt. t. 164. f. 2.* Herba admirationis. *Rumph. amb. 6. p. 39. t. 16. f. 1.* β Leonurus indicus. *Sp. plant. 817.* ☉. Caulis *ſtatura Phlom. Leonuri, bipedalis, erectus, herbaceus, tetragonus, obtuſus.* Folia *lanceolata, ſubtomentoſa, lineata, petiolata. remote ſubſerrata, internodiis longiora.* Verticilli *ſubterminales inuolucro ſubulato.* Calyx *oblique deorſum truncatus, obſolete 7-dentatus: dente ſuperiore longiore.* Corolla *alba: Lab. ſup. hirſuto, breuiſſimo, fornicato, clauſo, integro. Lab. inferiore magno, patente, 2-fido: intermedia ampla, ſubplicata: media vix triloba.* Antherae *nigrae, compreſſae, truncatae.* Stigma *alterum ſeſſile ſupra ſtylum pone apicem: alterum inferius, ſubulatum, acutum.*

indica. 10. P. inuolucris linearibus, calycibus vnilabiati obliquis, fol. ouatis piloſis.

nepe-

nepetifolia, 11. P. fol. cordatis acutis ſerratis ſubtomentoſis, calyc. ſeptemdentatis ariſtatis: ſuprema maiore, caul. herbaceo ⊙. Caulis *ſimplex*, *erectus*, *quadrangulus*, *obtuſus*. Folia *cordata*, *obtuſiuſcule profundeque ſerrata*, *ſubtomentoſa*, *viridia*. Petioli *longitudine foliorum*. Verticilli *aliquot verſus apices globoſi*, *multiflori*. Calyx *ſubpiloſus*, *cylindricus limbo ſpinoſo*, *acutiſſimo*; *dente ſuperiore duplo maiore*; *praeterea dentes 4-6 parui*. Corolla *villoſa*, *facie et colore Ph. Leonuri*, *ſed triplo minor*: *Lab. ſuper. teretiuſculo*, *longo*, *emarginato*; *Lab. infer. breui*, 3*fido*, *laeui*. Inuolucrum *ſubulatum*, *reflexum*. Stamina *per paria cohaerentia*. Stigmata 2, *filiformia*: *ſuperiore dimidio breuiore-*

Leonurus. 12. P. fol. lanceolatis ſerratis, calycibus decagonis decemdentatis muticis, caule fruticoſo.

Leonotis. 13. P. fol. ouatis obtuſis ſubtomentoſis crenatis, calyc. ſeptemdentatis ariſtatis, caule fruticoſo. *Mant. 83. Affinis. P. Leonuri.*

724. MOLVCCELLA. *Cal.* campanulatus, ampliatus, corolla latior, ſpinoſus.

821.

laeuis. 1. M. calycibus campanulatis ſubquinquedentatis: denticulis aequalibus.

ſpinoſa- 2. M. calycibus ringentibus octodentatis.

fruteſc. 3. M. calycibus infundibuliformibus quinquefidis, coroll. calyce longioribus. *Corolla calyce duplo longior. Perſica demum Italica facta. Specimen* perſicum. *Foliis magis pubeſcentibus*, *ſerraturis acutioribus*, *calycis laciniis obouatis*, *membranaceis*, *acutioribus*, *ſubtridentatis*; *certe eadem*; *Cl. Burmannus miſit.*

725. CLINOPODIVM. *Inuolucrum* multiferum, verticilo ſubiectum.

821.

vulgare. 1. C. capitulis ſubrotundis hiſpidis, bracteis ſetaceis.

incanum. 2. C. fol. ſubtus tomentoſis, verticillis explanatis, bracteis lanceolatis.

rugo-

rugoſum. 3. C. fol. rugoſis, capitulis axillaribus pedunculatis explanatis radiatis.

726. ORIGANVM. *Strobilus* tetragonus, ſpicatus, 822. calyces colligens.

aegyptiac. 1. O. fol. carnoſis tomentoſis, ſpic. nudis.
Dictamn. 2. O. fol. inferioribus tomentoſis, ſpicis nutantibus.
ſipylium. 3. O. fol. omnibus glabris, ſpicis nutantibus.
creticum. 4. O. ſpicis aggregatis longis priſmaticis rectis, bracteis membranaceis calyce duplo longioribus.
ſmyrnaeum. 5. O. fol. ouatis acutis ſerratis, ſpicis congeſtis vmbellatim faſtigiatis.
heracleoticum. 6. O. ſpicis longis pedunculatis aggregatis, bracteis longitudine calycum.
vulgare. 7. O. ſpicis ſubrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ouatis.
Onites. 8. O. ſpicis oblongis aggregatis hirſutis, fol. cordatis tomentoſis.
ſyriacum. 9. O. ſpicis longis ternatis pedunculatis villoſis, fol. ouatis villoſis.
Maru. 10. O. ſpicis hirſutis, fol. ouatis tomentoſis ſeſſilibus.
Maiorana. 11. O. fol. ouatis obtuſis, ſpicis ſubrotundis compactis pubeſcentibus.

727. THYMVS. *Calycis* bilabiati faux villis clauſa. 825.

Serpyllum. 1. T. flor. capitatis, caulibus repentibus, fol. planis obtuſis baſi ciliatis. *Calycis dentes ciliati.*
vulgaris. 2. T. erectus, fol. reuolutis ouatis, flor. verticillato-ſpicatis.
Zygis. 3. T. flor. verricillato-ſpicatis, caule ſuffruticoſo, erecto, fol. linearibus baſi ciliatis.
Acinos. 4. T. flor. verticillatis, pedunculis vnifloris, caulibus erectis ſubramoſis, fol. acutis ſerratis.
alpinus. 5. T. verticillis ſexfloris, fol obtuſiuſculis concauis ſubſerratis.

Piperella. T. pedunc. multifloris lateralibus, fol. ouatis obtuſis glabris neruoſis integerrimis. Marum hiſpanicum nigrum. *Bocc. muſ. 2. p. 166. t. 117. Barr. rar. 354. t. 694. Habitat in* Hiſpania. *Similis Meliſſae Nepetae, ſed glabra, Foliis minutis. Dau. Royen.*

cephalotus. 6. T. capitulis imbricatis magnis, bracteis ouatis, fol. lanceolatis,

villoſus. 7. T. capitulis imbricatis magnis, bracteis dentatis, fol. ſetaceis piloſis.

Tragoriganum. 8. T. flor. verticillatis, caule ſuffruticoſo erecto, fol. hiſpidis acuminatis. *Mant. 84.*

728. MELISSA. 827.

Calyx aridus, ſupra planiuſculus: lab. ſuperiore ſubfaſtigato. *Corollae* lab. ſuper. ſubfornicatum 2-fidum; lab. inf. lobo medio cordato.

officinal. 1. M. racemis axillaribus verticillatis: pedicellis ſimplicibus.

grandifl. 2. M. pedunc. axillaribus dichotomis longitudine florum.

Calamintha. 3. M. pedunc. axillaribus dichotomis longitudine foliorum.

Nepeta. 4. M. pedunc. axillaribus dichotomis folio longioribus, caule adſcendente hirſuto. *Caules duriuſculi, vti tota planta hirſuti. Folia ſubcordata, ſupra glabra. Bracteae ſubulatae. Corolla ſubcaerulea, palato albo cæruleoque marginato.*

cretica. 5. M. racemis terminalibus, pedunculis ſolitariis breuiſſimis. *Similis M. Nepetae. Caulis palmaris humilis, rectus, atropurpuraſcens. Folia ouata, parce obtuſeque ſerrata. Verticilli plurimi; e Pedunculis vniflori, aphyllis, inſtar racemi ramos terminantes: Bracteis lanceolatis. Calyces fuſci. Corollae albo-purpuraſcentes.*

fruticoſa. 6. M. ramis attenuatis virgatis, fol. ſubtus tomentoſis, caule fruticoſo. Calamintha montana incana minor. *Morif. hiſt. 3. p. 413. n. 6.*

729. DRACOCEPHALVM. *Corollae* faux inflata: lab. ſup. concauum.
828.

virgin. 1. D. flor. ſpicatis, fol. lanceolatis ſerratis.
canarienſe. 2. D. flor. ſpicatis, fol. compoſitis.
pinnatum. 3. D. flor. ſpicatis, fol. cordatis pinnato-ſinuatis.
peregrinum. 4. D. flor. ſubſpicatis, fol. caulinis ouato-oblongis inciſis, bracteis lineari-lanceolatis denticulato-ſpinoſis.
auſtriac. 5. D. flor. ſpicatis, fol. bracteisque linearibus partitis ſpinoſis.
Ruyshiana. 6. D. flor. ſpicatis, fol. bracteisque lanceolatis indiuiſis muticis.
grandifl. 8. D. flor. verticillatis, fol. ouatis inciſo-crenatis, bracteis lanceolatis integerrimis.
ſibiricum. 7. D. flor. ſubuerticillatis, pedunc. bifidis ſecundis, fol. cordato-oblongis acuminatis nudis.
Moldauica. 9. D. flor. verticillatis, bracteis lanceolatis: ſerraturis capilaceis.
caneſcens. 10. D. flor. verticillatis, bracteis oblongis: ſerraturis ſpinoſis, fol. ſubtomentoſis.
peltatum. 9. D. flor. verticillatis, bracteis orbiculatis ſerrato-ciliatis.
nutans. 10. D. flor. verticillatis, bracteis oblongis ouatis integerrimis, corollis maiuſculis nutantibus.
thymiflorum 11. D. flor. verticillatis, bracteis oblongis integerrimis, corollis vix calyce maioribus.

730. HORMINVM. *Calyx* campanulatus: laciniis 4 ſubaequalibus; 5-ta maiore emarginata. *Corolae* lab. ſuperius concauum.
831.

pyrenaicum. 1. H. fol. ouatis obtuſis, caule nudo. *Bracteae ouatae acuminatae integerrimae. Affinis Dracocephalo.*
virginie. 2. H. fol. cuneiformi-oblongis, caule bifolio.

731. MELITTIS. 832. *Calyx* tubo corollae amplior. *Corolae* lab. ſup. planum; lab. inf. crenatum. *Antherae* cruciatae.

meliſſoph. 1. MELITTIS.

732. OCYMVM. 832. *Calyx* lab. ſuperiore orbiculato; inferiore quadrifido. *Corolae* reſupinatae alterum lab. 4-fidum; alterum indiuiſum. *Filamenta* exteriora baſi proceſſum emitentia.

thyrſiflorum. 8. O. flor. paniculato-faſciculatis, caul. ramoſiſſimo. *Mant. 84.*

monachorum. 9. O. ſtaminibus edentulis: alternis baſi barbatis. *Mant. 85.*

gratiſſimum. 2. O. caule ſuffruticoſo, fol. lanceolato-ouatis, racemis teretibus. (*Excluſo Rumphii ſynonymo.*) *Caulis baſi perennans, ſtrictus. Folia coſta ſupra tomentoſo-caneſcente. Spicae ante antheſin tetragonae bracteis ſubulato-prominentibus. Bracteae cordatae, acutae. Flores parui. Corollae albae antheris luteis.*

album. 10. O. fol. ouatis obtuſis: verticillis racemorum approximatis: nubilibus tetragonis, coroliis crenatis. *Mant. 85.*

Baſilicum. 3. O. foliis ouatis glabris, calycibus ciliatis.

minimum. 4. O. fol. ouatis integerrimis.

ſanctum. 11. O. fol. oblongiuſculis obtuſis ſerratis vndulatis, caule hirto, bracteis cordatis. *Mant. 85. Caulis altro-purpureus.*

americanum. 5. O. fol. ſublanceolatis acuminatis ſubſerratis, racemis teretibus, caule ſubherbaceo.

tenuiflorum. 6. O. fol. ouato-oblongis ſerratis, bracteis cordatis reflexis concauis, ſpicis filiformibus.

menthoides. 7. O. fol. lineari-lanceolatis ſerratis.

ſcutellarioides. 8. O. coroll. falcatis, pedicellis ramoſis. *Mant. 84.*

733. TRICHOSTEMA. *Corolae* labium ſuperius falcatum. *Stamina* longiſſima.
834.

dichotom. 1. T. ſtaminibus longiſſimis exſertis.
brachiat. 2. T. ſtaminibus breuibus incluſis.

734. SCVTELLARIA. *Calyx* ore integro: poſt floreſcentiam clauſo, operculato.
834.

oriental. 1. S. fol. inciſis ſubtus tomentoſis, ſpic. rotundato-tetragonis.
alpina. 2. S. fol. cordatis inciſo-ſerratis crenatis, ſpic. imbricatis rotundato-tetragonis.
supina. 3. S. fol. cordatis inciſo-ſerratis acutis glabris, ſpic. imbricatis rotundato-tetragonis.
lateriflor. 4. S. flor. laeuibus carina ſcabris, racemis lateralibus folioſis.
galericul. 5. S. fol. cordato-lanceolatis crenatis, flor. axillaribus.
baſtifolia. 6. S. fol. integerrimis: inferioribus haſtatis; ſuperioribus ſagitatis.
minor. 7. S. fol. cordato-ouatis ſubintegerrimis, flor. axillaribus.
integrifolia. 8. S. fol. ſeſſilibus ouatis: inferioribus obſolete ſerratis: ſuperioribus integerrimis.
hauanenſis. 14. S. fol. cordato-ouatis crenatis axillaribus, coroll. labio vtroque trifido. *Jacq. obſ. 2. t. 30. Planta procumbens, herbacea, tenella. Pedunculi axillares, vniflori.*
hyſſopifol. 9. S. fol. lanceolatis.
peregrin. 10. S. fol. ſubcordatis ſerratis, ſpic. elongatis ſecundis. *Varietas floribus albis craſſior gaudet foliis ſubpiloſis.*
indica. 11. S. fol. ſubouatis crenatis petiolatis, racemis nudiuſculis.
altiſſima. 12. S. fol. cordato-oblongis acuminatis ſerratis, ſpicis ſubnudis.

cretica. 13. S. villoſa, fol. cordatis obtuſis obtuſeque ſerratis, ſpic. imbricatis: bracteis ſetaceis.

735. PRVNELLA. 837. *Filamenta* bifurca : altero apice antherifera. *Stigma* bifidum.

vulgaris. 1. P. fol. omnibus ouato-oblongis petiolatis.
grandifl. α. P. caerulea, magno flore.
laciniata. 2. P. fol. ouato-oblongis petiolatis: ſupremis quatuor lanceolatis dentatis.
hyſſopif. 3. P. lanceolato-linearibus ciliatis ſubſeſſilibus.

736. CLEONIA. 837. *Filamenta* bifurca : apice altero antherifera. *Stigma* quadrifidum.

luſitanica 1. CLEONIA.

737. PRASIVM. 835. *Baccae* 4, monoſpermae.

maius. 1. P. fol. ouato-oblongis ſerratis.
minus. 2. P. fol. ouatis crena vtrinque duplici. *An varietas praecedentis?*

738. PHRYMA. 838. *Semen* vnicum.

Leptoſtachya. 1. PHRYMA.

ANGIOSPERMIA.

739. BARTSIA. 839. *Cal.* 2-lobus, emarginatus, coloratus. *Corola* minus ipſo calyce colorata; labio ſuperiore longiore. *Capſula* 2-locularis.

coccinea. 1. B. fol. alternis linearibus vtrinque bidentatis.
pallida. 2. B. fol. alternis lanceolatis integerrimis : floralibus ouatis dentatis.

viſco-

viſcoſa 3. B. fol. ſuperioribus alternis ſerratis, flor. diſtantibus lateralibus. *Ger. prou. 283.*
alpina. 4. B. fol. oppoſitis cordatis obtuſe ſerratis.

740. RHINANTHVS. *Cal.* 4-fidus, ventricoſus. 840. *Capſula* 2-locularis, obtuſa, compreſſa.

orientał. 1. R. corollis labio ſuperiore ſubulato incuruo.
Elephas. 2. R. corollis labio ſuperiore ſubulato recto.
Criſtagall. 3. R. corollis labio ſuperiore compreſſo breuiore.
Trixago. 4. R. calycibus hirſuto-tomentoſis, foliis oppoſitis obtuſe ſerratis, caule ſimpliciſſimo.
capenſis. 6. R. calycibus tomentoſis, bracteis ouatis, fol. lanceolatis dentatis. Buchnera africana, foliis dentatis oppoſitis, calycibus ſubtomentoſis fructu longioribus. *Sp. plant. 879. Planta facie Trixaginis a exſiccatione tota nigra euadens. Folia lanceolat, vtrinque dentibus 4. ſ. 3. Spica oblonga Bracteis tomentoſis, ouatis, parum acuminatis. Calyces tomentoſi, quadrifidi, obtuſi, vti Criſtae galli.*
indica. 5. R. fol. ſublanceolatis piloſis integerrimis.
virginic. 6. R. corollis fauce patentibus, fol. ſinuato-dentatis.

741. EVPHRASIA. *Cal.* 4-fidus, cylindricus. *Capſ.* 841. 2-locularis, ouato-oblonga. *Antherae* inferiores altero lobo baſi ſpinoſae.

latifolia. 1. E. fol. dentato-palmatis, flor. ſubcapitatis. *Bracteae palmatae, ſubhirſutae.*
officinal. 2. E. fol. ouatis lineatis argute dentatis.
tricuſpid. 3. E. fol. linearibus tridentatis. *Folia linearia dente vtrinque vnico. Corolla ſimilis E. officinali.*
Odontites. 4. E. fol. linearibus: omnibus ſerratis.
lutea. 5. E. fol. linearibus ſerratis: ſuperioribus integerrimis.
linifolia. 6. E. fol. linearibus: omnibus integerrimis, calyc. glabris. *Ger. prou. 285. (exclusa β varietate).*

viscosa. 7. E. fol. linearibus, calyc. glutinoso-hispidis. *Mant. 86.*

742. MELAMPYRVM. *Cal.* 4-fidus. *Corollae* lab. sup. compressum, margine replicato. *Caps.* 2-locularis obliqua, hinc dehiscens. *Semina* 2-gibba.
842.

cristatum. 1. M. spicis quadrangularibus, bracteis cordatis compactis denticulatis imbricatis.
aruense. 2. M. spicis conicis laxis: bracteis dentato-setaceis coloratis.
uemorosum. 3. M. flor. secundis lateralibus: bracteis dentatis: summis coloratis sterilibus, calyc. lanatis.
pratense. 4. M. flor. secundis lateralibus, fol. coniugationibus remotis. coroll. clauis
syluaticum. 5. M. flor. secundis lateralibus, fol. coniugationibus remotis, coroll. hiantibus

743. LATHRAEA. *Cal.* 4-fidus. *Glandula* depressa, ad basin futurae germinis. *Capsula* 1-locularis.
843.

Clandest. 1. L. caule ramoso subterrestri, flor. erectis solitariis.
Phelypea. 2. L. corollis campanulato-patentibus.
Anbelatum. 3. L. corollarum labiis indiuisis.
Squamaria. 4. L. caule simpliciſſimo, corollis pendulis: labio inferiore trifido.

744. SCHWALBEA. *Cal.* 4-fidus: lobo superiore minimo; infimo maximo emarginato.
844.

americ. 1. SCHWALBEA.

745. TOZZIA. *Calyx* 5-dentatus *Capsula* vnilocularis, globosa, monosperma.
844.

alpina. 1. TOZZIA.

746. PEDICVLARIS. *Calyx* 5-fidus. *Capſula* 2-locularis, mucronata, obliqua. *Semina* tunicata.
845.

paluſtris. 1. P. caule ramoſo, calycibus criſtatis calloſo-punctatis, corollis labio obliquis.

ſyluatica. 2. P. caule ramoſo, calycibus oblongis angulatis laeuibus, corollis labio cordato.

roſtrata. 3. P. caule declinato ſubramoſo, corollis galea roſtrato-acuminatis, calycibus criſtatis ſubhirſutis. Pedicularis caulibus reflexis, ſpica laxa purpurea. *Seguuer. 3. p. 125. Caulis ſimplex ſ. rarius ramoſus.*

Sceptrum Carolin. 4. P. caule ſimplici, floribus terno-uerticillatis, corollis clauſis, calcibus criſtatis, capſulis regularibus.

verticillata. 5. P. caule ſimplici, foliis quaternis.

reſupinata. 6. P. caule ſimplici, fol. lanceolatis ſerratis crenulatis, flor. reſupinatis.

recutita. 7. P. caule ſimplici, ſtaminibus floris palea longioribus. *Caulis ſimplex. Folia pinnatifida, ſerrata. Spica ſubfolioſa. Calyces colorati. Corolla purpurea: galea obtuſa, nec roſtrata.*

triſtis. 8. P. caule ſimplici, corollarum galeis margine villoſis.

flammea. 9. P. caule ſimplici, foliis pinnatis retro-imbricatis.

hirſuta. 10. P. caule ſimplici, fol. dentato-pinnatis linearibus, calycibus hirſutis. Pedicularis pinnis foliorum acute pinnatis, floribus obtuſis purpureis ſpicatis. *Allion. pedem. 52. t. 12. f. 1.*

incarnata. 11. P. caule ſimplici, fol. pinnatis ſerratis, calycibus bifidis obtuſis.

comoſa. 13. P. caule ſimplici, ſpica folioſa, corollis galea acuta emarginata, calycibus quinquedentatis. Pedicularis foliis bis pinnatis, calyce non criſtatis, floribus ochroleucis in ſpicam nudam congeſtis. *Allion. pedem. 50. t. 12. f. 1. (non vero tab. 11. f. 2.)*

folioſa. 15. P. caule ſimplici ſpica folioſa, corollis galea obtuſiſſima integra, calyc. quinquedentatis. *Mant. 86.*

canaden sis. 16. P. caule ſimplici, ſpica ſubfolioſa, corollis galea ſetaceo-bidentata, calyc. deorſum truncatis. *Mant. 86.*

tuberoſa. 14. P. caule ſimplici, calycibus crennatis, corollis galea roſtrato-adunca. Pedicularis alpina lutea. (I. B. *Segu. ver.* 3. *p. 126. Folia Millefolii. Lanugo ad folia & calyces.*

747. GERARDIA. *Cal.* 5-fidus. *Corolla* 2-labiata: lab. inf. 3-partito: lobis emarginatis: medio 2-partito. *Capſ.* 2-locularis, dehiſcens.
848.

tuberoſa. 1. G. fol. ſubouatis tomentoſis repandis longitudine caulis.

delphinif. 2. G. fol. linearibus pinnatifidis, caule ſubramoſo.

purpurea. 3. G. fol. linearibus. *Confer. Pluk. phyt. 12. f. 2.*

flaua. 4. G. fol. lanceolatis pinnato-dentatis, caule ſimpliciſſimo.

pedicularia. 5. G. fol. oblongis duplicato-ſerratis, caule paniculato, calycibus crenatis. *Affinis Pedicular. triſti.*

glutinoſa. 6. G. fol. ouatis ſerratis, bracteis linearibus hiſpidis.

748. CHELONE. *Cal.* 5-partitus. *Rudimentum* filamenti quinti inter ſuprema ſtamina. *Capſ.* 2-locularis.
849.

glabra. 1. C. fol. petiolatis lanceolatis ſerratis; ſummis oppoſitis.

obliqua. 4. C. fol. petiolatis lanceolatis ſerratis oppoſitis. *Mill. dict.* Chelone glabra *β. Sp. plant. 449. Millerus diſtinguit hanc a praecedenti: Radice minus repente, Foliis latioribus, profundius ſerratis: floribus purpureis.*

hirſuta. 2. C. caule foliisque hirſutis. *an mera varietas ſequentis?*

Pentſtemon. 3. C. fol. amplexicaulibus, panicula dichotoma. Cynorynchium nou' anglicanum digitali accedens herba quadricapſularis, floribus albis rictum caninum referentibus. *Pluk. mant. 62 β.* Dracocephalus hirſutus, lyſimachiae foliis latioribus hirſutus, *Moriſ. hiſt. 3. p. 407. ſ. 11. t. 21. f. 3. Caulis teres, pubeſcens. Corolla violacea, rictu clauſo.* 24.

749. GES-

749. GESNERIA. *Cal.* 5-fidus, germini insidens.
850. *Corolla* incurua recuruaque. *Capsula* infera, 2-locularis.

humilis. 2. G. fol. lanceolatis serratis sessilibus, pedunculis ramosis multifloris.

acaulis. 1. G. fol lanceolato-ouatis serratis subpetiolatis terminali-confertis, pedunculis trifloris folio breuioribus.

tomentos. 3. G. fol. ouato-lanceolatis crenatis hirsutis, pedunculis lateralibus longissimis corymbiferis. *Jacq. amer. 179.* Gesneria erecta, fol. lanceolatis rugosis hirsutis, pedunculis longissimis ramosis ex alis superioribus. *Brow. jam. 261.*

750. ANTIRRHINVM. *Cal.* 5-phyllus. *Corollae* basis deorsum prominens, nectarifera. *Capsula* 2-locularis.
851.

* *Foliis angulatis.*

Cymbalaria. 1. A. fol. cordatis quinquelobis alternis, caulibus procumbentibus.

Elatine. 2. A. fol. hastatis alternis, caulibus procumbentibus.

spurium. 3. A. fol. ouatis alternis, caulibus procumbentibus.

aegyptiac. 4. A. fol. hastatis, caule erecto ramosissimo, pedunc, rigescentibus. *Similimum A. Elatines.* Caules *erecti, virgati, vix pubescentes.* Folia *cordata, angulis inferiorum duobus utrinque, superiorum dente unico.* Corollae *similes Elatines, luteae, sed absque nigra macula, at palato purpurascente punctato: Labium superius emarginatum pallidum. Calcar caerulescens, recuruum, longitudine floris.* Pedunculi *reiectis floribus rigent tamquam spinae.*

* * *Foliis oppositis.*

triphyll. 8. A. fol. ternis ouatis. Linaria ficula latifolia triphylla. *Bocc. sic. 44. t. 22.*

triornithophor. 10. A. fol. quaternis lanceolatis, caule erecto ramoso, flor. pedunculatis.

purpur. 11. A. fol. quaternis linearibus, caule erecto ſpicato.

repens. 16. A. fol. linearibus confertis: inferne quaternis, cal. capſulam aequantibus.

monſpeſſulanum. 15. A. fol. linearibus confertis, caule nitido paniculato, pedunc. ſpicatis nitidis. *Affinis maxime A. repentis.*

ſparteum. 14. A. fol. ſubulatis canaliculatis carnoſis: inferioribus ternis, caule paniculato corollisque glaberrimis.

bipunctatum. 13. A. fol. linearibus glabris: inferioribus quaternis, caule erecto paniculato, flor. ſpicato-capitatis.

triſte. 9. A. fol. linearibus ſparſis: inferioribus oppoſitis, nectariis ſubulatis, flor. ſubſeſſilibus. Linaria hiſpanica procumbens. *Mart. dec. 35. f. 2. Caules radicales plures, glabri, ſaepius decumbentes. Folia linearia, ſubcarnoſa, conuexa, rore glauca. Capitulum ante antheſin ſimile A. aruenſi, calyce & bracteis ſolis pubeſcentibus. Corolla colore Loti jacobaei, calcare ſtriato.*

ſupinum. 24. A. fol. ſubquaternis linearibus, caule diffuſo, flor. racemoſis, calcari recto.

aruenſe. 17. A. fol. ſublinearibus: inferioribus quaternis, calycibus piloſo-viſcidis, flor. ſpicatis, caule erecto.

peliſſerianum. 18. A. fol. caulinis linearibus alternis: radicalibus lanceolatis ternis, flor. corymboſis.

ſaxatile. 20. A. foliis lanceolato-linearibus ſparſis villoſis: inferioribus quaternis, caule decumbente, floribus ſpicatis. *Herba tota pubeſcens.*

viſcoſum. 19. A. fol. radicalibus quaternis lanceolatis, caulinis linearibus alternis, calycibus villoſis cauli approximatis.

multicaul. 22. A. fol quinis linearibus carnoſis, flor. capitatis.

glaucum. 21. A. fol. quaternis ſubulatis carnoſis, caulibus erectis, flor. ſpicatis.

alpinum. 23. A. fol. quaternis lineari-lanceolatis glaucis, caule diffuſo, flor. racemoſis calcari recto.

bicorne. 25. A. fol. oppoſitis ouato-oblongis ſerratis, caule erecto, flor. racemoſis, capſulis bicornibus.

villoſum. 5. A. fol. omnibus oppoſitis ouatis villoſis, caulibus ſimplicibus, flor. oppoſitis lateralibus.

origanifol. 6. A. fol. plerisque oppoſitis oblongis, flor. alternis,

minus.

minus. 7. A. fol. plerisque alternis lanceolatis obtusis, caule ramosissimo diffuso.

* * * *Foliis alternis.*

dalmaticum. 28. A. fol. alternis cordatis amplexicaulibus.

hirtum. 29. A. fol. lanceolatis hirtis alternis, flor. spicatis, foliolo calycino supremo maximo.

genistifol. 31. A. fol. lanceolatis acuminatis, panicula virgata flexuosa.

iunceum. 30. A. foliis linearibus alternis, caule paniculato virgato, floribus racemosis.

Linaria. 33. A. fol. lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, flor. imbricatis.(*).

linifolium. 32. A. fol. lanceolatis alternis trineruiis, flor. racemosis: pedunc. distantibus bractea breuoribus.

chalepense. 34. A. fol. lineari-lanceolatis alternis, flor. racemosis, calycibus corolla longioribus, caule erecto.

reflexum. 26. A. fol. ouatis alternis glabris, pedunculis axillaribus: fructiferis elongatis recuruatis, caule procumbente. Antirrhinum procumbens ramosum, fol. alternis ouatis acuminatis integerrimis, flor. cordatis axilaribus. *Allion. cors. 205. f. 1.*

pedunculatum. 27. A. fol. alternis linearibus remotis, flor. paniculatis: pedunc. folio longioribus strictis.

* * * * *Corollis hiantibus aut ecaudatis.*

maius. 35. A. corollis ecaudatis, flor. spicatis, calycibus rotundatis.

orontium. 36. A. coroll· ecaudatis, flor. subspicatis, calycibus corolla longioribus.

papilionaceum. 44. A. corollis ecaudatis, flor. axillaribus, calyc. papilionaceis, fol. carnosis. *Mant. 86.*

Asarina. 37. A. corollis ecaudatis, fol. oppositis cordatis crenatis, caulibus procumbentibus.

molle. 38. A. corollis ecaudatis, fol. oppositis ouatis tomentosis, caulibus procumbentibus.

* * * Co-

(*) PELORIA *Amoen. acad. 1. p. 55. t. 3.* LINARIAE *proles hybrida, eiusdemque qualitatis & constans, radicibus infinite sese multiplicans, charactere fructificationis diuersissima corolla regulari quinquecorniculata, pentandra, vt genus proprium absolute constitueret & distinctissimum, nisi fructus semper abortiret naturae prodigium.*

* * * *Corollis hiantibus.*

bellidifolium. 39. A. corollis patulis calcaratis, fol. radicalibus oblongis ſerratis; caulinis linearibus.

canadenſe. 40. A. fol. linearibus alternis, corollis hiantibus: labio inferiore explanato.

751. CYMBARIA. *Calyx* multipartitus: ramentis 861. linearibus. *Capſula* 1-locularis.

daurica. 1. CYMBARIA.

752. CRANIOLARIA. *Cal.* duplex floris: perianthio 4-phyllo; ſpatha 1-phylla. *Cor.* tubus longiſſimus. *Capſula* Martyniae. 861.

fruticoſa. 1. C. fol. lanceolatis dentatis.

annua. 2. C. fol. cordatis angulatis, calyce exteriore diphyllo.

753. MARTYNIA. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* ringens. *Capſ.* 862. lignoſa, corticata, roſtro hamato, trilocularis, biualuis.

perennis. 1. M. caule ſimplici, fol. ſerratis. *Fructus ni fallor inferus.*

annua. 2. M. caule ramoſo, fol. integerrimis angulatis. *Fabr. helmſt. 240.* Martynia caule ramoſo, fol. cordato-ouatis piloſis. *Mill. ic. t. 286.* Martynia caule petiolisque fiſtuloſis, floribus bibracteatis. *Gouan. hort. 303. Stigma tactu clauditur. Turra. Capſulae roſtrum vncinatum longiſſimum.*

longiflora. 1. M. caule ſimplici, fol. orbiculatis repandis. *Habitat ad* Cap. b. ſpei. ☉. Caulis *erectus, ſcabriuſculus, bipedalis.* Folia *oppoſita, petiolata, trineruia.* Flores *axillares, ſolitarii breuiter pedunculati. Stipularum loco, ad baſin pedunculi,* Glandula *ſ. cupula excipiens globum, quaſi ſtylo breui & ſtigmate donatum.* Perianthium *minimum, 5-dentatum.* Corollae *tubus praelongus, medio contractior, baſi dorſali giblus.* Germen *ſuperum.* Styllus *longitudine tubi.* Stigmata *linearia, 2, reuoluta.* Pericarpium *vix roſtratum, baſi vtrinque denticulo craſſo.* Semina *parua. D. Dau. Royen.*

754. TO-

754. TORENIA. *Cal.* 2-labiatus: ſuperiore tricuſpide. *Filamenta* inferiora ramulo ſterili. *Capſula* 2-locularis.
862.

aſiatica. 1. TORENIA.

755. BESLERIA. *Cal.* 5-partitus. *Bacca* ſubgloboſa, polyſperma.
862.

melitifol. 1. B. pedunculis ramoſis, fol. ouatis.
lutea. 2. B. pedunculis ſimplicibus confertis. fol. lanceolatis.
criſtata. 3. B. pedunculis ſimplicibus ſolitariis, caly. ſerrato-criſtatis. *Caulis radicando ſcandens. Calyx coccinens. Corolla flaveſcens. Jacq. amer. 187.*

756. SCROPHVLARIA. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* ſubgloboſa, reſupinata. *Capſ.* 2-locularis.
863.

marilandica 1. S. fol. cordatis ſerratis acutis baſi rotundatis, caule obtuſangulo.
nodoſa. 2. S. fol. cordatis trineruatis, caule obtuſangulo.
aquatica. 3. S. fol. cordatis obtuſis petiolatis decurentibus, caule membranis angulato: racemis terminalibus.
auriculata. 4. S. fol. cordatis ſubtus tomentoſis baſi appendiculatis, racemis terminalibus. *Statura S. nodoſae. Caulis tetragonus, minime piloſus, brachiatus. Folia cordata, duplicato-ſerrata, obtuſa vbique, opaca, nuda; ad baſin foliolis 2 ouatis acceſſoriis, nuda fere ternata in minoribus ramis folia ſimplicia. Corollae purpureae triſtiores: labio reuoluto liuidouireſcente.*
corodon. 5. S. fol. cordatis duplicato-ſerratis, racemo compoſito foliis interſtincto. *Similis S. nodoſae; caulis valde piloſus. Folia obtuſe ſerrata; Racemus foliis interſtinctus, quod non in prioribus.*
betonicifolia. 15. S. fol. cordatis oblongis dentatis: dentibus integerrimis: baſeos profundioribus *Mant. 87.*
orientalis. 6. S. fol. lanceolatis ſerratis petiolatis: caulinis ternis, ramis oppoſitis. *Folia caulina varianta terna aut quaterna.*

frute-

frutescens. 13. S. fol. lanceolatis obtusis serrato-dentatis, pedunculis bifidis.

vernalis. 7. S. fol. cordatis, pedunculis axillaribus solitariis dichotomis.

trifoliata. 8. S. fol. glabris: inferioribus ternato-pinnatis obtusis: superioribus simplicibus, pedunculis subtrifloris axillaribus.

sambucifolia. 9. S. fol. interupte pinnatis cordatis inaequalibus, racemo terminali: pedunc. axillaribus geminis dichotomis.

canina. 10. S. fol. pinnatifidis, racemo terminali nudo: pedunc. bifidis.

lucida. 11. S. fol. inferioribus bipinnatis subcarnosis glaberrimis, racemis bipartitis. *Caulis teres rectus viridis. Folia similia S. caninae, sed subcarnosa. Racemus rigidus, erectus. Corollae pallidae labio superiore rubro.*

coccinea. 14. S. fol. quaternis ouatis, flor, verticillatis spicatis.

peregrina. 12. S. fol. cordatis lineatis lucidis, pedunc. axillaribus bifloris, caule sexangulari. *Caulis atropurpureus. Corolla purpurea.* ☉.

757. CELSIA. 866.

Cal. 5-partitus, *Cor.* rotata. *Filamenta* barbata. *Capsf.* 2-locularis.

orientalis. 1. C. fol. bipinnatis.

758. DIGITALIS. 866.

Cal. 5-partitus. *Cor.* campanulata, 5-fida, ventricosa. *Capsf.* ouata, 2-locularis.

purpurea. 1. D. calycinis foliolis ouatis acutis, corollis obtusis: labio superiore integro.

lutea. 2. D. calycinis foliolis lanceolatis, corollis acutis: labio superiore bifido.

ferruginea. 3. D. calycinis foliolis ouatis obtusis, corol'. labio inferiore barbato. *Caulis strictus, laeuis, 6 pedalis. Folia sessilia, lanceolata, laeuia, lineata, integerrima. Racemus e singulis alis supremis, erectus. Bracteae lineari-lanceolatae, reflexae. Pedicelli breuissimi, solitarii. Calycis foliola superiora 3 appro-*

approximata. Corolla ventricosa, calyce paulo longior, pubescens, intus lutescens: laciniis 2 superioribus obsoletis; lateralibus acutis; infima longiore, barbata. Stamina flexuosa, absque rudimento quinti. Stylus longitudine floris.

Thapsi. 4. D. fol decurrentibus.

obscura. 5. D. fol. lineari-lanceolatis integerrimis basi adnatis.

canariensis 6. D. calycinis foliolis lanceolatis, corollis bilabiatis acutis, caule fruticoso.

759. BIGNONIA. *Cal.* 5-fidus, cyathiformis *Cor.* 868. fauce campanulata, 5-fida, subtus ventricosa. *Siliqua* 2-locularis. *Sem* membranaceo-alata.

Catalpa. 1. B. fol. simplicibus ternis cordatis, caule erecto, flor. diandris.

semperu. 2. B. fol simplicibus lanceolatis, caule volubili.

unguis. 3. B. fol. coniugatis: cirrho breuissimo arcuato tripartito.

aequinoctialis. 4. B. fol. coniugatis cirrhosis: foliolis ouato-lanceolatis, pedunc. bifloris, siliquis linearibus.

paniculata. 5. B. fol. coniugatis cirrhosis: foliolis cordato-ouatis, flor. racemosis, pedunc. trifloris. *Calyx duplici limbo: exteriore plano, amplo, albo, subquinquefido; Interiore erecto, angusto, Corolla purpurea.*

crucigera. 6. B. fol. couiugatis cirrhosis: foliolis cordatis, caule muricato-

capreolata. 7. B. fol. coniugatis cirrhosis: foliolis cordato-lanceolatis; fol. imis simplicibus. *Pedunculi vniflori, congesti, Calyces campanulati, integri.*

pubescens. 8. B. fol. coniugatis cirrhosis: foliolis cordato-ouatis subtus pubescentibus.

triphylla. 9. B. fol. ternatis: foliolis ouatis acuminatis, caule fruticoso erecto.

pentaphyl. 10. B. fol. digitatis: foliolis integerrimis obouatis.

Leucoxyl. 11. B. fol. digitatis: foliolis integerrimis ouatis acuminatis.

radiata. 12. B. fol. digitatis: foliolis pinnatifidis.

radi-

radicans. 13. B. fol. pinnatis: foliolis inciſis, caule geniculis radicatis.

ſtans. 14. B. fol. pinnatis: foliolis ſerratis, caule erecto firmo flor. racemoſis.

peruuiana. 15. B. fol. decompoſitis: foliolis inciſis, caule geniculis cirrhoſis.

indica. 16. B. fol. bipinnatis: foliol. integerrimis ouatis acuminatis.

caerulea. 17. B. foliis bipinnatis: foliol. lanceolatis integris.

760. CITHAREXYLVM. *Cal.* 5-dentatus, campanulatus. *Cor.* infundibuliformi-rotata: laciniis ſupra villoſis, aequalibus. *Bacca* 2-ſperma *Sem.* 2-locularia.
872.

cinereum. 1. C. ramis teretibus, calycibus dentatis. *Jacq. amer. 185. t. 118.*

caudatum. 2. C. ramis teretibus, calycibus truncatis.

761. HALLERIA. *Cal.* 3-fidus. *Cor.* 4-fida. *Filamenta* corolla longiora. *Bacca* infera, 2-locularis. (Fructum non vidi.)
872.

lucida. 1. HALLERIA.

762. CRESCENTIA. *Cal.* 2-partitus, aequalis. *Cor.* gibba. *Bacca* pedicellata, 1-locularis, polyſperma. *Semina* 2-locularia.
872.

Cuiete. 1. CRESCENTIA. *Arbor ramis ſimplicibus, longiſſimis, horizontalibus. Fructus figura variat in diſtinctis individuis & magnitudine a pollicari ad pedalem.*

763. GME-

763. GMELINA. *Calyx* ſub4-dentatus. *Cor.* 4-fida, campanulata. *Antherae* 2-bipartitae; 2 ſimplices. *Drupa* nucleo 2-loculari.
873.

aſiatica. 1. GMELINA. Iambolſa ſylueſtris paruifolia. *Rumph. amb, 1. p. 129. t. 40. Arbor ramis teretibus, ſtrictis. Folia oppoſita, petiolata, ouata, ſubtus tomentoſa, ſaepe vtrinque lobo laterali acutiore breui. Spinae axillares, oppoſitae, horizontales, apice pubeſcentes, longitudine petiolorum. Flores ex apice ramulorum tenellorum, pedunculati.*

764. PETREA. *Cal.* 5-partitus, maximus; coloratus. *Cor.* rotata. *Capſ.* 2-locularis, in fundo calycis. *Sem.* ſolitaria.
873.

volubilis. 1. PETREA. *Scandit arbores. Calyces violacei. Corollae caeruleae.*

765. LANTANA. *Cal.* 4-dentatus obſolete. *Stigma* vncinato-refractum. *Drupa* nucleo 2-loculari.
873.

miſta. 9. L. fol. oppoſitis acuminatis, flor. capitatis: inuolucris longitudine florum. Camara lamii albi folio, flore miſto. *Dill. elth. 64. t. 56. f. 64.* Viburnum americanum vrticae foliis. *Com. hort. 1. p. 151. t. 78.*

trifolia. 1. L. fol. ternis, ſpicis oblongis imbricatis.

annua. 2. L. fol. oppoſitis, caule inermi herbaceo, ſpicis oblongis. *Defloratum capitulum elongatur in ſpicam oblongam, baccis purpuraſcentibus, paleis lineari-lanceolatis interſtinctis.*

Camara. 4. L. fol. oppoſitis, caule inermi ramoſo, flor. capitato-vmbellatis aphyllis. Camara meliſſae folio, flore variabili. *Dill. elth. 64. t. 56. f. 65. Flores flaui, ſenſim fuſci euadunt; excluſo ſynonymo Commelini.*

inuolucrata. 3. L. fol. oppoſitis ternisque curuato-obouatis obtuſis lineatis tomentoſis, capitulis ſquarroſis.

odorata. 8. L. fol. oppoſitis ternisque lanceolato-ellipticis, caule inermi. Lantana aromatica, fol. ternis oppoſitisque ſubſeſſilibus, capitulis conicis in vmbellam coactis. *Roy. mſſ.* Viburnum ſaluiae folio, floribus albis. *Herm. prodr.* 384.

aculeata. 5. L. fol. oppoſitis, caule aculeato ramoſo, ſpicis hemiſphaericis.

ſaluifolia. 6. L. fol. oppoſitis ſubſeſſilibus, floribus racemoſis. *Stipulae* 2, *ſubouatae: folia lanceolata, rugoſa, venoſa, tomentoſa. Thyrſus terminalis. Corollae etiam tomentoſae. Fructus ignotus. Genus dubium.*

africana. 7. L. fol. alternis ſeſſilibus, flor. ſolitariis. *Fructum perfecit Lipſiae in Horto Ludwigiano, cui* Calyx *5-partitus, ſubulatis laciniis, perſiſtens.* Drupa *inſipida, globoſa, ſubacuminata, ſulco bipartita.* Nucleus *globoſus, bilocularis, obſeruante DD. Schreber.*

766. CORNVTIA. 875. *Cal.* 5-dentatus. *Stamina* corolla longiora. *Stylus* longiſſimus. *Bacca* monoſperma.

pyramid. 1. CORNVTIA.

767. LOESELIA. 875. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* laciniis omnibus ſecundis. *Stam.* petalo adnerſa. *Capſula* 3-locularis.

ciliata. 1. LOESELIA.

768. CAPRARIA. 875. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* campanulata, 5-fida, acuta. *Capſ.* 2-valuis, 2-locularis, polyſperma.

biflora. 1. C. fol. alternis, floribus geminis.

duo antifolia. 2. C. fol. ternis dentatis, pedunculis ſolitariis, ramis alternis.

gratio-

gratioloides. 3. C. fol. oppositis sessilibus ouatis integerrimis, pedunculis solitariis, caule repente: Pyxidaria repens annua, flosculis monopetalis vnilabiatis. *Lind. alsat. 1. p. 152. t. 1. et 2. p. 269. e Virginia nunc Italica et Alsatica.*

crustacea. 4. C. repens, fol. oppositis ouatis subpetiolatis crenatis. *Mant.* 87.

769. SELAGO. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* tubus capillaris; limbus subaequalis *Sem.* 1.
876.

corymbos. 1. S. corymbo multiplici, flor. disiunctis, fol. filiformibus fasciculatis.

rapuncul. 3. S. spicis corymbosis, foliis dentatis.

spuria. 5. S. spicis corymbosis, fol. linearibus denticulatis.

pinastri. 2. S. spicis corymbosis hirsutis, fol. senis verticillatis linearibus.

ericoides. 9. S. capitulis sessilibus terminalibus caulescentibus, fol. quaternis subimbricatis *Mant.* 87.

coccinea. 4. S. spicis corymbosis, fol. inferioribus linearibus integerrimis, superioribus lanceolato-subulatis subdentatis.

lychnidea. 6. S. spica terminali, fol. subpetiolatis lanceolatis obtusiusculis serratis subtomentosis.

tomentosa. 7. S. racemis ramosis, fol. obouatis crenatis tomentosis, caule prostrato.

fruticosa. 10. S. capitulis subrotundis terminalibus, fol. sparsis linearibus obtusis integerrimis, caule fruticoso. *Mant.* 87.

dubia. 8. S. racemo simplici, fol. linearibus alternis, flor. diandris. *Genus dubium.*

1264. MANVLEA. *Cal.* 5-partitus. *Coroll.* limbo 5-partito, subulato: laciniis superioribus 4 magis connexis. *Caps.* 2-locularis, polysperma.

Cheiranthus. 1. MANVLEA. *Mant.* 88. Lobelia Cheiranthus. *Sp. pl.* 1319.

770. HEBENSTRETIA. *Cal.* 2-emarginatus, ſubtus fiſſus. *Cor.* 1-labiata: lab. adſcendente 4-fido: *Capſ.* 2-ſperma. *Stam.* margini limbi corollae inſerta.
878.

dentata. 1. H. fol. dentatis. *Burm. afric. 109. t. 41. f. 1,* Caulis *erectus, pedalis, ad radicem et ſubſpica Ramis ſimplicibus, adſcendentibus.* Folia *alternato-ſparſa, linearia, ſubhiſpida, ſubdentata, erecta, ex ſingulis alis copioſis foliolis ſubramoſcentibus.* Spica *terminalis ſeſſilis oblonga, inferne ſterilis: bracteis laeuibus, ſubulatis in ordines* 10 *longitudinales imbricatis, vnifloris;* Spica *enim conſtructa eſt ex verticillis* 5*-floris, ſed alternis.* Corolla *alba, fauce dorſali rubra, ſingularis ſtaminibus ipſo margine fiſſurae impoſitis; inferioribus recuruatis.* Flores *Mane inodori, Meridie foetidi nauſeoſi, Veſperi ambroſiaci, vti flores tiſtes dicti ſ. Haycinthi orientalis. H. U.*

integrifol. 2. H. fol. integerrimis. *Nimis praecedenti affinis.*

cordata. 3. H. fol. ſubcarnoſis cordatis ſeſſilibus. *Dau. Royen* 24. Caulis *ſarmentoſus.* Folia *terno-verticillata, punctata.* Spica 5*-angularis. Dau. Royen.*

771. ERINVS. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* limbus 5-fidus, aequalis: lobis emarginatis; Lab. ſup. breuiſſimo reflexo. *Capſ.* 2-locularis.
878.

alpinus. 1. E. flor. racemoſis.

africanus. 2. E. flor. lateralibus ſeſſilibus, fol. lanceolatis ſubdentatis.

peruuian. 3. E. fol. lanceolato-ouatis ſerratis.

laciniat. 4. E. fol. laciniatis.

772. BVCHNERA. *Cal.* 5-dentatus obſolete. *Corollae* limbus 5-fidus, aequalis: lobis cordatis. *Capſ.* 2-locularis.
879.

americ. 1. B. fol. dentatis lanceolatis trineruiis. *Spica floribus remotis. Caulis vix ramoſus.*

cana-

canadenſ. 3. B. fol. laciniatis, caul. dichotomo. *Mant. 88.*
capenſis. 4. B. fol. dentatis linearibus, calyc. pubeſcentibus. *Mant. 88. Affinis Rhinantho africano.*
aſiatica. 2. B. fol. integerrimis linearibus, calycibus ſcabris.

773. BROWALLIA. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* limbus 5-fidus, aequalis, patens: vmbilico clauſo Antheris duabus maioribus. *Capſ.* 1-locularis.
879.

demiſſa. 1. B. pedunculis vnifloris.
elata. 2. B. pedunculis vnifloris multiflorisque.
alienata. 3. B. fol. ſuperioribus oppoſitis, ſtaminibus duobus longitudine corollae. *Mill. ic. 68. Hanc non vidi, tantum ex figura Milleri aſſumſi, ideoque in Speciebus omiſi.*

774. LINNAEA. *Cal.* duplex: fructus 2-phyllus; floris 5-partitus, ſuperus. *Corolla* campanulata. *Bacca* ſicca, trilocularis.
880.

borealis. 1. LINNEA.

775. SIBTHORPIA. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* limbus aequalis. *Stam.* paribus remotis. *Capſ.* compreſſa, orbicularis, 2-locularis: diſſepimento transuerſo.
880.

europaea. 1. S. fol. reniformi-ſubpeltatis crenatis.
africana. 2. S. fol. orbiculatis integris crenatis, pedunc. ſolitariis
peregrin. 3. S. fol. reniformibus crenatis, pedunculis geminis
De Genere ſpeciei 2 et 3, nondum plane euictum eſt,

776. LIMOSELLA. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-fida, aequalis. *Stam.* per paria approximata. *Capſ.* 1-locularis, 2-valuis polyſperma.
881.

aquatica. 1. LIMOSELLA.

1265. VANDELLIA. *Cal.* ſub. 4-fidus. *Cor.* ringens *Filamenta* 2 exteriora e diſco labii corollae. *Anth.* connexae. *Capſ.* 1-locularis, polyſperma.

diffuſa. VANDELLIA. *Mant.* 89.

777. STEMODIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* bilabiata. *Stam.* 4: filamentis ſingulis bifidis diantheris. *Capſ.* bilocularis.
881.

maritim. 1. STEMODIA.

778. OBOLARIA. *Cal.* 2-fidus. *Cor.* 4-fida, campanulata. *Capſ.* 1-locularis. 2-valuis, polyſperma. *Stamina* ex diuiſuris corollae.
881.

virginica. 1. OBOLARIA.

779. OROBANCHE. *Cal.* 2-fidus. *Cor.* ringens. *Capſula* 1-locularis, 2-valuis. polyſperma. *Glandula* ſub baſi germinis.
881.

laeuis. 1. O. caule ſimpliciſſimo, laeui, ſtaminibus exſertis.
maior. 2. O. caule ſimpliciſſimo pubeſcente, ſtaminibus ſubexſertis.
americana. O. caule ſimpliciſſimo foliis imbricato, corollis recuruatis, ſtaminibus exſertis. *Mant.* 88.
cernua. 3. O. caule ſimpliciſſimo, corollis recuruatis, bracteis ouatis corolla breuioribus, caule nudiuſculo.
ramoſa. 3. O. caule ramoſo, corollis quinquefidis.
virgin. 4. O. caule ramoſo, corollis quadridentatis.
vniflora. 5. O. caule vnifloro, calyce nudo.
Aeginetia. 6. O. caule vnifloro, flore ſubſpathaceo.

780. DO-

780. DODARTIA. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* labium
883. inf. duplo longius. *Capſ.* 2-locularis, globoſa.

orientalis. 1. D. fol. linearibus integerrimis glabris.
indica. 2. D. fol. ouatis ſerratis villoſis.

781. LIPPIA. *Cal.* 4-dentatus, ſubrotundus, erectus, compreſſo-membranaceus. *Capſ.*
883. 1-locularis, 2-valuis, 2-ſperma, recta. *Sem.* 1, biloculare.

americana. 1. L. capitulis pyramidatis.
hemiſphaerica. 2. L. capitulis hemiſphaericis. *Iacq. amer.* 176. *t.* 179. *f.* 100. *Mant.* 89.
ouata. 3. L. capitulis ouatis, fol. linearibus integerrimis. *Mant.* 89. *Genus vlterius inquirendum in hac ſpecie.*

782. SESAMVM. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* campanula-
883. ta, 5-fida: lobo infimo maiore *Rudimentum* Filamenti 5:ti. *Stigma* lanceolatum. *Capſ.* 4-locularis.

orientale. 1. S. fol. ouato-oblongis integris.
indicum. 2. S. fol. inferioribus trifidis.

783. MIMVLVS. *Cal.* 4-dentatus, priſmaticus. *Cor.*
884. ringens: labio ſuperiore lateribus replicato. *Capſ.* 2-locularis, polyſperma.

ringens. 1. M. erectus, fol. oblongis linearibus ſeſſilibus.
luteus. 2. M. repens, fol. ouatis.

784. RUELLIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* ſubcampanulata. *Stamina* per paria approximata. *Capſ.* dentibus elaſticis diſſiliens.
884.

Blechum. 1. R. fol. ouatis integerrimis, ſpic. ouatis: bracteis interioribus geminis, flor. binis ſeſſilibus.
ſtrepens. 2. R. fol. petiolatis, flor. verticillatis ſubſeſſilibus.
clandeſt. 3. R. fol. petiolatis, pedunculis longis ſubdiuiſis nudis.
paniculata. 4. R. fol. integerrimis, pedunc. dichotomis lateralibus, calyc. ſeſſilibus: lacinia ſuprema maiore.
tuberoſa. 5. R. fol. ouatis crenatis, pedunculis vnifloris.
tentaculata. 6. R. fol. obouatis, verticillis obuallatis ſpinis inermibus bifurcatis.
ciliaris. 12. R. fol. dentatis ciliatis, flor. oppoſitis. *Mant.* 89.
biflora. 7. R. flor. geminis ſubſeſſilibus.
criſpa. 8. R. fol. ſubcrenatis lanceolato-ouatis, capitulis ouatis foliofis hiſpidis, caule repente.
repanda. 9. R. fol. lanceolatis obtuſe dentatis petiolatis, caule repente.
ringens. 10. R. fol. oblongis integerrimis, flor. ſolitariis ſeſſilibus, caule procumbente. *Folia lanceolata, obtuſiuſcula. Bracteae 2, ſeſſiles, calyce breuiores.*
antipoda. 11. R. fol. mucronato-ſerratis, caule repente, flor. ſubſpicatis terminalibus quinis ternisue.
repens. 13. R. fol. lanceolatis acuminatis integerrimis, flor. ſeſſilibus, bracteis petiolatis calyce longioribus, caule repente. *Mant.* 89.

785. BARLERIA. *Cal.* 4-partitus. *Stamina* 2 longe minora. *Capſ.* 4-angularis, bilocularis? 2-valuis, elaſtica abſque vnguibus. *Sem.* 2.
887.

longifolia. A. B. ſpinis verticillorum ſenis, fol. enſiformibus longiſſimis ſcabris.
Solanifolia. 2. B. ſpinis axillaribus, fol. lanceolatis denticulatis †. Barleria ſpinis axillaribus, fol. lanceolatis integerrimis, flor. verticillatis ſeſſilibus. *Mill. dict.* 3.

Hy-

Hyſtrix. 7. B. ſpinis axillaribus geminis ſimplicibus, fol. integerrimis lanceolato ouatis. *Royen. Mant.* 89.

Prionitis. 3. B. ſpinis axillaribus pedatis quaternis, fol. integerrimis lanceolato-ouatis. *Spinae pedatae, quaternae. Caulis teres. Folia ſubtus pubeſcentia. (excluſis ſynonymis Seb. Pluk. Rumph. quae praecedentis).*

buxifolia. 4. B. ſpinis axillaribus oppoſitis ſolitariis, fol. ſubrotundis integerrimis.

criſtata. 5, B. fol. oblongis integerrimis, calycis foliolis duobus latioribus ciliatis, duobusque linearibus acutis.

coccinea. 6. B. inermis, fol. ouatis denticulatis petiolatis.

786. DVRANTA. *Calyx* 5-fidus, ſuperus. *Bacca* 4-ſperma. *Sem.* 2-locularis.
888.

plumieri. 1. D. calyc. fructeſcentibus contortis.

Elliſia. 2. D. calyc. fructeſcentibus erectis.

787. OVIEDA. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* tubus ſubcylindricus, ſuperus, longiſſimus. *Bacca* globoſa, 2-ſperma.
888.

ſpinoſa. 1. O. fol. oualibus dentatis.

mitis. 2. O. fol. lanceolatis ſubrepandis. *Burm. ind. t. 4c. f. 1. Folia longiſſima. Corollae tubus longiſſimus.*

788. VOLKAMERIA. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* laciniis ſecundis. *Bacca* 2-ſperma. *Sem.* 2-locularia.
889.

aculeata. 1. V. ſpinis petiolorum rudimentis.

inermis. 2. V. ramis inermibus.

ſerrata. 3. V. fol. lato-lanceolatis ſerratis ſeſſilibus. *Mant.* 90.

789. CLERODENDRVM. *Cal.* 5-fidus, campanulatus. *Cor.* tubo filiformi; limbo 5-partito, aequali. *Stamina* longiſſima, intra lacinias maxime hiantes. *Bacca* 1-ſperma.
889.

infortun. 1. C. fol. cordatis tomentoſis. Petaſites agreſtis. *Rumph. amb. 4. p.* 108. *t.* 49.
fortunat. 2. C. fol. lanceolatis integerrimis.
calamitoſ. 3. C. fol. oualibus ſubdentatis nudis. *Mant.* 90.
paniculatum. 4. C. fol. lobatis ſerratis, panicula ampliſſima. *Mant.* 90.

790. VITEX. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* limbus 6-fidus. *Bacca* 4-ſperma.
890.

Agn. caſt. 1. V. fol. digitatis ſerratis, ſpicis verticillatis.
trifolia. 2. V. fol. ternatis quinatisque integerrimis, paniculis dichotomis.
Negundo. 3. V. fol. quinatis ternatisque ſerratis, flor. racemoſo-paniculatis. *Mill. ic.* 275. *f.* 1, 2.
pinnata. 4. V. fol. pinnatis integerrimis, paniculis trichotomis.

791. BONTIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* bilabiata: labio inferiore 3-partito, reuoluto. *Drupa* ouata, monoſperma, apice obliquo. *Semen* vnicum.
890.

daphnoid. 1. B. fol. alternis, pedunculis vnifloris.

1237. AVICENNIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* bilabiata: lab. ſuperiore quadrato. *Capſ.* coriacea, rhomboidea. 1-ſperma.

tomentoſa. 1. A. fol. cordato-ouatis ſubtus tomentoſis. *Gen. plant. p.* 579. *Loef.* 193.

niti-

nitida. 2. A. fol. lanceolatis vtrinque nitidis. *Gen. plant.* 579.

792. COLVMNEA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* lab. ſup. fornicatum, integrum; ſupra baſin gibba. *Antherae* conuexae. *Capſ.* 2-locularis.
891.

ſcandens. 1. C. corollis hirſutiſſimis.
longifolia. 2. C. fol. lanceolatis longiſſimis ſubſerratis glabris. *Mant.* 90. *Generis certe Achimenes Brownii, an. Columneae?*

793. ACANTHVS. *Cal.* biſol. 2-fidus. *Cor.* 1-labiata, deflexa, 3-fida. *Capſula* 2-locularis.
891.

mollis. 1. A. fol. ſinuatis inermibus.
ſpinoſus. 2. A. fol. pinnatis ſpinoſis.
dioſcorid. 3. A. fol. lanceolatis integerrimis margine ſpinoſis. †
ilicifolius. 4. A. fol. repandis dentato-ſpinoſis, caule fruticoſo aculeato.
maderaſpatenſis. 5. A. fol. quaternis, flor. axillaribus, calycibus ciliatis. Melampyro affinis tetraphylla gangetica, floribus inter folia ſparſis. *Pluk. phyt. t. 99. f. 3.* Caulis *herbaceus, dichotomus. Folia quaterna, elliptica, mutica.* Calyx *exterior imbricatus: foliolis obouato-cuneatis, ciliatis, 4 parium. Interior 4-phyllus: foliolis 2 exterioribus lanceolatis, reliquis longioribus; interioribus 2 minoribus linearibus. Capſula rubra.*

794. PEDALIVM. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* ſubringens: limbo 5-fido. *Nux* ſuberoſa, tetragona, angulis ſpinoſa, 2-locularis. *Sem.* bina.
892.

murex. A. PEDALIVM. *Martyniae affinis.*

795. ME-

795. MELIANTHVS. *Cal.* 5-phyllus: fol. inferiore gibbo. *Petala* 4; nectario infra infima. *Capſ.* 4-locularis.
892.

maior. 1. M. ſtipulis ſolitariis petiolo adnatis.
minor. 2. M. ſtipulis geminis diſtinctis.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

SILICVLOSAE.

* *Silicula integra, nec apice emarginata.*

800. DRABA. *Silic.* valuulis planiuſculis. *Stylus* nullus.
809. LVNARIA. *Silic.* valuulis planis pedicellata. *Stylus* exſertus.
799. SVBVLARIA. *Silic.* valuulis ſemiouatis. *Stylus* breuior ſilicula.
796. MYAGRVM. *Silic.* valuulis concauis. *Stylus* perſiſtens.
797. VELLA. *Silic.* valuulis diſſepimento dimidio breuioribus.

* * *Silicula emarginata apice.*

804. IBERIS. *Petala* duo exteriora maiora.
805. ALYSSVM. *Filamenta* quaedam latere interiore dente notata.
807. CLYPEOLA. *Silic.* orbiculata: valuulis planis, decidua.
806. PELTARIA. *Silic.* orbiculata: compreſſo-plana, non dehiſcens.
803. COCHLEARIA. *Silic.* cordata: valuulis obtuſis, gibbis.
801. LEPIDIVM. *Silic.* cordata: valuulis acute carinatis.
802. TELASPI. *Silic.* obcordata: valuulis marginato-carinatis.
808. BISCVTELLA. *Silic.* biloba ſupra intraque, margine carinato.
798. ANASTATICA. *Silic.* retuſa: valuulis diſſepimento mucronato longioribus.

SILIQVOSAE.

* *Calyx clauſus foliolis longitudinaliter conniuentibus.*

822. RAPHANVS. *Siliqu.* articulata.
814. ERYSIMVM. *Siliqu.* tetragona.
815. CHEIRANTHVS. *Siliqu.* germine vtrinque glandula notato.
817. HESPERIS. *Glandulae* intra ſtamina breuiora. *Petala* obliqua.
818. ARABIS. *Glandulae* 4 intra foliola calycina. *Stigma* ſimplex.

820. BRASSICA. *Glandulae* 2 intra ſtamina breuiora; 2 extra ſtamina longiora.

819. TVRRITIS. *Petala* erecta.

811. DENTARIA. *Siliqu.* valuis reuoluto-dehiſcentibus.

810. RICOTIA. *Siliqu.* vnilocularis.

* * *Calyx hians foliolis ſuperne diſtantibus.*

825. CRAMBE. *Siliqu.* decidua, globoſa, ſicco-baccata. *Filamenta* 4 apice bifurca.

824. ISATIS. *Siliq.* decidua, lanceolata, monoſperma.

823. BVNIAS, *Siliqu.* decidua, ſubrotunda, muricata.

826. CLEOME. *Siliqu.* dehiſcens, vnilocularis.

812. CARDAMINE. *Siliqu.* dehiſcens: valuulis reuolutis.

827. SINAPIS. *Siliqu.* dehiſcens. *Cal.* horizontaliter patens.

813. SISYMBRIVM. *Siliqu.* dehiſcens: valuis rectiuſculis. *Cal.* patulus.

816. HELIOPHILA. *Siliqu.* dehiſcens. *Nectaria* 2, recuruata.

SILI-

SILICVLOSA.

796. MYAGRVM. *Silicula* ſtylo conico terminata; loculo ſubmonoſpermo. 893.

perenne. 1. M. ſiliculis biarticulatis monoſpermis, fol. extrorſum ſinuatis denticulatis. *Siliculae articulus inferior abortit; ſuperior monoſpermus. G.*

orientale. 2. M. ſiliculis ſulcatis laeuibus, fol. oblongis dentato-ſinuatis.

rugoſum. 3. M. ſiliculis ſulcatis piloſis rugoſis, fol. olongis obtuſis dentatis.

hiſpanic. 4. M. ſiliculis laeuibus ſubtoroſis, foliis lyratis.

perfoliat. 5. M. ſiliculis obcordatis ſubſeſſilibus, foliis amplexicaulibus.

ſatiuum. 6. M. ſiliculis obouatis pedunculatis polyſpermis.

panicul. 7. M. ſiliculis lentiformibus orbiculatis punctato-rugoſis.

ſaxatile. 8. M. ſiliculis lentiformibus obouatis glabris, foliis petiolatis oblongis ſerratis ſcabris, caule paniculato. *Filamenta longiora ſunt contigua, ad latus alterum alterius poſita, apice bifurco, cujus ramus interior truncatus, exterior extrorſum arcuatus. Iacq.*

aegyptium. 9. M. ſiliculis angulatis, foliis tripartitis.

797. VELLA. *Silicula* diſſepimento valvulis duplo maiore, extus ouato. 805.

annua. 1. V. fol. pinnatifidis, ſiliculis pendulis.

Pſeudo-Cytiſus. 2. V. foliis integris obouatis ciliatis, ſiliculis erectis.

798. ANASTATICA. *Silicula* retuſa, margine coronata valvulis diſſepimento duplo longioribus. *Stylo* intermedio mucronato, obliquo: loculis 1-ſpermis. 895.

hierochuntica. 1. A. fol. obtuſis, ſpicis axillaribus breuiſſimis, ſiliculis vngulatis ſpinoſis. Roſa hierochuntica. *Beſl eyſt. aut. 4. t. 1. f. 2, 3.*

ſyria-

ſyriaca. 2. A, fol. acutis, ſpicis folio longioribus, ſiliculis ouatis roſtratis. Myagrum e Sumatra et Syria, ſemine ſpinoſo ſimili capiti auiculae. *Zan. hiſt. 142.*

799. SVBVLARIA. *Silicula* integra, ouata valuis ouatis concauis, diſſepimento contrariis. *Stylus* ſilicula breuior.

aquatica. 1. SVBVLARIA.

800. DRABA. *Silicula* integra, ouali-oblonga: valuis planiuſculis, diſſepimento parallelis. *Stylus* nullus.

aizoides. 7. D. ſcapo nudo ſimplici, fol. enſiformibus carinatis ciliatis. *Mant. 91.*

ciliaris. 8. D. caule ſubnudo, fol. linearibus margine carinaque ciliatis, petalis integris. *Mant. 91.*

alpina. 1. D. ſcapo nudo ſimplici, fol. lanceolatis integerrimis. *Synonyma exceptis noſtris propriis et Oederi ad praecedentem amandanda. Folia radicalia omnia, patentia, lanceolata, ſupra pilis adſperſa, more Androſaces diſpoſita;* minime *imbricata ſ. linearia ſ. ciliata, aut ſupra laeuia. Caulis aphyllus, adſperſus raris pilis;* nec *monophyllus ſ. laeuis. Petala laeuiter emarginata;* nec *integra.*

verna. 2. D. ſcapis nudis, foliis ſubſerratis.

pyrenaica. 3. D. ſcapo nudo, fol. cuneiformibus palmatis trilobis. *Ger. prou. 344. Folia inferiora 5-fida, ſuperiora 3-fida. Flores purpurei.*

nemoroſa. 5. D. caule ramoſo, fol. ouatis ſeſſilibus dentatis. *Flores lutei.*

hirta. 5. D. ſcapo vnifolio, fol. ſubhirſutis, ſiliculis obliquis pedicellatis. *Oed. dan. t. 140.*

incana. 6. D. fol. caulinis numeroſis incanis, ſiliculis oblongis, obliquis ſubſeſſilibus. *Oed. dan. t. 130.*

801. LEPIDIVM. *Silicula* emarginata, cordata, po-
897. polyſperma: valuulis carinatis, contrariis.

perfoliatum. 1. L. fol. caulinis pinnato-multifidis, ramiferis cordatis amplexicaulibus integris.
veſicarium. 3. L. caulium geniculis inflatis.
nudicaul. 4. L. ſcapo nudo ſimpliciſſimo, flor. tetrandris, fol. pinnatifidis.
procumbens. 5. L. fol. ſinuato-pinnatifidis extremo maiore, ſcapo nudo, caul. proſtratis racemiferis.
alpinum. 6. L. fol. pinnatis integerrimis, ſcapo ſubradicato, ſiliculis lanceolatis mucronatis. *Petala calyce maiora. Stamina 4. Iacq.*
petraeum. 7. L. fol. pinnatis integerrimis, petalis emarginatis calyce minoribus.
cardamines. 9. L. fol. radicalibus pinnatis, caulinis lyratis. Lepidium fol. inferioribus alterno-pinnatis carnoſis glaucis, ſuperioribus ſeſſilibus dentatis apice ouatis. *Ard. ſpec.* 1. *p.* 19. *t.* 8.
ſatiuum. 8. L. flor. tetradynamis, fol. oblongis multifidis.
lyratum. 10. L. fol. lyratis criſpis.
latifolium. 11. L. fol. ouato-lanceolatis integris ſerratis.
ſubulatum. 12. L. fol. ſubulatis indiuiſis ſparſis, caule ſuffruticoſo.
graminifolium. 13. L. fol. linearibus: ſuperioribus integerrimis, caule paniculato virgato, floribus hexandris. *Similis, diuerſa tamen, ab Iberide linifolia.*
ſuffruticoſum. 18. L. fol. lanceolato-linearibus tenuibus integerrimis, caul. ſuffruticoſis. *Mant.* 91.
didymum. 19. L. fol. pinnatifidis, caul. erecto, fructibus didymis. *Mant.* 92.
ruderale. 14. L. flor. diandris apetalis, fol. radicalibus dentato-pinnatis, ramiferis linearibus integerrimis.
virginic. 15. L. flor. ſubtriandris tetrapetalis, fol. linearibus pinnatis.
Iberis. 16. L. flor. diandris tetrapetalis, fol. inferioribus lanceolatis ſerratis; ſuperioribus linearibus integerrimis.
bonarienſe. 17. L. flor. diandris tetrapetalis, fol. omnibus pinnato-multifidis.
chalepenſ. 2. L. fol. ſagittatis ſeſſilibus dentatis. *Cent.* 169.

802. THLASPI. *Silicula* emarginata, obcordata, 901. polyſperma: valuulis nauicularibus, marginato-carinatis.

peregrin. 1. T. ſiliculis ſuborbiculatis, fol. lanceolatis integerrimis.

aruenſe. 2. T. ſiliculis orbiculatis, fol. oblongis dentatis glabris.

alliaceum, 3. T. ſiliculis ſubouatis ventricoſis, fol. oblongis obtuſis dentatis glabris.

ſaxatile. 4. T. ſiliculis ſubrotundis, fol. lanceolato-linearibus obtuſis carnoſis. Thlaſpi ſiliculis ſubrotundis, fol. integris glabris lanceolato-linearibus, radicalibus ouatis. *Ger. prov.* 348. Thlaſpi montanum, pingui folio, carneo flore, plana & cordata ſiliqua. *Barr. ic.* 845.

hirtum. 5. T. ſiliculis ſubrotundis piloſis, fol. caulinis ſagittatis villoſis.

campeſtr. 6. T. ſiliculis ſubrotundis, fol. ſagittatis dentatis incanis.

montanum. 7. T. ſiliculis obcordatis, fol. glabris: radicalibus carnoſis obouatis integerrimis, caulinis amplexicaulibus, corollis calyce maioribus. *Corollae ſubaequales, Fructus Faciesque Thlaſpeos ab Iberide hanc diſtinguunt.*

perfoliatum. 8. T. ſiliculis obcordatis, fol. caulinis cordatis glabris ſubdentatis, petalis longitudine calycis, caule ramoſo.

alpeſtre. 9. T. ſiliculis obcordatis, fol. ſubdentatis: caulinis amplexicaulibus, petalis longitudine calycis, caule ſimplici.

Burſa paſtoris. 10. T. ſiliculis obcordatis, fol. radicalibus pinnatifidis,

803. COCHLEARIA. *Silicula* emarginata, turgida, ſcabra: valuulis gibbis, obtuſis. 903.

officinalis. 1. C. fol. radicalibus ſubrotundis, caulinis oblongis ſubſinuatis.

danica. 3. C. fol. haſtatis angulatis. *Oed. dan.* 100.

anglica. 2. C. fol. ouato-lanceolatis ſinuatis.

groen-

groenland. 4. C. fol. reniformibus integris, carnosis.
Coronop. 5. C. fol. pinnatifidis, caul. depresso.
Armorac. 6. C. fol. radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incisis.
glastifol. 7. C. fol. caulinis cordato-sagittatis amplexicaulibus. *Statura Turritidis.*
Draba. 8. C. fol. lanceolatis amplexicaulibus dentatis. *Caules prostrati, parum ramosi. Folia hastata, lato-lanceolata, incana.*

804. IBERIS. *Cor.* irregularis: petalis 2 exterioribus maioribus. *Silicula* polysperma, emarginata.
904.

semperfl. 1. I. frutescens, fol. cuneiformibus integerrimis obtusis.
semperv. 2. I. frutescens, fol. linearibus acutis integerrimis.
gibraltar. 4. I. frutescens, fol. apice dentatis.
saxatilis. 3. I. suffrutescens, fol. lanceolato-linearibus carnosis acutis integerrimis ciliatis. *Ger. prov.* 354. *Gouan. hort.*
rotundif. 5. I, herbacea, fol. ouatis: caulinis amplexicaulibus laeuibus succosis. *Confer Thlaspi montanum.*
vmbellata. 7. I. herbacea, fol. lanceolatis acuminatis: inferioribus serratis; superioribus integerrimis.
amara. 8. I. herbacea, fol. lanceolatis acutis subdentatis, flor. racemosis.
linifolia. 6. I. herbacea, fol. linearibus integerrimis, caulinis serratis, caule paniculato, corymbis hemisphaericis. *Diuersa a Lepidio graminifolio.*
odorata. 9. I. herbacea, fol. linearibus superne dilatatis serratis.
arabica. 10. I. herbacea, fol. ouatis glabris aueniis integerrimis, siliculis basi apiceque bilobis.
nudicaul. 12. I. herbacea, fol. sinuatis, caule nudo simplici.
pinnata. 11. I. herbacea, fol. linearibus pinnatifidis. *Corymbus non mutatur.*

805. ALYSSVM. *Filamenta* quaedam introrsum denticulo notata. *Silicula* emar-
907. ginata.

* *Suffrutieosa,*
spinosum. 1. A. racemis senilibus spiniformibus nudis. *Petala alba, integra. Stamina edentula.*

halimifolium. 3. A. caulibus procumbentibus perennantibus, fol. lanceolato-linearibus acutis integerrimis.

ſaxatile. 4. A. caulibus fruteſcentibus paniculatis, fol. lanceolatis moliſſimis repandis. *Ard. ſpec.* 1. *p.* 18. *t.* 7. Thlaſpi luteum, leucoji folio. *Boc. muſ.* 79. *t.* 93. *Petala lutea, integra.*

alpeſtre. 6. A. caulibus ſuffruticoſis diffuſis, fol. ſubrotundis incanis, calyc. coloratis. *Ger. prov.* 352. *t.* 13. *f.* 2. *Mant.* 92.

deltoideum. 5. A. caulibus ſuffruteſcentibus proſtratis, fol. lanceolato-deltoidibus, ſiliculis hirtis. *Flores Cheiranthi violacei, calyce clauſo oblongo, duobus foliolis baſi gibboſioribus.*

* * *Herbacea.*

hyperboreum. 14. A. caul. herbaceis, fol. incanis dentatis, ſtamin. quatuor bifurcatis.

incanum. 6. A. caule erecto, fol. lanceolatis incanis integerrimis, flor. corymboſis, petalis bifidis. *Petala alba.*

minimum. 7. A. caulib. herbaceis diffuſis, fol. linearibus tomentoſis, ſiliculis compreſſis. *Petala lutea, ſubemarginata.*

calycinum. 8. A. caulib. herbaceis, ſtam. omnibus dentatis, calyc. perſiſtentibus. Alyſſum ſtaminibus quatuor dentatis: duobus ſquamula longitudinali, calyc. perſiſtentibus. *Iacq. vind.* 114.

montanum. 2. A. caulibus herbaceis diffuſis, fol. ſublanceolatis punctato-echinatis. Thlaſpi alpinum repens. *Bauh. pin.* 107. *Petala lutea. Stamina* 4 *apice bifida;* 2 *baſi denticulo.*

campeſtre. 9. A. caule herbaceo, ſtaminibus ſtipatis pari ſetarum, calycibus deciduis.

clypeatum. 10. A. caule erecto herbaceo, ſiliculis ſeſſilibus oualibus compreſſo-planis petalis acuminatis linearibus.

* *Siliculis inflatis.*

ſinuatum. 11. A. caule herbaceo, fol. lanceolato-deltoidibus, ſiliculis inflatis.

creticum. 15. A. caule fruticoſo, fol. lanceolatis ſubdentatis tomentoſis, ſiliculis inflatis globoſis. *Mant.* 92.

gemonenſe. 17. A, caule herbaceo, ramis diuaricatis, fol. radicalibus obouatis ſubtomentoſis, ſiliculis inflatis. *Mant.* 92. *Ard. ſpec.* 2. *p. t.* 14. *differt ab Acretico ramis diuaricatis, floribus minoribus, ſaturate luteis.*

vtriculatum. 16. A. caule herbaceo erecto, fol. laeuibus lanceolatis integerrimis, ſiliculis inflatis. *Mant.* 92. Thlaſpi fruticoſum, leucoji folio. *Tournef. inſt.* 218.

Veſicaria. 13. A. fol. linearibus dentatis, ſiliculis inflatis angulatis acutis.

807. CLYPEOLA. 910.

Silicula emarginata, orbiculata, compreſſo-plana, decidua.

Jonthlaſp. 1. C. ſiliculis orbiculatis vnilocularibus monoſpermis.

tomentoſa. 3. C. ſiliculis orbiculatis bilocularibus, fol. ſubtomentoſis. *Mant.* 92.

maritim. 2. C. perennis, ſiliculis bilocularibus ouatis diſpermis. Thlaſpi montanum perenne, flore albo. *Barr. ic.* 844.

806. PELTARIA. 910.

Silicula integra, ſuborbiculata, compreſſo-plana, non dehiſcens.

alliacea. 1. PELTARIA.

808. BISCVTELLA. 911.

Silicula compreſſo-plana, rotundata, ſupra infraque biloba. *Cal.* foliola baſi gibba.

auriculata. 1. B. calycibus nectario vtrinque gibbis, ſiliculis in ſtylum coëuntibus.

didyma. 2. B. ſiliculis orbiculato-didymis a ſtylo diuergentibus. *Varietates huius plures ſunt.*

809. LVNARIA. *Silicula* integra, elliptica, com-
911. preſſo-plana, pedicellata: valuis diſſepimento aequalibus, parallelis, planis. *Cal.* foliolis ſaccatis.

rediuiua. 1. L. fol. alternis. *Besl. cyſt vern. 7. f. 2.*
annua. 2. L. fol. oppoſitis. *Besl. cyſt. vern. 7. f. 1.*

SILIQVOSA.

810. RICOTIA. *Siliqua* vnilocularis, oblonga,
912. compreſſa; valuulis planis.

aegyptiaca. 1. RICOTIA.

811. DENTARIA. *Siliqua* elaſtice diſſiliens valuu-
912. lis reuolutis. *Stigma* emarginatum. *Cal.* longitudinaliter conniuens.

enneaphyll. 1. D. fol. ternis ternatis.
bulbifera. 2. D. fol. inferioribus pinnatis, ſummis ſimplicibus.
pen'a-phyllos. 3. D. fol. ſummis digitatis.

812. CARDAMINE. *Siliqua* elaſtice diſſiliens val-
913. uulis reuolutis. *Stigma* integrum. *Cal.* ſubhians.

* *Foliis ſimplicibus.*

bellidifol. 1. C. fol. ſimplicibus ouatis integerrimis: petiolis longis. (*excluſo ſynonymo Cluſii*).
aſarifol. 2. C. fol. ſimplicibus ſubcordatis.
nudicaul. 3. C. fol. ſimplicibus lanceolatis ſinuato-dentatis, caulibus nudis.
petraea. 4. C. fol. ſimplicibus oblongis dentatis.

* * *Foliis ternatis.*

reſedifol. 5. C. fol. inferioribus indiuiſis, ſuperioribus trilobis pinnatisque.

trifo-

trifolia. 6. C. fol. ternatis obtusis, caule subnudo.
africana. 7. C. fol. ternatis acuminatis, caule ramosissimo.

* * * *Foliis pinnatis.*

Chelidon. 8. C. fol. pinnatis: foliolis quinis incisis.
impatiens. 9. C. fol. pinnatis incisis stipulatis, flor. apetalis. *Florem vnicum cum Corolla petalis albis, maioribus quam in paruiflora, reperi 1764; diuersa tamen a C. paruiflora.*
paruiflor. 10. C. fol. pinnatis exstipulatis: foliolis lanceolatis obtusis, floribus corollatis.
graeca. 11. C. foliis pinnatis: foliolis palmatis aequalibus petiolatis.
hirsuta. 12. C. fol. pinnatis, flor. tetrandris.
pratensis. 13. C. fol. pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis.
amara. 14. C. fol. pinnatis, axillis stoloniferis. Nasturtium pyrenaicum aquaticum latifolium, purpurascente flore. *Hermen. parad.* 203. *t.* 203.
virginic. 15. C. fol. pinnatis: foliolis lanceolatis basi vnidentatis.

§13. SISYMBRIVM. *Siliqua* dehiscens valuulis rectiusculis. *Calyx* patens. *Corolla* patens.

916.

* *Siliquis declinatis breuibus.*

Nasturtium. 1. S. siliquis declinatis, fol. pinnatis: foliolis subcordatis.
sylueſtre. 4. S. siliquis declinatis oblongo-ouatis, fol. pinnatis: foliolis lanceolatis serratis.
amphibium. 5. S. siliquis declinatis oblongo ouatis, fol. pinnatifidis serratis.
pyrenaicum. 3. S. siliquis subouatis, foliis inferioribus lyratis: superioribus bipinnatifidis amplexicaulibus, stylis filiformibus. Sisymbrium foliis pinnatis: imorum pinnis oblongis, superiorum linearibus integris, siliquis oualibus oligospermis. *Act. helv.* 4. *p.* 288.
tanacetifolium. 2. S. fol. pinnatis: foliolis lanceolatis inciso-serratis: extimis confluentibus.
tenuifol. 6. S. fol. integerrimis, infimis tripinnatifidis; suprenis integris. Eruca foliis sinuato-dentatis, caule nudiusculo, radice perenni. *Ger. prov.* 369.

* * *Siliquis sessilibus axillaribus.*

supinum. 8. S. siliquis axillaribus subsessilibus solitariis, fol. dentato-sinuatis.

polyceratium. 10. S. siliquis axillaribus sessilibus subulatis aggregatis, fol. repando-dentatis.

burserifolium. 9. S. racemo flexuoso, fol. lyratis, caule erecto folioso. *Dill. elth.* 179. *t.* 148. *f.* 177. *β.* Hesperis fol. dentato-pinnatifidis, caule laeui. *Sp. pl.* 928.

* * * *Caule nudo.*

murale. 11. S. subacaule, fol. lanceolatis sinuato-serratis laeuiusculis, scapis subscabris adscendentibus.

monense. 12. S. acaule, fol. pinnato-dentatis subpilosis. Sisymbrium foliis pinnato-sinuatis, caulibus nudis simplicibus. *Gor. prov.* 360.

pumilum. 13. S. acaule, fol. lyratis laeuibus, scapis adscendentibus, floribus minutis.

barrelieri. 14. S. caule subnudo ramoso, fol. radicalibus runcinatis dentatis hispidis.

arenosum. 15. S. caule subfolioso ramoso, fol. lyratis rectangulo-dentatis hispidis: pilis ramosis.

valentinum. 16. S. caule simplici erecto superne glabro, fol. lanceolatis hispidis antrorsum dentatis.

* * * * *Foliis pinnatis.*

asperum. 17. S. siliquis scabris, fol. pinnatifidis: pinnis linearilanceolatis subdentatis, corollis calyce longioribus. *Planta palmaris.*

Sophiae. 18. S. petalis calyce minoribus, fol. decomposito-pinnatis.

altissimum. 19. S. fol. runcinatis flaccidis: foliolis sublinearibus integerrimis, pedunculis laxis. *Calyx patens Sinapios.*

Irio. 21. S. fol. runcinatis dentatis nudis, caule laeui, siliquis erectis.

Loeselii. 22. S. fol. runcinatis acutis hirtis, caule hispido. *Cent.* 51.

orientale. 20. S. fol. runcinatis tomentosis, caule laeui. *Cent.* 173.

barbareae. 23. S. fol. simplicibus spatulato-ouatis dentatis amplexicaulibus nudis.

catholicum. 24. S. siliquis filiformibus laeuibus, fol. pinnatis denticulatis caulinis. *Mant.* 93.

* * * * * *Fo-*

* * * * * *Foliis lanceolatis integris.*

strictiss. 15. S. fol. lanceolatis dentato-serratis caulinis.
integrifolium. 16. S. fol. linearibus integerrimis, pedunculis glutinoso-hispidis.
indicum. 26. S. fol. lanceolato-ouatis serratis petiolatis laeuibus, siliquis subarmatis. *Mant.* 93.

814. ERYSIMVM. *Siliqua* columnaris, exacte tetraëdra. *Cal.* clausus. 922.

officinale. 1. E. siliquis spicae adpressis, fol. runcinatis.
Barbarea. 2. E. fol. lyratis: extimo subrotundo. γ. *Simillima Barbareae etiam caule angulosо, sed insipida. Foliis non lyratis, verum radicalibus cordato-ouatis integerrimis.*
Alliaria. 3. E. fol. cordatis.
repandum. 4. E. fol. lanceolatis dentatis, racemis oppositifoliis, siliquis racemosis subsessilibus, corollis minutis.
cheiranth. 5. E. fol. lanceolatis integerrimis, siliquis patulis.
hieracifol. 6. E. fol. lanceolatis serratis. *Rupp. hall.* 77. *nota. a.*

815. CHEIRANTHVS. *Germen* vtrinque denticulo glandulato. *Cal.* clausus: foliolis duobus basi gibbis. *Semina* plana. 923.

Erysimoides. 2. C. fol. lanceolatis dentatis nudis, caule erecto, siliquis tetragonis. (*excluso Allionio*).
alpinus. 14. C. fol. linearibus integris subtomentosis. *Mant.* 93.
Cheiri. 2. C. fol. lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoso.
fruticulosus. 16. C. fol. lanceolatis acutis glabris subserratis, caule fruticuloso. *Mant.* 94.
chius. 3. C. fol. obouatis aveniis emarginatis, siliquis apice subulatis
maritimus. 4. C. caule ramoso diffuso, fol. lanceolatis acutiusculis, antheris eminentibus.
salinus. 15. C. fol. lanceolatis obtusis integerrimis, caule erecto, antheris inclusis. *Mant.* 93.

incanus. 6. C. fol. lanceolatis integerrimis obtusis incanis, siliquis apice truncatis compressis, caule suffruticoso.

fenestralis. 5. C. fol. conferto-capitatis recuruatis vndatis, caule diuiso.

annuus. 7. C. fol. lanceolatis subdentatis obtusis incanis, siliquis cylindricis apice acutis, caule herbaceo.

littoreus. 10. C. fol. lanceolatis subdentatis subtomentosis subcarnosis, petalis emarginatis, siliquis tomentosis.

tristis. 8. C. fol. linearibus subsinuatis, flor. sessilibus: petalis vndatis, caule fruticoso.

trilobus. 9. C. fol. dentatis obtusis: calycibus laeuibus, siliquis nodosis mucronatis filiformibus laeuibus.

lacerus. 13. C. fol. lanceolatis runcinatis, calycibus pilosis, siliquis nodosis tridentatis. *Folia nuda, angusta, runcinata. Flores flauo-purpurascentes, noctu explicati odoratissimi. Siliquae apice subtridentatae.*

tricuspid. 12. C. fol. lyratis, siliquis apice tridentatis.

sinuatus. 11. C. fol. tomentosis obtusis subsinuatis: rameis integris, siliquis muricatis.

Farsetia. 17. C. siliquis oualibus compressis, fol. lineari-lanceolatis, caule fruticuloso erecto. *Mant.* 94.

816. HELIOPHILA. *Nectaria* 2, recuruata versus calycis basin vesicularem. 926.

integrifol. 1. H. fol. lanceolatis indiuisis.

coronopif. 2. H. fol. linearibus pinnatifidis.

817. HESPERIS. *Petala* oblique flexa. *Glandula* intra stamina breuiora. *Siliqua* stricta: *Stigma* basi bifurca apice conniuente. *Cal.* clausus. 927.

tristis. 1. H. caule hispido ramoso-patente.

matronalis. 2. H. caule simplici erecto, fol. ouato-lanceolatis denticulatis, petalis mucrone emarginatis.

sibirica. 3. H. caule simplici, fol. lanceolatis dentato-serratis, petalis obtusissimis integris. *an varietas prioris?*

inodo-

inodora. 4. H. caule simplici erecto, fol. subhastatis dentatis, petalis obtusis.

africana. 5. H. caule ramosissimo diffuso, fol. lanceolatis petiolatis acute dentatis scabris, siliquis sessilibus.

verna. 7. H. caule erecto ramoso, fol. cordatis amplexicaulibus serratis villosis.

818. ARABIS. 928.

Glandulae nectariferae 4, singulae intra calycis foliola, squamae instar reflexae.

alpina. 1. A. fol. amplexicaulibus dentatis. *Oed. dan. t. 62.*

grandifl. 2. A. caule nudo.

thaliana. 3. A. fol. petiolatis lanceolatis integerrimis.

bellidifolia. 9. A. fol. subdentatis: radicalibus obouatis; caulinis lanceolatis. *Mant. 94.*

lyrata. 4. A. fol. glabris: radicalibus lyratis: caulinis linearibus.

halleri. 5. A. fol. caulinis sublyratis; rameis lanceolatis incisis.

canadens. 6. A. fol. caulinis lanceolatis dentatis glabris.

pendula. 7. A. fol. amplexicaulibus, siliquis ancipitibus linearibus, calycibus subpilosis. *Flores albi.*

Turrita. 8. A. fol. amplexicaulibus, siliquis decuruis planis linearibus, calycibus subrogosis. *Flores ochroleuci.*

819. TVRRITIS. 930.

Siliqua longissima, angulata. *Cal.* conniuens erectus. *Cor.* erecta.

glabra. 1. T. fol. radicalibus dentatis hispidis; caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris.

hirsuta. 2. T. fol. omnibus hispidis; caulinis amplexicaulibus.

alpina. 3. T. fol. radicalibus dentatis hispidis, caulinis semiamplexicaulibus, ♂. 24. *Statura omnino T. hirsutae, sed Caulis laeuis et Folia caulina omnino glabra, integerrima, sessilia vel basi parum cordata et obtusa, vixque semiamplexicaulia. Flores maiores sunt: Petala alba, obtusissima, obouato-oblonga, calyce duplo longiora. Calyx compressiusculus, erectus. Flores diuersam a T. hirsuta dictitant. Habitat in Austria. Iacqu; in Gotlandia.*

820. BRAS-

820. BRASSICA. *Cal.* erectus, conniuens. *Sem.* 931. globoſa. *Glandula* inter ſtamina breuiora & piſtillum, interque longiora & calycem.

* *Stylo obtuſiuſculo.*

orientat. 1. B. fol. cordatis amplexicaulibus glabris; radicalibus ſcabris integerrimis, ſiliquis tetragonis.

campeſtr. 2. B. radice cauleque tenui, fol. caulinis vniformibus cordatis ſeſſilibus. *Radix annua; Corolla lutea.*

aruenſis. 11. B. fol. caulinis cordatis amplexicaulibus, petalis patentibus, ſiliquis obtuſe tetragonis. *Ger. prov.* 368. *Mant.* 94. *Radix perennis. Corolla purpurea.*

alpina. 13. B. fol. caulinis cordato-ſagittatis amplexicaulibus, radicalibus ouatis, petalis erectis. *Mant.* 95. *Figuram miſit D. Grim.*

Napus. 3. B. radice cauleſcente fuſiformi.

Rapa. 4. B. radice cauleſcente orbiculari depreſſa carnoſa.

oleracea. 5. B. radice cauleſcente tereti carnoſa.

chinenſis. 6. B. fol. ouatis ſubintegerrimis: floralibus amplexicaulibus lanceolatis, calycibus vngue petalorum longioribus. *Act. petrop.* 1761. *p.* 331.

olacea. 7. B. fol. lanceolato-ouatis glabris indiuiſis dentatis.

* * Erucae *ſiliquis ſtylo enſiformi.*

Eruca-ſtrum. 8. B. fol. runcinatis, caule hiſpido, ſiliquis laeuibus.

Eruca. 9. B. fol. lyratis, caule hirſuto, ſil. glabris.

veſicaria. 10. B. fol. runcinatis, ſiliquis hiſpidis tectis calyce tumido.

821. SINAPIS. *Cal.* patens. *Cor.* vngues recti. 933. *Glandula* inter ſtamina breuiora & piſtillum, interque longiora & calycem.

aruenſis. 1. S. ſiliquis multangulis toroſo-turgidis laeuibus roſtro ancipiti longioribus.

orien-

orientalis. 4. S. siliquis retrorsum hispidis apice subtetragonis compressis. *Similis praecedenti.*

alba. 2. S. siliquis hispidis: rostro obliquo longissimo ensiformi.

nigra. 3. S. siliquis glabris racemo appressis.

pyrenaica. 5. S. siliquis striatis scabris, fol. runcinatis laeuibus.

pubescens. 11. S. siliquis pubescentibus erectis rostro compresso, fol. lyratis villosis. *Mant.* 95.

chinensis. 12. S. siliquis laeuibus subarticulatis patulis, fol. lyrato-runcinatis subhirsutis. *Mant.* 95.

juncea. 6. S. ramis fasciculatis, fol. summis lanceolatis integerrimis.

erucoides. 9. S. siliquis laeuibus aequalibus, fol. lyratis oblongis glabris, caule scabro.

hispanica. 10. S. fol. duplicato-pinnatis: laciniis linearibus.

incana. 7. S. siliquis racemo adpressis laeuibus, fol. inferioribus lyratis scabris; summis lanceolatis, caule scabro.

laeuigata. 8. S. siliquis laeuibus patulis, fol. lyratis glabris: summis lanceolatis, caule laeui.

§22, RAPHANUS. 935.

Cal. clausus. *Siliqua* torosa, subarticulata teres. *Glandulae* melliferae 2 inter stamina breuiora & pistillum, totidem inter stamina longiora & calycem.

latiuus. 1. R. siliquis teretibus torosis bilocularibus.

caudatus. R. siliquis decumbentibus tota planta longioribus. *Mant.* 95. *Linn. dec.* 3. *t.* 10. *Siliquae serpenti-formes, longitudine caulis.*

Raphanistrum. 2. R. siliquis teretibus articulatis laeuibus vniloculari-bus. *vide Dissert. de Raphania.*

sibiricus. 3. R. siliquis teretibus toruloſis villoſis, fol. linearibus pinnatifidis.

823. BVNIAS. *Silicula* decidua, tetraëdra, angulis
935. inaequalibus acuminatis muricata.

cornuta. 1. B. filiculis diuaricato-bicornibus basi spinosis.
spinosa. 2. B. racemis spinescentibus. *Mant.* 96.
Erucago. 2. B. filiculis tetragonis: angulis bicristatis.
orientat. 3. B. filiculis ouatis gibbis verrucosis.
Cakile. 4. B. filiculis ouatis laeuibus ancipitibus.
myagroides. 5. B. filiculis biarticulatis ancipitibus superne torulosis, fol. pinnatis sinubus reflexis. *Mant.* 96.
balaearica. 6. B. filiculis hispidis, fol. pinnatis: foliolis subdentatis. *Habitat in* Balearibus. *Dav. Royen.*

Similis B. myagroidi, sed filiculae *statura B. erucaginis, verum omnino, excepto rostro, echinata.* Racemi *longi.* Flores *lutei.*

824. ISATIS. *Siliqua* lanceolata, vnilocularis, 1-
936. sperma, decidua, biualuis: valuulis nauicularibus.

tinctoria. 1. I. fol. radicalibus crenatis; caulinis sagittatis, filiculis oblongis.
lusitanica. 2. I. fol. radicalibus crenatis, caulinis sagittatis, pedunculis subtomentosis.
armena. 3. I. fol. integerrimis cordatis postice obtusis, filiculis cordatis.
aegyptia. 4. I. fol. omnibus dentatis.

825. CRAMBE. *Filamenta* 4 longiora apice bifur-
937. ca: altero anterifero. *Bacca* sicca, globosa, decidua.

maritim. 1. C. fol. cauleque glabris.
oriental. 2. C. fol. scabris, caule glabro.
hispanica. 3. C. fol. cauleque scabris.

826. CLE-

826. CLEOME. *Glandulae* nectariferae 3, ad singulum sinum calycis singulae, excepto infimo. *Petala* omnia adscendentia. *Siliqua* vnilocularis, bivalvis.
937.

fruticosa. 1. C. flor. gynandris tetrandris, fol. simplicibus, caule fruticoso.

heptaphyl. 2. C. flor. gynandris, fol. subseptenatis, caule aculeato.

pentaphyl. 3. C. flor. gynandris, fol. quinatis, caule inermi.

triphylla. 4. C. flor. gynandris, fol. ternatis, caule inermi.

polygama. 8. C. flor. superioribus tetrandris masculis, fol. ternatis: foliolis sessilibus margine subaculeatis.

icosandra. 5. C. flor. icositetrandris, fol. quinatis.

viscosa. 6. C. flor. dodecandris, fol. quinatis ternatisque.

dodecandra. 7. C. flor. dodecandris, fol. ternatis. *Caulis viscoso-pubescens, vti siliquae. Folia omnia ternata, elliptica, laeuia: intermedio maiore. Flores superiores fere masculi. Calyx purpurascens. Petala alba, emarginata. Stamina* 10-14. *Siliquae sessiles, erectae, fusiformes, subinflatae.*

spinosa. 9. C. flor. hexandris, fol. septenatis quinatisque, caule spinoso.

serrata. 10. C. flor. hexandris, fol. ternatis: foliolis linearilanceolatis serratis.

ornithopodioides. 12. C. flor. hexandris, fol. ternatis: foliolis ouali-lanceolatis.

violacea. 13. C. flor. hexandris, fol. ternatis solitariisque: foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. *Planta viscoso-pubescens. Foliola subaequalia: Floratia simplicia. Pedunculi laeues. Calyx luteus apicibus purpurascentibus. Petala 2 superiora atropurpurascentia atomis flauis; Lateralia 2 cordata, vnguiculata, crenata, concoloria. Antherae purpurascentes. Receptaculum supra stamina glandulis 3, flauis, globosis. Stamina declinata. Pistillum declinatum.*

arabica. 11. C. flor. hexandris, fol. ternatis lanceolatis obtusis, siliquis fusiformibus viscoso-scabris. *Linn. dec.* 3. *t.* 8. Sinapistrum trifoliatum angustifolium, siliqua latiore. *Schaw. afr.* 558. *f.* 558. *Planta viscoso-scabra, bipedalis, annua. Petioli longitudine foliorum. Foliola sessilia, subtus scabra; Floralia simplicia. Petala lutea, apice purpurea. Siliquae nutantes, subdiaphanae. Semina hirsuta.*

monophyl. 14. C. flor. hexandris, fol. simplicibus ouato-lanceolatis petiolatis.

capensis. 15. C. flor. hexandris, fol. simplicibus sessilibus lineari-lanceolatis, caule angulato.

procumbens. 16. C. flor. hexandris, fol. simplicibus lanceolatis petiolatis, caul. procumbentibus. *Iacq. amer.* 189. *t.* 120.

CLAS-

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

PENTANDRIA.

827. WALTHERIA. Monogyna. *Capſ.* 1-locularis, 1-ſperma.
828. HERMANNIA. Pentagyna. *Capſ.* 5-locularis, 1-ſperma. *Petala.* cucullata, obliqua.
829. MELOCHIA. Pentagyna. *Capſ.* 5-locularis, 1-ſperma.

HEPTANDRIA.

** *Gerania africana.*

ENNEANDRIA.

833. BROWNAEA. Monogyna. *Cal.* 2-fidus. *Cor.* exterior 5-fida : interior 5-petala.

DECANDRIA.

830. CONNARVS. Monogyna. *Legum* 1-loculare. *Stam.* alterna breuiſſima.
832. GERANIVM. Monogyna. *Capſ.* 5-cocca, roſtrata.
831. HVGONIA. Pentagyna. *Capſ.* 1-ſperma. *Stam.* in vrceolum.

DODECANDRIA.

834. PENTAPETES. Monogyna. *Capſ.* 5-locularis, polyſperma. *Stam.* 5 elongata, colorata.

POLYANDRIA.

642. MORISONIA. Monogyna. *Cal.* ſimplex, 2-fidus. *Bacca* capſularis, pedicellata. *Styl.* 1. *Petala* 4.
665. MESVA. Monogyna. *Cal.* ſimplex, 4-phyllus. *Nux* tetragona, 1-ſperma. *Piſt.* 1. *Petala* 4.
847. STEWARTIA. Pentagyna. *Cal.* ſimplex, patens. *Capſ.* locularis, 1-ſperma.
838. NAPAEA. Subdecagyna. *Cal.* ſimplex, teres. *Capſ.* locularis, 1-ſperma.

837. SIDA. Submonogyna. *Cal.* ſimplex, angulatus. *Capſ.* locularis, 1-ſperma.

835. BOMBAX. Monogyna. *Cal.* ſimplex. *Capſ.* 5-locularis, polyſperma. *Stylus* indiuiſus. *Sem.* lanata.

836. ADANSONIA. Monogyna. *Cal.* ſimplex. *Capſ.* locularis, polyſperma: pulpa farinacea.

845. GOSSYPIVM. Monogyna. *Cal.* exter. 3-fidus. *Capſ.* locularis, polyſperma, coadunata.

842. LAVATERA. Polygyna. *Cal.* exter. 3-fidus. *Arilli* 1-ſpermi, verticillati.

1266. MALACRA. Polygyna *Cal.* exter. triphyllus: *Arilli* 5, monoſpermi.

841. MALVA. Polygyna. *Cal.* exter. 3-phyllus. *Arilli* 1-ſpermi, verticillati, plures.

843. MALOPE. Polygyna. *Cal.* exter. 3-phyllus. *Arilli* 1-ſpermi, conglomerati.

844. VRENA. Monogyna. *Cal.* exter. 5-fidus. *Arilli* 1-ſpermi, muricati, quini.

840. ALCEA. Polygyna *Cal.* exter. 6-fidus. *Arilli* 1-ſpermi, plures.

846. HIBISCVS. Monogyna. *Cal.* exter. 8-fidus. *Capſ.* loculis polyſpermis, coadunatis.

839. ALTHAEA. Polygyna. *Cal.* exter. 9-fidus. *Arilli* 1-ſpermi, verticillati.

848. CAMELLIA. Monogyna. *Cal.* exter. imbricatus. *Capſ.* loculis polyſpermis. *Stylus* indiuiſus.

PEN-

PENTANDRIA.

827. WALTHERIA. Monogyna. *Capſ.* vnilocularis, 2-valuis, 1-ſperma.

941.

americana. 1. W. fol. oualibus plicatis ſerrato-dentatis tomentoſis, capitulis pedunculatis.
anguſtif. A. W. fol lanceolatis ſerratis nudis.
indica. 2. W. fol. ouatis ſerratis plicatis, capitulis ſeſſilibus.

828. HERMANNIA. Pentagyna. *Capſ.* 5-locularis. *Petala* baſi ſemitubulata, obliqua.

941.

althaeifol. 1. H. fol. ouatis plicatis crenatis tomentoſis.
trifurca. 3. H. fol. lanceolatis integris tridentatisque.
alnifolia. 2. H. fol. cuneiformibus plicatis crenato-emarginatis.
hyſſopif. 4. H. fol. lanceolatis obtuſis ſerratis.
lauendul. 5. H. fol. lanceolatis obtuſis integerrimis.
trifoliata. 6. H. fol. ternatis ſeſſilibus plicatis retuſis.
triphylla. 7. H. fol. ternatis petiolatis planis obouatis.
groſſularifolia. 8. H. fol. lanceolatis pinnatifidis.

829. MELOCHIA. Pentagyna. *Capſ.* 5-locularis, 1-ſperma.

943.

pyramidata. 1. M. flor. vmbellatis, capſulis pyramidatis pentagonis: angulis mucronatis, fol. nudis. Melochia dominicenſis. *Jacq. amer. 198.*
tomentoſa. 2. M. flor. vmbellatis axillaribus, capſulis pyramidatis pentagonis: angulis mucronatis, fol. tomentoſis. ♄
depreſſa. 3. M. flor. ſolitariis, capſulis depreſſis pentagonis: angulis obtuſis ciliatis.
concatenata. 4. M. racemis confertis terminalibus, capſulis globoſis ſeſſilibus.
corchorifolia. 5. M. flor. capitatis ſeſſilibus, capſulis ſubrotundis, fol. ſubcordatis ſublobatis.

ſupina. 6. M. flor. capitatis, fol. ouatis ſerratis, caulibus procumbentibus.

ENNEANDRIA.

833. BROWNAEA. *Cal.* 2-fidus. *Cor.* 2-plex: exterior 5-fida; interior 5-petala.
958.

coccinea. 1. BROWNAEA. *Loeflingius ſuae ſtamina 9; D. Jacquin. ſuae ſtamina 10, adſcribit; an ſpecie eaedem.*

DECANDRIA.

830. CONNARVS. Monogyna. *Stigma* ſimplex. *Capſ.* 2-valuis, vnilocularis, 1-ſperma.
944.

monocarp. 1. CONNARVS.

831. HVGONIA. Pentagyna. *Cor.* 5-petala. *Drupa* nucleo ſtriato.
944.

Myſtax. 1. HVGONIA ſpinis oppoſitis reuolutis.

832. GERANIVM. Monogyna. *Stigmat.* 5. *Fructus* roſtratus, 5-coccus.
945.

* *Staminibus 7 antheriferis; Foliis alternis; Pedunculis multifloris; Fruticoſae.*

fulgidum. 1. G. calycibus monophyllis, fol. tripartitis incisis: intermedio maiore, vmbellis geminis, caule carnoſo fruticoſo.

inquinans. 2. G. calyc. monophyllis, fol. arbiculato-reniformibus tomentoſis crenatis integriuſculis, caule fruticoſo.

hybridum. 58. G. calycibus monophyllis, fol. ſuborbiculatis glabris crenatis integris, caule fruticoſo. *Mant. 97.*

acetoſum. 10. G. calycibus monophyllis, fol. glabris obouatis carnoſis crenatis, caule fruticoſo laxo.

papilionaceum. 3. G. calyc. monophyllis, coroll. papilionaceis: alis carinaque minutis, fol. angulatis, caule fruticoſo. *Floret primo vere.*

ſca-

ſcabrum. 5. G. calyc. monophyllis, fol. cuneiformibus multifido-laciniatis ſcabris, caule fruticoſo.

betulinum. 4. G. calyc. monophyllis, fol. ouatis inaequaliter ſerratis planis, caule fruticoſo.

cucullatum. 6. G. calyc. monophyllis, fol. cucullatis dentatis, caule fruticoſo. Geranium africanum maximum. *Riu. pent. 325. reliquis robuſtior ac hirſutior planta.*

carnoſum. 8. G. calyc. monophyllis, caule fruticoſo articulis carnoſo-gibboſis, foliis pinnatifidis, petalis linearibus.

gibboſum. 7. G. calyc. monophyllis, caule fruticoſo geniculis carnoſis gibboſis, fol. ſubpinnatis. Geranium foliis aquilegiae. *Riu. pent. 327.*

peltatum. 9. G. calyc. monophyllis, fol. quinquelobis integerrimis glabris peltatis, caule fruticoſo. *Planta procumbens.*

Zonale. 11. G. calyc. monophyllis, fol. cordato-orbiculatis inciſis zona notatis, caule fruticoſo.

vitifolium. 12. G. calyc. monophyllis, fol. lobatis adſcendentibus pubeſcentibus, floribus capitatis, caule fruticoſo.

capitatum. 13. G. calyc. monophyllis, fol. lobatis vndatis villoſis, floribus capitatis, caule fruticoſo diffuſo.

tabulare. 14. G. calyc. monophyllis, fol. cordatis ſublobatis crenato-dentatis glabris ſubcilliatis, caule fruticoſo. *Similis G. Zonali, ſed caulis perit maximam partem ſupra radicem.*

** *Staminibus 7 antheriferis. Foliis oppoſitis; Herbaceae.*

alchimilloides. 15. G. calyc. monophyllis, fol. orbiculatis palmatis inciſis piloſis: caule herbaceo decumbente.

odoratiſſimum. 16. G. calyc. monophyllis, caule carnoſo breuiſſimo, ramis herbaceis longis, foliis cordatis molliſſimis.

aleeoides. 17. G. calyc. monophyllis, fol. ternatis trifidis laciniatis, caule herbaceo hirto.

groſſularioides. 18. G. calyc. monophyllis, fol. cordatis ſubrotundis lineatis inciſis crenatis, caule herbaceo

althaeoides. 19. G. calyc. monophyllis, fol. ouatis plicatis ſinuatis tomentoſis crenatis, caule proſtrato herbaceo. *Petala macula nigra.*

coriandrifolium. 20. G. calyc. monophyllis, fol. bipinnatis linearibus ſquarroſis, caule herbaceo laeuiuſculo.

myrrhifolium. 21. G. calyc. monophyllis, fol. bipinnatis: inferioribus cordatis lobatis, caule herbaceo, calycibus ſtrigoſis.

prolificum. 22. G. calyc. monophyllis, ſcapis radicalibus, vmbella compoſita globoſa. *Corollae nigrae.*

lobatum. 23. G. calyc. monophyllis, caule truncato, ſcapis ſubradicalibus, vmbella compoſita.

triſte. 24. G. calyc. monophyllis ſeſſilibus, ſcapis bifidis monophyllis. *corollae colore & odore triſtes.*

* * * *Staminibus quinque antheriferis.*

romanum. 25. G. pedunculis multifloris, flor. pentandris, fol. pinnatis inciſis, ſcapis radicalibus. *Conſer.* Geranium petraeum. *Magn. monſp. 109.* Geranium foetidum. *Lob. illuſtr. 134. Moriſ. hiſt. 2. p. 516. ſ. 5. t. 14. f. 27. forte ſola varietas.*

cicutarium. 26. G. pedunc. multifloris, flor. pentandris, fol. pinnatis inciſis obtuſis, caule ramoſo.

moſchatum. 27. G. pedunc. multifloris, flor. pentandris, fol. pinnatis inciſis, cotyledonibus pinnatifidis.

chium. 28. G. pedunc. multifloris, flor. pentandris, fol. cordatis inciſis; ſuperioribus lyrato-pinnatifidis.

malacoides. 30. G. pedunc. multifloris, flor. pentandris, fol. cordatis ſublobatis.

maritim. 29. G. pedunc. ſubtrifloris, flor. pentandris, fol. cordatis crenatis inciſis ſcabris, caulibus procumbentibus. *Pedunculi ſaepe 2-flori. Petala integra. Herba ad terram depreſſa.*

glaucophyllum. 31. G. pedunc. multifloris, flor. pentandris, fol. ouatis ſerratis lineatis incanis.

ardeinum. 32. G. pedunc, multifloris: flor. pentandris, fol. cordatis quinquelobis, ſcapis radicalibus.

gruinum. 33. G. pedunc. ſubmultifloris, flor. pentandris, fol. ternatis lobatis.

ciconium. 34. G. pedunc. multifloris, floribus pentandris, fol. pinnatis obtuſis.

pyrenaicum. 59. G. pedunc. bifloris, flor. pentandris, petalis bilobis, calycibus apice glanduloſis. *Mant. 97.* †

* * * * *Staminibus decem antheriferis. Pedunc. 2-floris.* 24

tuberoſum. 35. G. pedunc. bifloris, fol. multipartitis: laciniis linearibus ſubdiuiſis obtuſis.

macre-

macrorhizum. 36. G. pedunc. bifloris, calycibus inflatis, petal. integris piſtillo longiſſimo, ſcapo dichotomo.

phaeum. 37. G. pedunc. ſolitariis oppoſitifoliis, calycibus ſubariſtatis, caule erecto, petalis vndulatis.

fuſcum. 60. G. pedunc. bifloris oppoſitifoliis geminis, caule patulo, petalis integerrimis. *Mant. 97.*

nodoſum. 38. G. pedunc. bifloris, petal. emarginatis, fol. caulinis trilobis integris ſerratis; ſummis ſubſeſſilibus. *Caules diffuſi, compreſſi magis quam in G. ſtriato. Petala emarginata.*

ſtriatum. 39. G. pedunc. bifloris, foliis quinquelobis: lobis medio dilatatis, petalis bilobis venoſo-reticulatis.

ſyluaticum. 40. G. pedunc. bifloris, fol. ſubpeltatis quinquelobis inciſo-ſerratis, caule erecto, petalis emarginatis.

paluſtre. 41. G. pedunc. bifloris longiſſimis declinatis, petalis integris, foliis quinquelobis inciſis. *Rami diuaricatiſſimi bifariam angulati angulis obtuſis. Petala neruis 3 fuſcis, baſi villoſa.*

pratenſe. 42. G. pedunc. bifloris, fol. ſubpeltatis multipartitis rugoſis acutis, petalis integris.

argenteum. 43. G. pedunc. bifloris, petalis emarginatis, foliis ſubpeltatis ſeptempartitis trifidis tomentoſo-ſericeis.

maculatum. 44. G. pedunc. bifloris, caule dichotomo erecto, fol. quinquepartitis inciſis; ſummis ſeſſilibus.

* * * * * *Staminibus 10 antheriferis. Pedunculis 2-floris.* ☉.

bohemicum. 47. G. pedunc. bifloris, petalis emarginatis, arillis hirtis, cotyledonibus trifidis: medio truncato. *Cent. 176.*

robertianum. 45. G. pedunc. bifloris, calycibus piloſis decemangulatis.

lucidum. 46. G. pedunc. bifloris, calycibus pyramidatis angulatis eleuato-rugoſis, fol. quinquelobis rotundatis.

molle. 48. G. pedunc. bifloris, foliisque floralibus alternis, petalis bifidis, calycibus muticis, caule erecti-uſculo.

carolinianum. 50. G. pedunc. bifloris, calycibus ariſtatis, fol. multifidis, arillis hirſutis, petalis emarginatis.

columbinum. 51. G. pedunc. bifloris folio longioribus, fol. quinquepartito-multifidis, arillis glabris, calycibus ariſtatis.

diſſectum. 49. G. pedunc. biflori, fol. quinquepartito-trifidis, petalis emarginatis longitudine calycis, arillis villoſis.

rotundifolium. 53. G. pedunc. biflori, petalis ſubintegris longitudine calycis, caule proſtrato, fol. reniformibus inciſis.

puſillum. 54. G. pedunc. biflori, petalis emarginatis, caule depreſſo, fol. reniformibus palmatis linearibus acutis. *Stamina quinque alterna caſtrata ſunt. Petala purpurea. Antherae caeruleae.*

* * * * * * *Staminibus* 10 *antheriferis. Pedunculis* 1*-floris.*

ſibiricum. 37. G. pedunc. ſubunifloris, fol. quinquepartitis acutis: foliolis pinnatifidis.

ſanguineum. 38. G. pedunc. vnifloris, fol. quinquepartitis trifidis orbiculatis.

ſpinoſum. 60. G. pedunc. vnifloris, caule carnoſo noduloſo: ſpinis ſolitariis ſtrictis. *Mant. 98.*

DODECANDRIA.

834. PENTAPETES. 958. *Cal.* 5-partitus. *Stam.* 20. horum 5 caſtrata longa. *Capſ.* 5-locularis, polyſperma.

phoenicea. 1. P. fol. haſtato-lanceolatis ſerratis. Alceae indicae cognata. *Pluk. alm. 18. t. 255. f. 3.*

ſuberifol. 2. P. fol. ouatis repandis.

acerifolia. 3. P. fol. cordatis repandis.

POLYANDRIA.

836. ADANSONIA. 760. *Cal.* ſimplex, deciduus. *Stylus* longiſſimus: ſtigmata plura. *Capſ.* lignoſa, 10-locularis pulpa farinacea, polyſperma.

digitata. 1. ADANSONIA.

835. BOMBAX. *Cal.* 5-fidus. *Stam.* 5 f. multa. *Capſula* lignoſa, 5-locularis, 5-valuis. *Sem.* lanata. *Recept.* 5-gonum.
959.

pentandrum. 1. B. flor. pentandris. *Foliola nunc integerrima, nunc ſerrata. Caulis tenerior aculeatus, adultior inermis.*

Ceiba. 2. B. flor. polyandris, fol. quinatis *(excluſo Rheede).*

heptaphyllum. 3. B. flor. polyandris fol. ſeptenis Goſſypium f. Xylon arbor oriental. digitatis foliis laeuibus, fructu alba nitente lanugine. *Pluk. alm. 172. t. 188. f. 4.* Moul. elavou. Rheed. *mal. 3. p. 61. t. 52. Rai. hiſt. 1899.*

goſſypinum. 4. B. fol. quinquelobis acuminatis ſubtus tomentoſis. *Fl. zeyl. 222. Simillimum* Goſſypio religioſo, *vt figura Plukenetii vtramque referat, ſed differt foliis ſubtus tomentoſis & ſtaminibus diſtinctis.*

837. SIDA. *Cal.* ſimplex, angulatus. *Stylus* multi-partitus. *Capſ.* plures. 1-ſpermae.
960.

ſpinoſa. 1. S. fol. cordato-oblongis ſerratis, ſtipulis ſetaceis, axillis ſubſpinoſis. *Rumph. amb. 6. t. 18.*

alba. 2. S. fol. cordatis ſubrotundis, ſtipulis ſetaceis, axillis ſubtriſpinoſis.

rhombif. 3. S. fol. lanceolato-rhomboidibus ſerratis, axillis ſubbiſpinoſis.

iamaicenſis. 10. S. fol. ouatis ſerratis tomentoſis, flor. axillaribus ſubpedunculatis, ſem. quinis bicornibus.

abutifolia. 4. S. fol. orbiculatis plicatis ſerratis.

ciliaris. 6. S. fol. oualibus retuſis ſerratis, ſtipulis linearibus ciliatis, ſemin. muricatis.

retuſa. 5. S. fol. cuneiformibus retuſis ſerratis, ſubtus tomentoſis.

triquetra. 8. S. fol. cordatis ſerratis ſubtomentoſis: ramis triquetris.

viſcoſa. 14. S. fol. cordatis crenatis tomentoſis, flor. ſubſolitariis, capſ. ſeptemlocularibus rotundis depreſſis.

cordifol. 7. S. fol. cordatis ſubangulatis ſerratis villoſis.

vmbellata. 9. S. fol. cordatis ſubangulatis ſubtomentoſis, floribus vmbellatis, capſulis biroſtratis.

paniculata. 11. S. fol. cordato-oblongis acuminatis ſerratis ſubtus tomentoſis, pedunculis capillaribus longiſſimis.

periplocifolia. 12. S. fol. cordato-lanceolatis integerrimis, caule paniculato.

vrens. 13. S. fol. cordatis ſerratis hiſpidis, pedunc. multifloris terminalibus glomeratis.

* * *Multiloculares.*

occidentalis. 19. S. fol. cordatis ſublobatis, ſtipulis patentibus, pedunculis petiolo breuioribus, capſulis multilocularibus.

americana. 15. S. fol. cordatis oblongis indiuiſis, capſulis multilocularibus longitudine calycis: loculis lanceolatis.

Abutilon. 16. S. fol. ſubrotundo-cordatis indiuiſis, pedunc. folio breuioribus, capſul. multilocularibus: corniculis bifidis. *Calycis foliola complicata ſ. canaliculata.*

aſiatica. 17. S. fol. cordatis indiuiſis, ſtipulis reflexis, pedunculis longioribus, capſul. multilocularibus hirſutis calyce breuioribus. Abutilon hirſutum. *Rumph. amb. 4. p. 29. t. 10.* Beloeroe. *Rheed. mal. 6. p. 2. t. 4. Folia longiora quam lata, vt in S. americana. Capſulae truncatae, hirſutiſſimae.*

indica. 18. S. fol. cordatis ſublobatis, ſtipulis reflexis, pedunculis petiolo longioribus, capſulis multilocularibus ſcabris calyce longioribus. *Cam. hort. 3. t. 1. Pedunculi erecti. Capſulae terminatae angulo recto.*

criſpa. 20. S. fol. cordatis ſublobatis crenatis tomentoſis, capſulis cernuis inflatis multilocularibus crenatis repandis.

criſtata. 21. S. fol. angulatis, inferioribus cordatis, ſuperioribus panduriformibus, capſul. multilocularibus.

1266. MALACHRA. *Cal. commun.* 3-phyllus, multiflorus, maior, *Arilli* 5, monoſpermi.

capitat. 22. M. capitulis pedunculatis triphyllis ſeptemfloris.

radi-

radiata. 23. M. capitulis pedunculatis pentaphyllis multifloris, fol. palmatis. †

838. NAPAEA. *Cal.* simplex, teres. *Arilli* coadu-
965. nati, monospermi.

hermaphrodita. 1. N. pedunculis nudis laeuibus, fol. glabris, flor. hermaphroditis.
dioica. 2. N. pedunc. inuolucratis angulatis, fol. scabris, flor. dioicis.

839. ALTHAEA. *Cal.* duplex: exterior 9-fidus.
966. *Arilli* plurimi, monospermi.

officinalis. 1. A. fol. simplicibus tomentosis.
cannabina. 2. A. fol. inferioribus palmatis; superioribus digitatis.
hirsuta. 3. A. fol. trifidis piloso-hispidis, supra glabris, pedunc. solitariis vnifloris.
ludwigii. A. fol. lobatis vtrinque nudis, pedunc. congestis vnifloris. *Mant. 98. Calyx interior lanatus.*

840. ALCEA. *Cal.* duplex: exterior 6-fidus. *Arilli*
966. plures, monospermi.

rosea. 1. A. fol. sinuato-angulosis.
ficifolia. 2. A. fol. palmatis. *Varietas forte prioris.*

841. MALVA. *Cal.* duplex: exterior 3-phyllus.
967. *Arilli* plurimi, monospermi.

* *Foliis indiuisis.*

spicata. 1. M. fol. cordatis crenatis tomentosis, spicis oblongis hirtis.
tomentosa. 2. M. fol. cordatis crenatis tomentosis, flor. lateralibus congestis, caule fruticoso.
gangetica. 4. M. fol. cordatis obtusis scabris, flor. sessilibus glomeratis, arillis denis muticis crenulatis.
coromandeliana. 3. M. fol. ouato-oblongis acutis, flor. glomeratis, arillis denis tricuspidatis.

amert-

americana. 5. M. fol. cordatis crenatis, flor. lateralibus solitariis; terminalibus spicatis. *Caulis pedalis, strictus, teres, subpilosus. Rami ex alis inferioribus, erecti. Folia indiuisa, cordata, serrata, vix tomentosa. Pedunculi axillares, erecti, solitarii, vniflori. Spica terminalis floribus multis, sessilibus. Flores lutei, post meridiem explicati. Petalis obcordatis. Calyx exterior linearis, patens, longitudine interioris; Interior basi vrceolatus. Styli* 10, *capillares, staminibus longiores.*

* * *Foliis angulatis.*

peruuiana. 6. M. caule erecto herbaceo, fol. palmatis, spicis secundis axillaribus, seminibus denticulatis.

limensis. 7. M. caule erecto herbaceo, fol. lobatis, spicis secundis axillaribus, seminibus laeuibus.

bryoniifolia. 8. M. caule fruticoso tomentoso, fol. pinnatis scabris, pedunculis multifloris. *Hall. emend.* 15.*

capensis. 9. M. fol. cordatis quinquelobis, caule arborescente.

carolinia. 10. M. caule repente, fol. multifidis.

paruiflor. 12. M. caule patulo, fol. angulatis, flor. axillaribus sessilibus glomeratis, calycib. glabris patentibus.

rotundifolia. 11. M. caule prostrato, fol. cordato-orbiculatis obsolete quinquelobatis, pedunc. fructiferis declinatis.

sherardiana. 23. M. caulib. prostratis, fol. orbiculatis plicatis tomentosis crenatis, pedunc. solitariis vnifloris arcuatis. *Sp. plant.* 1674. Malua cretica minor hirsuta. *Buxb. cent. app. 46. f. 32. Pedunculi sub florescentia arcuati, foliis breuiores. Petala rubra, rotundata cum mucrone. Capsulae plures quam* 5, *in orbem positae aut sparsae.*

sylueſtris. 13. M. caule erecto herbaceo, fol. septemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilosis.

mauritiana. 14. M. caule erecto herbaceo, fol. quinquelobatis obtusis, pedunculis petiolisque glabriusculis,

hispanica. 15. M. caule erecto, fol. semiorbiculatis crenatis, calyce exteriore diphyllo.

verticill. 16. M. caule erecto, fol. angulatis, flor. axillaribus glomeratis sessilibus, calyc. scabris.

crispa. 17. M. caule erecto, fol. angulatis crispis, flor. axillaribus glomeratis.

Alcea. 18. M. caule erecto, fol. multipartitis ſcabriuſculis.

moſchata. 19. M. caule erecto, fol. radicalibus reniformibus inciſis, caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis.

tournefortiana. 21. M. caule decumbente, fol. radicalibus 5-partitis trilobis linearibus, pedunculis folio caulino longioribus. *Folia obtuſiora, ciliata ad apices ſupra ſetis adſperſa. Caules ad baſin valde ramoſi, proſtrati, aſſurgentes. Corollae calyce quadruplo maiores.*

aegyptia. 20. M. caule erecto, fol. palmatis dentatis, corollis calyce minoribus. *Folia acutiora, ciliata, ſupra omnino glabra. Caulis erectus, ramis alternis in ſuperiore caulis parte; nullis ad radicem. Corollae non calyce longiores. Affinis M. tournefortianae.*

842. LAVATERA. *Cal.* duplex: exterior 3-fidus, 972. *Arilli* plurimi, monoſpermi.

* *Caule fruticoſo.*

arborea. 1. L. caule arboreo, fol. ſeptemangularibus tomentoſis plicatis, pedunculis confertis vnifloris axillaribus.

micans. 2. L. caule arboreo, fol. ſeptemangularibus acutis crenatis plicatis tomentoſis, racemis terminalibus.

olbia. 3. L. caule fruticoſo, fol. quinquelobo-haſtatis, pedunculis ſolitariis.

triloba. 4. L. caule fruticoſo, fol. ſubcordatis ſubtrilobis rotundatis crenatis, ſtipulis cordatis, pedunculis aggregatis vnifloris. *In Spec. plant. Calyx exterior; lege Calyx interior.*

luſitanic. 5. L. caule fruticoſo, fol. ſeptemangularibus tomentoſis plicatis, racemis terminalibus. †

americana. 6. L. caule fruticoſo, fol. cordatis indiuiſis crenatis acuminatis tomentoſis, pedunculis ſolitariis vnifloris.

* * *Caule herbaceo.*

thuringica. 7. L. caule berbaceo, fructibus denudatis, calycibus inciſis.

cretica. 8. L. caule erecto, ramis inferioribus diffuſis, pedunculis confertis vnifloris, fol. lobatis: ſuperioribus acutis.

trimeſtr. 9. L. caule ſcabro herbaceo, fol. lanceolatis, pedunculis vnifloris, fructibus orbiculo tectis.

843. MA-

843. MALOPE. *Cal.* duplex: exterior 3-phyllus.
974. *Arilli* glomerati, monoſpermi.

malacoides. 1. MALOPE. fol. ouatis crenatis ſupra glabris.

844. VRENA. *Cal.* duplex: exterior 5-fidus. *Capſ.*
974. 5-locularis, echinata, monoſperma.

lobata. 1. U. fol. angulatis. *Porus glanduloſus ſubtus in coſtis 3 intermediis foliorum.*

ſinuata. 2. U. fol. ſinuato-palmatis: ſinubus obtuſis. *Porus glanduloſus ſubtus in coſta 1 intermedia foliorum.*

procumbens. 3. U. fol. oblongis ſinuatis ſerratis, caule procumbente.

845. GOSSYPIVM. *Cal.* duplex: exterior 3-fidus
5. *Capſ.* 4-locularis. *Sem.* lana obuoluta.

herbaceum. 1. G. fol. quinquefidis ſubtus eglanduloſis, caule herbaceo.

arboreum. 3. G. fol. palmatis: lobis lanceolatis, caule fruticoſo. *Inter foliorum ſinus ſaepe lacinula, unde omnes ſinus obtuſi.*

hirſutum. 4. G. fol. quinquelobis ſubtus vniglanduloſis, ramulis petiolisque pubeſcentibus. Goſſypium fruteſcens pentaphyllos barbadenſe. *Pluk. alm. 172. t. 299. f. 1. Variat foliis obtuſis; ſaepe bienne.*

religioſum. 5. G. fol. trilobis acutis ſubtus vniglanduloſis, ramulis nigro-punctatis. Goſſypium fruteſcens annuum, folio vitis ampliore quinquefido. *Pluk. alm. 172. t. 188. f? Habitat in* Indiis ♄. Frutex *ramis vix piloſis, ſed vti Petioli adſperſus atomis nigris.* Folia *cordata, profunde triloba, in fertiliori ſolo quinqueloba, magnitudine palmae, acuminata, glandula vnica ſub coſta tantum media.* Stamina *omnino monadelphia.*

barbaden. 2. G. fol. trilobis integerrimis ſubtus triglanduloſis.

846. HI-

846. HIBISCVS. *Cal.* duplex: exterior polyphyllus.
976. *Capſ.* 5-locularis, polyſperma.

Moſchеutos. 1. H. fol. ouatis acuminatis ſerratis, caule ſimpliciſſimo, petiolis floriferis.

paluſtris. 2. H. caule herbaceo ſimpliciſſimo, fol. ouatis ſubtrilobis ſubtus tomentoſis, flor axillaribus.

populneus. 3. H. fol. cordatis integerrimis, caule arboreo. *Calyce exteriore indiuiſo.*

tiliaceus. 4. H. fol. cordatis ſubrotundis indiuiſis acuminatis crenatis, caule arboreo, calyce exteriore decemdentato. *Folia iuniora ſubtriloba.*

ſimplex. 5. H. fol. cordatis trilobis repandis integerrimis, caule arboreo ſimpliciſſimo.

Roſa ſinenſis. 6. H. fol. ouatis acuminatis ſerratis, caule arboreo. *Variat flore pleno.*

braſilienſis. 7. H. fol. cordatis denticulatis, calycibus exterioribus duplo longioribus, caule fruticoſo: ramis hirtis.

hirtus. 8. H. fol. lanceolato-ouatis acuminatis ſerratis, caule herbaceo: ramis ſcabris.

mutabilis. 9. H. fol. cordato-quinquangularibus obſolete ſerratis, caule arboreo.

maluauiſcus. 10. H. fol. cordatis crenatis: angulis lateralibus extimis paruis, caule arboreo. *Corolla conuoluta, erecta, clauſa fauce lacinia laterali conniuente. Fructus Bacca ſphaerica.*

ſpinifex. 11. H. fol. cordatis crenatis indiuiſis, capſ. ſpinis exſtantibus. *Calyx exterior 5-fidus. Capſula ſpina terminali 1; lateralibus 2, oppoſitae approximatis, vt in circumferentia 5 tantum appareant.*

ſyriacus. 12. H. fol. cuneiformi-ouatis ſuperne inciſo-ſerratis, caule arboreo.

ſiculneus. 13. H. fol. quinquefido palmatis, caule aculeato, flor. pedunculatis.

ſabdariffa. 14. H. fol. ſerratis: inferioribus ouatis indiuiſis; ſuperioribus ſeptenis partitis, caule inermi, flor. ſeſſilibus. *Iacq. obſ. 2. t. 35. Caulis inermis linea a petiolis vtrinque decurrente. Petioli ſubtus aculeis retroſpectantibus.*

cannabinus. 15. H. fol. ſerratis: ſuperioribus palmatis quinquepartitis ſubtus vnigladuloſis, caule aculeato, flor. ſeſſilibus. *Caulis aculeis raris erectis. Folia 3 ſ. 5-partita. Petioli ſubtus aculeis rectis. Conuenit cum ſabdariffa: ſtructura, facie, ſerraturis, glandula ſub foliis.*

ſuratenſis. 16. H. recuruato-aculeatus, fol. trilobis, calycibus exterioribus appendiculatis, ſtipulis ſemicordatis, flor. pedunculatis.

Manihot. 17. H. fol. palmato-digitatis ſeptempartitis, caule petiolisque linearibus.

Abelmoſchus. 18. H. fol. ſubpeltato-cordatis ſeptemangularibus ſerratis, caule hiſpido.

eſculentus. 19. H. fol. quinquepartito-pedatis, calycibus interioribus latere rumpentibus. *Iaqu. obſ. 2. t. 35. Calyx exterior 12-partitus cadit cum corolla, remanente baſi. Interior 5-dentatus, latere rumpendus a Corolla explicanda.*

clypeatus. 20. H. fol. cordatis angulatis, capſulis turbinatis truncatis hiſpidis.

vitifolius. 21. H. fol. quinquangularibus acutis ſerratis, caule inermi, flor. pendulis.

zeilonicus. 22. H. fol. cordato-haſtatis, pedunculis alternis vnifloris geniculatis.

virginicus. 23. H. fol. inferioribus cordatis acuminatis ſerratis: ſuperioribus haſtatis. *Nimis affinis H. pentacarpo;* anne varietas?

pentacarpos. 24. H. fol. inferioribus cordatis angulatis: ſuperioribus ſubhaſtatis, flor. ſubnutantibus, piſtillo cernuo.

Trionum. 25. H. fol. tripartitis inciſis, calycibus inflatis. *Varietas β. Caulis erectior, ſimplicior. Folia ſimplicia, ſemitriſida ſ. triloba: ſupremis 5-lobis. Pedunculi petiolis longiores. Folia Trionii e Malua capenſi ſcabroſa patre.*

847. STEWARTIA. 982.

Cal. ſimplex. *Stylus* ſimplex, ſtigmate 5-fido. *Pomum* exſuccum 5-lobum, 1-ſpermum, 5-fariam diſſiliens.

malacodendron. 1. STEWARTIA. *Duham. arb. 2. t. 284.*

848. CA-

848. CAMELLIA. *Cal.* imbricatus, polyphyllus: foliolis interioribus maioribus.
982.

japonica. 1. CAMELLIA.

665. MESVA. *Cal.* ſimplex, 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Piſt.* 1. *Nux* tetragona, 1-ſperma.
734.

ferrea. 1. MESVA. fol. lanceolatis. Nagaſſarium. *Rumph. amb. 7. p. 3. t. 2.*

642. MORISONIA. *Cal.* ſimplex, 2-fidus. *Cor.* 4-petala. *Piſt.* 1. *Bacca* cortice duro, 1-locularis, polyſperma, pedicellata.
718.

americana. 1. MORISONIA. *Iacq. amer.* 156. *t.* 97.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

PENTANDRIA.

851. MONNIERIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* ringens. *Filamentum* ſuperius antheris 2; inferius 3. *Capſulae* 5.

HEXANDRIA.

849. FVMARIA. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* ringens, baſi gibboſa nectarifera. *Filamenta* antheris 3.

1267. SARACA. *Cal.* o. *Cor.* 4-fida. *Filamenta* vtrinque 3 connexa.

OCTANDRIA.

850. POLYGALA. *Cal.* 2-laciniae alaeformes. *Cor.* vexillum cylindricum. *Stamina* conexa. *Capſ.* obcordata, 2-locularis.

851. SECVRIDACA. *Cal.* 3-phyllus. *Vexillum* nullum. *Legum.* 1-ſpermum ala ligulata.

DECANDRIA.

* *Stamina omnia connexa.*

853. NISSOLIA. *Legum.* 1-ſpermum, terminatum ala ligulata.

854. PTEROCARPVS. *Legum.* foliaceum, varicoſum.

861. AMORPHA. *Alae Carinaque* nullae.

855. ERYTHRINA. *Alae Carinaque* breuiſſimae. *Cal.* poro mellifero.

1286. ABRVS. *Filamenta* 9 baſi infima connexa latere ſuperiore diſtincta. *Sem.* ſphaerica.

858.

VOLVBILES: *Phaſeolus, Dolichos, Clitoria, Glycine.*
PINNATAE absque impari: *Orobus, Piſum, Lathyrus, Vicia, Ervum, Arachis.*
PINNATAE cum impari; *Biſerrula, Aſtragalus, Phaca, Hediſarum, Glycyrrhiza, Indigofera, Galega, Colutea, Amorpha, Piſcidia.*
TRIFOLIATAE: *Trifolium, Lotus, Medicago, Erythrina, Geniſta, Cytiſus, Ononis, Trigonella, Phaſeolus, Dolichos, Clitoria.*

858. SPARTIVM. *Filamenta* adhaerentia germini. *Stigma* adnatum, villoſum.

859. GENISTA. *Piſtillum* deprimens carinam. *Stigma* inuolutum.

865. LVPINVS. *Antherae* alternae rotundae; alternae oblongae. *Legum.* coriaceum.

864. ANTHYLLIS. *Cal.* turgidus, includens ſiliquam.

856. PISCIDIA. *Legumen* alis 4 longitudinalibus.

857. BORBONIA. *Legumen* mucronatum. *Stigma* emarginatum.

881. VLEX. *Calyx* diphyllus. *Legum.* vix calyce longius.

876. ARACHIS. *Corolla* reſupinata. *Legum.* coriaceum.

895. EBENVS. *Corolla* alis obliteratis. *Legum.* monoſpermum.

860. ASPALATHVS. *Legumen* muticum, ouatum, ſubdiſpermum.

863. ONONIS. *Legumen* rhombeum, ſeſſile. *Vexillum* ſtriatum.

862. CROTALARIA. *Legumen* pedicellatum, turgidum.

* * *Stigma pubeſcens* (nec priorum notae.)

880. COLVTEA. *Legumen* inflatum, ſupra baſin dehiſcens.

866. PHASEOLVS. *Carina Stylusque* ſpirales.

867. DOLICHOS. *Vexillum* baſi callis duobus.

871. OROBVS. *Stylus* linearis, teretiuſculus, ſupra villoſus.

870. PISVM. *Stylus* ſupra carinatus villoſusque.

872. LATHYRVS. *Stylus* ſupra planus villoſusque.

873. VICIA. *Stylus* ſub ſtigmate barbatus.

* * * *Legumen ſubbiloculare* (nec priorum.)

892. ASTRAGALVS. *Legum.* 2-loculare, rotundatum.

893. BISERRVLA. *Legum.* 2-loculare, planum, dentatum.

891. PHACA. *Legum.* ſemibiloculare.

* * * * *Legumina ſubmonoſperma* (nec priorum.)

894. PSORALEA. *Cal.* punctis glandulosis.

896. TRIFOLIVM. *Legum.* vix calyce longius, 1-ſ. 2-permum *Flores* capitati.

882. GLYCYRRHIZA. *Cal.* 2-labiatus: ſuperiore 3-fido.

* * * * * *Legumen ſubarticulatum.* (*).

888. AESCHYNOMENE. *Legum.* articulis monoſpermis. *Cal.* bilabiatus.

(*) VMBELLATAE: *Lotus, Coronilla, Ornithopus, Hippocrepis, Scorpiurus.*

887. HEDYSARVM. *Legum.* articulis ſubrotundis, compreſſis *Carina* obtuſiſſima.

883. CORONILLA. *Legum.* iſthmis interceptum, rectum.

884. ORNITHOPVS. *Legum.* articulatum, arcuatum.

886. SCORPIVRVS. *Legum.* iſthmis interceptum, teretiuſculum, inuolutum.

885. HIPPOCREPIS. *Legum.* compreſſo-membranaceum: altera ſutura emarginaturis ad medium exciſa.

899. MEDICAGO. *Legum.* ſpirale, membranaceo-compreſſum. *Piſtillum* carinam deflectens.

* * * * * * *Legumen vnlioculare polyſpermum* (nec priorum.)

898. TRIGONELLA. *Vexillum Alaeque* patentes quaſi tripetalae. *Carina* minuta.

868. GLYCINE. *Carina* vexillum reflectens.

869. CLITORIA. *Vexillum* amplum alas obtegens. *Corolla* reſupinata.

879. ROBINIA. *Vexillum* reflexo-patens, ſubrotundum.

889. INDIGOFERA. *Carina* vtrinque denticulo.

875. CICER. *Calycis* 4 laciniae ſuperiores vexillo incumbentes.

874. ERVVM. *Calyx* 5-partitus, ſubequalis. longitudine fere corollae.

877. CYTISVS. *Legum.* pedicellatum. *Calyx* bilabiatus.

890. GALEGA. *Legum.* lineare ſtriis oblique transuerſis.

897. LOTVS. *Legum.* teres, farctum ſeminibus cylindricis.

878. GEOFFRAEA. *Drupa* nucleo ligneo.

PEN-

PENTANDRIA.

850. MONNIERIA. *Cal.* 5-partitus: lacinia ſuperiore longa. *Cor.* ringens. *Stam.* 2: ſuperiore Antheris 2, inferiore 3. *Capſulae* 5, monoſpermae. 986.

trifolia. 1. MONNIERIA. *Loeſl. hiſp.* 197.

HEXANDRIA.

1267. SARACA. *Cal.* o. *Cor.* infundibulif. 4-fida. *Filamenta* 3 vtrinque faucis. *Legumen* pedicellatum.

indica. 1. SARACA. *Mant. 98. huc referenda.*

849. FVMARIA. *Cal.* diphyllus. *Cor.* ringens. *Filamenta* 2, membranacea, ſingula *Antheris* 3. 983.

* *Corollis bicalcaratis.*

Cucullaria. 1. F. ſcapo nudo.

ſpectabilis. 2. F. flor. poſtice bilobis, caule folioſo. *e Figura in diſſert. de hiſt. nat. Roſſiae.*

* * *Corollis vnicalcaratis.*

nobilis. 12. F. caulibus ſimplicibus, bracteis flore breuioribus indiuiſis. *Habitat in* Sibiria 24. *Simillima* F. bulboſae, *ſed multo maior.* Folia radicalia 7-9, *ſpithamaea, bipinnata.* Scapi 1 *ſ.* 2, *obliqui, pentagoni.* Folia caulina 4, *ſeſſilia, compoſita.* Racemus *ſecundus, obtuſiſſimus.* Bracteae *ouato-lanceolatae, integrae.* Flores *Fum. bulboſae duplo maiores, albi, limbo luteo, odore Primulae veris, labiis nec emarginatis, nec ſerratis. Faux apice nigra.* Calyx *minutus, dentatus.*

bulboſa. 3. F. caule ſimplici, bracteis longitudine florum.

ſemperu. 4. F. ſiliquis linearibus paniculatis, caule erecto.

Capnoid. 5. F. filiquis linearibus tetragonis, caulibus diffusis acutangulis,

enneaph. 6. F. fol. triternatis: foliolis cordatis.

officinal. 7. F. pericarp. monospermis racemosis, caule diffuso.

capreolata. 9. F. pericarp. monospermis racemosis, fol. scandentibus subcirrhosis. *Varietas* Fum. officinalis *Ger. at singulare quod non occurrat in Sueciae agris f. frutetis, ubi F. officinalis frequens.*

spicata. 8. F. pericarp. monospermis spicatis, caule erecto, foliolis filiformibus. Fumaria minor tenuifola, caulibus procumbentibus et caducis. *Bauh. pin.* 194. *β.* Fumaria foliis tenuissimis, floribus albis, circa monspelium. *Bauh. pin.* 143.

clauicul. 10. F. filiq. linearibus, fol. cirrhiferis. *Cirrhus foliorum terminalis.*

vesicaria. 11. F. filiq. globosis acutis inflatis, fol. cirrhosis.

OCTANDRIA.

851. POLYGALA. *Cal.* 5-phyllus: foliolis duobus alaeformibus, coloratis. *Legumen* obcordatum, biloculare. 986.

* *Crista* (*flor. appendice penicilliformi.*)

incarnat 1. P. flor. cristatis spicatis, caule herbaceo ramoso erecto, fol. alternis subulatis.

aspalatha. 25. P. flor. cristatis capitatis, caul. simplicissimis, fol. setaceis sparsis. *Mant.* 99.

brasiliensis. 26. P. flor. cristatis subspicatis, caul. simplicissimis, fol. lanceolatis sparsis. *Mant.* 99.

amara. 3. P. flor. cristatis racemosis, caulib. erectiusculis, fol. radicalibus obouatis maioribus. *Amaritie mox distinguitur.*

vulgaris. 2. P. flor. cristatis racemosis, caul. herbaceis simplicibus procumbentibus, fol. lineari-lanceolatis.

monspeliaca. 4. P. flor. cristatis racemosis, caule erecto, fol. lanceolato-linearibus acutis. *Varietas. P. vulgaris sec. Gerardum.*

paniculata. 5. P. flor. cristatis, racemis nudis, caul. herbaceis erectis superne ramosis, fol. linearibus.

sibi-

ſibirica. 6. P. flor. criſtatis, racemo laterali nudo, caul. herbaceis, fol. lanceolatis.

bracteolata. 5. P. flor. criſtatis racemoſis, bracteis triphyllis, fol. lineari-lanceolatis, caule fruticoſo.

myrtifol. 8. P. flor. criſtatis carina lunulata, caule fruticoſo, fol. laeuibus oblongis obtuſis.

* * *Imberbes (flores absque penicillo carinati) fruteſcentes.*

Penaea. 9. P. flor. imberbibus lateralibus ſolitariis, caule arboreo, fol. obtuſis petiolatis.

diuerſifolia. 10. P. flor. imberbibus racemoſis, caule arboreo, fol. ſenioribus oblongo-ouatis; recentibus ſubouatis,

microphylla. 12. P. flor. imberbibus racemoſis, caul. fruticoſis, fol. minutiſſimis ellipticis.

chinenſis. 11. P. flor. imberbibus ſpicatis axillaribus, caul. ſuffruticoſis, fol. oualibus.

Chamaebuxus. 13. P. flor. imberbibus ſparſis: carina apice ſubrotundo, caule fruticoſo, fol. lanceolatis.

ſpinoſa. 14. P. flor. imberbibus lateralibus, caule arboreo ſpinoſo, fol. oualibus mucronatis.

Heiſteria. 15. P. flor. imberbibus lateralibus, caule arboreſcente, fol. triquetris mucronato-ſpinoſis.

* * * *Imberbes: herbaceae, caule ſimpliciſſimo.*

Senega. 16. P. flor. imberbibus ſpicatis, caule erecto herbaceo ſimpliciſſimo, fol. lato-lanceolatis.

lutea. 17. P. flor. imberbibus oblongo-capitatis, caule erecto herbaceo ſimpliciſſimo, fol. lanceolatis acutis.

virideſcens. 18. P. flor. imberbibus globoſo-capitatis, caule erecto herbaceo ſimpliciſſimo, fol. lanceolatis obtuſiu, ſculis.

triflora. 19. P. flor. imberbibus, pedunculis ſubtrifloris, caule herbaceo erecto, fol. linearibus alternis.

glaucoides. 20. P. flor. imberbibus, pedunculis multifloris lateralibus, caulibus diffuſis herbaceis, fol. acutis.

* * * * *Imberbes: herbaceae, ramoſae.*

ciliata. 21. P. flor. imberbibus, capſ. ciliato-dentatis, caule herbaceo erecto.

ſanguinea. 22. P. flor. imberbibus, pedunc. ſquarroſis, caule herbaceo ramoſo erecto.
verticillata. 23. P. flor. imberbibus ſpatio remotis, fol. linearibus verticillatis, caule herbaceo ramoſo.
cruciata. 24. P. flor. imberbibus, fol. quaternis.

852. SECVRIDACA. 992. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* papilionacea: vexillo diphyllo intra alas. *Legumen* ouatum, vniloculare, monoſpermum, deſinens in alam ligulatam.

erecta. 1. S. caule erecto.
volubilis. 2. S. caule ſcandente. *Brow. iam.* 241.

DECANDRIA.

853. NISSOLIA. 992. *Cal.* 5-dentatus. *Capſ.* monoſperma, deſinens ala ligulata.

arborea. 1. N. caule arboreo erecto. *Rami reclinati. Folia quino pinnata. Iacq.*
fruticoſa. 2. N. caul. fruticoſo volubili.

1286. ABRVS. *Cal.* obſolete quadrilobus: ſuperiore latiore. *Filamenta* 9, baſi infima connata, dorſo hiantia. *Stigma* obtuſum. *Sem.* ſphaerica.

precatorius. 1. ABRVS. Glycine fol. abrupto-pinnatis: pinnis numeroſis obtuſis. *Sp. pl.* 1025. *Variat ſeminibus ſanguineis et albis. Statura et ipſa facies diſtincti generis plantam eſſe ſuadent, quibus accedunt Semina pulcherrima, maxime deleteria.*

854. PTE-

854. PTEROCARPVS. *Cal.* 5-dentatus. *Capſ.* falcata, foliacea, varicoſa. *Sem.* aliquot ſolitaria.

Draco. 1. PTEROCARPVS. (*)

855. ERYTHRINA. *Cal.* 2-labiatus : ½. *Cor.* vexillum longiſſimum, lanceolatum.
992.

herbacea. 1. E. fol. ternatis, caul. ſimpliciſſimis fruticoſo-annuis. *Trew. chret. t.* 58.
Corallodendrum. 2. E. fol. ternatis inermibus, caule arboreo aculeato. *Folia circa meridiem coniiuendo obdormiunt.*
picta. 3. E. fol. ternatis aculeatis, caule arboreo aculeato.
criſta galli. E. fol. ternatis : petiolis ſubaculeatis glanduloſis, caule arboreo inermi. *Mant.* 99.
planiſiliq. A. E. fol. ſimplicibus oblongis.

856 PISCIDIA, *Stigma* acutum. *Legumen* quadrifariam alatum.
993.

Erythrina. A. P. foliolis ouatis.
carthaginenſis. 2. P. foliolis obouatis. *An Varietas prioris?*

857. BORBONIA. *Stigma* emarginatum. *Cal.* acuminato-ſpinoſus. *Legum.* mucronatum.
993.

ericifolia. 1. B. fol. ſublinearibus acutis villoſis, capitulis terminalibus.
laeuigata. 7. B. fol. lanceolatis eneruis glabris, inuolucris calycibusque hirtis. *Mant.* 100.
trineruia. 2. E. fol. lanceolatis trineruis integerrimis.
lanceolat. 3. E. fol. lanceolatis multineruiis integerrimis.
cordata. 4 E. fol. cordatis multineruiis integerrimis.

(*) Pterocarpi *ſtamina vtrum connata aut diſtincta ex authorum ſcriptis nondum didiceram, neque ipſe flores vidi.*

tomentoſa. 5. B. fol. obouatis villoſis. *Habitus Aſpalathi anthylloidis. Flores faſciculati. Stamina diadelpha.*

arenata. 6. B. fol. cordatis multineruiis denticulatis.

858. SPARTIVM. *Stigma* longitudinale, ſupra villoſum. *Filamenta* germini adhaerentia. *Cal.* deorſum productus.
995.

* *Foliis ſimplicibus.*

ſepiarium. 1. S. ramis ſcabris, fol. ſuperioribus filiformibus.

capenſe. 3. S. ramis lateralibus alternis, foliis lanceolatis alternis: floralibus ſaepius oppoſitis.

iunceum. 2. S. ramis oppoſitis teretibus apice floriferis, fol. lanceolatis.

monoſpermum. 4. S. ramis angulatis, racemis lateralibus, fol. lanceolatis.

purgans. 11. S. ramis teretibus ſtriatis, fol. lanceolatis ſubſeſſilibus pubeſcentibus. *Ger. prou.* 480. *Gouan. monſp.* 474. Geniſta purgans. *Sp. pl.* 999. *Rami inermes. Legumina ouata, pendula, hinc ſinuata.*

ſcorpius. 5. S. ramis ſpinoſis patentibus, fol. ouatis.

** *Foliis ternatis.*

angulatum. 6. S. fol. ſolitariis ternatisque, ramis ſexangularibus apice floriferis.

complicatum. 7. S. fol. ternatis: foliolis conduplicatis, caul. inermibus proſtratis glabris, leguminibus ſcabris.

ſcoparium. 8. S. fol. ternatis ſolitariisque, ramis inermibus angulatis.

radiatum. 9. S. fol. ternatis linearibus ſeſſilibus: petiolatis perſiſtentibus, ramis oppoſitis angulatis. *Mill. ic. t.* 259. *f.* 1.

ſpinoſum. 10. S. fol. ternatis, ramis angulatis ſpinoſis.

859. GENISTA. *Cal.* 2-labiatus: $\frac{3}{3}$. *Vexillum* oblongum, a piſtillo ſtaminibusque deorſum reflexum,
997.

* *Inermes.*

canarienſis. 1. G. fol. ternatis tomentoſis, ramis angulatis.

candi-

candicans. 2. G. fol. ternatis ſubtus villoſis, pedunc. lateralibus ſubquinquefloris foliatis, legum, hirſutis.
linifolia. 3. G. fol. ternatis ſeſſilibus linearibus ſubtus ſericeis.
ſagittalis. 4. G. ramis ancipitibus membranaceis articulatis, fol. ouato-lanceolatis. *Mill, ic. t. 259. f. 2.*
tridentat. 5. G. ramis triquetris membranaceis ſubarticulatis, fol. tricuſpidatis.
tinctoria. 8. G. fol. lanceolatis glabris, ramis ſtriatis teretibus erectis.
florida. 7. G. fol. lanceolatis ſericeis, ramis ſtriatis teretibus, racemis ſecundis.
piloſa. 5. G. fol. lanceolatis obtuſis, caule tuberculato decumbente.
humifuſa. 6. G. fol. lanceolatis ciliatis, ramis proſtratis ſtriatis villoſis.

* * *Spinoſae.*

anglica. 11. G. ſpinis ſimplicibus, ramis floriferis inermibus, fol. lanceolatis.
germanica. 12. G. ſpinis compoſitis, ramis floriferis inermibus, fol. lanceolatis.
hiſpanica. 13. G. ſpinis decompoſitis, ramis floriferis inermibus, fol. linearibus piloſis. *Ger. prou.* 483.
luſitanic. 9. G. caule aphyllo, ſpinis decuſſatis.

860. ASPALATHVS. 1000. *Cal.* 5-fidus: lacinia ſuperiore maiore. *Legum.* ouatum, muticum, ſubdiſpermum.

ſpinoſa. 1. A. fol. faſciculatis linearibus nudis ſpinam gemmaceam circumſtantibus.
capitata. 3. A. fol. faſciculatis linearibus acutis, flor. capitatis, bracteis nudis.
aſtroites. 2. A. fol. faſciculatis ſubulatis mucronatis glabris, caule villoſo. flor. ſparſis.
chenopoda. 4. A. fol. faſciculatis ſubulatis mucronatis hirtis, flor. capitatis hirſutiſſimis.
thymifolia. 5. A. fol. faſciculatis ſubulatis inermibus glabris breuiſſimis, flor. alternis.
ericifolia. 6. A. fol. faſciculatis ſubulatis inermibus hirſutis, flor. alternis, calycibus linearibus.

verru-

verrucoſa. 7. A. fol. faſciculatis ſubulatis, gemmis verruca tomentoſa prominentibus nudis.

retroflexa. 8. A. fol. faſciculatis ſubulatis glabris minimis, ramis filiformibus patentiſſimis, flor. ſolitariis terminalibus.

vniflora. 9. A. fol. faſciculatis linearibus inermibus glabris, ſtipulis acutis perſiſtentibus, flor. ſolitariis, calycibus laciniis cymbiformibus.

araneoſa. 10. A. fol. faſciculatis ſetaceis inermibus hiſpidis, flor. capitatis.

indica. 12. A. fol. quinatis ſeſſilibus, pedunc. vnifloris.

Ebenus. 11. A. fol. aggregatis obouato-oblongis ſubtus tomentoſis, pedunc. bifloris, legum. bilobis diſpermibus.

cretica. 14. A. fol. trinis cuneiformibus glabris: lateralibus breuioribus, ſtipulis obſoletis, flor. congeſtis.

quinquefolia. 13. A. fol. quinis ſeſſilibus, pedunc. ſpicatis.

tridentata. 15. A. fol. trinis lanceolatis glabris, ſtipulis tridentatis mucronatis, flor. capitatis.

anthylloides. 16. A. fol. trinis lanceolatis aequalibus ſubpubeſcentibus, ſtipulis nullis, capitulis terminalibus.

argentea. 17. A. fol. trinis linearibus ſericeis, ſtipulis ſimplicibus mucronatis, flor. ſparſis tomentoſis.

calloſa. 18. A. fol. trinis ſubulatis aequalibus, ſtipulis ſubrotundis calloſis, flor. ſpicatis glabris. *Fruticulus Ramis a caſu foliorum adſperſis Callis rotundatis, ſinu villoſis. Folia terna, baſi calloſae inſidentia, ſeſſilia, ſubulato-linearia, iuniperina, acuta, glabra, plana, ſubtus conuexa. Spicae laxae terminales. Bracteae propriae monophyllae, ſubulatae, longitudine calycis, vtrinque ad baſin calycis ſolitariae. Calyces glabri dentibus ſubulatis. Corollae flauae.*

pinnata. 19. A. fol. pinnato-quinatis obcordatis, pedunc. capitatis.

881. VLEX. *Cal.* 2-phyllus. *Legumen* vix calyce longius,

1045.

europaeus. 1. U. fol. villoſis acutis, ſpinis ſparſis.

capenſis. 2. U. fol. ſolitariis obtuſis, ſpinis ſimplicibus terminalibus.

861. AMORPHA. *Corollae* vexillum ouatum, con-
1003. cavum. *Alae* o. *Carina* o.

fruticosa. 1. AMORPHA. *Duhamel. arb. 1. t. 46.*

862. CROTALARIA. *Legumen* turgidum, infla-
1003. tum, pedicellatum. *Filamenta* connata cum fissura dorsali.

* *Foliis simplicibus.*

perforata. 1. C. fol. perfoliatis ouatis margine scabris.
perfoliata. 2. C. fol. perfoliatis cordato-ouatis.
amplexicaulis. 3. C. fol. caulinis amplexicaulibus cordatis alternis; floralibus oppositis reniformibus.
sagittalis. 4. C. fol. simplicibus lanceolatis, petiolis decurrentibus solitariis bidentatis.
chinensis. 5. C. fol simplicibus ouatis subpetiolatis, stipulis minutissimis.
juncea. 6. C. fol. simplicibus lanceolatis petiolato-sessilibus: caule striato.
imbricata. 7. C. fol. simplicibus ouatis acutis villosis sessilibus, flor. subsessilibus.
retusa. 8. C. fol. simplicibus oblongis cuneiformibus retusis.
sessiliflora. 9. C. fol. simplicibus lanceolatis subsessilibus, flor. sessilibus lateralibus, caule aequali.
triflora. 10. C. fol. simplicibus ouatis sessilibus glabris, ramis angulatis, pedunc. ternis lateralibus vnifloris.
verrucosa. 11. C. fol. simplicibus ouatis, stipul. lunatis declinatis, ramis tetragonis.

** *Foliolis compositis.*

latifolia. 12. C. fol. ternatis obouatis, flor. lateralibus subracemosis.
lunaris. 13. C. fol. ternatis ouatis acutis, stipul. semicordatis lunatis.
laburnifolia. 14. C. fol. ternatis ouatis acuminatis, stipul. nullis, legum. pedicellatis. Crotalaria arborescens trifoliata glabra viridis. *Burm. zeyl. 82. t. 35. Corollae Carina lata compressa rostrata. Alae vexillo et carina dimidio breuiores.*

inca-

incana. 15. C. fol. ternatis ouatis acuminatis, ſtipul. ſetaceis, legum. hirſutis.

quinquef. 17. C. fol. quinatis.

863. ONONIS. *Cal.* 5-partitus : laciniis linearibus. 1006. *Vexillum* ſtriatum. *Legumen* turgidum, ſeſſile. *Filamenta* connata absque fiſſura.

* *Floribus ſubſeſſilibus.*

antiquorum. 1. O. flor. ſolitariis foliolo maioribus, fol. inferioribus ternatis, ramis laeuiuſculis ſpinoſis.

aruenſis. 2. O. flor. racemoſis geminatis, fol. ternatis: ſuperioribus ſolitariis, ramis inermibus ſubuilloſis.

repens. 3. O. caulibus diffuſis, ramis erectis, fol. ſuperioribus ſolitariis, ſtipul. ouatis.

minutiſſima. 4. O. flor. ſubſeſſilibus lateralibus, fol. ternatis glabris, ſtipul. enſiformibus, caul. ſcarioſis corolla longioribus. *Caules filiformes, diffuſi, glabri, ſuffruticuloſi. Stipulae acuminatiſſimae, ſubbipartitae, integerrimae. Folia ternata, laeuia, petiolata; Foliolis oblongiuſculis, rigidulis, ſerratis, recuruatis, vix mucronatis. Petioli breuiſſimi. Flores axillares, ſolitarii. Calyces glabri, ſubſcarioſi, profunde quinquefidi, recti, ſubulati, corolla longiores. Corollae luteae. Legumen ouatum, fuſcum, calyce breuius. Folia floralia ſuperiora ſimplicia.*

mitiſſima. 6. O. flor. ſeſſilibus ſpicatis, bracteis ſtipulatis ouatis ventricoſis ſcarioſis imbricatis.

alopecuroides. 7. O. ſpicis folioſis, fol. ſimplicibus obtuſis, ſtipulis dilatatis.

variegat. 8. O. ſtipulis bracteisque dentatis, fol. ſimplicibus, flor. ſubpedunculatis. Anonis maritima mitis, folio lucido ſerrato. *Bocc. ſicc. 70. t. 38. f. 3.*

** *Floribus pedunculatis: pedunc. mutico.*

cernua. 17. O. racemis ſtrictis, fol. cuneiformibus, legumin. cernuis linearibus recuruatis. *β* Cytiſus aethiopicus. *Sp. plant.* 1042. *Frutex facie Geniſtae canarienſis. Rami teretes, purpuraſcentes, adſperſi pilis albidis. Folia ternata, petiolata, parua, ſub-*

ſubtus purpuraſcentia : Foliola ſeſſilia, ſubcuneiformia, obtuſa, vix emarginata : Racemi erecti, piloſi, vti Calyces. Corollae paruae, luteae. Stamina connata, ſupra rima diſſecta. Legumen lineare, cernuum, refalcatum, compreſſum, toruloſum.

capenſis. 18. O. racem. pedunculatis longis, fol. ternatis ſubor-biculatis.

reclinata. 19. O. pedunc. vnifloris muticis, fol. ternatis ſubrotundis crenatis, leguminibus cernuis. *Planta tota pubeſcenti viſcoſa. Folia omnia ternata, craſſiuſcula. Calyces obtuſi. Legumina arcte ſub pedunculo reflexa, fuſca.*

* * * *Pedunculis ariſtatis.*

Cherleri, 5. O. pedunc. vnifloris ariſtatis, fol. ternatis, ſtipul. ſerratis. *Ger. prou.* 487.

viſcoſa. 11. O. pedunc. vnifloris ariſtatis, fol. ſimplicibus; infimis ternatis. *Ger. prou.* 486.

ornitho. podioides 12. O. pedunc. bifloris ariſtatis, leguminibus linearibus cernuis.

pinguis. 10. O. pedunc. vnifloris ariſtatis, fol. ternatis lanceolatis, ſtipul. integerrimis.

Natrix. 9. O. pedunc. vnifloris ariſtatis, fol. ternatis viſcoſis, ſtipul. integerrimis, caul. fruticoſo.

* * * * *Fruticoſae.*

tridentata. 13. O. fruticoſa, fol. ternatis carnoſis ſublinearibus tridentatis, pedunculis bifloris.

criſpa. 14. O. fruticoſa, fol. ternatis vndulatis ſubrotundis dentatis viſcoſo-pubeſcentibus, pedunc. vnifloris muticis.

fruticoſa. 15. O. fruticoſa, fol. ſeſſilibus ternatis lanceolatis ſerratis, ſtipulis vaginalibus, pedunc. ſubtrifloris.

rotundifolia. 16. O. fruticoſa, fol. ternatis ouatis dentatis, calyc. triphyllo-bracteatis, pedunc. ſubtrifloris.

trifoliata. 18. O. fruticoſa, fol. ſeſſilibus ternatis, ſpicis pedunculatis ſubuilloſis. Trifolium fruticans. *Sp. pl.* 1085. *Fabric. helmſt.* 305. *Corolla violacea, carina alba, anterius macula violacea.*

864. ANTHYLLIS. *Cal.* ventricosus. *Legumen* 1011. subrotundum, tectum.

* *Herbaceae.*

tetraph. 1. A. herbacea, fol. quaterno-pinnatis, flor. lateralibus.
Vulneraria. 2. A. herbacea, fol. pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato.
montana. 3. A. herbacea, fol. pinnatis aequalibus, capitulo terminali secundo, flor. obliquatis.
cornicina. 4. A. herbacea, fol. pinnatis inaequalibus, capitulis solitariis.
lotoides. 5. A. herbacea, fol. tripartitis, calyc. prismaticis fasciculatis longitudine leguminum.
gerardi. A. herbacea, fol. pinnatis inaequalibus, pedunc. lateralibus folio longioribus, capitulis aphyllis. *Mant.* 100.

* * *Fruticosae.*

Barb. jou. 6. A. fruticosa, fol. pinnatis aequalibus tomentosis, flor. capitatis.
heterophyl. 7. A. fruticosa, fol. pinnatis: floralibus ternatis.
Cytisoid. 8. A. fruticosa, fol. ternatis inaequalibus, calyc. lanatis lateralibus. *Gouan. hort.* 362. *Folia summa simplicia, sessilia, e quorum alis Pedunculi solitarii, trisori: Bractea ouata, terminali.*
herman. 9. A. fruticosa, fol. ternatis subpedunculatis, calyc. nudis.
Erinacea. 9. A. fruticosa spinosa, fol. simplicibus.

876. ARACHIS. *Cal.* 2-labiatus. *Coroll.* supinata. 1040. *Filamenta* connexa. *Legum.* gibbum, toruloſum, venoſum, coriaceum.

hypogaea. 1. ARACHIS.

895. EBENVS. *Cal.* dentes longitudine corollae. *Cor.* 1176. alis subnullis. *Semen.* 1, hirtum.

cretica. 1. EBENVS.

865. LV-

865. LVPINVS. *Cal.* 2-labiatus. *Antherae* 5 oblongae; 5 ſubrotundae. *Legumen* coriaceum.
1014.

perennis. 1. L. calyc. alternis inappendiculatis: labio ſuperiore emarginato; inferiore integro. *Mill. ic.* 170. *f.* 1.

albus. 2. L. calyc. alternis inappendiculatis: labio ſuperiore integro; inferiore tridentato.

varius. 4. L. calyc. ſemiuerticillatis appendiculatis: labio ſuperiore bifido; inferiore ſubtridentato. *Foliola linearia.*

hirſutus. 3. L. calyc. alternis appendiculatis? labio ſuperiore bipartito; inferiore tridentato. Lupinus lanuginoſus latifolius humilis, flore caeruleo-purpuraſcente, ſtoloniferus. *Shaw. afr.* 393. *Totus ferrugineus, vix diverſus.*

anguſtifolius. 5. L. calyc. alternis appendiculatis: labio: ſuperiore bipartito; inferiore integro.

luteus. 6. L. calyc. verticillatis appendiculatis: labio ſuperiore bipartito; inferiore tridentato.

866. PHASEOLVS. *Carina* cum ſtaminibus ſtyloque ſpiraliter tortis.
1016.

* *Scandentes.*

vulgaris. 1. Ph. caule volubili, flor. racemoſis geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pendulis.

lunatus. 2. Ph. caule volubili, legum. acinaciformibus ſublunatis laeuibus.

inamaenus. 3. Ph. caule volubili, florum vexillo reuoluto calycibus concolore.

farinoſus. 5. Ph. caule volubili, pedunc. ſubcapitatis, ſem. tetragono-cylindricis puluerulentis.

vexillatus. 6. Ph. caule volubili, pedunc. petiolo craſſioribus capitatis, alis ſubfalcatis difformibus, legum. linearibus ſtrictis.

heluolus. 7. Ph. caule volubili, flor. capitatis, calyc. bracteatis, alis expanſis maximis, foliol. deltoidibus oblongis.

ſemierectus. 14. Ph. caule ſemiuolubili, flor. ſpicatis, calyc. ebracteatis, alis expanſis maioribus, foliol. ouatis. *Mant.* 100.

alatus. 8. Ph. caule volubili, flor. laxe ſpicatis, alis longitudine vexili.

Caracalla. 9. Ph. caule volubili, vexillis carinaque ſpiraliter conuolutis.

** *Erecti.*

nanus. 9. Ph. caule erecto laeui, bracteis calyce maioribus, legum. pendulis compreſſis rugoſis.

radiatus. 10. Ph. caule erecto tereti, flor. capitatis, legum. cylindricis horizontalibus.

Max. 11. Ph. caule recto anguloſo hiſpido, legum. pendulis hirtis. *Legumina roſtro incurvo.*

Mungo. 15. Ph. caule flexuoſo tereti hirſuto, legum. capitatis hirtis. *Mant.* 101.

lathyroid. 12. Ph. caule erecto, foliolis lanceolatis.

ſphaeroſpermus. 13. Ph. caule erecto, ſem. globoſis hilo tinctis.

867. DOLICHOS. *Vexilli* baſis callis 2, parallelis oblongis, alas ſubtus comprimentibus. 1018.

* *Volubiles.*

Lablab. 2. D. volubilis, legum. ouato-acinaciformibus, ſeminibus ouatis hilo arcuato verſus alteram extremitatem.

ſinenſis. 1. D. volubilis, legum. pendulis cylindricis toruloſis, peduncul. erectis multifloris.

vncinatus. 3. D. volubilis, legum. cylindricis hirſutis apice unguiculo ſubulato hamato, pedunc. multifloris, caule hirto.

vnguiculatus. 4. D. volubilis, legum. capitatis ſubcylindricis apice recuruo concauo.

tetragonolobus. 9. D. volubilis, legum. membranaceo-quadrangulatis.

ſeſquipedalis. 5. D. volubilis, legum. ſubcylindricis laeuibus longiſſimis.

dltiſſimus. 6. D. volubilis, legum. racemoſis hirtis aequalibus, ſem. hilo cinctis, fol. vtrinque glabris. *Mant.* 101.

pruri-

pruriens. 7. D. volubilis, legum racemoſis: valuulis ſubcarinatis hirtis, pedunc. ternis. Strizolobium ſpicis multis pendulis alaribus, floribus ternis. *Brown. jam.* 290. *Corollae vexillum ouatum, reliquis petalis triplo minus.*

vrens. 8. D. volubilis, legum. racemoſis: ſulcis transuerſim lanceolatis, ſeminibus hilo cinctis. Phaſeolus ſiliquis latis hiſpidis rugoſis, fructu nigro. *Plum. ic. t.* 107. *Folia ſubtus tomentoſa nitida.*

minimus. 11. D. volubilis, legum. racemoſis: compreſſis tetraſpermis, fol. rhombeis. *Iacq. ſpec. t.* 22.

capenſis. D. volubilis, pedunc. ſubbifloris, legum. ellipticis compreſſis, fol. glabris.

ſcarabaeoides. 12. D. volubilis, fol. ouatis tomentoſis, flor. ſolitariis, ſem. bicornibus.

bulboſus. 6. D. volubilis, fol. glabris multangulis dentatis.

trilobus. 14. D. volubilis, fol. lateralibus extrorſum gibbis: intermedio trilobo.

trilobatus. 27. D. volubilis piloſus, fol. trifidis. *Mant.* 101.

ariſtatus. 15. D. volubilis, pedunc. bifloris axillaribus, legum. linearibus compreſſis; ariſta terminali recta.

filiformis. 16. D. volubilis, foliol. linearibus obtuſis mucronatis glabris ſubtus pubeſcentibus.

pubeſcens. 17. D. volubilis, caule pubeſcente, legum. ternis ſubſeſſilibus compreſſis piloſis nutantibus.

purpureus. 18. D. volubilis, caule glabro, petiol. pubeſcentibus, corollae alis patentibus.

regularis. 19. D. volubilis, fol. ouatis obtuſis, pedunc. multifloris, pet. aequalis magnitudinis figuraeque.

lignoſus. 20. D. volubilis, caule perenni, pedunc. capitatis, legum ſtrictis linearibus.

polyſtachios. 21. D. volubilis, caule perenni, ſpicis longiſſimis, pedicellis geminis, legum. acuminatis compreſſis.

* * *Erecti.*

enſiformis. 23. D, caule ſuberecto, legum. acinaciformibus tricarinatis, ſem. arillatis.

Soja. 24. D. caule erecto flexuoſo, racemis axillaribus erectis, legum. pendulis hiſpidis ſubdiſpermis. *Corollae vix calyce majores.*

biflorus. 25. D. caule perenni laeui, pedunc. bifloris, leguminibus erectis.

repens. 22. D. caule repente, fol. pubescentibus ouatis, flor. racemosis geminis, legum. linearibus teretibus.

868. GLYCENE. *Cal.* 2-labiatus *Corollae* carina apice vexillum reflectens.

1023.

subterranea. 1. G. fol. ternatis radicalibus, caul. procumbentibus flexuosis, pedunc. bifloris. *Linn. dec.* 37. *t.* 17.

monoica. 2. G. fol. ternatis nudiusculis, caul. pilosis, racem. pendulis, flor. fructiferis apetalis. Phaseolus americanus supra & infra terram fructus gerens. *Boerh. lugdb. 2. p. 28. sub terra etiam fructificat, vt Lathyrus subterraneus.*

jauanica. 3. G. fol. ternatis, caule villoso, petiol. hirsutis, bracteis lanceolatis minutis.

comosa. 4. G. fol. ternatis hirsutis, racemis lateralibus.

tomentosa. 5. G. fol. ternatis tomentosis, racem. breuissimis axillaribus, legum. dispermis.

bituminosa. 6. G. fol. ternatis, flor. racemosis, legum. tumidis villosis.

Apios. 8. G. fol. impari-pinnatis ouato-lanceolatis: foliolis septenis.

frutescens. 9. G. fol. impari pinnatis, caule perenni. *Legumen vti praecedentis biloculare.*

monophylla. 10. G. fol. simplicibus cordatis, caule pubescente triquetro. *Mant.* 101.

869. CLITORIA. *Cor.* supinata: vexillo maximo patente alas obumbrante.

1025.

Ternatea. 1. C. fol. pinnatis. *Flores hysteranthi.*

brasiliana. 2. C. fol. ternatis, calyc. solitariis campanulatis.

virginian. 3. C. fol. ternatis, calyc. geminis campanulatis.

mariana. 4. C. fol. ternatis, calyc. cylindricis.

Galactia. 5. C. fol. ternatis, racemo erecto, flor. pendulis.

870. PISVM. *Stylus* triangulus, ſupra carinatus pubeſcens. *Calycis* laciniae ſuperiores 2 breuiores. 1026.

ſatiuum. 1. P. petiol. teretibus, ſtipul. inferne rotundatis crenatis, pedunc. multifloris.

aruenſe. 2. P. petiol. tetraphyllis, ſtipul. crenatis, pedunc. vnifloris.

maritimum. 3. P. petiol. ſupra planiuſculis, caule angulato, ſtipul. ſagittatis, pedunc. multifloris.

Ochrus. 4. P. petiol. decurrentibus membranaceis diphyllis, pedunc. vnifloris.

871. OROBVS. *Stylus* linearis. *Cal.* baſi obtuſus: laciniis ſuperioribus profundioribus, breuioribus. 1027.

lathyroid. 1. O. fol. coniugatis ſubſeſſilibus, ſtipulis dentatis.

hirſutus. 2. O. fol. coniugatis petiolatis, ſtipul. integris.

luteus. 3. O. fol. pinnatis ouato-oblongis, ſtipul. rotundato-lanatis dentatis, caule ſimplici. Orobus foliis quinatis: foliolis ouato oblongis, ſtipulis ſemiſagittatis, pedunculis longiſſimis, caule ſimplici. *Ger. prov.* 492. *Folia ſubtus glauca. Stipulae ſemiſagittatae, integerrimae, minime ſubrotundo-lunatae aut dentatae. Turra.*

vernus. 4. O. fol. pinnatis ouatis, ſtipul. ſemiſagittatis integerrimis, caule ſimplici.

tuberoſus. 5. O. fol. pinnatis lanceolatis, ſtipul. ſemiſagittatis integerrimis, caule ſimplici.

ſyluatic. a. O. caulibus decumbentibus hirſutis ramoſis. *Mant.* 67.

anguſtifolius. 6. O. fol. bijugis enſiformibus, ſtipul. ſubulatis, caule ſimplici. β. Orobus caule ramoſo, fol. quaternopinnatis linearibus, ſtipulis ſemiſagittatis ſubulatis. *Ger. prov.* 493. Orobus orientalis, foliis anguſtiſſimis coſtae breuiſſimae. *Tournef. cor.* 26. Araci f. Apios leguminoſae ſpecies toſſano carolo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 326.

niger. 7. O. caule ramoſo, fol. ſexjugis ouato-oblongis.

pyrenaicus. 8. O. caule ramoſo, fol. bijugis lanceolatis neruoſis, ſtipul. ſubſpinoſis.

ſyluaticus. 9. O. caule ramoſo hirſuto decumbente, fol. ſubſeptemiugis.

872. LATHYRVS. 1029.

Stylus planus, ſupra villoſus, ſuperne latior. *Cal.* laciniae ſuperiores 2 breuiores.

* *Pedunculis vniſloris.*

Aphaca. 1. L. pedunc. vnifloris, cirrhis aphyllis, ſtipul. ſagittato-cordatis.

Niſſolia. 2. L. pedunc. vnifloris, fol. ſimplicibus, ſtip. ſubulatis.

amphicarpos. 3. L. pedunc. vnifloris calyce longioribus, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis.

Cicera. 4. L. pedunc. vnifloris, cirrhis diphyllis, legum. ouatis compreſſis: dorſo canaliculatis.

ſatiuus. 5. L. pedunc. vnifloris, cirrhis diphyllis tetraphyllisque, legum. ouatis compreſſis dorſo bimarginatis.

inconſpicuus. 6. L. pedunc. vnifloris calyce breuioribus, cirrhis diphyllis, foliol. lanceolatis.

ſetifolius. 7. L. pedunc. vnifloris, cirrhis diphyllis, foliol. ſetaceo-linearibus. *Ger. prov.* 495. *Caules ſubſolitarii. Foliola ſubauenia. Stipulae appendiculatae. Petiolus ſtipula 3-plo longior. Legumen ouatum, turgidum. G.*

angulatus. 8. L. pedunc. vnifloris ariſtatis, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis, foliol. linearibus. *Ger. prov.* 495. *Caules multi. Foliola neruoſa. Stipulae lanceolatae. Petiolus vix ſtipula longior. Legumen oblongum, compreſſum. G.*

articulatus. 9. L. pedunc. ſubumbifloris, cirrhis polyphyllis, foliol. alternis.

* * *Pedunculis bifloris.*

odoratus. 10. L. pedunc. bifloris, cirrhis diphyllis, foliol. ouato-oblongis, leguminibus hirſutis.

annuus. 11. L. pedunc. bifloris, cirrhis diphyllis, foliol. enſiformibus, legum. glabris, ſtipul. bipartitis.

tingitanus. 13. L. pedunc. bifloris, cirrhis diphyllis: foliol. alternis lanceolatis glabris, ſtipulis lunatis.

Clymenum. 14. L. pedunc. bifloris, cirrhis polyphyllis, ſtipul. dentatis.

* * * *Pedunculis multifloris.*

hirſutus. 12. L. pedunc. ſubtrifloris, cirrhis diphyllis, fol. lanceolatis, legum. hirſutis, ſem. ſcabris. *Pedunculi ſaepius trifiori ſunt. Flores purpurei* ⊙.

tuberoſus. 15. L. pedunc. multifloris, cirrhis diphyllis: foliol. oualibus, internodiis nudis.

pratenſis. 16. L. pedunc. multifloris, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis: foliol. lanceolatis.

ſylueſtris. 17. L. pedunc. multifloris, cirrhis diphyllis: foliol. enſiformibus, internodiis membranaceis.

latifolius. 18. L. pedunc. multifloris, cirrhis diphyllis: foliol. lanceolatis, internodiis membranaceis.

heterophyllus. 19. L. pedunc. multifloris, cirrhis diphyllis tetraphyllisque: foliol. lanceolatis, internodiis membranaceis.

paluſtris. 20. L. pedunc. multifloris, cirrhis polyphyllis, ſtip. lanceolatis.

piſiformis. 21. L. pedunc. multifloris, cirrhis polyphyllis, ſtip. ouatis: baſi acutis. *Linn. dec.* 39. *t.* 20.

873. VICIA. *Stigma* latere inferiore transuerſe barbatum. 1034.

* *Pedunculis elongatis.*

piſiformis. 1. V. pedunc. multifloris, petiol. polyphyllis: foliol. ouatis: infimis ſeſſilibus.

dumetorum. 2. V. pedunc. multifloris, foliol. reflexis ouatis mucronatis, ſtip. ſubdentatis.

ſyluatica. 3. V. pedunc. multifloris, foliol. oualibus, ſtip. denticulatis.

caſſubica. 4. V. pedunc. ſubſexfloris, foliol. denis ouatis acutis, ſtip. integris. *Oed. dan. t.* 98.

Cracca. 5. V. pedunc. multifloris, flor. imbricatis, foliol. lanceolatis pubeſcentibus, ſtip. integris.

onobrychioides. 6. V. pedunc. multifloris, flor. diſtantibus, foliol. linearibus, ſtip. inferne denticulatis. *Legumina latiſſima.*

niſſoliana. 7. V. pedunc. multifloris, foliol. oblongis, ſtip. integris; legum. villoſis ouato-oblongis.

biennis. 8. V. pedunc. multifloris, petiol. ſulcatis ſubdodecaphyllis: foliol. lanceolatis glabris.

benghalenſis. 9. V. pedunc, multifloris, foliol. integerrimis, ſtip. integris, legum. erectiuſculis. *Ger. prov.* 498.

* * *Floribus axillaribus, ſubſeſſilibus.*

ſatiua. 10. V. legum. ſeſſilibus ſubbinatis erectis, fol. retuſis, ſtip. notatis.

lathyroides. 11. V. legum. ſeſſilibus ſolitariis erectis glabris, foliol. ſenis: inferioribus obcordatis. *Gouan. hort.* 371.

lutea. 12. V. legum. ſeſſilibus reflexis piloſis ſolitariis pentaſpermis, corollae vexillis glabris.

hybrida. 13. V. legum. ſeſſilibus reflexis piloſis pentaſpermis, corollae vexillis villoſis.

peregrina. 14. V. legum. ſubſeſſilibus pendulis glabris tetraſpermis, foliol. linearibus emarginatis.

ſepium. 15. V. legum pedicellatis ſubquaternis erectis, foliol. ouatis integerrimis: exterioribus decreſcentibus.

bithynica. 16. V. legum. pedunculatis ſolitariis erectis, foliol. quaternis ouali-lanceolatis, ſtip. dentatis. *Lathyrus bithynicus. Sp. pl.* 9.

narbonenſis. 17. V. legum. ſubſeſſilibus ſubternis erectis, foliol. ſenis ſubouatis, ſtip. denticulatis.

Faba. 18. V. caule erecto, petiol. absque cirrhis. *Habitat non procul a Mari* Caſpio *in confiniis* Perſiae. *D. Lerche.*

874. ERVVM. *Cal.* 5-partitus, longitudine corollae. 1040.

Lens. 1. E. pedunc. ſubbifloris, ſem. compreſſis conuexis.

tetraſper. 2. E. pedunc. ſubbifloris, ſem. globoſis quaternis.

birſutum. 3. E. pedunc. multifloris, ſemin. globoſis binis.

ſolonienſe. 4. E. pedunc. ſubbifloris ariſtatis, petiol. acuminatis: foliol. obtuſis. *Affinis Lathyro angulato?*

monanth. 5. E. pedunc. vnifloris.

Eruilia. 6. E. germinibus vndato-plicatis, fol. impari pinnatis.

875. GI-

875. CICER. *Cal.* 5-partitus, longitudine corollae: laciniis quatuor ſuperioribus vexillo incumbentibus. *Legumen* rhombeum, turgidum, diſpermum.
1040.

arietinum. CICER foliolis ferratis.

876. CYTISVS. *Cal.* 2-labiatus: $\frac{1}{4}$. *Legumen* baſi attenuatum.
1041.

Laburnum. 1. C. racemis ſimplicibus pendulis, foliol. ouato-oblongis.

nigricans. 2. C. racem. ſimplicibus erectis, foliol. ouato-oblongis.

ſeſſilifolius. 3. C. racem. erectis, calyc. bractea triplici, fol. floralibus ſeſſilibus.

Cajan. 4. C. racem. axillaribus erectis, foliol. ſublanceolatis tomentoſis: intermedio longius petiolato. *Iacq. ſpec.* 1. *Hugh. barb.* 199. *t.* 19. *Folia moliſſima, certo reſpectu alba. Racemus erectus. Calyx ſubpubeſcens. Corolla flaua: Vexillum erectum. Alae horizontaliter planae. Carina obtuſa. Stamina diadelpha. Legumen ſtriis oblique tranſuerſis interceptum.* 24.

hirſutus. 5. C. pedunc. ſimplicibus lateralibus, calyc. hirſutis trifidis obtuſis ventricoſo-oblongis.

ſupinus. 6. C. flor. vmbellatis terminalibus, ramis decumbentibus, foliol. ouatis. *Caulis Petiolique pubeſcentes. Folia laeuiuſcula. Calyx tubuloſus, ventricoſus, pubeſcens, bilabiatus.*

auſtriacus. 7. C. flor. vmbellatis terminalibus, caul. erectis, foliol. lanceolatis.

pſoralodes. 9. C. ſpicis pubeſcentibus, ramis angulatis, caule ſuffruticoſo, foliol. lanceolatis.

graecus. 10. C. fol. ſimplicibus lanceolato-linearibus, ramis angulatis.

argenteus. 11. C. flor. ſubſeſſilibus ſubbinatis, fol. tomentoſis, caul' decumbentibus, ſtipul. minutis. *Ger. prov.* 484. *n.* 4. *Gouan. hort.* 377. *Planta incana nitida. Bracteae* 2. *ſ.* 3. *calycis baſi adnatae. Calycis laciniae longiores, quam in congeneribus.*

878. GEOFFRAEA. *Cal.* 5-fidus. *Drupa* ouata.
1043. *Nucleus* compreſſus.

ſpinoſa. 1. GEOFFRAEA. *Iacq. amer.* 207. *t.* 180. *f.* 2.

879. ROBINIA. *Cal.* 4-fidus. *Legumen* gibbum,
1043. elongatum.

Pſeudacacia. 1. R. racemis pedicellis vnifloris, fol. impari-pinnatis, ſtipul. ſpinoſis.

violacea. 2. R. racemis pedicellis bifloris, fol. impari-pinnatis, caule inermi. *Iacq. amer.* 210. *t.* 177. *f.* 49. Pſeudacacia flor. violaceis. *Plum. ſpec.* 19.

hiſpida. 7. R. racem. axillaribus, fol. impari-pinnatis, caul. inermi hiſpido. *Mant.* 101.

mitis. 3. R. racem. pedicellis ternis, fol. impari-pinnatis, caul. inermi. *Legumen ouali-oblongum, compreſſum, acuminatum. Pluk. t.* 310. *f.* 3.

Caragana. 4. R. pedunc. ſimplicibus, fol. abrupte pinnatis.

fruteſcens. 5. R. pedunc. ſimplicibus, fol. quaternatis ſubpetiolatis.

pygmaea. 6. R. pedunc. ſimplicibus, fol. quaternatis ſeſſilibus.

880. COLVTEA. *Cal.* 5-fidus. *Legumen* inflatum,
1045. baſi ſuperiore dehiſcens.

arboreſcens. 1. C. arborea, foliolis obcordatis.

frutejcens. 2. C. fruticoſa, foliol. ouato-oblongis. *Alae minutae. Vexillum breue.*

herbacea. 3. C. herbacea, foliol. linearibus glabris.

882. GLYCYRRHIZA. *Cal.* 2-labiatus: $\frac{1}{5}$. *Legu-*
1046. *men* ouatum, compreſſum.

echinata. 1. G. legum. echinatis, fol. ſtipulatis, foliol. impari ſeſſili.

glabra. 2. G. legum. glabris, ſtipul. nullis, foliol. impari petiolato.

hirſuta. 3. G. legum. hirſutis, foliol. impari petiolato.

883. CO-

883. CORONILLA. *Cal.* 2-labiatus: $\frac{2}{3}$: dentibus
1046. ſuperioribus connatis. *Vexillum* vix alis longius. *Legumen* iſthmis interceptum.

Emerus. 1. C. fruticoſa, pedunc. ſubtrifloris, corollarum vnguibus calyce triplo longioribus, caul. angulato.

juncea. 2. C. fruticoſa, foliol. quinatis ternatisque lineari-lanceolatis ſubcarnoſis obtuſis.

valentina. 3. C. fruticoſa, foliol. ſubnouenis, ſtip. ſuborbiculatis. *Florum odor grauis.*

glauca. 4. C. fruticoſa, foliol. ſeptenis, ſtipul. lanceolatis. Coronilla fruticoſa, leguminibus craſſioribus. *Mill. ic. t.* 289. *f.* 1. *Foliola cuneiformia, obtuſa cum mucrone. Stipulae lanceolatae patulae; noctu inodora.*

coronata. 5. C. fruticoſa, foliol. nouenis obouatis: internis cauli approximatis, ſtipula oppoſitifolia bipartita.

minima. 7. C. ſuffruticoſa procumbens, foliol. nouenis lanceolatis, ſtipula oppoſitifolia emarginata, legum. angulatis nodoſis. *Foliola infima loco ſtipularum, vt in C. coronata, ſed haec non frutex, vix ſuffrutex dicenda.*

argentea. 6. C. fruticoſa, foliol. vndenis ſericeis: extimo maiore.

Securidaca. 8. C. herbacea, legum. falcato-gladiatis, foliol. plurimis. *Dormit Foliolis ſupra petiolum conniuentibus; verſusque petioli baſin flexis.*

varia. 9. C. herbacea, legum. erectis teretibus toroſis numeroſis, foliol. plurimis glabris. *Foliola in petiolo communi infima cauli, vti ſtipulae, approximata ſaepius ſunt, quemadmodum in C. coronata, aut. C. minima.*

cretica. 10. C. herbacea, legum. quinis erectis teretibus articulatis, foliol. vndenis.

ſcandens. 11. C. caule ſcandente flaccido.

884. ORNITHOPVS. *Legumen* articulatum, teres,
1049. arcuatum.

perpuſill. 1. O. fol. pinnatis, legumin. incuruatis. *Pl. glabra. Folia petiolata.*

com-

compreſſ. 2. O. fol, pinnatis, legum recuruatis compreſſis rugoſis, bractea pinnata. *Pl. tomentoſa. Folia ſeſſilia.*

ſcorpioid. 3. O. fol. ternatis ſubſeſſilibus : impari maximo. *Pl. erecta. Pedunculi aphylli, ſubquadriflori.*

4-phylla. 4. O. fol. quaternatis, flor. ſolitariis.

885. HIPPOCREPIS. 1049.

Legumen compreſſum, altera ſutura pluries emarginatum, curuum.

vniſiliqu. 1. H. legum. ſeſſilibus ſolitariis rectis.

multiſiliq. 2. H. legum. pedunculatis confertis circularibus: margine altero lobatis.

comoſa. 3. H. legum. pedunculatis confertis arcuatis: margine exteriore repandis. 4.

886. SCORPIVRVS. 1050.

Legumen iſthmis interceptum, reuolutum, teres.

vermiculata. 1. S. pedunc. vnifloris, legum. tectis vndique ſquamis obtuſis.

muricata. 2. S. pedunc. bifloris, legum. extrorſum obtuſe aculeatis.

ſulcata. 3. S. pedunc. ſubbifloris, legum. extrorſum ſpinis diſtinctis acutis.

ſubuilloſa. 4. S. pedunc. ſubquadrifloris, legum. extrorſum ſpinis confertis acutis.

888. AESCHYNOMENE. 1060.

Cal. bilabiatus. *Legum.* articulis truncatis, monoſpermis.

grandiflora. 1. AE. caule arboreo, flor. maximis, legum. filiformibus.

arborea. 2. AE. caule arboreo laeui, legum. articulis ſemicordatis glabris.

aſpera. 3. AE. caule herbaceo ſcabro, legum. articulis medio ſcabris.

americana. 4. AE. caule herbaceo hiſpido, legum. articulis ſemicordatis, foliol. acuminatis, bracteis ciliatis. *Act. petr.* 1763. *p.* 321. *t.* 12.

indica.

indica. 5. AE. caule herbaceo laeui, legum. laeuibus hinc toroſis obtuſis, foliol. obtuſis.

Sesban. 6. AE. caul. herbaceo laeui, legum. cylindricis aequalibus, foliol. obtuſis.

pumila. 7. AE. caul. herbaceo laeui, legum. hinc ſerratis medio ſcabris, foliol. acuminatis.

887. HEDYSARVM. *Cor.* carina transuerſe obtuſa. *Legumen* articulis 1-ſpermis.
1051.

* *Foliis ſimplicibus.*

Alhagi. 1. H. fol. ſimplicibus lanceolatis obtuſis, caule fruticoſo ſpinoſo.

bupleurif. 2. H. fol. ſimplicibus lanceolatis acutis, caule inermi.

nummul. 3. H. fol. ſimplicibus cuneiformibus.

moniliferum. 49. H. fol. ſimplicibus orbiculatis, legum. moniliformibus globoſo-articulatis. *Mant.* 102.

reniforme. 4. H. fol. ſimplicibus reniformibus. *Burm. ind. t.* 49. *f.* 1.

ſtyraciſolium. 6. H. fol. ſimplicibus cordato-orbiculatis retuſis ſupra glabris.

gangeticum. 8. H. fol. ſimplicibus ouatis acutis ſtipulatis. *Folia palmaria, oblongo-ouata. Caulis ſuffruticoſus, inclinatus, rameſus. Legumina articulata, ſerrata.*

maculatum. 5. H. fol. ſimplicibus ouatis obtuſis.

Ecaſtaphyllum. 7. H. fol. ouatis ſubtus ſericeis, petiolis muticis. *Brown. jam. t.* 32. *f.* 1.

vaginale. 9. H. fol. ſimplicibus cordato-lanceolatis, petiol. ſimplicibus, ſtip. vaginalibus.

triquetrum. 10. H. fol. ſimplicibus oblongis, petiol. alatis, ramis triquetris. *Burm. ind. t.* 49. *f.* 2.

ſtrobiliferum. 11. H. fol. ſimplicibus, bracteis ſtrobilorum inflatis cordatis obtuſis.

** *Foliis coniugatis.*

diphyllum. 12. H. fol. binatis petiolatis, bracteis geminis ouatis acutis ſeſſilibus.

*** *Fo-*

* * * *Foliis ternatis.*

pulchellum. 13. H. fol. ternatis: bracteis geminis coniugatis orbiculatis lineatis.

lineatum. 19. H. fol. ternatis oblongis lineatis, racemis axillaribus pendulis. ♄.

retroſlexum. 50. H. fol. ternatis, racemis erectis, legum. pendulis multiarticulatis. *Mant.* 103.

vmbellatum. 15. H. fol. ternatis, pedunc. vmbelliferis, caule fruticoſo.

biarticulatum. 16. H. fol. ternatis, caule ſuffruticoſo, legumin. biarticulatis.

heterocarpon. 17. H. fol. ternatis, flor. ſpicatis, legum. articulatis: infimo monoſpermo, ſtipulis ſetaceis.

viſcidum. 18. H. fol. ternatis, legum. membranaceis laeuibus integris, caule ramisque hiſpidis.

canadenſ. 20. H. fol. ſimplicibus ternatisque, flor. racemoſis.

caneſcens. 21. H. fol. ternatis ſubtus ſcabris, caule hiſpido, flor. racemoſis coniugatis.

marilandicum. 23. H. fol. ternatis: foliol ſubrotundis, caule fruteſcente ramoſiſſimo, legum. articulatis laeuibus.

fruteſc. 24. H. fol. ternatis ſubouatis ſubtus villoſis, caule fruteſcente.

viridiflorum. 25. H. fol. ternatis acutiuſculis, caule erecto, racem. longiſſimis erectis.

hirtum. 26. H. fol. ternatis oualibus, caule fruticoſo, racemis ouatis, calyc. fructibusque hirſutis monoſpermis.

junceum. 14. H. fol. ternatis lanceolatis, leguminibus vniarticulatis rhombeis, pedunculis ſubumbellatis lateralibus. *Simile H. violaceo; Vmbellae foliis breuiores. Legumina monoſperma.*

violaceum. 27. H. fol. ternatis ouatis, flor. geminatis, legum. nudis venoſis rhombeis.

paniculatum. 28. H. fol. ternatis lineari-lanceolatis, flor. paniculatis, legum. rhombeis.

nudiflorum. 29. H. fol ternatis, ſcapo florifero nudo, caule folioſo angulato.

repens. 30. H. fol. ternatis obcordatis, caulib. procumbentibus, racem. lateralibus.

hamatum. 31. H. fol. ternatis neruoſis nudis, ſpicis ſeſſilibus, legum. diſpermis obtectis acumine vncinatis.

triflo-

triflorum. 32. H. fol. ternatis obcordatis, caul. procumbentibus, pedunc. vnifloris ternis.

barbarum. 22. H. fol. ternatis, racem. oblongis ſubramoſis, legum. inflexis, cal. piloſis.

lagopodioides. 33. H. fol. ternatis, racem. oblongis, legum. inflexis cal. hirſutis. *Affinis H. barbaro. Commune huic cum barbaro, quod quiuis pedicellus defloratus inflectatur armatus calycis laciniis 3 maioribus piloſis reflexis, ſic occultans Legumen laeue, 3. ſ. 4-articulatum.*

volubile. 34. H. fol. ternatis ouato-oblongis, caule volubili.

* * * * *Foliis pinnatis.*

alpinum. 35. H. fol. pinnatis, legum. articulatis glabris, pendulis, caule erecto,

obſcurum. 36. H. fol. pinnatis, ſtip. vaginalibus, caule erecto flexuoſo, flor. pendulis.

coronarium. 37. H. fol. pinnatis, legum. articulatis aculeatis nudis rectis, caule diffuſo.

flexuoſum. 39. H. fol. pinnatis, legum articulatis aculeatis flexuoſis, caule diffuſo.

humile. 40. H. fol. pinnatis, legum. articulatis aſperis, corollae alis obſoletis, ſpicis hirſutis, caulib. depreſſis.

ſpinoſiſſimum. 38. H. fol. pinnatis, legum articulatis aculeatis tomentoſis, caule diffuſo. *Legum: ſaepius articulis 2, orbiculatis, aequaliter aculeatis.*

virginicum. 41. H. fol. pinnatis, caule fruticoſo, legum. articulatis glabris pedunculatis erectis.

pumilum. 44. H. fol. pinnatis, caule ſuffruticoſo, corollarum alis vexillo vexilloque carina breuioribus, legum. monoſpermis.

Onobrychis. 42. H, fol. pinnatis, legum monoſpermis aculeatis, corollarum alis calyce breuioribus, caule elongato.

ſaxatile. 43. H. fol. pinnatis, legum. monoſpermis ſulcatis muticis, corollarum alis breuiſſimis, ſcapis ſubradicatis. *Corollae alae calyce vix longiores.*

Caput-galli. 45. H. fol. pinnatis, legum. monoſpermis criſtatis aculeatis, pet. aequalibus, caule diffuſo.

crinitum. 47. fol. pinnatis, racemis longis, legumini. inflexis, caule fruticoſo. *Mant.* 102. *Affinitas ſumma H.* 33. *et* 22.

proſtra-

proſtratum. 48. H. fol. pinnatis, legum. cylindricis indiuiſis diſpermis, capitulis ſeſſilibus lateralibus, caul. proſtratis. *Mant.* 102.

cornutum. 46. H. fol. pinnatis linearibus, legum. monoſpermis laeuibus, caule fruticoſo: pedunculis perſiſtenti-ſpinoſis. *Figura refert Onobrychiden 2 Cluſ. hiſt. 2. p.* 239.

889. INDIGOFERA. *Cal.* patens. *Corollae* carina vtrinque calcari ſubulato patulo! *Legumen* lineare. 1061.

tinctoria. 1. I. legum. arcuatis incanis, racemis, folio breuioribus *Trew. ehret. t.* 53, 54.

hirſuta. 2. I. legum. pendulis lanatis tetragonis.

glabra. 3. I. legum. horizontalibus teretibus, fol. pinnatis ternatisque.

trifolitata. 5. I. legum. ſubſeſſilibus compreſſis pendulis, fol. ternatis lanceolatis. *Legumina axillaria bina, linearia, reflexa, tetragona angulis lateralibus latioribus.*

pſoraloides. 4. I. racemoſa, legum. cernuis, racem. elongatis, fol. ternatis. Cytiſus pſoraloides. *Sp. pl.* 1043. Cytiſus africanus. *Riv. tetr.* 71. *f.* 125. Trifolium aethiopicum ex alis ſpicatum. *Pluk. phyt.* 320. *f.* 3. *Caulis perennans, angulatus a petiolis decurrentibus coſtis* 2, *ſubſcaber. Pedunculus angulatus, foliis longior Racemo multiflori: Pedicelli breuiſſimi. Bracteae propriae caducae. Calycis dentes ſuperiores magis quam in aliis diuaricati. Corollae rubrae: Alae horizontales, conniuentes margine ſuperiore. Carina vtrinque, in medio, dente ſubulato, concauo, reflexo. Stamina diadelpha. Antherae luteae. Germen canaliculatum. Stylus purpureus. Stigma obtuſum. Semina multa.*

cytiſoides. 5. I. fol. quinato-pinnatis ternatisque, racemis axillaribus. Pſoralea cytiſoides. *Sp. plant.* 1076.

890. GALEGA. *Cal.* dentibus ſubulatis ſubaequalibus. *Legumen* ſtriis obliquis, ſeminibus interiectis. 1062.

officinalis. 1. G. legum. ſtrictis erectis, foliol. lanceolatis ſtriatis nudis.

cine-

cinerea- 2. G. legum. ſtrictis patentibus pedunculatis, racem. oppoſitifoliis, fol. mucronatis, ſubtus villoſis.

littoralis. 9. G. legum. racemoſis, tota villoſo-tomentoſa. Vicia littoralis pedunculis multifloris, foliolis oblongis tomentoſis, ſtipulis integris, leguminibus ſublinearibus. *Iacq. amer.* 206. *t.* 124. *Habitat in Carthagenae littoribus arenoſis marinis.* 4. *Flores carnei.*

virginia-na. 3. G. legum. retrofalcatis compreſſis villoſis ſpicatis, calyc. lanatis, foliol. ouali-oblongis acuminatis.

villoſa. 4. G. legum. retrofalcatis villoſis pendulis racemoſis lateralibus, fol. glabris lanceolatis.

maxima. 5. G. legum. ſtrictis adſcendentibus glabris, ſtipulis lanceolatis, foliol. oblongis glabris ſtriatis.

purpurea. 6. G. legum ſtrictis adſcendentibus glabris racemoſis terminalibus, ſtip. ſublatis, foliol. oblongis, glabris.

caribaea. 10. G. legum. ſtrictis glabris pendulis racemoſis, foliol. glabris mucronatis, caul. fruticoſo. *Iacq. amer.* 212. *t.* 125. *Habitat in Caribaeis.* ♄. *Racemi foliis longiores.*

tinctoria. 7. G. ſpic. lateralibus pedunculatis, legum. ſtrictis pendulis, foliol. emarginatis ſubtus villoſis.

ſenticoſa. 8. G. legum. binis lateralibus glabris, foliol. emarginatis ſubtus ſericeis, caule fruticoſo.

891. PHACA. *Legumen* ſemibiloculare.

1062.

baetica- 1. P. cauleſcens erecta piloſa, legum. tereti-cymbiformibus.

alpina. 2. P. cauleſcens erecta glabra, legum. oblongis inflatis ſubpiloſis. (*excluſo Tilli ſynonymo.*)

auſtralis. 4. P. caule ramoſo proſtrato, foliol. lanceolatis, florum alis ſemibifidis. *Mant.* 123.

veſicaria. 5. P. acaulis, calycibus fructiferis oualibus inflatis glabris. *Mant.* 123.

ſibirica. 3. P. acaulis, fol. pinnatis: foliol. digitatis.

892. ASTRAGALVS. *Legumen* biloculare, gibbum. 1064.

* *Caulibus folioſis erectis; nec proſtratis.*

alopecuroides, 1. A. cauleſcens, ſpic. cylindricis ſubſeſſilibus, calycibus leguminibusque lanatis.

chriſtianus. 2. A. cauleſcens erectus, flor. glomeratis ſubſeſſilibus ex omnibus axillis foliaceis.

capitatus. 3. A. cauleſcens, capitulis globoſis: pedunc. longiſſimis, fol. emarginatis.

piloſus. 4. A. cauleſcens erectus piloſus, flor. ſpicatis, legum. ſubulatis piloſis.

ſulcatus. 5. A. cauleſcens erectus, caule glabro ſulcato, foliol. lanceolatis, legum. ſubtriquetris.

galegiformis. 7. A. cauleſcens ſtrictus glaber, flor. ramoſis pendulis, legum. triquetris vtrinque mucronatis.

chinenſis, 8. A. cauleſcens ſtrictus glaber, flor. racemoſis pendulis, legum. ouatis inflatis vtrinque mucronatis.

viliginoſus. 9. A. cauleſcens erectiuſculus, flor. ſpicatis, legum. erectiuſculis nudis tumidis tereti-depreſſis: mucrone reflexo.

carolinianus. 10. A. cauleſcens erectus laeuis, pedunc. ſpicatis, legum. ouato-cylindricis ſtylo acuminatis.

* * *Caulibus folioſis, diffuſis.*

canadenſis. 11. A. cauleſcens diffuſus, legum. ſubcylindricis mucronatis, foliol. ſubtus ſubuilloſis. *Dodart. mem. t. 65.*

Cicer. 12. A. cauleſcens proſtratus, legum. ſubgloboſis inflatis mucronatis piloſis.

microphyllus. 13. A. cauleſcens recto-patulus: foliolis oualibus, calyc. tumidiuſculis, legum. ſubrotundis.

glycyphyllos. 14. A. cauleſcens proſtratus, legum. ſubtriquetris arcuatis, foliol. oualibus pedunculo longioribus.

hamoſus. 15. A. cauleſcens procumbens, legum. ſubulatis recuruatis glabris, foliol. obcordatis ſubtus viloſis.

contortuplicatus. 16. A. cauleſcens procumbens, legum. contortuplicatis canaliculatis villoſis.

baeticus. 17. A. cauleſcens procumbens, ſpic. pedunculatis, legum. priſmaticis rectis triquetris apice vncinatis.

ſeſa-

ſeſameus. 18. A. cauleſcens diffuſus, capitul. ſubſeſſilibus lateralibus, legum. erectis ſubulatis acumine reflexis. *Flores minuti, caeruleſcentes, axillares, ſeſſiles, calyce non longiores. Legumina ſubterna, erecta, incurua, hiſpida, apice patula.*

Epiglottis. 19. A. cauleſcens procumbens, legum. capitatis cordatis acutis hirſutis complicatis.

ſyriacus. 20. A. cauleſcens procumbens, capitulis pedunculatis, flor. reflexis, legum. tomentoſis ouato oblongis.

arenarius. 21. A. ſubcauleſcens procumbens, flor. ſubracemoſis erectis, fol. tomentoſis.

Glaux. 22. A. cauleſcens diffuſus, capitulis pedunculatis imbricatis ouatis, flor. erectis, legum. ouatis calloſis.

Onobrychis. 23. A. cauleſcens diffuſus, pedunc. ſpicatis, vexillis flore duplo longioribus.

tenuifolius. 6. A. cauleſcens procumbens glaber, foliol. linearibus, pedunc. elongatis triquetris. *Similis A onobrychidi, ſed folia ſubtomentoſa. Flores maiores, Stipulae ſolitariae.*

ſinicus. 40. A. cauleſcens proſtratus, capitulis pedunculatis, legum. priſmaticis triquetris erectis apice ſubulatis. *Mant.* 103.

auſtriacus. 24. A. cauleſcens procumbens, flor. racemoſis, legum. vtrinque acutis teretiuſculis, fol. linearibus. *Flores minuti.*

alpinus. 25. A. cauleſcens procumbens, flor. pendulis racemoſis, legum. vtrinque acutis piloſis.

trimeſtris. 36. A. ſubcauleſcens, ſcapis ſubbifloris, legum. hamatis ſubulatis bicarinatis.

* * * *Scapo nudo; abſque caule folioſo.*

montanus. 26. A. ſubacaulos, ſcap. folio longioribus, flor. laxe ſpicatis erectis, legum. ouatis acumine inflexo.

veſicarius. 27. A. acaulos, ſcap. folio longioribus, flor. laxe ſpicatis, calycibus leguminibusque inflatis hirſutis.

phyſodes. 28. A. acaulos, ſcap. folia aequantibus, legum inflatis ſubgloboſis nudis.

caprinus. 29. A. acaulos, ſcapo erecto, foliol. ciliatis, legum. ouatis tumidis viloſis. †

vralenſis. 30. A. acaulos, ſcapo erecto foliis longiore, legum. ſubulatis inflatis villoſis erectis.

monoſpeſulanus. 33. A. acaulos, ſcapis declinatis longitudine foliorum, legum. ſubulatis teretibus ſubarcuatis glabris.

incanus. 34. A. acaulos, ſcap. declinatis, foliol. tomentoſis. legum. ſubulatis ſubarcuatis incanis apice incuruis. *Ger. prou. 522. Scapi ſcabri.*

grandiflorus. 31. A. acaulos hirſutus, ſcap. erectis ſpicatis, foliol. ouatis obtuſis villoſis.

uncatus. 35. A. acaulos exſcapus, legum. ſubulatis hamatis folio longioribus, foliol. obcordatis.

campeſtris. 32. A. acaulos, calyc. leguminibusque villoſis, foliol. lanceolatis acutis, ſcapo decumbente.

depreſſus. 37. A. acaulos, ſcapis folio breuioribus, legum. cernuis, foliol. ſubemarginatis nudis.

* * * * *Caule lignoſo.*

tragoides. 38. A. ſubacaulos, floribus radicalibus numeroſis ſubſeſſilibus.

Tragacant. 39. A. caudice arboreſcente, petiolis ſpineſcentibus.

893. BISERRVLA. *Legumen* biloculare, planum: 1073. diſſepimento contrario.

Pelecinus. 1. BISERRVLA.

894. PSORALEA. *Calyx.* punctis calloſis adſperſus, longitudine *Leguminis* 1-ſpermi. 1074.

pinnata. 1. P. fol. pinnatis linearibus, flor. axillaribus.

aculeata. 2. P. fol. ternatis: foliol. cuneiformibus recuruo-mucronatis, capitul. terminalibus.

tenuifolia. 4. P. fol. inferioribus ternatis: ſuperioribus ſimplicibus lanceolato-ſubulatis. *In aliis Pedunculi laterales conferti capillares, longitudine foliorum.*

hirta. 3. P. fol. ternatis: foliol. obouatis recuruato-mucronatis, flor. ternis ſeſſilibus.

bituminoſa. 6. P. fol. omnibus ternatis, foliol. lanceolatis, pedunc. capitatis.

glandulo-ſa. 7. P. fol. omnibus ternatis: foliol. ouato-lanceolatis, ſpic. pedunculatis.

ame-

americana. 8. P. fol. ternatis: foliol. subrotundis angulatis, spic. pedunculatis.

tetragonoloba. 15. P. fol. ternatis dentatis, caul. flexuoso, legum. stricto quadrangularibus. *Mant.* 104.

corylifol. 9. P. fol. simplicibus ouatis.

pentaph. 11. P. fol. digitato-quinatis: foliol. inaequalibus.

prostrata. 12. P. fol. supradecompositis digitatis linearibus.

Dalea. 14. P. fol. pinnatis, spicis terminalibus.

enneaphylla. 13. P. fol. pinnatis, spic. axillaribus. *Stamina omnia connata Ebeni. Planta luteo-tinctoria.*

896. TRIFOLIVM. 1077.

Flores subcapitati. *Legumen* vix calyce longius, non dehiscens, deciduum.

* Meliloti *leguminibus nudis polyspermis.*

M. caerulea. 1. T. leguminibus seminudis mucronatis, caule erecto, spicis oblongis.

M. indica. 2. T. leguminibus racemosis nudis monospermis, caule erecto.

M. polonica. 3. T. leguminibus racemosis nudis dispermis lanceolatis, caule erecto.

M. officinal. 4. T. leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis, acutis, caule erecto.

M. italica. 5. T. leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis obtusis, caule erecto, foliol. integris.

M. cretica. 6. T. leguminibus racemosis nudis dispermis membranaceis, caule erectiusculo.

M. ornithopodioides. 7. T. leguminibus nudis octospermis subternis, calyc. duplo longioribus, caulibus declinatis.

** Lotoidea *leguminibus tectis, polyspermis.*

Lupinaster. 8. T. capitulis dimidiatis, fol. quinatis sessilibus, leguminibus polyspermis.

reflexum. 9. T. capitulis fructiferis reflexis, leguminibus trispermis.

strictum. 10. T. capitulis globosis, leguminibus dispermis, caule patulo, foliol. serrulatis, stipulis rhombeis.

Trifolii *character, vt ut genus habitu facillimum, difficillime eruitur.*

hybridum. 11. T. capitulis vmbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule adſcendente. Trifolium flore albo *Riuin. tetr. t.* 127. *f.* 2.

repens. 12. T. capitulis vmbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule repente.

comoſum. 13. T. capitulis vmbellato-globoſis imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, leguminibus tetraſpermis.

alpinum. 14. T. ſcapo nudo, leguminibus diſpermis pendulis, fol. lineari-lanceolatis.

* * * *Lagopoda calycibus villoſis.*

ſubterraneum. 15. T. capitulis villoſis quinquefloris, coma centrali reflexa rigida fructum obuoluente.

globoſum. 16. T. capitulis villoſis globoſis, calycibus ſuperioribus floſculo deſtitutis.

eherleri. 17. T. capitulis villoſis globoſis terminalibus ſolitariis, calycibus omnibus fertilibus, caul. procumbentibus, fol. obcordatis.

rubens. 18. T. ſpicis villoſis longis, corollis monopetalis, caule erecto, fol. ſerrulatis.

pratenſe. 19. T. ſpicis ſubuilloſis cinctis ſtipulis oppoſitis membranaceis, corollis monopetalis.

alpeſtre. 21. T. ſpic. ſubgloboſis villoſis terminalibus, caule erecto, fol lanceolatis ſerrulatis. *Simillimum T. pratenſi, herba T. montani; diſtinguitur a Tr. pratenſi, quod hoc alpeſtre capitulis terminalibus* 2, *illud* 1; *hoc ſtipulis viridibus, illud ſcarioſis venis rubris; hoc ſtipulis vltimis vtrinque lanceolatis, illud ſubouatis.*

ſquarroſum. 20. T. ſpicis ſubpiloſis, calycum infimo dente longiſſimo reflexo, caule herbaceo erecto.

lappaceum. 22. T. ſpicis globoſis terminalibus, calycibus ſetis rigidis hiſpidis, caule patulo, foliol. oualibus.

incarnatum. 23. T. ſpic. villoſis oblongis obtuſis aphyllis, foliol. ſubrotundis crenatis.

angu-

Racemoſa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38, 39, 40, 41, 42.
Vmbellata: 8, 9, 11, 12, 13, 14.
Faſciculata: 15, 16, 43.
Capitata: 22, 17, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 31.
Spicata: 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 10.

anguſtifo-lium. 24. T. ſpic. villoſis conico-oblongis dentibus calycinis ſetaceis ſubaequalibus, foliol. linearibus.

aruenſe. 25. T. ſpic. villoſis oualibus, dentibus calycinis ſetaceis villoſis aequalibus. *Alae intus macula ſanguinea.*

ſtellatum. 26. T. ſpic. piloſis ouatis, calyc. patentibus, caule diffuſo, foliol. obcordatis.

clypeatum. 27. T. ſpic. ouatis, calyc patulis: lacinia infima maxima lanceolata, foliol. ouatis.

ſcabrum. 28. T. capitul. ſeſſilibus lateralibus ouatis, calyc. laciniis inaequalibus rigidis recuruis.

glomeratum. 29. T. capit. ſeſſilibus haemiſphaericis rigidis, calyc. ſtriatis patulis aequalibus.

ſtriatum. 30. T. capit. ſeſſilibus ſublateralibus ouatis, calyc. ſtriatis rotundatis.

alexandrin. 31. T. capit. oblongis pedunculatis, caule erecto, foliis oppoſitis.

vniflorum. 33. T. acaule, pedunc. trifidis ſubtriflorisque ſtipula breuioribus.

* * * * *Veſicaria calycibus inflatis ventricoſis.*

ſpumoſum. 34. T. ſpicis ouatis, calyc. inflatis glabris quinquedentatis, inuolucr. vniuerſalibus pentaphyllis. *corollae rubrae.*

reſupinatum. 35. T. ſpicis ſubouatis, coroll. ſupinatis, calyc. inflatis dorſo gibbis, caul. proſtratis.

tomentoſum. 36. T. ſpicis ſeſſilibus globoſis tomentoſis, calyc. inflatis obtuſis. Trifolium capitulis ſeſſilibus axillaribus tomentoſis, calycibus inflatis, fol. glabris, caul. decumbentibus. *Ger. prou.* 510.

fragiferum. 37. T. ſpic. ſubrotundis, calyc. inflatis bidentatis reflexis, caul. repentibus.

* * * * * *Lupulina vexillis corollae inflexis.*

montanum. 38. T. ſpicis ſubimbricatis ſubtribus: vexillis ſubulatis emarceſcentibus, calyc. nudis, caul. erecto.

agrarium. 39. T. ſpic. oualibus. imbricatis: vexillis deflexis perſiſtentibus, calyc. nudis, caule erecto.

ſpadiceum. 37. T. ſpic. oualibus imbricatis: vexillis deflexis perſiſtentibus, calyc. piloſis, caule erecto.

procumbens. 38. T. ſpic. oualibus imbricatis: vexillis deflexis perſiſtentibus, caul. procumbentibus. *Sata euaſit diuerſa a ſequenti.*

filiforme. 39. T. spic. subimbricatis: vexillis deflexis persistentibus, calyc. pedicellatis, caul. procumbentibus.

biflorum. 40. T. spic. bifloris sessilibus, inuol. hispidis infundibuliformibus, fol. lanceolatis.

897. LOTVS. *Legumen* cylindricum, strictum. *Alae* 1089. sursum longitudinaliter conniuentes. *Cal.* tubulosus.

* *Leguminibus rarioribus, nec capitulum constituentibus.*

maritimus. 1. L. legum. solitariis membranaceo-quadrangulis, fol. glabris, bracteis lanceolatis.

siliquosus. 2. L. legum. solitariis membranaceo-quadrangulis, caul. procumbentibus, fol. subtus pubescentibus.

tetragonolobus. 3. L. legum. solitariis membranaceo-quadrangulis, bract. ouatis.

coniugatus. 4. L. legum. coniugatis membranaceo-quadrangulis, bract. oblongo-ouatis.

prostratus. 5. L. legum. subsolitariis tomentosis, foliol. acuminatis, stipulis minutis, caul. filiformibus.

edulis. 6. L. legum. subsolitariis gibbis incuruis. Trifolium corniculatum creticum. *Alp. exot. t.* 268.

peregrin. 7. L. legum. subbinatis linearibus compressis nutantibus.

angustissimus. 7. L. legum. subbinatis linearibus strictis erectis, caule erecto, pedunc. alternis.

arabicus. 19. L. legum. cylindricis aristatis, caul. prostratis, pedunc. trifloris, bracteis monophyllis. *Mant.* 104.

ornithopodioides. 9. L. legum. subternatis arcuatis compressis, caul. diffusis.

iacobaeus. 10. L. legum. subternatis, caule herbaceo erecto, foliol. linearibus. *Corollae colore Antirrh. triste.*

creticus. 12. L. legum. subternatis, caule suffruteſcente, fol. sericeis nitidis.

* * *Pedunculis multifloris in capitulum.*

mauritanicus. 11. L. capit. racemosis, fol. obouatis villosis, caul. erecto suffruticoso.

hirsutus. 13. L. capit. subrotundis, caul. erecto hirto, legum. ouatis.

gra-

graecus. 18. L. capit. ſubrotundis, caul. erecto, fol. quinatis, legum. ouatis. *Mant.* 104.

rectus. 14. L. capit. ſubgloboſis, caule erecto laeui, legum. rectis glabris.

corniculatus. 15. L. capit. depreſſis, caul. decumbentibus, legum. cylindricis patentibus.

cytiſoides. 16. L. capit dimidiatis, caule diffuſo ramoſiſſimo, fol. tomentoſis.

Dorycnium. 17. L. capit. aphyllis, fol. ſeſſilibus quinatis.

898. TRIGONELLA. 1093.

Vexillum et *Alae* ſubaequales, patentes, forma corollae 3-petalae,

ruthenica. 1. T. legum. pedunculatis congeſtis pendulis linearibus rectis, foliol. ſublanceolatis.

platycarpos. 2. T. legum. pedunculatis congeſtis pendulis oualibus compreſſis, caule diffuſo, foliol. ſubrotundis.

polyceratа. 3. T. legum. ſubſeſſilibus congeſtis erectis ſubrectis longis linearibus, pedunc. muticis.

hamoſa. 6. T. legum. pedunculatis racemoſis declinatis hamoſis teretibus, pedunc. ſpinoſis foliolo longioribus.

ſpinoſa. 5. T. legum. ſubpedunculatis congeſtis declinatis falcatis compreſſis, pedunc. ſpinoſis breuiſſimis.

corniculata. 4. T. legum. pedunculatis congeſtis declinatis ſubfalcatis, pedunc. longo ſubſpinoſo, caule erecto.

monſpeliaca. 7. T. legum. congeſtis ſeſſilibus arcuatis diuaricatis inclinatis breuibus, pedunc. mucronato inermi.

laciniata. 8. T. legum. pedunculatis ſubumbellatis ellipticis foliol. cuneiformibus dentatis, ſtipul. laciniatis.

Foenum-Graecum. 9. T. legum. ſeſſilibus ſtrictis erectiuſculis ſubfalcatis acuminatis, caule erecto.

ſylueſtris. *α.* T. eadem caule baſi ramoſo-ſtolonifero.

indica. 10. T. legum. ſeſſilibus ſubſolitariis ſubfalcatis, foliol. integerrimis, caule diffuſo.

899. MEDICAGO. 1096.

Legumen compreſſum, cochleatum. *Carina* corollae a vexillo deflectens,

arborea. 1. M. legum. lunatis margine integerrimis, caule arboreo.

virginica. 2. M. caule erecto ramoſiſſimo, flor. faſciculatis terminalibus.

radiata. 3. M. legum. reniformibus margine dentatis, fol. ternatis.

circinata. 4. M. legum. reniformibus margine dentatis, fol. pinnatis.

ſatiua. 5. M. pedunc. racemoſis, legum. contortis, caule erecto glabro.

falcata. 6. M. pedunc. racemoſis, legum. lunatis, caule proſtrato.

lupulina. 7. M. ſpicis oualibus, legum. reniformibus monoſpermis, caul. procumbentibus.

marina. 8. M. pedunc. racemoſis, legum. cochleatis ſpinoſis, caule procumbente tomentoſo.

polymorp. 9. M. legum. cochleatis, ſtipul. dentatis, caule diffuſo.

orbicularis. α. M. legum. ſolitariis cochleatis depreſſis planis, ſtipul. ciliatis, caule diffuſo.

ſcutellata. β. M. cochleata maior, dicarpos, capſula rotunda globoſa ſcutellata.

tornata. γ. M. tornata maior et minor laeuis.

turbinata. δ. M. fructu turbinato.

intertexta. ε. M. cochleata ſpinoſa maior dicarpos, capſula ſ. ſpinis longioribus ſurſum et deorſum tendentibus.

arabica. ζ. M. cochleata minor polycarpos annua, capſula maiore alba, folio cordato macula fuſca.

coronata. η. M. fructu minimo, coronulam vtrinque dentatam referente.

ciliaris. θ. M. legum. congeſtis globoſis hiſpidis, ſtipulis ciliatis.

hirſuta. ι. M. legum. ſolitariis globoſis breuiſſimis echinatis, ſtipulis ſerratis.

rigidula. κ. M. triphylla, leguminibus cochleatis ſpinoſis, foliolis inferioribus cuneiformibus retuſis, ſuperioribus ſubrotundis.

minima. λ. M. legum. cochleatis, aculeis vncinatis alternis externe donatis, ſtipulis integris.

muricata. μ. M. cochleata dicarpos, capſula ſpinoſa rotunda minore.

laciniata. ν. M. fructu echinato, fol. linearibus dentatis.

CLAS-

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

PENTANDRIA.

900. THEOBROMA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 5-petala, nectariis 5. *Stam.* 5: antheris 5. *Piſtill.* 1.

DODECANDRIA.

1368. MONSONIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 5: antheris 3. *Piſtill.* 5-fidum.

ICOSANDRIA.

901. CITRVS. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 20. in cylindrum paſſim connata. *Piſtill.* 1. *Bacca* 9-locularis pulpa veſiculari.

POLYANDRIA.

1269. MELALEVCA. *Cal.* 5-partitus, ſuperus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* ſemiueſtita calyce baccato.

1270. HOPEA. *Cal.* 5-fidus, ſuperus. *Cor.* 5-petala. *Drupa* nucleo 3-loculari.

902. HYPERICVM. *Cal.* 5-partitus, inferus. *Cor.* 5-petala. *Styli* 1, 3, ſ. 5. *Capſ.* locularis.

903. ASCYRVM. *Cal.* 2-phyllus, inferus. *Cor.* 4-petala. *Styli* 2. *Capſ.* 2-valuis.

PEN-

PENTANDRIA.

900, 1100. **THEOBROMA.** *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 5, fornicata, bicornia. *Nectarium* 5-phyllum, regulare, *Stam.* nectario innata, singulo antheris 5.

Cacao. 1. T. fol. integerrimis.
Guazum. 2. T. fol. serratis. *Antherae ternae.*

DODECANDRIA.

1268. **MONSONI.** *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 15 connata in 5 filamenta. *Stylus* 5-fidus. *Capſ.* 5-cocca.

ſpecioſa 1. T. MONSONIA. *Mant.* 105.

ICOSANDRIA.

901. 1100. **CITRVS.** *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5, oblonga. *Antherae* 20 filamentis connatis in varia corpora. *Bacca* 9-locularis.

Medica. 1. C. petiolis linearibus.
Aurantium. 2. C. petiolis alatis, fol. acuminatis.
decumanus. 3. C. petiolis alatis, fol. obtuſis emarginatis. Limo decumanus. *Rumph. amph. 2. p. 96. t. 24. f. 2.* Citrus Aurantium decumanum. *Sp. plant.* 1100. 2. *ß.* Differt *ab aurantio foliis fructibusque magnis, floribus magis racemoſis, racemis ſubtomentoſis.*

POLY-

POLYANDRIA.

1269. MELALEVCA. *Cal.* 5-partitus, ſuperus. *Cor.* 5-petala. *Filamenta* multa, connata in 5 corpora. *Stylus* 1. *Capſ.* ſemiueſtita calyce baccato, 3-valuis, 3-locularis.

Leucadendra. 1. MELALEVCA. *Mant.* 105. Myrtus Leucadendron. *Sp. pl.* 676.

1270. HOPEA. *Cal.* 5-fidus, ſuperus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* multa, connata in 5 corpora. *Stylus* 1. *Drupa* nuce 3-loculari.

tinctoria. 1. HOPEA. *Mant.* 105.

902. HYPERICVM. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Filamenta* multa, in 5 phalanges baſi connata. *Capſula.* 1101.

* *Pentagyna.*

balearicum. 1. H. flor. pentagynis, caule fruticoſo, fol. ramisque cicatriſatis.

kalmianum. 2. H. flor. pentagynis, caule fruticoſo, fol. linearilanceolatis.

Laſianth. 3. H. flor. pentagynis, fol. lanceolatis ſerratis. *Sem. allata; an monadelpha?*

calycinum. 30. H. flor. pentagynis ſolitariis terminalibus, caule tetragono fruticoſo, fol. oblongo-ouatis coriaceis. *Mant.* 106.

Aſcyron. 4. H. flor. pentagynis, caule tetragono herbaceo erecto ſimplici, fol. laeuibus integerrimis.

* * *Trigyna.*

Androſaemum. 5. H. flor. trigynis, fruct. baccatis, caule fruticoſo ancipiti.

olympi-

olympicum. 6. H. flor. trigynis, calyc. acutis, ſtam. corolla breuioribus, caule fruticoſo.

petiolatum. 7. H. flor. trigynis, fol. ouatis petiolatis integerrimis ſubtus tomentoſis, caule fruticoſo tetragono compreſſo.

canarienſe. 8. H. flor. trigynis, calyc. obtuſis, ſtam. corolla breuioribus, caule fruticoſo.

hircinum. 9. H. flor. trigynis, ſtam. corolla longioribus, caule fruticoſo ancipiti.

aegyptium. 10. H. flor. trigynis, nectariis petalorum lanceolatis, caul. ſuffruticoſis compreſſis.

orientale. 11. H. flor. trigynis, ſtip. reflexis, fol. oblongis denticulato-crenatis.

ſeabrum. 13. H. flor. trigynis, caule tereti ſuffruticoſo muricato, fol. oblongis.

repens. 12. H. flor. trigynis, caule tereti repente, fol. lanceolato-linearibus obtuſis.

prolificum. 31. H. flor. trigynis: primordialibus ſeſſilibus, caule ancipiti fruticoſo, fol. lanceolato-linearibus. *Mant.* 106.

ericoides. 14. H. flor. trigynis, fol. linearibus imbricatis.

canadenſe. 16. H. flor. trigynis, fol. lineari-lanceolatis, caule quadrangulo, pericarp. coloratis.

virginicum. 15. H. flor. trigynis: petalis calyce ſublongioribus, fol. oblongis obtuſis amplexicaulibus, caule tereti.

quadrang. 17. H. flor. trigynis, caule quadrato herbaceo.

perforatum. 18. H. flor. trigynis, caule ancipiti, fol. obtuſis pellucido-punctatis.

humifuſum. 19. H. flor. trigynis axillaribus ſolitariis, caul. ancipitibus proſtratis filiformibus, fol. glabris. *Oed. dan. t.* 141.

criſpum. 32. H. flor. trigynis, caule tereti, fol. ſeſſilibus lanceolatis baſi vndulato-dentatis. *Mant.* 106.

montanum. 20. H. flor. trigynis, calyc. ſerrato-glandulоſis, caule tereti erecto, fol. ouatis glabris. *Oed. dan. t.* 173.

hirſutum. 21. H. flor. trigynis, calyc. ſerrato-glandulоſis, caule tereti erecto, fol. ouatis ſubpubeſcentibus.

tomentoſum. 22. H. flor. trigynis, calyc. ſerrato-glandulоſis, fol. ſemiamplexicaulibus flexuoſis tomentoſis, caulibus proſtratis. *Stamina phalangibus tribus.*

perfoliatum. 32. H. flor. trigynis, caule ſubancipiti, fol. amplexicaulibus ouatis, cyma floribus ſeſſilibus.

elodes. 23. H. flor. trigynis, caule tereti repente foliisque villoſis ſubrotundis.

pulchrum. 24. H. flor. trigynis, calyc. ſerrato-glanduloſis. fol. cordatis glabris, caule tereti.

nummularium. 25. H. flor. trigynis, calyc. ſerrato-glanduloſis, fol. cordato-orbiculatis glabris.

Coris. 26. H. flor. trigynis, calyc. ſerrato-glanduloſis, fol. ſubuerticillatis.

* * * *Digyna.*

mutilum. 27. H. flor. digynis, fol. ouatis ſeſſilibus.

ſetoſum. 28. H. flor. digynis, fol. linearibus.

* * * * *Monogyna.*

monogynum. 29. H. flor. monogynis, ſtam. corolla longioribus, calycibus coloratis, caule fruticoſo.

903. ASCYRVM. 1107.

Cal. 4-phyllus. *Petala* 4. *Filamenta* multa, in 4 phalanges digeſta.

Cr. Andr. 1. A. fol. ouatis, caule tereti, panicula dichotoma.

hypericoid. 2. A. fol. oblongis, ramis ancipitibus.

villoſum. 3. A. fol. hirſutis, caule ſtricto.

CLAS-

CLASSIS XIX.

SINGENESIA.

POLYGAMIA AEQUALIS.

* *Semifloſculoſi Tournef. corollis ligulatis omnibus.*

922. SCOLYMVS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* nullus. *Cal.* imbricatus, ſpinoſus.

921. CICHORIVM. *Recept.* ſubpaleaceum. *Pappus* ſub 5-dentatus. *Cal.* calyculatus.

920. CATANANCHE. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 5-ariſtatus. *Cal.* imbricatus, ſcarioſus.

917. SERIOLA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* ſubpiloſus. *Cal.* ſimplex.

918. HYPOCHOERIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* ſubplumoſus. *Cal.* imbricatus.

904. GEROPOGON. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 5-ariſtatus radii, *Cal.* ſimplex. plumoſus diſci.

915. ANDRYALA. *Recept.* villoſum. *Pappus* piloſus. *Cal.* ſubaequalis, rotundatus.

905. TRAGOPOGON. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* ſimplex.

907. PICRIS. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* calyculatus.

912. LEONTODON. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* imbricatus ſquamis laxis.

908. SONCHVS. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* imbricatus gibbus.

906. SCORZONERA. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* imbricatus margine ſcarioſo.

914. CREPIS *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* calyculatus ſquamis difformibus.

910. CHONDRILLA. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal* calyculat. multiflorus.

911. PRENANTHES. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* calyculat. ſubſ florus.

909. LACTVCA. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* imbricat. margine ſcarioſo.

913. HIERACIVM. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* imbricat. ouatus.

919. LAPSANA. *Recept.* nudum. *Pappus* nullus. *Cal.* calyculatus.

916. HYOSERIS. *Recept.* nudum. *Pappus* non pilosus. *Cal.* subaequalis.

* * *Capitati.*

930. ATRACTYLIS. *Corolla* radiata!

929. CARLINA. *Calyx* radiatus: radiis coloratis!

926. CNICVS. *Calyx* bracteis obuallatus.

923. ARCTIVM. *Calyx* squamis apice incuruato-hamosis!

931. CARTHAMVS. *Calyx* squamis squarrosus foliaceis.

928. CYNARA. *Calyx* squamis squarrosus canaliculatis, spinosis.

925. CARDVVS. *Calyx* squamis spinosis ventricosus. *Recept.* pilosum.

927. ONOPORDON. *Calyx* squamis ventricosus spinosis. *Recept.* fauosum!

924. SERRATVLA. *Calyx* squamis acutiusculis muticis imbricatus, subcylindricus.

* * * *Discoidei.*

934. ETHVLIA. *Recept* nudum. *Pappus* nullus. *Cal.* aequalis.

1287. SPILANTHVS. *Recept.* nudum. *Pappus* bidentatus. *Cal.* subaequalis.

936. AGERATVM. *Recept.* nudum. *Pappus* 5-aristatus. *Cal.* subaequalis.

933. CACALIA. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus. *Cal.* calyculatus.

939. CHRYSOCOMA. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus. *Cal.* imbricatus. *Pist.* breuissima.

935. EVPATORIVM. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus. *Cal.* imbricatus. *Pist.* longissima.

942. SANTOLINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* nullus. *Cal.* imbricatus, hemisphaericus.

941. CACALA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* pilosus. *Cal.* imbricatus.

943. ATHANASIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* paleaceus. *Cal.* imbricatus.

232. BIDENS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* aristatus. *Cal.* imbricatus.

938. STAEHELINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* plumosus, ramosus. *Antherae* caudatae.

937. PTERONIA, *Recept.* ſetis partitis. *Pappus* ſubplumoſus. *Cal.* imbricatus.

940. TARCHONANTHVS. *Recept.* piloſum *Pappus* piloſus, veſtiens. *Cal.* turbinatus, monophyllus.

* *Tanacetum.*

POLYGAMIA SVPERFLVA.

* *Diſcoidei.*

945. ARTEMISIA. *Recept.* ſubnudum. *Papp.* nullus. *Cor.* radii nulli.

948. CARPESIVM. *Recept.* nudum. *Papp.* nullus. *Cor.* radii 5-fidae.

944. TANACETVM. *Recept.* nudum. *Papp.* ſubmargin. *Cor.* radii 3-fidae.

968. COTVLA. *Recept.* ſubnudum. *Papp.* marginatus. *Cor.* diſci 4-fidae!

949. BACCHARIS. *Recept.* nudum. *Papp.* piloſus. *Cor.* femineae hermaphroditis mixtae.

950. CONYZA. *Recept.* nudum. *Papp.* piloſus. *Cor.* radii 3-fidae.

946. GNAPHALIVM. *Recept.* nudum. *Papp.* plumoſus. *Cal.* ſcarioſus: ſquam. concauis.

947. XERANTHEMVM. *Recept.* paleaceum. *Papp.* ſubſetaceus. *Cal.* ſcarioſus radio explanato.

969. ANACYCLVS. *Recept.* paleaceum. *Papp.* nullus. *Sem.* marginata, emarginata.

* * *Semifloſculoſi.*

960. PERDICIVM. *Recept.* nudum. *Papp.* piloſus. *Cor.* trifidae: exteriore majore 3-loba.

* * * *Radiati.*

962. BELLIS. *Recept.* nudum. *Papp.* nullus. *Cal.* ſquamis aequalibus ſimplex.

967. MATRICARIA. *Recept.* nudum. *Papp.* nullus. *Cal.* ſquamis imbricatus acutis.

966. CHRYSANTHEMVM. *Recept.* nudum. *Papp.* nullus. *Cal.* ſquamis intimis membranaceis.

959. DORONICVM. *Recept.* nudum. *Papp.* piloſus. *Pappus* radii nullus:

958. ARNICA. *Recept.* nudum. *Papp.* piloſus. *Stamina* radii caſtrata!

956. INV-

956. INVLA. *Recept.* nudum. *Papp.* piloſus. *Antherae* baſi biſetae.

951. ERIGERON. *Recept.* nudum. *Papp.* piloſus. *Cor.* radii capillares.

955. SOLIDAGO. *Recept.* nudum. *Papp.* piloſus. *Cor.* radii ſubſeni, remoti.

957. CINERARIA. *Recept.* nudum. *Papp.* piloſus. *Cal.* aequalis ſimplex.

953. SENECIO. *Recept.* nudum. *Papp.* piloſus. *Cal.* ſquamis apice ſphacelatis.

952. TVSSILAGO. *Recept.* nudum. *Papp.* piloſus. *Cal.* ſquamis ſubmembranaceis.

954. ASTER. *Recept.* nudum. *Papp.* piloſus. *Cal.* ſubſquarroſus.

964. TAGETES. *Recept.* nudum. *Papp.* ariſtatus. *Cal.* 1-phyllus. *Radius* 5-florus.

961. HELENIVM. *Recept.* ſeminudum. *Papp.* 5-ariſtatus. *Cal.* multipartitus. *Radiis. Cor.* 3-fidis.

965. PECTIS. *Recept.* nudum. *Papp.* ariſtatus. *Cal.* 5-phyllus. *Radius* 5-florus.

965. LEYSERA. *Recept.* ſemipaleaceum. *Papp.* plumoſus. *Cal.* ſcarioſus.

973. SIGESBECKIA. *Recept.* paleaceum. *Papp.* nullus. *Radius* dimidiatus.

970. ANTHEMIS. *Recept.* paleaceum. *Papp.* nullus. *Cal.* hemiſphaericus.

971. ACHILLEA. *Recept.* paleaceum. *Papp.* nullus. *Radius* ſub-5-florus. *Cal.* oblongus.

077. BVPHTHALMVM. *Recept.* paleaceum. *Papp.* marginatus. *Stigma* hermaphrodit. ſimplex.

978. AMELLVS. *Recept.* paleaceum. *Papp.* piloſus. *Cal.* imbricatus.

972. TRIDAX. *Recept.* paleaceum. *Papp.* piloſus. *Cor.* radii 3-partitae.

975. VERBESINA. *Recept.* paleaceum. *Papp.* ariſtatus. *Floſculi* radii circiter 5.

974. ZINNIA. *Recept.* paleaceum. *Papp.* ariſtatus. *Rad.* 5-florus, perſiſtens. *Cal.* imbricat.

* *Tetragonotheca*; *vide Polymniam.*

POLYGAMIA FRVSTRANEA.

982. GORTERIA. *Recept.* nudiuſculum. *Papp.* piloſus. *Radius* corollae ligulatus.

984. CENTAVREA. *Recept.* ſetoſum. *Papp.* piloſus.
Radius corollae tubuloſus.

1271. ZOEGEA. *Recept.* ſetoſum. *Papp.* ſetaceus.
Radius corollae ligulatus.

980. RVDBECKIA. *Recept.* paleaceum. *Papp.* marginatus.
Cal. ſerie duplici.

981. COREOPSIS. *Recept.* paleaceum. *Papp.* ariſtatus.
Cal. calyculatus.

979. HELIANTHVS. *Recept.* paleaceum. *Papp.* ariſtatus.
Cal. ſquarroſus.

988. OSMITES. *Recept.* paleaceum. *Papp.* obſoletus.
Cal. imbricatus.

POLYGAMIA NECESSARIA.

995. FILAGO. *Recept.* nudum. *Papp.* nullus.
Floſc. femin. inter ſquamas calycis.

996. MICROPVS. *Recept.* nudum. *Papp.* nullus.
Floſc. femin. ſquamis calycis vaginati.

985. MILLERIA. *Recept.* nudum. *Papp.* nullus.
Floſc. femineus ſubſolitarius.

993. OTHONNA. *Recept.* nudum. *Papp.* piloſus.
Calyx monophyllus.

992. OSTEOSPERMVM. *Recept.* nudum. *Papp.* nullus.
Sem. globoſa, oſſea.

990. CALENDVLA. *Recept.* nudum. *Papp.* nullus.
Sem. membranacea.

991. ARCTOTIS. *Recept.* ſubpiloſum. *Papp.* 5-phyllus.
Sem. tomentoſa.

994. ERIOCEPHALVS. *Recept.* villoſum. *Papp.* nullus.
Floſc, radii quini.

987. POLYMNIA. *Recept.* paleaceum. *Papp.* nullus.
Cal. 5-phyllus.

989. MELAMPODIVM. *Recept.* paleaceum. *Papp.* vuluatus.
Cal. 5-phyllus.

986. SILPHIVM. *Recept.* paleaceum. *Papp.* 2-ariſtatus.
Cal. ſquarroſus.

988. CHRYSOGONVM. *Recept.* paleaceum. *Papp.* 3-ariſtatus.
Sem. calyculis propriis.

POLYGAMIA SEGREGATA.

1001. STOEBE. *Perianth.* 1-florum. *Papp.* plumoſus.
Polyg. aequalis.

999. ECHINOPS. *Perianth.* 1-florum. *Papp.* pubeſcens. *Polyg.* aequalis.

997. ELEPHANTOP. *Perianth.* 4-florum. *Papp.* ſetoſus. *Polyg.* aequalis.

1000. GVNDELIA. *Recept.* 5-florum. *Papp.* nullus. *Polyg.* fruſtranea.

998. SPHAERANTHVS. *Recept.* multiflorum. *Papp.* nullus. *Polyg.* neceſſaria.

MONOGAMIA.

1002. STRVMPFIA. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-petala regularis. *Bacca* infera, 1-ſperma.

1003. SERIPHIVM. *Cal.* imbricatus. *Cor.* 1-petala regularis. *Sem.* 1, oblongum.

1004. CORYMBIVM. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 1-petala regularis. *Sem.* 1, lanatum.

1005. JASIONE. *Cal.* communis. *Cor.* 5-petala regularis. *Capſ.* infera, 2-locularis.

1006. LOBELIA. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 1-petala irregularis. *Capſ.* infera, 2-locularis.

1007. VIOLA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala irregularis. *Capſ.* ſupera, 3-valuis.

1008. IMPATIENS. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 5-petala irregularis. *Capſ.* ſupera, 5-valuis.

POLYGAMIA AEQVALIS.

904. GEROPOGON. *Receptaculum* ſetoſo-paleaceum. *Cal.* ſimplex. *Sem.* Diſci Pappo plumoſo; Radii 5-ariſtato. 1190.

glabrum. 1. G. fol. glabris.
hirſutum. 2. G. fol. piloſis.

905. TRAGOPOGON. *Recept.* nudum. *Cal.* ſimplex. *Pappus* plumoſus. 1109.

pratenſe. 1. T. calycibus corollae radium aequantibus, fol. integris ſtrictis.
orientale. 2. T. calyc. corollae radio breuioribus, fol. integris ſubundulatis.
porrifolium. 3. T. calyc. corollae radio longioribus, fol. integris ſtrictis, pedunc. ſuperne incraſſatis.
crocifolium. 5. T. calyc. corollae radio longioribus, fol. integris, radicalibus pedunculisque baſi villoſis.
villoſum. 4. T. calyc. corollae radio ſeſquilongioribus, caule foliisque villoſis. Tragopogon caule tomentoſo. *Hall. goett.* 418.
dalechampii. 6. T. calyc. monophyllis corolla breuioribus inermibus, fol. runcinatis.
Picroides. 7. T. calyc. monophyllis corolla breuioribus aculeatis, fol. runcinatis denticulatis.
aſperum. 8. T. calyc. corolla breuioribus hiſpidis, fol. integris: caulinis oblongis.
dandelion. 9. T. fol. enſiformibus integris laeuibus, ſcapis radicalibus.
lanatum. 10. T. fol. enſiformibus vndulatis villoſis, ſcapis radicalibus.
virginicum. 11. T. fol. radicalibus lyratis rotundatis, caulinis indiviſis.

906. SCORZONERA. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* imbricatus ſquamis margine membranaceis.
1112.

tomentoſa. 3. S. fol. ouatis neruoſis tomentoſis integerrimis ſeſſilibus.
humilis 1. S. caul. ſubnudo vnifloro, fol. lato-lanceolatis neruoſis planis.
hiſpanica. 2. S. caul. ramoſo, fol. amplexicaulibus integris ſerrulatis.
graminif. 4. S. fol. lineari-enſiformibus integris carinatis.
purpurea. 5. S. fol. lineari-ſubulatis integris planis, pedunc. cylindricis.
anguſtifolia. 6. S. fol. ſubulatis integris, pedunc. incraſſato, caul. baſi villoſo.
reſedifol. 8. S. fol. obtuſe dentatis, caule diuaricato, calyc. apicibus tomentoſis, *Bocc. ſic.* 13. *t.* 7, *f. A.*
laciniata. 9. S. fol. linearibus dentatis acutis, caul. erecto, calyc. ſquamis patulo-mucronatis.
oriental. 7. S. fol. ſinuatis denticulatis acutis, caul. ſubunifloris.
tingitana. 10. S. fol. omnibus runcinatis amplexicaulibus.
Picroides. 9. S. fol. ſuperioribus amplexicaulibus integerrimis, inferioribus runcinatis, pedunc. ſquamoſis. *Pappus piloſus.*

907. PICRIS. *Recept.* nudum *Cal.* calyculatus. *Pappus* plumoſus. *Sem.* transuerſim ſulcata.
1114.

Echioid. 1. P. perianth. exterioribus pentaphyllis interiore ariſtato maioribus.
Hierac. 2. P. perianth. laxis. fol. integris.
aſplenioides. 4. P. fol. pinnatifidis: lobis alternis rotundatis. †.

908. SONCHVS. *Recept.* nudum. *Cal.* imbricatus, ventricoſus. *Pappus* piloſus.
1115.

canadenſ. 1. S. pedunc. hiſpidis, flor. racemoſis, fol. runcinatis.

paluſtris. 2. S. pedunc. calycibusque hiſpidis ſubumbellatis, fol. runcinatis baſi ariſtatis.
aruenſis. 3. S. pedunc. calycibusque hiſpidis ſubumbellatis, fol. runcinatis baſi cordatis.
oleraceus. 5. S. pedunc. tomentoſis, calyc. glabris.
tenerrim. 6. S. pedunc. tomentoſis, calyc. piloſis.
plumieri. 8. S. pedunc. nudis, flor. paniculatis, fol. runcinatis.
alpinus. 7. S. pedunc. ſquamoſis, flor. racemoſis, fol. runcinatis.
floridan. 9. S. pedunc. ſquamoſis, fol. lyrato-haſtatis.
ſibiricus. 8. S. pedunc. ſquamatis, fol. lanceolatis indiuiſis ſeſſilibus.
maritimus 4. S. pedunc. nudo, fol. lanceolatis amplexicaulibus indiuiſis retrorſum argute dentatis.

909. LACTVCA. *Recept.* nudum. *Cal.* imbricatus, cylindricus, margine membranaceo. *Pappus* ſimplex, ſtipitatus.
1118.

quercina. 1. L. fol. runcinatis denticulatis acutis: ſubtus laeuibus, caule glabro.
ſatiua. 2. L. fol. rotundatis, caule corymboſo.
Scariola. 4. L. fol. verticalibus carina aculeatis. γ. *Folia inferiora runcinata, obliqua ſ. verticalia; Caulina ſuperiora amplexicaulia, ſagittata, carina laeui margine ſcabro.*
viroſa. 5. L. fol. horizontalibus carina aculeatis dentatis.
ſaligna. 6. L. fol. haſtato-linearibus ſeſſilibus carina aculeatis.
canadenſ. 3. L. fol. laciniato-enſiformibus dentatis inermibus.
perennis. 7. L. fol. linearibus dentato-pinnatis: laciniis ſurſum dentatis.

910. CHONDRILLA. *Recept.* nudum. *Cal.* calyculatus. *Pappus* ſimplex, ſtipitatus. *Floſculi* multiplici ſerie.
1120.

juncea. 1. C. fol. ſagittatis amplexicaulibus, caule ſimplici, flor. ſubſeſſilibus lateralibus. *Poſſet* Crepidis *generi aſſoci-*

ſociari. Caulis *ſimplex*, *ſaepiusque ſimpliciſſimus*, *ſeſquipedalis*, *baſi purpurea ſtriatus*, *adſperſus ſetis albis raris.* Folia *Turritidis ſagittata*, *amplexicaulia*, *indiuiſa*, *oblonga*, *ſcabra margine et imprimis carina albidis pilis*; *ſupra laeuia*, *infima denticulata.* Flores *alterni pedunculo vix calycis longitudine*, *bracteea vna alteraue.* Calyx *cylindricus*, *ſtriatus*, *adſperſus tuberculis nigris ſeta alba.* Calyx inferior *breuiſſimus*, *foliolis ſubulatis perſiſtentibus.* Corolla *lutea*, *ſubtus purpuraſcens*, *longitudine calycis.* ☉.

911. PRENANTHES. *Recept.* nudum. *Cal.* calyculatus. *Pappus* ſimplex, ſubſeſſilis. *Floſculi* ſimplici ſerie. 1120.

tenuifol. 1. P. fol. linearibus integerrimis.

viminea. 2. P. foliorum ramentis cauli adnatis. Chondrilla ſaxatilis viſcoſa, caule clemidophora. *Col. ecphr.* 1. *p.* 238. *t.* 240.

purpurea. 3. P. floſc. quinis, fol. lanceolatis denticulatis.

muralis. 4. P. floſc. quinis, fol. runcinatis.

altiſſima. 5. P. floſc. quinis, fol. trilobis, caul. erecto.

chondrilloides. 8. P. floſc. denis, calyc. octofidis, fol. lanceolatis: radicalibus indiuiſis ſubdentatis. *Mant.* 107.

japonica. 9. P. floſc. quindenis, fol. radicalibus lyratis, caule ſubnudo. *Mant.* 107.

alba. 6. P. floſc. plurimis, flor. nutantibus ſubumbellatis, fol. haſtato-angulatis.

repens. 7. P. repens, fol. trilobis.

912. LEONTODON. *Recept.* nudum. *Cal.* imbricatus ſquamis laxiuſculis. *Pappus* plumoſus. 1124.

Taraxac. 1. L. calyce ſquamis inferne reflexis, fol. runcinatis denticulatis laeuibus.

bulboſum. 3. L. fol. oblongo-ouatis ſubdentatis glabris, calyc. laeui, ſcapo ſuperne hirto.

aureum. 2. L. fol. runcinatis, caule ſubunifolio, calyce hiſpido.
haſtile. 5. L. ſcapo calyceque laeui, fol. lanceolatis dentatis integerrimis glabris.
tuberoſum. 6. L. fol. runcinatis ſcabris, calyce acuto hirſuto.
autumnale. 4. L. caule ramoſo, pedunc. ſquamoſis, fol. lanceolatis dentatis integerrimis glabris.
hiſpidum. 8. L. calyce toto erecto, fol. dentatis integerrimis hiſpidis: ſetis furcatis.
hirtum. 7. L. calyce toto erecto, fol. dentatis hirtis: ſetis ſimpliciſſimis. *Folia rigidula, tactu quaſi arida, laciniis obliquatis. Calycis foliola extima baſi vtrinque dilatata mediante plica.*

913. HIERACIVM. *Recept.* nudum. *Cal.* imbricatus, ouatus. *Pappus* ſimplex, ſeſſilis.

1124.

* *Scapo nudo vnifloro.*

incanum. 1. H. fol. integerrimis ſubdenticulatis lanceolatis ſcabris, ſcapo vnifloro.
alpinum. 1. H. fol. oblongis integris dentatis, ſcapo ſubnudo vnifloro, calyce piloſo.
Taraxaci. 2. H. fol. lanceolatis dentatis glabris, ſcapo ſubnudo vnifloro, calyce hirſuto. Hieracium fol. glabris ſemipinnatis, calyce erecto hirſutiſſimo. *Hall. emend. n. 96.*
venoſum. 3. H. fol. cuneiformibus hirtis, ſcapo vnifloro nudo craſſiſſimo erecto.
Piloſella. 4. H. fol. integerrimis ouatis ſubtus tomentoſis, ſtolonibus repentibus, ſcapo vnifloro. *Corolla extus rubra.*

* * *Scapo nudo multifloro.*

dubium. 5. H. fol. integris ouato-oblongis, ſtolon. repentibus, ſcapo nudo multifloro.
auricula. 6. H. fol. integerrimis lanceolatis, ſcapo nudo multifloro, ſtolonibus repentibus.
cymoſum. 7. H. fol. lanceolatis integris piloſis, ſcapo ſubnudo baſi piloſo, flor. ſubumbellatis.
praemorſum. 8. H. fol. ouatis ſubdentatis, ſcapo nudo, racemoſo, flor. ſuperioribus primoribus.

auran-

aurantiacum. 9. H. fol. integris, caule ſubnudo ſimpliciſſimo piloſo corymbifero.

Gronouii. 10. H. caule paniculato ſubnudo, fol. radicalibus obouatis integerrimis piloſis.

Gmelini. 13. H. caule paniculato nudo, fol. radicalibus ouatis ſerratis glabris.

ſanctum. 12. H. ſcapo nudo multifloro, fol. lyratis obtuſis dentatis.

capenſe. 11. H. caul. nudo multifloro, pedunc. inferioribus altioribus, fol. oblongis dentatis ſcabris.

* * * *Caule folioſo.*

paniculatum. 14. H. caule erecto, fol. alternis lanceolatis nudis dentatis, panicula capillari.

porrifolium. 16. H. caule ramoſo folioſo, fol. lanceolato-linearibus integerrimis.

chondrilloides. 25. H. caule ramoſo, fol. caulinis elongato-dentatis glabris; radicalibus lanceolatis integris.

murorum. 17. H. caule ramoſo, fol. radicalibus ouatis dentatis; caulino minori.

paludoſum. 18. H. caule paniculato, fol. amplexicaulibus dentatis glabris, calyc. hiſpidis.

lyratum. 19. H. caule multifloro, fol. lyratis glabris, calyce pedunculisque hiſpidis.

cerinthoides. 20. H. fol. radicalibus obouatis denticulatis; caulinis oblongis ſemiamplexicaulibus.

amplexicaule. 21. H. fol. amplexicaulibus cordatis ſubdentatis, pedunc. vnifloris hirſutis, caule ramoſo. *Affine admodum H. pyrenaici.*

pyrenaicum. H. fol. amplexicaulibus obouato-lanceolatis retrorſum dentatis, caul. ſimplici, cal. laxis. *Syſt. nat.* 10. *p.* 1195.

blattarioides. β. Hieracium fol. lanceolatis amplexicaulibus dentatis, flor. ſolitariis, calyc. laxis. *Sp. plant.* 1130.

piloſum. γ. Picris *pyrenaica* perianthiis laxis, caule piloſo, fol. dentato-ſinuatis. *Sp. plant.* 1115.

auſtriacum. δ. Crepis *auſtriaca* foliis oblongis denticulatis, inuolucro laxiſſimo & calycibus hiſpidis. *Iacq. vind.* 270. *

helue-

helueticum. ε. Hieracium foliis amplexicaulibus minute ſerratis acutis. *Hall. helv.* 749. Hieracium alpinum aſperum, conyzae facie. *Bauh. pin.* 128. *Planta polymorpha ex loco difficilius determinanda, media inter* Hieracia, Crepides *et* Picres. *Affinis proximus* Crepidis ſibiricae. *Inquirendumquomodo et quibus ab hac differant β-ε, problematice propoſitae.*

glutinoſum. 24. H. fol. lanceolatis runcinatis ſcabriuſculis, flor. vmbellatis.

Kalmii. 25. H. caule erecto multifloro, fol. lanceolatis dentatis, pedunc. tomentoſis.

ſprengerianum. 26. H. caule ramoſo folioſo, fol. ſemiamplexicaulibus oblongis repandis hiſpidis.

ſabaudum. 27. H. caule erecto multifloro, fol. ouato-lanceolatis dentatis ſemiamplexicaulibus.

vmbellatum. 28. H. fol. linearibus ſubdentatis ſparſis, flor. ſubumbellatis.

914. CREPIS. 1131.

Recept. nudum. *Cal.* calyculatus ſquamis deciduis. *Pappus* plumoſus, ſtipitatus.

pygmaea. 1. C. fol. ouatis integris villoſis petiolatis, caule procumbente.

purſifolia. 2. C. fol. pinnatifidis crenatis, ſcapo nudo paucifloro.

barbata. 3. C. inuolucris calyce longioribus: ſquamis ſetaceis ſparſis. Hieracium boeticum maius. *Herm. par.* 185. *t.* 185.

veſicaria. 5. C. inuolucris ſcarioſis longitudine calycis, flor. corymboſis, bracteis ouatis.

alpina. 10. C. inuolucris ſcarioſis longitudine calycis, flor. ſolitariis.

rubra. 6. C. fol. amplexicaulibus lyrato-runcinatis.

foetida. 7. C. fol. runcinato-pinnatis hirtis, petiolis dentatis.

aſpera. 4. C. fol. dentatis: inferioribus ouatis auriculatis, ſuperioribus ſagittatis, caule ſetis rigidis ſparſis.

rhagadioloides. 16. C. fol. integris amplexicaulibus oblongis, calycibus interioribus toruloſo-articulatis hiſpidis: foliolis cymbiformibus. *Mant.* 108.

ſibirica. C. fol. amplexicaulibus oblongis dentatis, caule hirto, calycibus carina ciliatis. *confer. Hieracium pyrenaicum.*

tectorum. 10. C. fol. lanceolato-runcinatis ſeſſilibus laeuibus, inferioribus dentatis.

biennis. 11. C. fol. runcinato-pinnatifidis ſcabris: baſi ſuperne dentatis, calyc. muricatis.

virens. 9. C. fol. runcinatis glabris amplexicaulibus, calyc. ſubtomentoſis.

dioſcoridis. 8. C. fol. radicalibus runcinatis; caulinis haſtatis, calyc. ſubtomentoſis.

pulchra. 8. C. fol. ſagittatis denticulatis, caul. paniculato, flor. pyramidatis glabris.

neglecta. 15. C. fol. amplexicaulibus runcinatis dentatis ſubpiloſis, caul. paniculato, calyc. inermi-ſubſpinoſis. *Mant.* 107.

915. ANDRYALA. *Recept.* villoſum. *Cal.* multi-
1136. partitus, ſubaequalis, rotundatus. *Pappus* ſimplex, ſeſſilis.

integrifolia. 1. A. fol. inferioribus runcinatis, ſuperioribus ouato-oblongis tomentoſis. *β.* Andryala ſinuata. *Sp. pl.* 1137. *Varietas tantum.*

ragusina. 2. A. fol. lanceolatis indiuiſis denticulatis acutis tomentoſis, flor. ſolitariis.

lanata. 4. A. fol. oblongo-ouatis ſubdentatis lanatis, pedunc. ramoſis.

916. HYOSERIS. *Recept.* nudum. *Cal.* ſubaequa-
1137. lis. *Pappus* piloſus vel obſoletus.

* *Caule nudo.*

foetida. 1. H. ſcap. ſimpliciſſimis vnifloris, fol. pinnatifidis, feminibus nudis.

radiata. 2. H. ſcap. vnifloris nudis, fol. glabris runcinatis angulis dentatis.

lucida. 9. H. ſcap. vnifloris nudis, fol. ſubcarnoſis runcinatis angulatis dentatis. *Mant.* 108.

ſcabra.

ſcabra. 3. H. ſcap. ſimpliciſſimo vnifloro, fol. ſcabris, ſem. pappoſis.
virginic. 4. H. ſcap. vnifloris, fol. lanceolatis lyratis glabris.
minima. 5. H. caule diuiſo nudo, pedunc. incraſſatis.

* * *Caule folioſo.*

Hedypnois. 6. H. fruct. ouatis glabris, caule ramoſo.
Rhagadiol. 7. H. fruct. ouatis piloſis, caule ramoſo.
cretica. 8. fruct. ouatis ſcabris, caule ramoſo.

917. SERIOLA. *Recept.* paleaceum. *Cal.* ſimplex. 1139. *Pappus* ſubplumoſus.

raeuigata. 1. S. laeuiuſcula, fol. obouatis dentatis.
rethnenſis. 2. S. hiſpida, fol. obouatis ſubdentatis.
lvetenſis. 3. S. hirta, fol. runcinatis.
caens- 4. S. vrens, fol. dentatis, caule ramoſo.

918. HYPOCHAERIS. *Recept.* paleaceum. *Cal.* 1140. ſubimbricatus. *Pappus* plumoſus.

pontana. 1. H. caule ſimplici folioſo vnifloro, fol. lanceolatis dentatis.
maculata. 2. H. caule ſubnudo: ramo ſolitario, fol. ouato-oblongis integris dentatis.
glabra. 3. H. glabra: calyc. oblongis imbricatis, caule ramoſo nudo, fol. dentato-ſinuatis. *Corollae minutae. Calyc. ſquamis laeuibus.*
radicata. 4. H. fol. runcinatis obtuſis ſcabris, caule ramoſo nudo, laeui, pedunc. ſquamoſis. *Oed. dan. t.* 150. *Corollae magnae. Calyc. ſquamae carina ciliata.*

919. LAPSANA. *Recept.* nudum. *Cal.* calyculatus, 1141. ſquamis ſingulis interioribus canaliculatis.

communis. 1. L. calyc. fructus angulatis, pedunc. tenuibus ramoſiſſimis.
zacintha. 2. L. calyc. fructus toruloſis depreſſis obtuſis ſeſſilibus.

ſtella-

ſtellata. 3. L. calyc. fructus vndique patentibus: radiis ſubulatis, fol. caulinis lanceolatis indiuiſis.

Rhagadiolus. 4. L. calyc. fructus vndique patentibus: radiis ſubulatis, fol. lyratis. *Varietas antecedentis. Ger.*

920. CATANANCHE. *Recept.* paleaceum. *Cal.* imbricatus. *Pappus* ariſtatus calyculo 5-ſeto. 1142.

caerulea. 1. C. ſquamis calycinis inferioribus ouatis. *Variat flore pleno.*

lutea. 2. C. ſquamis calycinis inferioribus lanceolatis. *Flores ſeriores ſeſſiles ad radicem, vix explicandi, magis fertiles.*

graeca. 3. C. fol. inciſis. *Varietas praecedentis ſecundum Millerum.*

921. CICHORIVM. *Recept.* ſubpaleaceum, *Cal.* calyculatus. *Pappus* ſub-5-dentatus, obſolete piloſus. 1142.

Intybus. 1. C. flor. geminis ſeſſilibus, fol. runcinatis.

Endiuia. 2. C. flor. ſolitariis pedunculatis, fol. integris crenatis.

ſpinoſum. 3. C. caule dichotomo ſpinoſo, flor. axillaribus ſeſſilibus.

922. SCOLYMVS. *Recept.* paleaceum. *Cal.* imbricatus, ſpinoſus. *Pappus* nullus. 1143.

maculatus. 1. S. flor. ſolitariis. *Herba annua radice tenui. Caulis inferne ramoſior. Folia glabra, nitida, margine cartilagineo, decurrentia fere ad baſin caulis. Flores e diuaricaturis ſolitarii. Corolla minor Antheris fuſcis.*

hiſpanicus. 2. S. flor. congeſtis. *Herba altero anno florens, radice fuſiformi. Caulis inferne minus ramoſus. Folia ſubſcabra, cineraſcentia, margine non cartilagi ea, decurrentia, ſed deſinentia ante proximum folium. Flores ſaepius 4, congeſti. Corolla duplo major antheris concoloribus.*

923. AR-

923. ARCTIVM. *Cal.* globoſus: ſquamis apice ha-
1143. mis inflexis.

Lappa. 1. A. fol. cordatis inermib s petiolatis.
Perſonat. 2. A. fol. decurrentibus ciliato-ſpinoſis: radicalibus pinnatis; caulinis oblongo-ouatis. *An cardui ſpecies?*
Carduel. 3. A. fol. pinnatifidis aculeatis. *Mant.* 108.

924. SERRATVLA. *Cal.* ſubcylindricus, imbri-
1144. catus, muticus.

tinctoria. 1. S. fol. lyrato-pinnatifidis: pinna terminali maxima, floſculis conformibus.
coronata. 2. S. fol. lyrato-pinnatifidis: pinna terminali maxima, floſculis radii femineis longioribus.
alpina. 3. S. calycibus ſubhirſutis ouatis, fol. indiuiſis.
ſalicifol. 4. S. fol. lineari-lanceolatis alternis ſubtus incanis ſeſſilibus integerrimis.
multiflor. 5. S. fol. lanceolatis ſubtus villoſis ſubdecurrentibus integerrimis, caul. corymboſo, calyc. cylindricis.
noueborac. 6. S. fol. lanceolato-oblongis ſerratis pendulis.
praealta. 7. S. fol. lanceolato-oblongis ſerratis patentibus ſubtus hirſutis.
glauca. 8. S. fol. ouato-oblongis acuminatis ſerratis, flor. corymboſis, calyc. ſubrotundis.
ſquarroſ. 9. S. fol. linearibus, calycibus ſquarroſis ſubſeſſilibus acuminatis lateralibus.
ſcarioſa. 10. S. fol. lanceolatis integerrimis, calyc. ſquarroſis pedunculatis obtuſis lateralibus.
ſpicata. 11. S. fol. linearibus baſi ciliatis, flor. ſeſſilibus lateralibus ſpicatis, caule ſimplici.
amara. 13. S. fol. lanceolatis, ſquamis calycinis apice ſcarioſis obtuſis patulis coloratis, flor. terminalibus
babylonica. 15. S. fol. ſubtomentoſis: radicalibus lyratis; caulinis decurrentibus, flor. thyrſoideis. *Gerard.*
centauroides. 14. S. fol. pinnatifidis obliquis acutis glabris inermibus, ſquamis calycinis mucronatis, interioribus ſcarioſis.

babylo-

babyloni-ca. 15. S. fol. decurrentibus ſubtomentoſis integerrimis concauis canaliculatis, radicalibus lyratis, flor. thyſoideo-ſpicatis. *Flores in thyrſum digeſti, ſubſeſſiles, pedicellis breuiſſimis, ſubquadrifloris.*

aruenſis. 14. S. fol. dentatis ſpinoſis.

925. CARDVVS. *Cal.* ouatus, imbricatus ſquamis 1149. ſpinoſis. *Recept.* piloſum.

* *Foliis decurrentibus.*

leucographus. 1. C. fol. decurrentibus dentatis ſpinoſis, pedunc. nudis longiſſimis vnifloris, calyc. ſpinoſis inclinatis.

lanceolatus. 2. C. fol. decurrentibus pinnatifidis hiſpidis: laciniis diuaricatis, calyc. ouatis ſpinoſis villoſis, caule piloſo.

nutans. 3. C. fol. ſemidecurrentibus ſpinoſis, flor. cernuis: ſquamis calycinis ſuperne patentibus.

acanthoides. 4. C. fol. decurrentibus ſinuatis: margine ſpinoſis: calyc. pedunculatis ſolitariis erectis villoſis.

criſpus. 5. C. fol. decurrentibus ſinuatis: margine ſpinoſis, flor. aggregatis terminalibus: ſquamis inermibus ſubariſtatis patulis.

polyanthemus. 23. C. fol. decurrentibus ſinuatis ciliatis ſubtus nudis, flor. pedunculatis congeſtis. *Mant.* 109.

paluſtris. 6. C. fol. decurrentibus dentatis: margine ſpinoſis, flor. racemoſis erectis, pedunc. inermibus.

pycnocephalus. 7. C. fol. decurrentibus pinnatifido-ſinuatis pubeſcentibus ſpinoſis, pedunc. nudis tomentoſis, calyc. deciduis.

diſſectus. 8. C. fol. decurrentibus lanceolatis: denticulis inermibus, calyc. ſpinoſis.

cyanoides. 9. C. fol. decurrentibus pinnatifidis linearibus integerrimis inermibus petiolatis: ſubtus tomentoſis.

canus. 27. C. fol. decurrentibus lanceolatis eroſo-dentatis ciliato-aculeatis: vtrinque arachnoideo-ſubuilloſis. *Mant.* 108.

defloratus. 11. C. fol. decurrentibus lanceolatis ſerratis ſubſpinoſo-ciliatis nudis, peduncul. longiſſimis lanuginoſis vnifloris. *Fructus nutans non eſt Iacq.*

monſpeſſulanus. 10. C. fol. decurrentibus lanceolatis ſubrepandis glabris inaequaliter ciliatis, pedunc. alternis, calyc. inermibus.

tuberoſus. 19. C. fol. ſubdecurrentibus petiolatis ſubpinnatifidis ſpinoſis, caule inermi, flor. ſolitariis.

* * *Foliis ſeſſilibus.*

vagabonae. 12. C. fol. ſeſſilibus lanceolatis integerrimis: margine ſpinis ternatis.

ſtellatus. 13. C. fol. ſeſſilibus integris lanceolatis inermibus ſubtus tomentoſis, ſpinis ramoſis axillaribus, flor. ſeſſilibus lateralibus.

marianus. 14. C. fol. amplexicaulibus haſtato-pinnatifidis ſpinoſis, calycibus aphyllis: ſpinis canaliculatis duplicato-ſpinoſis.

ſyriacus. 15. C. fol. amplexicaulibus angulato-ſpinoſis, flor. ſolitariis ſubſeſſilibus obuallatis foliolis ſubquinis.

eriophorus. 16. C. fol. ſeſſilibus bifariam pinnatifidis: laciniis alternis erectis, calyc. globoſis villoſis. *Mill. ic. t.* 293.

altiſſimus. 17. C. fol. ſeſſilibus pinnatifidis ſinuatis ſerratis inermibus, caule ramoſiſſimo, calyc. villoſis ſubſerratis.

virginianus. 18. C. fol. lanceolatis ſpinuloſis: ſubtus tomentoſis, caule inermi folioſo vnifloro.

heterophyllus. 20. C. fol. amplexicaulibus lanceolatis ciliatis integris laciniatisque, caule ſubunifloro, calyc. inermi.

helenioides. 21. C. fol. amplexicaulibus lanceolatis dentatis: ſpinulis inaequalibus ciliatis, caule inermi.

ſerratuloides. 22. C. fol. ſubamplexicaulibus lanceolatis integris: ſerraturis ſpinoſo-ſetaceis, pedunc. vnifloris.

tataricus. 23. C. fol. amplexicaulibus lanceolatis: ſerraturis ſpinoſo-ſetaceis, flor. triphyllis.

flaueſcens. 24. C. fol. lanceolatis integris inermibus dentatis glabris, flor. aphyllis inermi-ſpinoſis.

mollis. 25. C. fol. pinnatifidis linearibus ſubtus tomentoſis, caule inermi vnifloro.

acaulis. 26. C. acaulis, calyc. glabro.

926. CNICVS. *Cal.* ouatus, imbricatus ſquamis ramoſo-ſpinoſis, obuallatus bracteis. *Corollulae* aequales.

1156.

oleraceus. 1. C. fol. pinnatifidis carinatis nudis, bracteis concauis integris ſubcoloratis.

Eriſi-

Eriſitha-les. 4. C. fol. amplexicaulibus pinnatifidis ariſtato-ſerratis, pedunc. cernuis, calyc. glutinoſis. *Iacq. obſ. 28. t. 19.* Folia *pinnato-partita, ſenſilia, ſubtus imprimis pubeſcentia:* Pedunculi *aphylli.* Flores *ſolitarii, nutantes, lutei: diſco conuexo longiore.*

ferox. 8. C. fol. decurrentibus ligulatis dentato-ſpinoſis, caul. ramoſo erecto. *Mant.* 109.*

pygmeus. 2. C. fol. ſeſſilibus ſublinearibus confertiſſimis, calyc. inermi.

Acarna. 7. C. fol. decurrentibus lanceolatis indiuiſis, calyc. pinnato-ſpinoſis.

ſpinoſiſſimus. 3. C. fol. amplexicaulibus ſinuato-pinnatis ſpinoſis, caule ſimplici, flor. ſeſſilibus.

centaur. 5. C. fol. pinnatifidis, calyc. ſcarioſis.

cernuus. 6. C. fol. cordatis, petiolis criſpis ſpinoſis amplexicaulibus, flor. cernuis, calyc. ſcarioſis.

927. ONOPORDVM. *Recept.* fauoſum. *Cal.* ſquamae mucronatae. 1158.

Acanthium. 1. O. calyc. ſquarroſis: ſquamis patentibus, fol. ouato-oblongis ſinuatis. *Planta canaſcenti-virens; Caule alis rectis ad ipſum calycem excurrentibus; Calyce ſquamis patentibus, ſubulatis.*

illyricum. 2. O. calyc. ſquarroſis; ſquamis inferioribus vncinatis, fol. lanceolatis pinnatifidis. *Planta cinereo-cana; Caule alis vndulatis infra calycem ſpatio deſinentibus; Calyce ſquamis inferioribus reflexo-vncinatis, lanceolatis.*

arabicum. 3. O. calyc. imbricatis.

acaulon. 4. O. acaule. *Folia A. illyrici, tomentoſo-albida. Caulis omnino nullus. Calyx vnus ſeſſilis ad radicem, dein alii laterales calyces enaſcuntur pariter ſeſſiles.*

928. CYNARA. *Cal.* dilatatus, imbricatus ſquamis carnoſis, emarginatis cum acumine. 1159.

Scolymus. 1. C. fol. ſubſpinoſis pinnatis indiuiſisque, calycinis ſquamis ouatis.

Carduncul. 2. C. fol. ſpinoſis: omnibus pinnatifidis; calycinis ſquamis ouatis.
humilis. 3. C. fol. ſpinoſis pinnatifidis ſubtus tomentoſis, calyc. ſquamis ſubulatis.
acaulis. 4. C. acaulos, fol. pinnatis inermibus ſupra glabris.

929. CARLINA. *Cal.* radiatus ſquamis marginalibus longis, coloratis. 1160.

acaulis. 1. C. caule vnifloro flore breuiore.
lanata. 2. C. caule bifido, calyc. ſanguineis terminalibus: primo axillari ſeſſili. *Calycis ſquamae verae terminantur omnes ſpina ſimpliciſſima; in reliquis autem ſpinae compoſitae ſunt.*
corymbo-ſa. 3. C. caule multifloro ſubdiuiſo, flor. ſeſſilibus, calyc. radio flauo.
vulgaris. 4. C. caule multifloro corymboſo, flor. terminalibus, calyc. radio albo.
racemoſa. 5. C. flor. ſeſſilibus lateralibus pauciſſimis.
pyrenai. 6. C. caule multifloro, fol. decurrentibus.
atractyl. 7. C. caule ramoſo, calycibus ſpinis ciliatis.

930. ATRACTYLIS. *Cor.* radiatae, corollulis radii 5-dentatis. 1161.

gummif. 1. A. flore acauli.
humilis. 2. A. fol. dentato-ſinuatis, flore radiato: obuallato inuolucro patente, caule herbaceo.
cancellata. 3. A. inuolucris cancellatis ventricoſis linearibus dentatis, calyc. ouatis, flor. floſculoſis. *Caulis palmaris ſimplex, albo-araneoſus: Ramis ex alis 2 vltimis. Folia lineari-lanceolata, ciliata, araneoſa. Flos terminalis, cinctus Bracteis 3, patentibus et incluſus 8 conniuentibus, in peripheriam globoſam inflatam, quorum 3 alternae apice recuruae. Bracteae ſingulae lineares, pinnato-dentatae dentibus bifurcatis. Corolla parua, caerulea, floſculoſa, radio rarius. Inuolucrum cancellatum, naturae ſtupendum artificium, muſcas arcet.*

931. CAR-

931. CARTHAMVS. *Cal.* ouatus, imbricatus ſquamis apice ſubouato-foliaceis.

1162.

tinctorius. 1. C. fol. ouatis integris ſerrato-aculeatis.

lanatus. 2. C. caule piloſo: ſuperne lanato, fol. inferioribus pinnatifidis: ſummis amplexicaulibus dentatis.

creticus. 3. C. caule laeuiuſculo, calyc. ſublanatis, floſculis ſubnouenis, fol. inferioribus lyratis. *Corollulae albae fauce lineis 5 nigris, dein bifidis laciniarum margines nigros efficientibus.*

tingitanus. 4. C. fol. radicalibus pinnatis; caulinis pinnatifidis, caul. vnifloro.

caeruleus. 5. C. fol. lanceolatis ſpinoſo-dentatis, caul. ſubunifloro.

mitiſſimus. 6. C. fol. inermibus: radicalibus dentatis, caulinis pinnatis. *Hortenſis vix dignoſcendus Caule decumbente palmari Foliisque ſinuatis longioribus mollibus Ger.* 182.

Carduncc. 7. C, fol. caulinis linearibus pinnatis longitudine plantae.

arboreſc. 9. C. fol. enſiformibus ſinuato-dentatis.

corymboſ. 8. C. flor. corymboſis numeroſis.

1287. SPILANTHVS. *Iacq.**

CAL. *Communis* erectus: foliolis pluribus, ſubaequalibus, oblongis: exterioribus duobus longioribus.

COR. *Compoſita* uniformis, tubuloſa. *Corollae* hermaphroditae, aequales. *Propria* infundibuliformis limbo quinquefido.

STAM. *Filamenta* quinque, breuia. *Anthera* cylindrica, tubuloſa.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, recurua.

PER. nullum. *Calyx* immutatus.

SEM. ſolitaria, oblonga, compreſſo-plana, membranaceo-marginata, apice biariſtata: ariſta altera minore.

REC. nudum, conicum.

vrens. 1. S. fol. lanceolatis integerrimis. *Iacq, amer.* 214. *t.* 126. *f.* 1.

infipida. 2. S. fol. obouatis ſubdentatis ſeſſilibus. *Iacq. amer.* 215.

oleracea. 3. S. fol. ſubcordatis ſerrulatis petiolatis. *Caules procumbentes, pedales, teretes, ſcabriuſculi. Folia ſubcordata, obtuſa, ſerrata, petiolata, oppoſita. Flores ſolitarii, longius petiolati, omnino lutei.* Genus *differt a Bidente defectu palearum.*

932. BIDENS. 1165.

Recept. paleaceum. *Pappus* ariſtis erectis, ſcabris. *Cal.* imbricatus. *Cor.* rarius floſculo vno alterne radiante inſtruitur.

tripartita. 1. B. fol. trifidis, calyc. ſubfolioſis, ſem. erectis.

minima. 2. B. fol. lanceolatis ſeſſilibus, floribus ſeminibusque erectis.

nodiflora. 4. B. fol. oblongis integerrimis vnidentatis, caul. dichotomo, flor. ſolitariis ſeſſilibus.

tenella. 5. B. fol. linearibus, pedunc. capillaribus, calyc. ſubtetraphyllis, ſem. erectis quinis.

cernua. 3. B. fol. lanceolatis amplexicaulibus, flor. cernuis, ſem. erectis. *Confer.* Coreopſis Bidens.

frondoſa. 6. B. fol. pinnatis ſerratis lineatis glabris, ſem. erectis, calyc. frondoſis, caule laeui.

piloſa. 7. B. fol. pinnatis ſubpiloſis, caule geniculis barbatis, calycibus inuolucro ſimplici, ſem. diuergentibus *β.* Agrimonia moluca. *Rumph. amb. 6. p. 38. t. 15. f. 2. Simillima, ſed foliola diſtincta et ſemina ſemper 4-ariſtata.*

bipinnata. 8. B. fol. bipinnatis inciſis, calyc. inuolucratis, coroll. ſemiradiatis, ſem. diuergentibus.

niuea. 9. B. fol. ſimplicibus ſubhaſtatis ſerratis petiolatis, flor. globoſis, pedunc. elongatis, ſem. laeuibus.

verticillata. 10. B. fol. oblongis integris: inferne alternis, ſuperne oppoſitis, flor. verticillatis.

ſcandens. 11. B. fol. oppoſitis ouatis acuminatis integerrimis, caule ſcandente fruticoſo, flor. oppoſitis paniculatis.

bulla-

bullata. 12. B. fol. ouatis ſerratis: inferioribus oppoſitis; ſuperioribus ternatis: intermedio maiore. *Arduin. ſpec. 2. p. 37. t. 18.* Bidens paluſtris annua, fol. ſubrotundis latioribus plerumque trilobis. *Mich. flor.* 120. Bidens fol. ouatis et tripteris, caulibus hirſutis et brachiatis. *Hall. goet.* 383. *nunc in Italia.*

atriplicifolia. 13. B. fol. alternis deltoidibus dentatis petiolatis ſtipulatis, caule paniculato. *Sem. mutica. Affinitas Verbeſinae Acmellae.*

933. CACALIA. 1168.

Recept. nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* cylindricus, oblongus, baſi tantum ſubcalyculatus.

* *Fruteſcentes.*

papillaris. 1. C. caule fruticoſo obuallato ſpinis petiolaribus truncatis.

Anteuphorbiumcuneifolia. 2. C. caule fruticoſo, fol. ouato oblongis, planis, petiol. baſi linea triplici deductis.

C. caul. fruticoſo, fol. cuneiformibus carnoſis. *Mant.* 110. *Fructificationem non vidi.*

Kleinia. 3. C. caule fruticoſo compoſito, fol. lanceolatis planis, petiolorum cicatricibus obſoletis.

Ficoides. 4. C. caule fruticoſo, fol. compreſſis carnoſis.

repens. 14. C. caule fruticoſo, fol. depreſſis carnoſis. *Mant.* 110.

ſuffruticoſa. 13. C. caule ſuffruticoſo ramoſo, fol. linearibus planis ſparſis. *Mant.* 109. *Affinis C. porophyllo.*

* * *Herbaceae.*

Porophyll. 5. C. caule herbaceo indiuiſo, fol. ellipticis ſubcrenatis.

ſonchifolia. 6. C. caule herbaceo, fol. lyratis amplexicaulibus dentatis.

incana. 7. C. caule herbaceo, fol. lanceolatis dentatis.

ſaracenica. 8. C. caule herbaceo, fol. lanceolatis ſerratis decurrentibus. *Simillima ſenecioni ſaracenicae. Bracteae ſetaceae.*

haſtata. 9. C. caule herbaceo, fol. trilobis acuminatis ſerratis.

iuaueolens. 10. C. caule herbaceo, fol. haſtato-ſagittatis denticulatis, petiol. ſuperne dilatatis.

atriplicifolia. 11. C. caule herbaceo, fol. subcordatis dentato-sinuatis, calyc. quinquefloris.

alpina. 12. C. fol. reniformi-cordatis acutis denticulatis. *Calyc. subtrifloris. Calycis foliola conglutinata. Corollulae 4-fidae. Scop.*

934. ETHVLIA. *Recept.* nudum. *Pappus* nullus. 1171.

conyzoid. 1. E. flor. paniculatis.

Spargano-phora. 2. E. flor. sessilibus lateralibus. *Habui plantam ind. orient. minimam, floribus sessilibus; an valantiana eadem?*

diuaricata. 4. E. fol. linearibus dentatis decurrentibus, pedunc. oppositifloris vnifloris, caule diuaricato. *Mant.* 110. Artemisia minima. *Sp. plant.* 1190. *Burm. ind. t. 56. f. 3, 4.*

tomentosa. 3. E. suffruticosa, fol. linearibus integerrimis tomentosis. *Mant.* 110.

lidentis. 5. E. racemulis secundis, calyc. subquinquefloris, fol. lanceolatis. *Mant.* 110. *Hallstroem. Hortul. reg.*

935. EVPATORIVM. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus. *Cal.* imbricatus, oblongus. *Stylus* semibifidus, longus. 1171.

* *Calycibus quadrifloris.*

Dalea. 1. E. fol. lanceolatis venosis obsolete serratis glabris, calyc. quadrifloris, caul. fruticoso.

hyssopif. 2. E. fol. lanceolato-linearibus trineruiis subintegerrimis.

scandens. 3. E. caule volubili, fol. cordatis dentatis acutis. *Planta indiae orientalis laeuior, foliorum dentibus obsoletioribus.*

houstonis. 4. E. caule volubili, fol. ouatis integerrimis.

* * *Calycibus quinquefloris.*

Zeilanic. 6. E. fol. ouato-hastatis petiolatis dentatis.

sessilifol. 7. E. fol. sessilibus amplexicaulibus distinctis lanceolatis.

album. 22. E. fol. lanceolatis serratis, calyc. foliolis lanceolatis apice scariosis coloratis. *Mant.* 111.

chinen-

chinenſe. 8. E. fol. ouatis petiolatis ſerratis.
rotundif. 9. E. fol. ſeſſilibus diſtinctis ſubrotundo-cordatis.
altiſſimum. 10. E. fol. lanceolatis neruoſis: inferioribus extimo ſubſerratis, caule ſuffruticoſo.
haſtatum. 5. E. fol. cordato-haſtatis ſubdentatis nudis, caule volubili, flor. ſpicatis.
trifoliat. 11. E. fol. ternis.
cannabin. 12. E. fol. digitatis.

* * * *Calycibus octofloris.*

purpur. 13. E. fol. quaternis ſcabris lanceolato-ouatis inaequaliter ſerratis petiolatis rugoſis.
maculatum. 14. E. fol. quinis ſubtomentoſis lanceolatis aequaliter ſerratis venoſis petiolatis.

* * * * *Calycibus quindecim pluribusue floſculis.*

perfoliat. 15. E. fol. connato-perfoliatis tomentoſis.
coeleſtinum. 18. E. fol. cordato-ouatis obtuſe ſerratis petiolatis, calycibus multifloris.
aromaticum. 19. E. fol. ouatis obtuſe ſerratis petiolatis trineruiis, calyc. ſimplicibus.
odoratum. 16. E. fol. deltoidibus inferne dentatis ſubtus tomentoſis, calyc. multifloris.
ivaefolium. 17. E. fol. anguſto-lanceolatis trineruiis ſubſerratis, calyc. ſquarroſis multifloris.

936. AGERATVM. *Recept.* nudum. *Pappus* 5-ariſtatus. *Cal.* oblongus. ſubaequalis. *Stylus* flore vix longior.
1175.

Conyzoid. 1. A. fol. ouatis, caule piloſo.
ciliare. 2. A. fol. ouatis crenatis obtuſis, caule glabro.
altiſſimum. 3. A. fol. ouato-cordatis rugoſis: floralibus alternis, caule glabro.

937. PTERONIA. *Recept.* ſetis multipartitis. *Pappus* ſubplumoſus. *Cal.* imbricatus.
1176.

camphor. 1. P. fol. ſparſis baſi ciliatis.

oppoſitifolia. 2. P. fol. oppoſitis, ramis dichotomis. Cyanus centauroides fruteſcens, lauandulae folio. *Breyn. prodr. 3. p. 28. t. 17. f. 3. centaur. faſcic. p. 21. Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄. Fruticulus *palmaris, nudus, Ramis oppoſitis, dichotomis.* Folia *oppoſita, parua, ſublanceolata; incana ſ. ſubtomentoſa.* Flores *terminales, ſeſſiles, lutei. Corollulae profunde diuiſae.* Stigmata 2, *longiuſcula.* Sem. *birſuta.* Pappus *ſetaceus, hiſpidus.* Receptaculum *paleaceum Dau. Royen. Conuenit generi Staehelinae, ſed pappus neque ramoſus, neque antherae caudatae, neque folia alterna.*

938. STAEHELINA. *Recept.* breuiſſimae paleaceum. *Pappus* ramoſus. *Antherae* caudatae.
1176.

gnaphaloides. 1. S. fol. tomentoſis, ſquamis calycinis lanceolatis apice membranaceis reflexis. *Stylus bifidus.*

dubia. 2. S. fol. linearibus denticulatis, ſquamis calycinis lanceolatis, pappo calycibus duplo longiore. *Ger. prou.* 190. *t. 6. Caulis et folia ſubtus tomentoſa. Stigma ſimplex.*

arboreſc. 3. S. fol. oualibus. *Mant.* 111.

fruticoſa. 4. S. fol. lanceolatis obtuſis. Centaurea fruticoſa, *Sp. pl.* 1286.

Chamaepeuce. 5. S. fol. linearibus. Serratula chamaepeuce. *Sp. plant.* 1147.

939. CHRY-

939. CHRYSOCOMA. *Recept.* nudum. *Pappus* ſimplex. *Cal.* hemiſphaericus, imbricatus. *Stylus* vix floſculis longior.
1177.

* *Fruteſcentes.*

oppoſitifolia. 1. C. fruticoſa, fol. oppoſitis obouatis, flor. faſciculatis pedunculatis. *Differt haec tantum a Chryſocomis, quantum conuenit Pteroniae oppoſitifoliae facie externa, calycibus, caule reliquisque, ſed huic receptaculum nudum eſt.*

Comaurea. 2. C. fruticoſa, fol. linearibus rectis glabris dorſo decurrentibus.

cernua. 3. C. ſuffruticoſa, fol. linearibus recuruis ſubſcabris, flor. nubilibus cernuis.

ciliata. 4. C. ſuffruticoſa, fol. linearibus rectis ciliatis, ramis pubeſcentibus.

tomentoſa. 6. C. ſuffruticoſa, foliis ramisque tomentoſis. *Dau. Royen.* Rami *tomentoſi, albidi.* Folia *linearia, ſubtus ſimiliter tomentoſa, recta. Flores vt in proximis.*

cabra. 5. C. ſuffruticoſa, fol. lanceolato-ouatis recuruis denticulato-ſerratis, pedunc. pubeſcentibus.

* * *Herbaceae.*

Linoſyris. 6. C. herbacea, fol. linearibus glabris, calyc. laxis.

biflora. 7. C. herbacea paniculata, fol. lanceolatis trineruiis punctatis nudis.

graminifolia. 8. C. herbacea, fol. linearibus lanceolatis glabris, flor. corymboſis.

villoſa. 9. C. herbacea, fol. lanceolatis villoſis, calyc. arctis.

940. TARCHONANTHVS. *Recept.* villoſum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* 1-phyllus, ſemi 7-fidus, turbinatus.
1179.

camphoratus. 1. TARCHONANTHVS.

941. CA-

941. CALDA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* piloſus. 1179. *Cal.* imbricatus.

jamaicenſis. 1. C. flor. ſubternis pedunculatis, fol. ouato-oblongis ſubſerratis petiolatis.
oppoſitifolia. 2. C. corymb. congeſtis, pedunc. longiſſimis, fol. lanceolatis, caul. herbaceo.
Anellus. 3. C. flor. ſubpaniculatis, calyc. breuibus, ſem. nudis, fol. ouato-lanceolatis petiolatis.

942. SANTOLINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* nullus. *Cal.* imbricatus, hemiſphaericus. 1179.

Chamaecypar. 1. S. pedunc. vnifloris, fol. quadrifariam dentatis.
roſmarin. 2. S. pedunc. vnifloris, fol. linearibus margine tuberculatis.
alpina. 3. S. pedunc. vnifloris, fol. bipinnatis, caul. ſimplicibus.
anthemoides. 4. S. pedunc. vnifloris, fol. bipinnatis, caul. ramoſiſſimo villoſo.

943. ATHANASIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* paleaceus, breuiſſimus. *Cal.* imbricatus. 1180.

ſquarroſa. 1. A. pedunc. vnifloris lateralibus, fol. ouatis recuruatis.
crenata. 2. A. flor. ſolitariis terminalibus, fol. linearibus.
capitata. 3. A. flor. terminalibus ſubſeſſilibus, fol. lanceolatis hirſutis.
maritima. 10. A. pedunc. vnifloris ſubcorymboſis, fol. lancolatis crenatis obtuſis tomentoſis. *Semina pappo deſtituta, an itaque potius Santolinae ſpecies?*
geniſtifolia, 11. A. corymbis ſimplicibus, fol. linearibus indiuiſis nudis imbricato-patentibus. *Dau, Royen.*
pubeſcens 8. A. corymbis ſimplicibus, fol. lanceolatis indiuiſis villoſis.
annua. 9. A. corymbis ſimplicibus coarctatis, fol. pinnatifidis dentatis.

dent i-

dentata. 5. A. corymb. compoſitis, fol. inferioribus linearibus dentatis; ſuperioribus ouatis ſerratis.

laeuigata. 4. A. corymb. compoſitis, fol. ouatis amplexicaulibus ſubdentatis recuruis.

trifurcata. 6. A. corymbis ſimplicibus, fol. trilobis cuneiformibus.

crithmifolia. 7. A. corymb. ſimplicibus, fol. ſemitrifidis linearibus. *Folia tenella quaſi conglutinata ſunt.*

POLYGAMIA SVPERFLVA.

944. TANACETVM. 1182. *Recept.* nudum. *Pappus* ſubmarginatus. *Cal.* imbricatus, hemiſphaericus. *Cor.* radii obſoletae, 3-fidae. *(interdum nullae omnesque floſculi hermaphroditi.)*

crithmif. 1. T. fol. pinnatis: pinnis linearibus remotis integerrimis. *Calyces ſubtriflori.*

ſibiricum. 4. T. fol. pinnatis: laciniis lineari-filiformibus, corymbis glabris, caule herbaceo.

incanum. 5. T. fol. bipinnatis tomentoſis, corymbo ouato compoſito.

annuum. 6. T. fol. bipinnatifidis linearibus acutis, corymbis tomentoſis.

monanthos. 9. T. caul. ſimpliciſſimis vnifloris longitudine foliorum *Mant.* 111,

vulgare. 7. T. fol. bipinnatis inciſis ſerratis.

Balſamin. 8. T. fol. ouatis integris ſerratis.

945. ARTEMISIA. 1184. *Recept.* ſubuilloſum vel nudiuſculum. *Pappus* nullus. *Cal.* imbricatus ſquamis rotundatis, conniuentibus. *Cor.* radii nullae.

* *Fruticoſae erectae.*

aethiopica. 1. A. fol. linearibus confertis minimis diuiſis, caule fruticoſo.

iudai-

iudaica. 24. A. fol. caulinis minutis obouatis palmatis obtuſis tomentoſis planis. *Mant.* 111.

Abrotanum. 2. A. fol. ramoſiſſimis ſetaceis, caule erecto ſuffruticoſo.

arboreſcens. 15. A. fol. compoſitis multifidis linearibus, flor. ſubgloboſis, caul. fruteſcente.

* * *Procumbentes ante floreſcentiam.*

ſantonica. 3. A. fol. caulinis linearibus pinnato-multifidis, ramis indiuiſis, ſpic. ſecundis reflexis, flor. quinquefloris. *ß.* Abſinthium ſantonicum gallicum. *Bauh. pin.* 139. *Cam. epit.* 457.

campeſtris. 4. A, fol. multifidis linearibus, caul. procumbentibus virgatis. *Racemi ſimplices, alterni, floribus ſolitariis.*

paluſtris. 5. A. fol. linearibus pinnatis integerrimis, flor. glomeratis ſubſeſſilibus.

crithmifolia. 6. A. fol. compoſitis diuaricatis linearibus carnoſis glabris, caule adſcendente paniculato,

maritima. 7. A. fol. multipartitis tomentoſis, racem. cernuis, floſculis femineis ternis. *γ.* Abſinthium ſeriphium gallicum. *Bauh. pin.* 139.

glacialis. 9. A. fol. palmatis multifidis ſericeis, caul. adſcendentibus, flor. glomeratis faſtigiatis.

rupeſtris. 8. A. fol. pinnatis, caulibus adſcendentibus, flor. globoſis cernuis receptaculo pappoſo.

* * * *Erectae herbaceae, foliis compoſitis.*

pontica. 10. A. fol. multipartitis ſubtus tomentoſis, flor. ſubrotundis nutantibus: receptaculo nudo.

annua. 11. A. fol. triplicato pinnatis vtrinque glabris, flor. ſubgloboſis nutantibus: receptaculo glabro conico.

tanacetifolia. 13. A. fol. bipinnatis ſubtus tomentoſis nitidis: pinnis transuerſis, racem. ſimplicibus.

Abſinthium. 14. A. fol. compoſitis multifidis. flor. ſubgloboſis pendulis: receptaculo villoſo.

vulgaris. 16. A. fol. pinnatifidis planis inciſis ſubtus tomentoſis, racem. ſimplicibus recuruatis, flor. radio quinquefloro.

* * * * *Foliis ſimplicibus.*

integrifolia. 14. A. fol. lanceolatis ſubtus tomentoſis integerrimis dentatisque, floſculis femineis quinis.

caeru-

caerulescens, 15. A. fol. caulinis lanceolatis integris : radicalibus multifidis, floſculis femineis ternis.

Dracunc. 16. A. fol. lanceolatis glabris integerrimis.

chinenſis. 17. A. fol. ſimplicibus tomentoſis obtuſis lanceolatis : inferioribus cuneiformibus trilobis.

maderaſpatana. 18. A. fol. ſimplicibus lyrato-ſinuatis, caul. procumbentibus, flor. pedunculatis ſolitariis globoſis oppoſitifoliis.

ambigua. 23. A. fol. linearibus indiuiſis acerosis, ſpic. terminalibus, calyc. foliolis intimis coloratis, caule fruticoſo.

946. GNAPHALIVM. 1191

Recept. nudum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* imbricatus: ſquamis marginalibus rotundatis, ſcarioſis, coloratis.

* *Fruticoſa Argyrocoma.*

arboreum. 1. G. fruticoſum, fol. ſeſſilibus linearibus ſupra glabris margine reuolutis, flor. ſubcapitatis, pedunc. elongatis.

grandiflorum. 2. G. fruticoſum, fol. amplexicaulibus ouatis trineruiis vtrinque lanuginoſis.

coronatum. 3. G. fruticoſum, fol. ſeſſilibus lanceolatis, corymb. compoſitis ſeſſilibus, pedunculis aphyllis, calyc. coronatis.

diſcolorum. 4. G. fruticoſum, fol. ſeſſilibus lanceolatis, calycibus albis : ſquamis inferioribus incarnatis.

niueum. 5. G. fruticoſum, fol. filiformibus tomentoſis ſubimbricatis, caule ramoſiſſimo, calyc. ſubtomentoſis.

muricatum. 6. G. fruticoſum, fol. ſubulatis, vmbella compoſita, cal. ſubtrifloris cylindricis.

ericoides. 7. G. fruticoſum, fol. ſeſſilibus linearibus, calyc. exterioribus rudibus ; interioribus incarnatis.

teretifolium. 10. G. fruticoſum, fol. confertis teretiuſculis, corymb. ramoſis, calyc. extus ferrugineis.

* * *Fruticoſa Chryſocoma.*

ſordidum. 8. G. fruticoſum, fol. linearibus, pedunc. ſubtrifloris, calycibus ſquamis lanceolatis.

Stoe-

Stoechas. 9. G. fruticoſum, fol. linearibus, corymb. compoſito, ramis virgatis

igneſcens. 11. G. fruticoſum, fol. ſublanceolatis tomentoſis ſeſſilibus, corymb. alternis conglobatis, flor. globoſis-

dentatum. 12. G. fruticoſum, fol. cuneiformibus dentatis ſeſſilibus, corymb. ſimplici.

ſerratum. 13. G. fruticoſum, fol. amplexicaulibus lanceolatis ſerratis ſupra nudis.

patulum. 14. G. fruticoſum, fol. amplexicaulibus ſpatulatis, corymb. aggregatis, ramis patentibus.

petiolatum. 15. G. fruticoſum, fol. ouatis integerrimis petiolatis, flor. confertis terminalibus. *Affinis maxime praecedenti.*

craſſifolium. 16. G. fruticoſum, fol. lato-lanceolatis ſubpetiolatis coriaceis tomentoſis, corymbo compoſito, caul. prolifero. *Mant.* 112.

* * * *Herbacea Chryſocoma,*

cylindricum. 16. G. herbaceum, fol. ſeſſilibus oblongis tomentoſis, corymb, inaequalibus, calyc. glabris cylindricis ſeſſilibus.

orientale. 17. G. ſubherbaceum, fol. lineari-lanceolatis ſeſſilibus, corymb. compoſito, pedunc. elongatis.

arenarium. 18. G. herbaceum. fol. lanceolatis: inferioribus obtuſis, corymbo compoſito, caul. ſimpliciſſimis.

rutilans. 19. G. herbaceum, fol. lanceolatis, corymbo decompoſito, caule inferne ramoſo.

imbricatum. 20. G. herbaceum, fol. lanceolatis tomentoſis, ſquamis calycinis reflexis, caule ramoſo.

cymoſum. 21. G. herbaceum, fol. lanceolatis trineruiis: ſupra glabris, racemo terminali, caule inferne ramoſo.

nudifolium. 22. G. herbaceum, fol. lanceolatis trineruiis nudis reticulato-venoſis.

luteo-album. 23. G. herbaceum, fol. ſemiamplexicaulibus enſiformibus repandis obtuſis vtrinque pubeſcentibus, flor. conglomeratis.

odoratiſſimum. 24. G. herbaceum, fol. decurrentibus mucronatis vtrinque tomentoſis planis.

* * * * *Herbacea Argyrocoma.*

ſanguineum. 25. G. herbaceum, fol. decurrentibus lanceolatis tomentoſis planis apiculo nudo terminali.

foeti-

foetidum. 26. G. herbaceum, fol. amplexicaulibus integerrimis ſubtus tomentoſis, caule ramoſo. *Varietas calycibus argenteis & aureis.*

vndulatum. 27. G. herbaceum, fol. ſubdecurrentibus lanceolatis vndulatis acutis ſubtus tomentoſis, caule ramoſo. *Folia ſumma amplexicaulia, vix decurrentia.*

criſpum. 28. G. herbaceum, fol. amplexicaulibus ſpatulatis tomentoſis, calyc. obtuſiſſimis plicato-vndulatis: baſi tomentoſis.

helianthemifolium. 29. G. herbaceum, fol. amplexicaulibus lanceolatis, corymbis compoſitis, calycum ſquamis ſubplicatis.

quarroſum. 30. G. herbaceum, fol. ſeſſilibus lingulatis tomentoſis, calyc. ſquamis interioribus ſubulatis recuruatis.

ſtellatum. 31. G. herbaceum, fol. ſeſſilibus lanceolatis villoſis, calyc. acutis extus incarnatis.

obtuſifolium. 32. G. herbaceum, fol. lanceolatis, caule tomentoſo paniculato, flor. glomeratis conicis terminalibus.

margaritaceum. 33. G. herbaceum, fol. lineari-lanceolatis acuminatis alternis, caule ſuperne ramoſo, corymbis faſtigiatis.

plantagineum. 34. G. ſarmentis procumbentibus, caule ſimpliciſſimo, fol. radicalibus ouatis maximis.

dioicum. 35. G. ſarmentis procumbentibus, caule ſimpliciſſimo, corymbo ſimplici, flor. diuiſis.

alpinum. 35. G. ſarmentis procumbentibus, caule ſimpliciſſimo, capitulo aphyllo, flor. oblongis. *Femineis adhuc ſolum viſis.*

indicum. 37. G. herbaceum, fol. lanceolatis, caule ramoſiſſimo diffuſo, corymbis inaequalibus, calyc. intus coloratis.

purpureum. 38. G. herbaceum, fol. lanceolatis nudis, caule erecto ſimpliciſſimo, flor. ſpicatis lateralibus ſeſſilibus.

* * * * * *Filaginoidea.*

ſyluaticum. 39. G. caule herbaceo ſimpliciſſimo erecto, flor. ſparſis. *Varietas forte? minor, calyce ſimillimo ex alpibus europaeis.*

vliginoſum. 41. G. caule herbaceo ramoſo diffuſo, floribus confertis terminalibus.

glomeratum. 40. G. caule herbaceo diffuſo, calycib. ſquamis interioribus ſubulatis recuruatis, fol. ſubamplexicaulibus.

947. XERANTHEMVM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* ſetaceus. *Cal.* imbricatus, radiatus : radio colorato.
1201.

* *Receptaculo paleaceo; Semin. corona quinqueſeta.*

annuum. 1. X. herbaceum, fol. lanceolatis patentibus. *Radii ſtigma ſimplex; Semine nudo. Diſci ſtigma ſubbifidum; Semina quinque-ariſtata.*

** *Receptaculo nudo. Seminum corona piloſa.*

veſtitum. 3. X. fruticoſum erectum, fol. adnatis lanceolato-linearibus apice calloſo mucronatis, ramis vnifloris foliosis.

ſpecioſiſſimum. 4. X. fruticoſum erectum, fol. amplexicaulibus lanceolatis trineruiis, ramis vnifloris ſubnudis.

proliferum. 5. X. caule fruticoſo prolifero, flor. ſeſſilibus, fol. granulato-ſubrotundis imbricatis obſoletis.

caneſcens. 6. X. caul. fruticoſis, fol. ouatis nudis, pedunc. ſquamoſis.

imbricat. 7. X. fruticoſum, fol. imbricatis ouato-ſubulatis glabris.

*** *Receptaculo nudo, Seminum corona plumoſa.*

retortum. 8. X. caul. fruteſcentibus prouolutis, fol. tomentoſis recuruatis.

ſpinoſum. 9. X. ſquamis calycinis mucronato-ſpinoſis.

ſeſamoid. 10. X. ramis vnifloris imbricatis, fol. linearibus.

ſtaehelina. 12. X. pedunculis terminalibus exſertis nudis vnifloris, fol. lanceolatis tomentoſis. *Habitat ad Cap. b. ſpei. Dav. Royen.* Caulis *lignoſus, tener, paniculato ramoſus, vt tota Herba albo-tomentoſus.* Pedunculi *longi, terminales.*

variegatum. 12. X. flor. ſolitariis nutantibus, ſquamis calycinis obtuſis maculatis. *Roy. mſſ.* Xeranthemum africanum, gnaphalii foliis tomentoſis, foliis & ſquamarum ſummitatibus ferugineis. *Rai. ſuppl. 181.**

paniculat. 11. X. flor. paniculatis, fol. lineari-lanceolatis.

948. CAR-

948. CARPESIVM. *Recept.* nudum. *Pappus* nullus
1203. *Cal.* imbricatus: squamis exterioribus reflexis.

cernuum. 1. C. flor, terminalibus.
abrotanoides. 2. C. flor. lateralibus.

949. BACCHARIS. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus.
1204. *Cal.* imbricatus, cylindricus. *Flosculi* feminei hermaphroditis immixti.

ivaefolia. 1. B. fol. lanceolatis longitudinaliter dentato-serratis. *(excluso Synonymo Morisoni) Flosculi Feminei corollula 3-fida, copiosissimi; Hermaphroditi disci pauci, 5-fidi.*
neriifol. 2. B. fol. lanceolatis superne vno alteroue denticulo serratis.
halimifol. 3. B. fol. obouatis superne emarginato-crenatis.
dioscorid. 4. B. fol. lato-lanceolatis dentatis sessilibus stipulatis.
indica. 5. B. fol. obouatis denticulatis petiolatis.
brasiliana. 6. B. fol. obouatis integris scabris sessilibus subtus venosis.
foetida. 7. B. fol. lanceolatis serrato dentatis, corymb. foliosis.

950. CONYZA. *Recept.* nudum. *Pappus* simplex.
1205. *Cal.* imbricatus, subrotundus. *Cor.* radii trifidae.

squarrosa. 1. G. fol. lanceolatis acutis, caule herbaceo corymboso, calyc. squarrosis,
linifolia. 2. C. fol. lineari-lanceolatis integerrimis, coroll. radiatis.
saxatilis. 3. C. fol. linearibus subdentatis, pedunc. longissimis vnifloris, caul. suffruticoso.
rupestr. 22. C. fol. spatulatis subdentatis cauleque suffruticoso tomentosis, pedunc. elongatis vnifloris. *Mant. 113.*
scabra. 21. C. fol. oblongis subdentatis sessilibus scabris, pedunc. vnifloris elongatis. *Mant. 113.*

aſteroides. 4. C. fol. lato-lanceolatis ſubſerratis, coroll. radiatis, cal. ſquarroſis.

biſrons. 7. C. fol. ouato-oblongis amplexicaulibus *Conf. Inula biſrons.*

lobata. 8. C. fol. inferioribus trifidis; ſuperioribus ouato-lanceolatis obſolete ſerratis, flor. corymboſis.

bifoliata. 5. C. fol. oualibus dentatis, pedunc. diphyllis: bracteis oppoſitis.

pubigera. 20. C. fol. oblongis ſubdentatis ſubpetiolatis, pedunc. lanatis ſubbifloris. *Mant. 113.*

tortuoſa. 10. C. caule tortuoſo fruticoſo, fol. ouato-oblongis integerrimis, racem. reflexis.

candida. 12. C. fol. ouatis tomentoſis, flor. confertis, pedunc. lateralibus terminalibusque.

anthelmintica. 11. C. fol. lanceolato-ouatis ſcabris, pedunc. vnifloris, calyc. ſquarroſis. *Radix annua. Caulis teres, pubeſcens, rectus. Folia alterna, acuta, ſerrata, anguſtata in Petiolum baſi purpuraſcentem. Calycis apices lanceolati, elongati, patuli. Corolla parua, purpuraſcens: Floſculis 25, hermaphroditis.*

cinerea. 14. C. fol. oblongis, flor. paniculatis; coroll. cylindricis, calyce duplo longioribus. Senecio indicus atriplicis folio. *Moriſ. hiſt. 3. p. 106. ſ. 7. t. 17. f. 7. Caulis erectus, paniculatus, pubeſcens. Folia caneſcentia, lanceolato-elliptica, repando-ſerrata, remota. Corollae cylindricae, purpureae. Styli breues. Pappus calyce longior.*

odorata. 15. C. fol. ouatis ſerratis ſubtomentoſis acutis, caule corymboſo, coroll. ſubgloboſis.

chinenſis. 16. C. fol. lanceolato-ouatis reflexo-ſerratis ſubtus tomentoſis, flor. terminalibus congeſtis.

hirſuta. 19. C. fol. oualibus integerrimis ſcabris ſubtus hirſutis.

arboreſcens. 18. C. fol. ouatis integerrimis acutis ſubtus tomentoſis, ſpicis recuruatis ſecundis, bract. reflexis.

fruticoſa. 17. C. fol. ouatis integerrimis obtuſis, flor. ſeſſilibus alternis, ramulis flexuoſis.

virgata. 5. C. fol. decurrentibus lanceolatis ſerrulatis, caul. virgatis, flor. ſpicatis ſparſis congeſtis.

decurrens. 6. C. fol. decurrentibus lanceolatis ſerrulatis, flor. axillaribus ſeſſilibus glomeratis.

951. ERIGERON. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus. *Cor.* radii lineares, angustissimae.
1209.

viscosum. 1. E. pedunc. vnifloris lateralibus, fol. lanceolatis denticulatis, calyc. squarrosis, coroll. radiatis.

graueolens. 2. E. fol. sublinearibus integerrimis, ramis lateralibus multifloris. *Flores lutei.*

glutinosum. 18. E. fol. lanceolato-linearibus piloso-viscidis, pedunc. vnifloris. *Mant. 112. Flores purpurei.*

siculum. 3. E. squamis calycinis inferioribus laxis florem superantibus, pedunc. foliosis. *Caules rubentes.*

carolinianum. 4. E. caule paniculato, flor. subsolitariis terminalibus, fol. linearibus integerrimis.

canadens. 5. E. caule floribusque paniculatis.

bonarien. 7. E. fol. basi reuolutis.

iamaicense. 6. E. caule paucifloro subvilloso, fol. cuneiformi-lanceolatis: serraturis vtrinque duabus.

philadelphicum. 8. E. caule multifloro, fol. lanceolatis subserratis: caulinis semiamplexicaulibus, flosc. radii capillaceis longitudine disci. (*Non descriptio, quae E. aegyptiaci*).

aegyptiacum. 17. E. fol. semiamplexicaulibus spatulatis dentatis, flor. globosis. *Mant. 112.*

acre. 9. E. pedunculis alternis vnifloris.

alpinum. 10. E. caule subbifloro, calyce subhirsuto, fol. obtusis subtus villosis.

vniflor. 11. E caule vnifloro, calyce piloso.

gramin. 12. E. caule vnifloro, fol. linearibus ciliatis scabris.

camphoratum. 14. E. fol. lanceolato-ouatis villosis: serraturis apice cartilagineis.

gouani. 13. E. flor. congestis, calyc. scariosis, fol. lanceolatis subdentatis margine scabris.

tuberosum. 12. E. fol. linearibus, ramis vnifloris, caule suffruticoso Erigeron fol. rigidis, caul. sublignoso pauciflo-ro. *Ger. prou. 205. Radix praemorsa.*

foetidum. 16. E. fol. lanceolato-linearibus retusis, flor. corymbosis. Pseudo-Helichrysum fruteseens africanum, retusis foliis viridibus, flore luteo nudo. *Morif. hist. 3. p. 90. n. 1. conf.* Inulam foetidam.

952. TVSSILAGO. *Recept.* nudum. *Pappus* ſimplex. *Cal.* ſquamae aequales, diſcum aequantes, ſubmembranaceae. 1213.

Anandria. 1. T. ſcapo vnifloro ſquamoſo erecto, fol. lyrato-ouatis.
dentata. 3. T. ſcapo vnifloro ebracteato, fol. lanceolatis dentatis villoſis.
nutans. 2. T. ſcapo vnifloro ebracteato, flor. nutante, fol. lyratis obtuſis.
alpina. 4. T. ſcapo vnifloro ſubnudo, fol. cordato-orbiculatis crenatis.
Farfara. 5. T. ſcapo vnifloro imbricato, fol. ſubcordatis angulatis denticulatis.
iaponica. 10. T. floribus alternis radiatis. *Mant.* 113.
frigida. 6. T. thyrſo faſtigiato, flor. radiatis.
alba. 7. T. thyrſo faſtigiato, floſculis femineis nudis paucis.
hybrida. 8. T. thyrſo oblongo, floſculis femineis nudis plurimis.
Petaſites. 9. T. thyrſo ouato, floſculis femineis nudis paucis.

953. SENECIO. *Recept.* nudum. *Pappus* ſimplex. *Cal.* cylindricus, calyculatus: ſquamis apice ſphacelatis. 1215.

* *Floribus floſculoſis.*

hieracifolius. 1. S. coroll. nudis, fol. amplexicaulibus laceris, caule herbaceo erecto.
purpureus. 5. S. coroll. nudis, fol. lyratis hirtis; ſuperioribus lanceolatis dentatis.
perſicifolius. 3. S. coroll. nudis, fol. lanceolatis integerrimis baſi dentatis.
virgatus. 4. S. coroll. nudis, fol. lyratis ſubtus tomentoſis, pedunc. vnifloris: ſquamis ſubulatis.
diuaricatus. 2. S. coroll. nudis, fol. lanceolatis dentatis ſcabris, ramulis floriferis diuaricatis.
Pſ. Chin. 6. S. coroll. nudis, ſcapo ſubnudo longiſſimo.

vulga-

vulgaris. 7. S. coroll. nudis, fol. pinnato-ſinuatis amplexicaulibus, flor. ſparſis.

arabicus. 41. S. coroll. nudis, fol. ſubbipinnatis petiolatis laeuibus. *Mant. 114.*

* * *Flor. radiatis: radio reuoluto.*

triflorus. 8. S. coroll. reuolutis, fol. ſeſſilibus ſinuatis, calyc. conicis: ſquamis minimis intactis.

aegyptius. 9. S. coroll. reuolutis, fol. amplexicaulibus ſinuatis, ſquamis calycinis breuioribus integris ſphacelatis.

liuidus. 10. S. coroll. reuolutis, fol. amplexicaulibus lanceolatis dentatis, ſquamis calycinis breuiſſimis intactis.

trilobus. 11. S. coroll. reuolutis, fol. amplexicaulibus, ſquamis calycinis ſphacelatis laceris.

viſcoſus. 12. S. coroll. reuolutis, fol. pinnatifidis viſcidis, ſquamis calycinis laxis longitudine perianthii.

ſyluaticus. 13. S. coroll. reuolutis, fol. pinnatifidis denticulatis, caule corymboſo erecto.

helvodenſis. 14. S. coroll. reuolutis, fol. lyratis ſinuatis obtuſis petiolatis, caule hirto.

glaucus. 15. S. coroll. reuolutis, fol. amplexicaulibus lanceolatis obtuſis dentatis integerrimis.

varicoſus. 16. S. coroll. reuolutis, fol. ouatis petiolatis dentatis punctulato-varicoſis.

* * * *Floribus radiatis: radio patente, fol. pinnatifidis.*

haſtatus. 17. S. coroll. radiantibus, petiolis amplexicaulibus, pedunc. folio triplo longioribus, fol. pinnato-ſinuatis.

pubigerus. 18. S. coroll. radiantibus, petiol. radicalibus lanatis, fol. pinnatifidis, caul. ſimpliciſſimis, flor. lateralibus ſeſſilibus.

elegans. 19. S. coroll. radiantibus, fol. pinnatifidis aequalibus patentiſſimis margine incraſſato recuruato. *Calycis ſquamae ſubciliatae.*

ſqualidus. 20. S. coroll. radiantibus calyce longioribus integris, fol. pinnatifidis: laciniis linearibus diſtantibus.

erucifolius. 21. S. coroll. radiantibus, fol. pinnatifidis dentatis ſubhirtis, caule erecto.

incanus. 22. S. coroll. radiantibus, fol. vtrinque tomentosis subpinnatis obtusis, corymbo subrotundo.

abrotanifolius. 23. S. coroll. radiantibus, fol. pinnato-multifidis linearibus nudis acutis, pedunc. subbifloris. Iacobaea alpina, foliis multifidis etscheriana, flore luteo plerumque gemello. *Pluk. alm. 194. Folia Radicalia bipinnatifida; Caulina simpliciter pinnatifida. Pedunculi pubescentes, 3. s. 4, saepius biflori.*

canadensis. 24. S. coroll. radiantibus, fol. bipinnatis linearibus. Iacobaea chaerophylli folliis mariana. *Pluk. mant. 107.*

Iacobaea. 25. S. coroll. radiantibus, fol. pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto.

aureus. 26. S. coroll. radiantibus, fol. crenatis: infimis cordatis petiolatis; superioribus pinnatifidis lyratis.

umbellatus. 27. S. coroll. radiantibus calyce longioribus, fol. pinnato-dentatis denticulatis: laciniis distantibus.

* * * * *Floribus radiatis: radio patente, fol. indiuisis.*

linifolius. 28. S. coroll. radiantibus, fol. linearibus integerrimis, corymb. subsquamato, caule herbaceo.

paludosus. 29. S. coroll. radiantibus, fol. ensiformibus acute serratis subtus subvillosis, caule stricto.

nemorensis. 30. S. coroll. radiantibus octonis, fol. lanceolatis biserratis subtus villosis, caule ramoso.

sarracenicus. 32. S. coroll. radiantibus, flor. corymbosis, fol. lanceolatis serratis glabriusculis.

Doria. 31. S. coroll. radiantibus, flor. corymbosis, fol. subdecurrentibus nudis lanceolatis serratis: superioribus sensim minoribus.

doronicum. 33. S. coroll. radiante, caule indiuiso subunifloro, fol. indiuisis serratis: radicalibus ouatis subtus villosis. *Varietates progressiuas α-ε vidit D. Iacquin, at omnes negat conuenire D. Haller.*

longifolius. 34. S. coroll. radiantibus, fol. linearibus sparsis, caule fruticoso.

byzantinus. 35. S. coroll. radiantibus, fol. oblongis remote dentatis spinoso-denticulatis supra nudis, caule herbaceo.

hali-

halimifolius. 36. S. coroll. radiantibus, fol. obouatis carnoſis dentatis, caule fruticoſo.

iliciſolius. 37. S. coroll. radiantibus, fol. ſagittatis amplexicaulibus dentatis, caule fruticoſo.

rigens. 38. S, coroll. radiantibus, fol. amplexicaulibus oblongis indiuiſis denticulatis nudis, caul. fruticoſo.

rigidus. 39. S. coroll. radiantibus, fol. amplexicaulibus ſpatulatis repandis eroſis ſcabris, caule fruticoſo. *Caulis inamoenus. Folia rigida, ſupra quaſi oleo oblinita, non tamen glabra; ſubtus incana, villoſiuſcula. Flores parui radio luteo pentapetalo: floſculis remotis integris.*

populifolius. 40. S. coroll. radiantibus, fol. ouatis ſpatulatis integris obtuſis: adultioribus ſupra glabris, caule fruticoſo.

954. ASTER. 1224.

Recept. rudum. *Pappus* ſimplex. *Coradii* plures 10. *Cal.* imbricati ſquamae inferiores patulae.

* *Fruticoſi.*

polifolius. 1. A. ſuffruticoſus, fol. decurrentibus obouatis ſubtus tomentoſis ſubſerratis, flor. terminalibus ſeſſilibus.

taxifolius. 2. A. ſuffruticoſus, fol. decurrentibus ſubulatis margine ſcabris, flor. terminalibus.

reflexus. 3. A. fruticoſus, fol. ouatis ſubimbricatis recuruatis ſerrato-ciliatis, flor. terminalibus.

crinitus. 4. A. fruticuloſus, fol. ouato-oblongis acutis ſubtus tomentoſis, calyc. pilo terminatis. *Folia exquiſite acuminata.*

fruticuloſus. 5. A. fruticoſus, fol. linearibus punctatis, pedunc. vnifloris nudis.

* * *Herbacei integrifolii; pedunculis nudis.*

tenellus. 6. A. fol. ſubfiliformibus aculeato-ciliatis, pedunc. nudis, calyc. hemiſphaericis aequalibus. Aſter parnus aethiopicus, chamaemeli floribus, tamariſci aegyptiaci foliis tenuiſſime denticulatis. *Pluk. alm. 56. t. 271. f. 4. Rai. ſuppl. 164. n. 84. Flores ante antheſin nutantes. Semina pappo rariore.*

alpinus. 7. A. fol. lanceolatis hirtis: radicalibus obtuſis, caul. ſimpliciſſimo vnifloro. *Folia caulina 2, rarius 3. Gouan.*

ſibiricus. 8. A. fol. lanceolatis venoſis ſcabris extimo ſerratis, caul. ſtriatis, pedunc. tomentoſis.

Tripolium. 9. A. fol. lanceolatis integerrimis carnoſis glabris, ramis inaequatis, flor. corymboſis.

Amellus. 10. A. fol. lanceolatis obtuſis ſcabris trineruiis integris, pedunc. nudiuſculis corymboſis, ſquamis calycinis obtuſis. *Eſt etiam flos in pratis, cui nomen Amello. Virg.*

diuaricatus. 11. A. ramis diuaricatis, fol. ouatis ſerratis, floralibus integerrimis obtuſiuſculis amplexicaulibus.

* * * *Herbacei Integrifolii, pedunculis ſquamoſis.*

hyſſopifolius. 37. A. fol. linearibus integerrimis obliquatis acutis margine ſcabris, pedunc. ſubfolioſis. *Mant. 114.*

dumoſus. 12. A. fol. linearibus integerrimis, caule paniculato, flor. terminalibus.

ericoides. 13. A. fol. linearibus integerrimis, caul. paniculato, pedunc. racemoſis: pedicellis folioſis.

tenuifol. 14. A. fol. ſublinearibus integerrimis, pedunc. folioſis.

linariifolius. 15. A. fol. linearibus integerrimis mucronatis ſcabris carinatis, pedunc. folioſis.

linifolius. 16. A. fol. linearibus acutis integerrimis, caule corymboſo ramoſiſſimo.

acris. 17. A. fol. lanceolato-linearibus ſtrictis integerrimis planis, flor. corymboſis faſtigiatis, pedunc. folioſis.

concolor. 18. A. fol. ouatis ſeſſilibus integerrimis, caule ſimpliciſſimo, racemo terminali.

rigidus. 19. A. fol. linearibus alternis, flor. terminalibus ſolitariis.

nou. angl. 21. A. fol. lanceolatis alternis integerrimis ſemiamplexicaulibus, flor. confertis terminalibus, caule hiſpido.

vndulatus. 20. A. fol. amplexicaulibus vndulatis ſubtus tomentoſis, flor. racemoſis adſcendentibus.

grandiflorus. 32. A. fol. amplexicaulibus lingulatis integerrimis, ramis vniſloris, calyc. ſquarroſis. *Mill. ic. 282. Cateſby hunc in Europam primus introduxit.*

* * * * *Her-*

* * * * *Herbacei Serratifolii, pedunculis laeuibus.*

cordifolius. 22. A. fol. cordatis ſerratis petiolatis, caule corymboſo, pedunc. aphyllis. *Caulis ſubl aeuis, ſuperne magis ramoſus. Folia Radicalia cordata, acute ſerrata, ſubtus piloſiuſcula; Caulina inferiora ouata, ſerrata petiolis marginatis; ſuprema ſpatulato-lanceolata, amplexicaulia. Panicula corymboſa. Pedunculi nudi. Calyces imbricati, arcti. Radius exalbidus, vix purpuraſcens, 12-petalus.*

puniceus. 23. A. fol. ſemiamplexicaulibus lanceolatis ſerratis ſcabris, pedunc. alternis ſubvnifloris, calyc. diſcum ſuperantibus.

annuus. 24. A. fol. lanceolatis: inferioribus crenatis, caule corymboſo, pedunc. nudis, calyc. hemiſphaericis.

vernus. 25. A. fol. radicalibus lanceolatis integerrimis obtuſis, caul. ſubnudo filiformi ſubramoſo, pedunc. nudis.

* * * * * *Herbacei Serratifolii, pedunculis ſquamoſis.*

indicus. 26. A. fol. ouato-oblongis ſerratis: floralibus ouali-lanceolatis integerrimis, ramulis vnifloris.

laeuis. 27. A. fol. lanceolatis ſeſſilibus laeuibus ſubſerratis, pedunc. folioſis ſubdiuiſis.

mutabilis. 28. A. fol. lanceolatis ſerratis, calyc. ſquarroſis, panic. ſubfaſtigiata.

tradeſcanti. 29. A. fol. lanceolato linearibus medio ſerratis, pedunc. folioſis, caule racemoſo, calyc. erectis.

noui belgii. 30. A. fol. lanceolatis ſubſerratis ſeſſilibus, caule paniculato, ramulis vnifloris ſolitariis, calyc. ſquarroſis.

tardiflorus. 31. A. fol. ſpatulato-lanceolatis ſerratis oblongis: baſi flexuoſis ſemiamplexicaulibus, caul. proſtratis, flor. terminalibus.

miſer. 33. A. fol. ſerratis: ramorum integerrimis, flor. ouatis: diſco radiis longiore.

macrophyllus. 34. A. fol. ſerratis: radicalibus maximis cordatis trineruatis; caulinis ouatis ſeſſilibus.

chinenſis. 35. A. fol. ouatis angulatis dentatis petiolatis, caul. patentibus folioſis terminalibus. *Differt. nonnihil a congeneribus.*

955. SOLIDAGO. *Recept.* nudum. *Pappus* ſimplex
1232. *Cor.* radii circiter 5. *Cal.* ſquamae imbricatae, clauſae.

ſemperui-rens. 1. S. fol. lanceolatis ſubcarnoſis glaberrimis margine ſcabriuſculis, panic. corymboſa.

canadenſis. 2. S. paniculato-corymboſa, racem. recuruatis, flor. adſcendentibus, fol. trineruiis ſubſerratis ſcabris.

altiſſima. 3. S. paniculato-corymboſa, racem. recuruis, flor. adſcendentibus, fol. eneruiis ſerratis.

lateriflora. 4. S. panic. corymboſa: racem. recuruis adſcendentibus, caule inferne ramoſo floriferoque.

bicolor. 14. S. racem. ſpicatis, fol. ſubſerratis, florum radio dicolore. *Mant. 114.*

lanceolata. 13. S. corymb. terminalibus, fol. lineari-lanceolatis integerrimis trineruiis. *Mant. 114.*

caeſia. 5. S. panic. corymboſa, racem. ſupra denſioribus, caule glabro laeui.

mexicana. 9. S. caule obliquo, pedunc. erectis foliolatis ramoſis, fol. lanceolatis integerrimis.

flexicaulis. 7. S. caule flexuoſo, fol. ouatis acuminatis ſerratis, racem. lateralibus ſimplicibus.

latifolia. 8. S. caule erecto, fol. ouatis acuminatis ſerratis, racem. lateralibus ſimplicibus.

Virgaurea. 9. S. caule ſubflexuoſo angulato, racem. paniculatis erectis confertis.

minuta. 10. S. caul. ſimpliciſſimo, fol. caulinis integerrimis, pedunc. axillaribus vnifloris.

rigida. 11. S. fol. caulinis ouatis ſcabris integerrimis ram. alternis faſtigiatis, corymb. terminalibus.

nouebo-racenſis. 12. S. fol. radicalibus ouato oblongis petiolatis, caule nudiuſculo ramoſo faſtigiato.

957. CINERARIA. *Recept.* nudum. *Pappus.* ſim-
1242. plex. *Cal.* ſimplex, polyphyllus, aequalis.

geifolia. 1. C. pedunc. ramoſis, fol. reniformibus ſuborbiculatis ſublobatis dentatis petiolatis.

cymbalarifolia. 2. C. fol. lyratis: impari reniformi denticulato; caulinis ſummis amplexicaulibus lobatis integerrimis.

ſibirica. 3. C. racem. ſimplici, fol. cordatis obtuſis denticulatis laeuibus, caul. ſimpliciſſimo monophyllo. *Bracteae 2, oblongae, emarceſcentes.*

glauca. 4. C. racem. ſimplici; fol. ſpatulato-cordatis integerrimis, caul. ſimpliciſſimo. *Folia colore Crambes maritimae, glauca petiolis marginato-ſpatulatis.*

ſonchifol. 5. C. fol. amplexicaulibus ſinuatis difformibus.

paluſtris. 6. C. flor. corymboſis, fol. lato-lanceolatis dentato-ſinuatis, caul. villoſo.

alpina. 7. C. vmbella inuolucrata, pedunc. communi nudiuſculo, fol. oblongis villoſis.

aurea. 8. C. flor. corymboſis, fol. lanceolatis ſerratis ſubtus tomentoſis.

maritima. 9. C. flor. paniculatis, fol. pinnatifidis tomentoſis: laciniis ſinuatis, caul. fruteſcente.

canadenſis. 10. C. flor. paniculatis, fol. pinnatifidis ſubuilloſis: laciniis ſinuatis, caule herbaceo.

linifolia. 11. C. pedunc vnifloris, fol. ſparſis, caule fruticoſo.

othonnites. 12. C. pedunc. vnifloris, fol. oblongis indiuiſis ſubdentatis nudis petiolatis alternis.

Amelloides. 13. C. pedunc, vnifloris, fol. oppoſitis ouatis, caul. ſuffruticoſo.

956. INVLA. *Recept.* nudum. *Pappus* ſimplex. *Antherae* baſi in ſetas duas deſinentes. 1236.

Helenium. 1. I. fol. amplexicaulibus ouatis rugoſis ſubtus tomentoſis, calycum. ſquamis ouatis.

odora. 4. I. fol. amplexicaulibus dentatis hirſutiſſimis: radicalibus ouatis; caulinis lanceolatis, caule pauciflоro.

Oculus Chriſti. 5. I. fol. amplexicaulibus oblongis integris hirſutis, caule piloſo corymboſo.

britannica. 6. I. fol. amplexicaulibus lanceolatis ſerratis diſtinctis ſubtus villoſis, caule ramoſo erecto villoſo.

dyſenterica. 7. I. fol. amplexicaulibus cordato-oblongis, caule villoſo paniculato, ſquamis calycinis ſetaceis.

undulata. 24. I. fol. amplexicaulibus cordato-lanceolatis vndulatis. *Mant. 115.*

indica. 8. I. fol. amplexicaulibus cordato-lanceolatis ferratis, pedunc. vnifloris filiformibus, flor. globosis. *Folia subscabra, subtus subtomentosa. Calyx cum disco corollae conficit globum. Flos luteus disco flauo.*

Pulicaria. 9. I. fol. amplexicaulibus vndulatis, caule prostrato, flor. subglobosis radio breuissimo.

arabica. 22. I. fol. oblongis sessilibus, pedunc. filiformibus, calycib. cylindricis. *Mant. 114.*

spiraeifolia. 10. I. fol. subsessilibus ouato-oblongis nudis reticulatis confertis serrulatis, flor. terminalibus subsessilibus.

squarrosa. 14. I. fol. oualibus laeuibus reticulato-venosis subcrenatis, cal. squarrosis.

salicina. 11. I. fol. lanceolatis recuruis serrato-scabris, ramis angulatis, flor. inferioribus altioribus.

hirta. 12. I. fol. sessilibus lanceolatis recuruis subserrato-scabris, caul. teretiusculo subpiloso, flor. inferioribus altioribus.

mariana. 16. I. fol. sessilibus lanceolatis subserratis pilosis, pedunc. subvnifloris subuiscosis: foliolis linearibus.

germanica. 13. I. fol. sessilibus lanceolatis recuruis scabris, flor. subfasciculatis.

ensifolia. 15. I. fol. sessilibus linearibus acuminatis neruosis glabris sparsis, caule subvnifloro.

crithmif. 17. I. fol. linearibus carnosis tricuspidatis.

prouincialis. 18. I. fol. subserratis subtus tomentosis: radicalibus petiolatis ouatis, caule erecto vnifloro.

montana. 19. I. fol. lanceolatis hirsutis integerrimis, caule vnifloro, calyce breui imbricato.

aestuans. 2. I. fol. spatulatis subtus tomentosis.

hifrons. 3. I. fol. decurentibus oblongis denticulatis, flor. congestis terminalibus subsessilibus.

aromatica. 20. I. fol. linearibus integerrimis tomentosis sparsis, caul. fruticoso.

pinifolia. 21. I. fol. subulato-linearibus triquetris confertissimis, caul. fruticoso.

foetida.

foetida. 22. I. fol. lanceolato-linearibus integerrimis, corymb. ramosis, radiis florum breuissimis. *Morif. hist. 3. p. 90.*

958. ARNICA. *Recept.* nudum. *Pappus.* simplex. 1245. *Corollulae* radii filamentis 5 absque antheris.

montana. 1. A. fol. ouatis integris: caulinis geminis oppositis. *Oed. dan. t. 63.*
piloselloides. 2. A. fol. integerrimis ellipticis villosis, scapo vnifloro aphyllo lanato, calyce radium aequante.
scorpioid. 3. A. fol. alternis serratis.
maritim. 4. A. fol. lanceolatis: inferioribus serratis, caule folioso multifloro.
crocea. 5. A. fol. ouatis repando-denticulatis subtus tomentosis.
Gerbera. 6. A. fol. pinnatifidis: lobis rotundatis.
coronopif. 7. A. fol. pinnatis: laciniis linearibus.

959. DORONICVM. *Recept.* nudum. *Pappus* simplex. 1247. *Calycis* squamae duplicis ordinis aequales, disco longiores. *Sem.* radii nuda pappoque destituta.

pardalianches. 1. D. fol. cordatis obtusis denticulatis: radicalibus petiolatis: caulinis amplexicaulibus.
plantag. 2. D. fol. ouatis acutis subdentatis, ramis alternis.
Bellidiastrum. 4. D. caule nudo simpliciſſimo vnifloro.

960. PERDICIVM. *Recept.* nudum. *Pappus* simplex. 1248. *Corollulae* bilabiatae.

semifloscul. 1. P. flore semifloſculoso, scapo vnifloro nudo.
radiale. 2. P. flor. subradiatis, calyc. exteriore tetraphyllo, caule fruticoso.
brasilienſe. 3. P. flor. subradiatis, calyc. simplicibus, caule herbaceo. *Mant. 115.*

961. HELENIVM. *Recept.* nudum: *Radii* paleaceum. *Pappus* 5-ariſtatus. *Cal.* ſimplex, multipartitus. *Corollulae* radii ſemitrifidae.
1248.

autumn. 1. H. fol. ſerratis. *Speciem alteram foliis integerrimis Mill. dict. non vidi.*

962. BELLIS. *Recept.* nudum, conicum. *Pappus* nullus. *Cal.* hemiſphaericus: ſquamis aequalibus. *Sem.* obouata.
1248.

perennis. 1. B. ſcapo nudo.
annua. 3. B. caule ſubfolioſo.

964. TAGETES. *Recept.* nudum. *Pappus.* ariſtis 5, erectis. *Cal.* 1-phyllus. 5-dentatus, tubuloſus. *Floſculi* radii 5, perſiſtentes.
1249.

patula. 1. T. caule ſubdiuiſo patulo.
erecta. 2. T. caule ſimplici erecto, pedunc. nudis vnifloris.
minuta. 3. T. caule ſimplici recto, pedunculis ſquamoſis multifloris.

963. LEYSERA. *Recept.* nudum. *Pappus* paleaceus; diſci etiam plumoſus. *Cal.* ſcarioſus.
1249.

gnaphaloides. 1. L. fol. planis ciliatis. *Margines foliorum ciliati glandulis pilo inſidentibus. Semina omnia coronata margine membranaceo, ſed inſuper diſci ſemina pappoſa. Receptaculum radii paleaceum, diſci nudum. Dau. Royen.*

palea-

paleacea. 2. L. fol. triquetris apice calloſis recuruatis. *Roy. Folia raris pilis obſita, interius ſulco tomentoſo exarata. Receptaculum totum paleis longitudine fere florum. Seminum corona omnis membranacea; nec vlla pappoſa. Hinc* Buphthalmis *charactere conuenit, ſed adeo ſimilis priori, vt facie vix diſtinguatur.*

974. ZINNIA. *Recept.* palaceum. *Pappus* ariſtis 2 erectis. *Cal.* ouato-cylindricus, imbricatus. *Floſculi* radii 5, perſiſtentes, integri.
1269.

pauciflora. 1. Z. flor. ſeſſilibus. Verbeſina fol. oppoſitis ouatis acutis integerrimis ſcabris. *Act. petrop.* 1763. *p.* 325. *t.* 13. *Flores lutei.*

multiflora. 2. Z. flor. pedunculatis. *Iacq. obſ. 2. t. 40. Caulis hirtus; Folia petiolata; radius ruber.*

965. PECTIS. *Recept.* nudum. *Pappus* ariſtatus. *Cal.* 5-phyllus, cylindricus. *Floſculi* radiantes 5.
1250.

ciliaris. 1. P. fol. linearibus ciliatis.

punctata. 2. P. fol. linearibus integerrimis ſubtus punctatis.

linifolia. 3. P. fol. linearibus integerrimis vtrinque laeuibus.

minuta. 4. P. fol. ouatis petiolatis.

966. CHRYSANTHEMVM. *Recept.* nudum. *Pappus* marginatus. *Cal.* hemiſphaericus, imbricatus: ſquamis marginalibus membranaceis.
1251.

* *Leucanthema.*

frutescens. 1. C. fruticoſum, fol. carnoſis linearibus pinnatis dentatis apice trifidis.

ſerotinum. 3. C. fol. lanceolatis ſuperne ſerratis vtrinque acuminatis.

atratum. 5. C. fol. omnibus cuneiformibus oblongis inciſis carnoſis. *Folia radicalia cuneiformia, apice lobata; Caulina lanceolata, ſerrata. Caulis vniflorus. Calyx margine atro.*

alpinum. 11. C. fol. cuneiformibus pinnatifidis: laciniis integris: caul. vnifloris. *Ger. prou.* 206. *Calycis ſquamae nigrae ſcarioſae.*

Leucanthemum. 4. C. fol. amplexicaulibus oblongis: ſuperne ſerratis; inferne dentatis.

montanum. 6. C. fol. imis ſpatulato-lanceolatis ſerratis: ſummis linearibus.

graminif. 7. C. fol. linearibus ſubintegerrimis.

monſpel. 9. C. fol. imis palmatis: foliolis linearibus pinnatifidis.

Balſamita. 8. C. fol. ouatis oblongis ſerratis auriculatis. *Similli-mum Tanaceto Balſamitae, ſed radiatum. Caulis ſubangulatus, ramoſus. Folia lanceolato-ouata; obtuſiuſcula, ſerrata, ſubtomentoſa, petiolata, auricula vtrinque parua, Flos Aſteris annui. Calyx fere Achilleae. Corolla lutea radio albo. Pappus nullus.*

inodorum. 10. C. fol. pinnatis multifidis, caul. ramoſo diffuſo.

achilleae. 22. C. fol. bipinnatis: pinnis imbricatis, caul. ſtricto multifloro. Parthenium foliis tenuiſſimis, achilleae caeſuris. *Mich. gen. 34. t. 29. Habitat in* Italia. 24. Caulis *erectus, ſubangulatus, pedalis multiflorus.* Folia *Millefolii, ſed octuplo maiora: punctis eminentibus vix conſpicuis adperſa; ſubtus pilis albis raris; apicibus mucrone terminali albido.*

corymboſum. 2. C. fol. pinnatis inciſo-ſerratis, caule multifloro.

* * *Chryſanthema.*

indicum. 12. C. fol. ſimplicibus ouatis ſinuatis angulatis ſerratis acutis.

arcticum. 13. C. fol. ſimplicibus cuneiformibus ſubpalmatis multifidis obtuſis.

pectinatum. 17. C. fol. pinnatis linearibus parallelis acutis integerrimis, pedunc. ſolitariis vnifloris.

ſegetum. 15. C. fol. amplexicaulibus: ſuperne laciniatis; inferne dentato-ſerratis.

myconis. 14. C. fol. lingulatis obtuſis ſerratis, calyc. ſquamis aequalibus. *Caulis erectus. laeuis, teretiuſculus. Folia extrorſum latiora, obtuſa, obtuſe ſerrata, laeuia, ſemiamplexicaulia. Pedunculus terminalis. ſtriatus, obſcurior, apice non incraſſatus. Calyx ſquamis apice ſcarioſis. Corolla ſaturate lutea. Radius breuis tridentatus. Seminum corona membranacea.*

italicum. 20. C. fol. bipinnatis ſerratis, florum radiis longitudine diſci, caule procumbente. *Mant.* 116.

millefolia-tum. 21. C. fol. bipinnatis dentatis, caule decumbente, corollae radiis diſco breuioribus. Anthemis millefolia. *Sp. plant.* 1263. *Diſcus omnino absque paleis. Differt a C. bipinnato diſci corollarum diametro non ſuperante longitudinem calycis, at C. bipinnatum diſco duplo latiore gaudet.*

bipinnat. 18. C. fol. bipinnatis ſerratis villoſis, radiis diſco breuioribus.

coronar. 16. C. fol. pinnatis inciſis extrorſum latioribus.

floſculoſ. 19. C. floſculis omnibus vniformibus hermaphroditis. *Procumbens, ſemperuirens. Folia obouata ſinuato-dentata, rigidula. Flores terminales, ſolitarii. G.*

967. MATRICARIA. 1255.

Recept. nudum. *Pappus* nullus. *Cal.* hemiſphaericus, imbricatus: marginalibus ſolidis, acutiuſculis.

Partheni-um. 1. M. fol. compoſitis planis: foliolis ouatis inciſis, pedunculis ramoſis.

maritima, 2. M. receptaculis haemiſphaericis, fol. bipinnatis ſubcarnoſis: ſupra conuexis; ſubtus carinatis.

capenſis. 6. M. fol. ſimpliciter pinnatis ſubcarnoſis teretiuſculis: infimis ſubbipinnatis. *Mant.* 115.

ſuaueolens. 5. M. receptac. conicis, radiis deflexis, ſquamis calycinis margine aequalibus.

Chamomilla. 3. M. receptac. conicis, radiis patentibus, ſquamis calycibus margine aequalibus.

argentea. 4. M. fol. bipinnatis, pedunc. ſolitariis.

Aſteroid. 7. M. fol. lanceolatis integris glabris obliquis. *Mant.* 116.

968. COTVLA. *Recept.* ſubnudum. *Pappus* marginatus. *Corollulae* diſci 4-fidae; radii fere nullae.
1256.

Anthemoides. 1. C. fol. alternis pinnato-multifidis dilatatis, corollis radio deſtitutis. *β.* Artemiſia nilotica. *Sp. pl.* 1188. *Caulis erectus, piloſus. Folia pinnatifida, inciſa, glabra. Pedunculi longi, ſolitarii, vniflori. Flos globoſus, cernuus, luteus. Calyx non imbricatus.*

aurea. 4. C. fol. alternis pinnato-ſetaceis multifidis, flor. cernuis radio deſtitutis.

coronopifolia. 3. C. fol. alternis lanceolato-linearibus amplexicaulibus dentatis.

grandis. 2. C. fol. alternis lanceolatis dentatis, caul. erecto, flor. ſolitariis. *Floſculi ſaepius 5-fidi. Seminum corona ligulata. Facies Chryſanthemi Leucanthemi abſque radio. Calycis ſquamae margine nigro.*

viſcoſa. 5. C. fol. alternis lyrato-pinnatis, coroll. radiatis.

turbinata. 6. C. fol. alternis, receptaculis ſubtus inflatis turbinatis

tanacetifolia. 10. C. fol. alternis tripinnatis: lacinulis acutis, caule erecto, flor. corymboſis. Tanacetum ſuffruticoſum. *Sp. pl.* 1183. *Floſculi feminei vix vlli; diſci quadrifidi* ⊙.

Verbeſina. 7. C. fol. oppoſitis trineruiis cordatis crenatis, flor. pedunculatis binis.

proſtrata. 8. C. fol. oppoſitis trineruiis ouato-oblongis ſerratis, flor. alternis geminis ſubſeſſilibus. Verbeſina proſtrata. *Sp. pl.* 1272.

alba. 9. C. fol. oppoſitis lanceolatis triplineruiis ſerratis ſeſſilibus: flor. alternis ſubternis ſeſſilibus. Verbeſina alba. *Sp. pl.* 1272. Eccliptica. *Rumph. amb. 6. t. 18. f. 1. Floſculi quadrifidi; Calyx ſimplex; Semina mutica.*

969. ANACYCLVS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* emarginatus. *Semin.* lateribus membranaceis.
1258.

creticus. 1. A. fol. decompoſitis linearibus: laciniis diuiſis planis.

orientalis. 2. A. fol. compoſitis ſetaceis acutis rectis.

valen-

valentinus. 3. A, fol. decompoſitis linearibus : laciniis diuiſis teretiuſculis acutis, flor. floſculoſis. *Confer.* Anthemis valentina, *cui corollae ſimiliter ariſtatae, ſed Calyx minus ſcariojus.*

970. ANTHEMIS. 1259. *Recept.* paleaceum. *Pappus* nullus. *Cal.* hemiſphaericus, ſubaequalis. *Floſculi* radii plures quam 5.

* *Radio diſcolore ſ. albo.*

leucantha. A. A. ſuffruticoſa, fol. ſublanceolatis dentatis acutis indiuiſis.

Cota. 1. A. florum paleis rigidis pungentibus.

altiſſima. 2. A. erecta, fol. pinnatis : pinnarum baſibus denticulo reflexo aſperis.

maritima; 3. A. fol. pinnatis denticulatis carnoſis nudis punctatis, caule proſtrato, calyc. ſubtomentoſis.

tomentoſa. 4. A. fol. pinnatifidis obtuſis planis, pedunculis hirſutis foliоſis, calyc. tomentoſis. *Corollae laciniis 2 exterioribus maioribus.*

mixta. 5. A. fol. ſimplicibus dentato-laciniatis.

alpina. 9. A. fol. dentato-pinnatis integerrimis linearibus, caule villoſo vnifloro, petalis ouatis, paleis ſphacelatis.

chia. 6. A. fol. pinnatifidis laciniatis, pedunc. nudis ſubuilloſis.

nobilis. 7. A. fol. pinnato-compoſitis linearibus acutis ſubuilloſis.

aruenſis. 8. A. receptac. conicis : paleis ſetaceis, ſem. corona-to-marginatis.

Cotula. 10. A. receptac. conicis: paleis ſetaceis, ſem. nudis.

Pyrethrum. 13. A. caul. ſimplicibus vnifloris decumbentibus, fol. pinnato-multifidis: *Mill. fig. t. 38.*

* * *Radio concolore ſ. luteo.*

valentina. 14. A. caule ramoſo, fol. pubeſcentibus tripinnatis ſetaceis, calyc. villoſis pedunculatis.

repanda. 15. A. fol. ſimplicibus ouato-lanceolatis repando-crenatis.

americana 14. A. fol. triternatis, pedunc. terminalibus ramo longioribus.

tinctoria. 16. A. fol. bipinnatis ſerratis ſubtus tomentoſis, caule corymboſo.

arabica. 17. A. caule decompoſito, calyc. ramiferis.

971. ACHILLEA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* nullus. *Cal.* ouatus, imbricatus. *Flo. culi* radii circiter 5. 1264.

* *Corollis flauis.*

Santolina. 1. A. fol. ſetaceis dentatis: denticulis ſubintegris ſubulatis reflexis.

Ageratum. 2. A. fol. lanceolatis obtuſis acute ſerratis.

falcata. 3. A. fol. linearibus dentatis obtuſis planis: denticulis crenatis.

tomentoſa. 4. A. fol. pinnatis hirſutis: pinnis linearibus dentatis.

pubeſcens. 5. A. fol. pinnatis: foliolis lanceolatis inciſis ſerratis ſubtus lanigeris.

abrotanifolia. 6. A, fol. pinnatis ſupradecompoſitis: laciniis linearibus diſtantibus.

bipinnata. 7. A. fol. bipinnatis tomentoſis: foliolis ouatis integris.

aegyptiaca. 8. A. fol. pinnatis: foliolis obtuſe lanceolatis ſerratodentatis.

inodora. 9. A. fol. dentato-lanceolatis integerrimis apice trifidis.

* * *Corollis radio albis.*

macrophylla. 10. A. fol. pinnatis planis inciſo-ſerratis: extimis maioribus coadunatis.

impatiens. 11. A. fol. pinnatis: pinnis diſtantibus lineari-lanceolatis: baſi ſurſum acutis.

Clauennae. 12. A. fol. laciniatis planis obtuſis tomentoſis.

Ptarmica. 13. A. fol. lanceolatis acuminatis argute ſerratis.

alpina. 14. A. fol. lanceolatis dentato-ſerratis: denticulis tenuiſſime ſerratis.

atrata. 15. A. fol. pinnulis pectinatis integriusculis, pedunc. villoſis.

nana. 16. A. fol. pinnatis dentatis hirſutiſſimis, flor. glomerato-vmbellatis.

magna. 17. A. fol. bipinnatis ſubpilloſis: laciniis linearibus dentatis: auriculis decuſſatis.

Milli-

Millefolium. 18. A. fol. bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caul. ſuperne ſulcatis.

nobilis. 19. A. fol. bipinnatis: inferioribus nudis planis, ſuperioribus obtuſis tomentoſis, corymb. conuexis confertiſſimis.

odorata. 20. A. fol. bipinnatis oualibus nudiuſculis, corymb. faſtigiatis conſertis.

cretica. 21. A. foliis linearibus: pinnis ſubrotundis retrorſum imbricatis, caule tomentoſo.

972. TRIDAX. 1268. *Recept.* paleaceum. *Pappus* multiradiatus ſimplex. *Cal.* imbricatus, cylindricus. *Corollulae* radii 3-partitae.

procumb. 1. TRIDAX.

978. AMELLVS. 1276. *Recept.* paleaceum. *Pappus* ſimplex. *Cal.* imbricatus. *Corollulae* radii indiuiſae.

lychnitis. A. A, fol. oppoſitis lanceolatis obtuſis, pedunc. vnifloris.

vmbellatus. B. A. fol. oppoſitis triplineruiis ſubtus tomentoſis, flor. vmbellatis.

973. SIGESBECKIA. 1269. *Recept.* paleaceum. *Pappus* nullus. *Cal.* exterior 5-phyllus, proprius, patens. *Radius* dimidiatus.

orientalis. 1. S. petiol. ſeſſilibus, calyc. exterioribus linearibus maioribus patentibus.

occident. 2. S. petiol. decurrentibus, calyc. nudis. *An Milleriae generis?*

975. VERBESINA. 1270. *Recept.* paleaceum. *Pappus* ariſtatus. *Cal.* 2-plici ordine. *Floſculi* radii circiter 5.

alata. 1. V. fol. alternis decurrentibus vndulatis obtuſis.

chinenſis. 2. V. fol. alternis petiolatis ouato-lanceolatis ſerratis.
virginica. 3. V. fol. alternis lanceolatis petiolatis, flor. corymboſis.
Pſeudo-Acmella. 4. V. fol. oppoſitis lanceolatis ſubſerratis, pedunc. flore longioribus.
Acmella. 5. V. fol. oppoſitis oblongo-ouatis trineruiis petiolatis ſubdentatis, pedunc. elongatis axillaribus, flor. conicis.
Lavenia. 8. V. fol. oppoſitis ouatis trineruiis glabris petiolatis, ſem. tricornibus.
biflora. 9. V. fol. oppoſitis oblongo-ouatis triplineruiis acuminatis ſerratis, pedunc. geminis bifloris.
calendulacea. 12. V. fol. oppoſitis lanceolatis obtuſiuſculis, pedunc longis vnifloris, calyc. ſimplicibus.
nodiflora. 7. V. fol. oppoſitis ouatis ſerratis, calyc. oblongis ſeſſilibus; caulinis lateralibus.
fruticoſa. 6. V. fol. oppoſitis ouatis ſerratis petiolatis, caule fruticoſo.

977. BVPHTHALMVM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* margo obſoletus. *Seminum* latera, praeſertim radii, marginata. *Stigma* floſcul. hermaphroditicorum indiuiſum.
1273.

* *Aſteriſci T.*

fruteſc. 1 B. fol. oppoſitis lanceolatis, petiol. bidentatis, caule fruticoſo. *Folia ſupra venoſa, ſubtus laeuia.*
arboreſcens. 2. B. fol. oppoſitis lanceolatis vtrinque tomentoſis edentulis integerrimis, caule fruticoſo. *Plum. ic. 106. f. 2.*
ſpinoſum. 4. B. calycibus acute foliofis, fol. alternis lanceolatis amplexicaulibus integerrimis. *Radius multiplex tenuiſſimus.*
aquaticum. 5. B. calyc. obtuſe foliofis ſeſſilibus axillaribus, fol. alternis oblongis obtuſis, caul. herbaceo.
maritimum. 6. B. calyc. obtuſe foliofis pedunculatis, fol. alternis ſpatulatis, caul. herbaceo.

capenſe. 3. B. calyc. acute folioſis, fol. oppoſitis lanceolato-linearibus recuruis denticulato-ciliatis, caul. ſuffruticoſo.

* * *Aſteroidea T.*

ſalicifol. 7. B. fol. alternis lanceolatis ſubſerratis villoſis, calyc. nudis, caul. herbaceo.

grandifl. 8. B. fol. alternis lanceolatis ſubdenticulatis glabris, calyc. nudis, caul. herbaceo. *Pappus eſt margo ciliaris et Calyx aequalis; an itaque potius Inula ſeminibus ſubnudis.*

ſpecioſiſſimum. 11. B. fol. alternis amplexicaulibus ouatis nudis ſerratis ſubciliatis, caul. vnifloro. *Mant.* 117.

Helianthoides. 10. B. fol. oppoſitis ouatis ſerratis triplineruiis, calyc. folioſis, caul. herbaceo.

* *Leyſera paleacea.*

POLYGAMIA FRVSTRANEA.

979. HELIANTHVS. 1276. *Recept.* paleaceum planum, *Pappus* 2-phyllus. *Cal.* imbricatus ſubſquarroſus.

annuus. 1. H. fol. omnibus cordatis trineruatis, pedunc. incraſſatis, flor. cernuis.

indicus. H. fol. omnibus cordatis trineruatis, pedunc. aequalibus, calyc. folioſis. *Mant.* 117.

multiflorus. 2. H. fol. inferioribus cordatis trineruatis: ſuperioribus ouatis.

tuberoſus. 3. H. fol ouato-cordatis triplineruiis.

decapetalus. 5. H. caule inferne laeui, fol. lanceolato-cordatis triplineruiis, radiis decapetalis, pedunc. ſcabris.

frondoſus. 4. H. calyc. ſquarroſis vndulatis frondoſis, radiis octopetalis, fol. ouatis, caul. inferne ſcabro.

ſtrumoſus. 6. H. radice fuſiformi; *an varietas H. giganteiPluk. alm.* 99.

giganteus. 8. H. fol. alternis lanceolatis ſcabris baſi ciliatis, caule ſtricto glabro. *Moriſ. loc. cit. t. 7. f. 6.*

altiſſimus. 7. H. fol. alternis latiuſcule lanceolatis ſcabris, petiol. ciliatis, caul. ſtricto glabro. *Moriſ. loc. cit. t. 7. f. 7.*

laeuis. 9. H. fol. oppositis trineruiis lanceolatis serratis laeuibus, caule pedunculisque glabris.

angustifolius. 10. H. fol. alternis linearibus. *Caulis purpurascens, sesquipedalis. Folia linearia, acuminata, scabra, margine reuoluta, subtus pallida. Corollae discus fuscus; radius saturate luteus, emarginatus.*

diuaricatus. 11. H. fol. oppositis sessilibus ouato-oblongis trineruiis, panic. dichotoma.

atrorubens. 12. H. fol. oppositis spatulatis crenatis triplineruiis scabris, squamis calycinis erectis longitudine disci.

980. RVDBECKIA. *Recept.* paleaceum, conicum. *Pappus* margine 4-dentato. *Cal.* 2-plici ordine squamarum.

1279.

laciniata. 1. R. fol. compositis laciniatis.

triloba. 2. R. fol. spatulatis: inferioribus trilobis, superioribus indiuisis.

hirta. 3. R. fol. indiuisis spatulato-ouatis, radii petalis emarginatis. Rudbeckia ramis indiuisis vnifloris, foliis ouato-lanceolatis, hirta. *Buttn. cun.* 227.

purpurea. 4. R. fol. lanceolato-ouatis alternis indiuisis, radii petalis bifidis.

oppositifolia. 5. R. fol. oppositis lanceolato-ouatis serratis, radii petalis bifidis.

angustif. 6. R. fol. oppositis linearibus integerrimis.

981. COREOPSIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* bicornis. *Cal.* erectus, polyphyllus, basi radiis patentibus cinctus.

1281.

verticill. 1. C. fol. decomposito-pinnatis linearibus.

coronata. 2. C. fol. pinnatis serratis lineatis glabris.

leucantha. 6. C. fol. pinnatis serratis, radio florum diuersicolore.

chrysantha. 5. C. fol. ternatis ouato-oblongis serratis, radio florum concolore.

tri-

tripteris. 9. C. fol. subternatis integerrimis.
alba. 8. C. fol. subternatis cuneatis serratis.
reptans. 3. C. fol. serratis ouatis : summis ternatis, caule repente.
auriculat. 7. C. fol. integerrimis ouatis: inferioribus ternatis.
lanceolat. 10. C. fol. lanceolatis integerrimis ciliatis.
Bidens. 4. C. fol. lanceolatis serratis oppositis amplexicaulibus.
alternifolia. 11. C. fol. lanceolatis serratis alternis petiolatis decurrentibus.

983. OSMITES. *Recept.* paleaceum. *Pappus* obsoletus. *Cor.* radii ligulatae. *Cal.* imbricatus, scariosus.
1285.

Bellidiastrum. 1. O. fol. linearibus carnosis, caul. scariosis.
camphorina. 2. O. fol. lanceolatis subserratis.
Asteriscoides. 3. O. fol. lanceolatis punctatis, caul. foliosis.

981. GORTERIA. *Recept.* nudum. *Pappus* lanatus. *Cor.* radii ligulatae. *Cal.* imbricatus squamis spinosis.
1283.

personata. 1. G. fol. lanceolatis integris sinuatisque, caul. erecto, flor. pedunculatis.
rigens. 2. G. scapis vnifloris, fol. lanceolatis pinnatifidis, caul. depresso,
squarrosa. 3. G. fol. lanceolatis decurrentibus ciliato-spinulosis, flor. sessilibus.
ciliaris. 4. G. fol. imbricatis bifariam ciliatis: ciliis exterioribus spinaque terminali reflexis.
fruticosa. 5. G. fol. lanceolatis integris dentato-spinosis subtus tomentosis, caule fruticoso. *Folia etiam calycina subtus tomentosa.*

1271. ZOEGEA. *Recept.* setosum. *Pappus* setaceus. *Cor.* radii ligulatae. *Cal.* imbricatus.

Leptaurea. ZOEGEA. *Mant.* 117. *Radius ligulatus distinguit Centauream.*

984. CENTAVREA. *Recept.* ſetoſum. *Pappus* ſimplex. *Cor.* radii infundibuformes, longiores, irregulares.

1285.

* Iaceae: *calycibus laeuibus inermibus.*

Crupina. 1. C. calyc. inermibus: ſquamis lanceolatis, fol. pinnatis ſerratis. *Semen ſaepius 1 ſ. 2. in flore.*

moſchata. 2. C. calyc. inermibus ſubrotundis glabris: ſquamis ouatis, fol. lyrato-dentatis.

erucifolia. 3. C. calycibus inermibus: ſquamis lanceolatis, fol. lanceolatis ſubdentatis. Iacea maior exotica. *Pluk. phyt. 39. f. 3. mala.*

lippii. 4. C. calyc. inermibus: ſquamis mucronatis, fol. ſubdecurrentibus lyrato-dentatis. Herba *palmaris, facie fere Cyani*; Caulis *ramoſiſſimus*: Folia *ſaepius ſeſſilia, rarius decurrentia.* Calyces *pedunculati, imbricati ſquamis apice mucrone ſcarioſo.* Corollae *purpureae radio magno.* Floſculi *radii* 9-12, *lineares*, 3 *ſ.* 4-*partiti*; *Floſc. diſci totidem.*

alpina. 6. C. calyc. inermibus: ſquamis ouatis obtuſis, fol. pinnatis glabris integerrimis: impari ſerrato.

Centaureum. 7. C. calyc. inermibus: ſquamis ouatis, fol. pinnatis: foliolis ſerratis decurrentibus.

* * Cyani: *calycinis ſquamis ſerrato-ciliatis.*

phrygia. 8. C. calyc. recuruato-plumoſis, fol. indiuiſis oblongis ſcabris.

capillata. 10. C. calyc. recuruato-plumoſis, fol. imis pinnatis dentatis; ſumis lanceolatis.

uniflora. 62. C. calyc. recuruato-plumoſo, fol. lanceolatis ſubdentatis tomentoſis. *Mant.* 118.

linifolia. 63. C. calyc. recuruato-plumoſis, fol. linearibus ſparſis. *Mant.* 117.

pectinata. 9. C. calyc. erecto-plumoſis, fol. lyratis denticulatis; rameis lanceolatis integerrimis.

nigra. 11. C. calyc. ciliatis: ſquamula ouata: ciliis capillaribus erectis, fol. lyrato-angulatis, flor. floſculoſis. *Similis C. Iaceae.*

pul-

pullata. 12. C. calyc. ciliatis verticillato-foliosis, fol. lyratis dentatis obtusis.

montana. 13. C. calyc. serratis, fol. lanceolatis decurrentibus, caule simpliciſſimo.

Cyanus. 14. C. calyc. serratis, fol. linearibus integerrimis; infimis dentatis.

paniculata. 15. C. calyc. ciliatis: squamis planis, fol. bipinnatis: rameis pinnatifidis linearibus, caul. paniculato.

spinosa. 16. C. calyc. subciliato, ramis spinosis.

ragusina. 17. C. calyc. ciliatis, fol. tomentosis pinnatifidis: foliolis obtusis ouatis integerrimis: exterioribus maioribus.

cineraria. 18. C. calyc. ciliatis terminali-sessilibus, fol. tomentosis bipinnatifidis: lobis acutis.

argentea. 19. C. calyc. serratis, fol. tomentosis: radicalibus pinnatis: foliolis inauritis.

sibirica. 20. C. calyc. ciliatis, fol. tomentosis indiuisis pinnatifidisque integerrimis, caule declinato.

semperuirens. 21. C. calyc. ciliatis, fol. lanceolatis serratis: infimo dente substipulatis; inferioribus hastatis.

Scabiosa. 22. C. calyc. ciliatis, fol. pinnatifidis: pinnis lanceolatis.

Stoebe. 24. C. calyc. ciliatis oblongis, fol. pinnatifidis linearibus integerrimis.

acaulis. 25. C. calyc. ciliatis, fol. lyratis, caule subnullo.

* * * Rhapontica: *calycinis squamis aridis scariosis.*

orientalis. 23. C. calyc. scariosis ciliatis, fol. pinnatifidis: pinnis lanceolatis. *Similis C. scabiosae.*

Behen. 26. C. calycibus scariosis, fol. radicalibus lyratis: lobis oppositis; caulinis amplexicaulibus.

repens. 28. C. calyc. scariosis, fol. lanceolatis subpetiolatis dentatis, pedunc. filiformibus aphyllis.

lacea. 29. C. calyc. scariosis laceris, fol. lanceolatis: radicalibus sinuato-dentatis, ramis angulatis.

amara. 27. C. calyc. scariosis, fol. lanceolatis integerrimis, caul. decumbentibus. *Varietas C. laceae secundum Ger. prou.* 188.

alba. 30. C. calyc. scariosis integris mucronatis, fol. pinnato-dentatis: caulinis linearibus basi dentatis.

splen-

ſplendens. 31. C. calyc. ſcarioſis obtuſis, fol. radicalibus bipinnatifidis; caulinis pinnatis: dentibus lanceolatis.

Rhapontica. 32. C. calyc. ſcarioſis, fol. ouato-oblongis denticulatis integris petiolatis, ſubtus tomentoſis.

glaſtifol. 33. C. calyc ſcarioſis, fol. indiuiſis integerrimis decurrentibus.

conifera. 34. C. calyc. ſcarioſis, fol. tomentoſis: radicalibus lanceolatis; caulinis pinnatifidis, caule ſimplici.

* * * * *Stoebe: calycinis ſpinis palmatis.*

ſonchifolia. 35. C. calyc. palmato-ſpinoſis, fol. decurrentibus ſpinuloſis repando-dentatis.

ſeridis. 36. C. calyc. palmato-ſpinoſis; fol. decurrentibus tomentoſis oblongis: infimis ſinuato-dentatis.

romana. 37. C. calyc. palmato-ſpinoſis, fol. decurrentibus inermibus: radicalibus pinnatifidis: impari maximo,

tphaerocephala. 38. C. calyc. palmato-ſpinoſis, fol. ouato-lanceolatis petiolatis dentatis.

iſnardi. 39. C. calyc. palmato-ſpinoſis, fol. lyrato-dentatis hiſpidis ſubamplexicaulibus, flor. ſeſſilibus terminalibus.

napifolia. 40. C. calyc. palmato-ſpinoſis, fol. decurrentibus ſinuatis ſpinuloſis: radicalibus lyratis.

aſpera. 41. C. calyc. palmato-triſpinoſis, fol. lanceolatis dentatis. *Calyc. ſpinae* 3-5-*plices.*

* * * * *Calcitrapae: calycinis ſpinis compoſitis.*

Benedicta. 42. C. calyc. duplicato-ſpinoſis lanatis inuolucratis, fol. ſemidecurrentibus denticulato-ſpinoſis.

eriophora. 43. C. calyc. duplicato-ſpinoſis lanatis, fol. ſemidecurrentibus integris ſinuatisque, caule prolifero.

aegyptiaca. 64. C. calyc, duplicato-ſpinoſis ſublanatis, fol ſeſſilibus lanceolatis integris dentatisque, caul. prolifero. *Mant.* 118.

Calcitrapa. 44. C. calyc. ſubduplicato-ſpinoſis ſeſſilibus, fol. pinnatifidis linearibus dentatis, caule piloſo.

Calcitrapoides. 45. C. calyc. ſubduplicato-ſpinoſis, fol. amplexicaulibus lanceolatis indiuiſis ſerratis.

ſolſtitialis. 46. C. calyc. duplicato-ſpinoſis ſolitariis, fol. rameis decurrentibus inermibus lanceolatis; radicalibus lyrato-pinnatifidis.

meli-

melitenſis. 47. C. calyc. duplicato-ſpinoſis confertis terminalibus, fol. decurrentibus lanceolatis ſinuoſis inermibus.

ſicula. 48. C. calyc. ciliato-ſpinoſis terminalibus, fol. decurrentibus lyratis inermibus incanis.

centauroides. 49. C. calyc. ciliatis ſpinoſis, fol. lyrato-pinnatis integerrimis: lacinia impari maiore.

rupeſtris. 50. C. calyc. ciliatis ſpinoſis, fol. bipinnatis linearibus.

collina. 51. C. calyc. ciliatis inermibus ſpinoſis, fol. radicalibus bipinnatifidis, caul. acutangulo.

* * * * * *Crocodiloidea: ſpinis ſimplicibus.*

Verutum. 52. C. calyc. ſimpliciſſime ſpinoſis: dentibus duobus oppoſitis, fol. lanceolatis integris decurrentibus.

ſalmantica. 54. C. calyc. ſetula ſubſpinoſa exſtante glabris, fol. lyrato-runcinatis ſerratis.

cichoracea. 53. C. calyc. ſetaceo-ſpinoſis, fol. decurrentibus indiuiſis ſerrato-ſpinoſis.

muricata. 55. C. calyc. ſimpliciſſime ſpinoſis, fol. inferioribus pinnatifidis; ſuperioribus lanceolatis, pedunc. longiſſimis.

peregrina. 56. C. calyc. ſetaceo-ſpinoſis, fol. lanceolatis petiolatis: inferne dentatis.

radiata. 65. C. calyc. ſubinermibus ſubariſtatis radiatis, fol. pinnatifidis. Xeranthemum *erucifolium* fol. pinnatifidis. *Sp. pl.* 1201. *n.* 2. *An Zoegeae ſpecies.*

nudicaulis. 58. C. calyc. ſetaceo-ſpinoſis, fol. indiuiſis: ſuperioribus ſubdentatis, caule nudiuſculo vnifloro ſimplici. *Ger. prou.* 187. *t.* 5.

crocodylium. 57. C. calyc. ſcarioſis ſimpliciſſime ſpinoſis, fol. pinnatifidis integerrimis: lacinia extima maiore dentata.

pumila. 59. C. calyc. ſimpliciſſime ſpinoſis, foliis dentato-pinnatis villoſis, caule nullo.

tingitana. 60. C. calyc. margine ſpinoſis, fol. lanceolatis indiuiſis ſerrato-ſubſpinoſis. †

galactites. 61. C. calyc. ſetaceo-ſpinoſis, fol. decurrentibus ſinuatis ſpinoſis ſubtus tomentoſis.

POLY-

POLYGAMIA. NECESSARIA.

985. MILLERIA. *Recept.* nullum. *Pappus* nullus. 1301. *Cal.* 3-valuis. *Radius* corollae dimidiatus.

quinquefl. 1. M. fol. cordatis, pedunculis dichotomis.
biflora. 2. M. fol. ouatis, pedunculis ſimpliciſſimis.

986. SILPHIVM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* marginato-bicornis. 1301. *Cal.* ſquarroſus.

laciniatum. 1. S. fol. alternis pinnato-ſinuatis. *Linn. dec. 1.*
perfoliat. 2. S. fol. oppoſitis deltoidibus petiolatis perfoliatis.
Aſteriſcus. 3. S. fol. indiuiſis ſeſſilibus oppoſitis; inferioribus alternis.
ſolidaginoides. 4. S. fol. oppoſitis petiolatis lanceolatis acute ſerratis.
trifoliat. 5. S. fol. ternis.
trilobatum. c. S. fol. oppoſitis ſeſſilibus cuneiformibus.

987. POLYMNIA. (Tetragonotheca 976.) *Recept.* paleaceum. *Pappus* nullus. 1303. *Cal. exterior* 4 ſ. 5-phyllus; *interior* 10-phyllus foliolis concauis.

canadenſ. 1. P. fol. alternis haſtato-ſinuatis.
Vuedalia. 2. P. fol oppoſitis haſtato-ſinuatis.
Tetragonotheca. P. fol. oppoſitis ſpatulatis ſubdentatis. Tetragonotheca helianthoides. *Sp. pl.* 1273.
wedelia. P. fol. lanceolatis, caule fruticoſo. *Mant.* 118. *Calyx exterior huius, vti praecedentis tetraphyllus, nec vt primi pentaphyllus. Haec differt a reliquis petalis radii emarginatis et ſeminibus pappo plano decemdentato.*

988. CHRYSOGONVM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 1-phyllus, 3-dentatus. *Cal.* 5-phyllus. *Sem.* calyculo 4-phyllo inuoluta.
1303.

virgin. 1. C. petiolis folio longioribus.

989. MELAMPODIVM. *Recept.* paleaceum, conicum. *Pappus* 1-phyllus, vuluiformis. *Cal.* 5-phyllus.
1303.

americ- 1. M. caul. erecto, fol. ſublinearibus vtrinque vnidentatis.
auſtrale. 2. M. caul. decumbente, fol. ouatis ſerratis. †

990. CALENDVLA. *Recept.* nudum. *Pappus* nullus *Cal.* polyphyllus, aequalis. *Sem.* diſci membranacea.
1303.

aruenſis. 1. C. ſem. cymbiformibus muricatis incuruatis: extimis erectis protenſis.
ſanctа. 2. C. ſem. vrceolatis obouatis laeuibus, calyc. ſubmuricatis.
officinalis. 3. C. ſem. cymbiformibus muricatis incuruatis omnibus.
pluuialis. 4. C. fol. lanceolatis ſinuato-denticulatis, caule folioſo, pedunc. ſiliformibus.
hybrida. 5. C. fol. lanceolatis dentatis, caule folioſo, pedunc. ſuperne incraſſatis.
nudicaul. 6. C. fol. lanceolatis ſinuato-dentatis, caule ſubnudo.
gramini-folia. 7. C. fol. linearibus ſubintegerrimis. caule ſubnudo.
fruticoſa. 8. C. fol. obouatis ſubdentatis, caule fruticoſo decumbente. *Mill. ic. 189. t. 283.*

991. ARCTOTIS. *Recept.* villosum. *Pappus* corona pentaphylla. *Cal.* imbricatus: squamis apice scariosis. 1305.

calendulacea. A. flosculis radiantibus sterilibus, fol. runcinatis subtomentosis.
a. A. flosc. radiant. sterilib. duodenis subintegris 3.
hypochondriaca. *β.* A. flosc. radiant. sterilib. trifidis media inflexa.
trifis. *γ.* A. flosc. radiant. sterilib. quadripartitis 2.
coruscans. *δ.* A. flosc. radiant. sterilib. tripartitis: exteriore trifida.
superba. *ε.* A. flosc. radiant. sterilib. quinquepartitis. 1.
plantaginea 5. A. flosculis radiantibus fertilibus, fol. lanceolato-ouatis neruosis denticulatis amplexicaulibus.
angustifolia. 6. A. flosculis radiantibus fertilibus, fol. lanceolatis integris dentatis.
aspera. 7. A. flosculis radiantibus fertilibus, fol. pinnato-sinuatis villosis: laciniis oblongis dentatis.
paradoxa. 8. A. flosculis radiantibus sterillibus, paleis coloratis disco longioribus, fol- bipinnatis linearibus.
paleacea. 9. A. flosculis radiantibus sterillibus, paleis flosculos disci aequantibus, fol. pinnatis linearibus.
dentata. 11. A. flosculis radiantibus sterilibus, fol. pinnatis: pinnis pinnatifido-dentatis.
anthemoides. 12. A. paleis flosculo breuioribus, fol. supradecompositis linearibus.
acaulis. 4. A. pedunc. radicalibus, fol. lyraris.

992. OSTEOSPERMVM. *Recept.* nudum. *Pappus* nullus. *Cal.* polyphyllus. *Sem.* globosa, colorata, ossea. 1308.

pisiferum. 1. O. fol. lanceolatis mucronatis subpetiolatis glabris serratis, ramulis denticulato-angulatis.
ilicifolium. 2. O. fol. oblongis dentato-angulatis scabris semiamplexicaulibus, ramis sulcatis.
spinosum. 3. O. spinis ramosis.
monilifer. 4. O. fol. ouatis serratis petiolatis subdecurrentibus.

poly-

polygaloides. 5. O. fol. lanceolatis subimbricatis ducurrentibus glabris integerrimis.

993. OTHONNA. *Recept.* nudum. *Pappus* subnullus. *Cal.* 1-phyllus, multifidus, subcylindricus.
1309.

bulbosa. 1. O. fol. oblongis nudis petiolatis, caul. herbaceo, pedunc. vnifloris longissimis.
Tagetes. 2. O. fol. linearibus pinnatis subdentatis.
pectinata. 3. O. fol. pinnatifidis: laciniis linearibus parallelis.
abrotanifolia. 4. O. fol. multifido-pinnatis linearibus, caul. geniculis villosis.
coronopifolia. 5. O. fol. infimis lanceolatis integerrimis: superioribus sinuato-dentatis.
cheirifolia. 6. O. fol. lanceolatis trineruiis integerrimis, caul. suffruticoso repente. (*Excluso Synonymo Hort. cliff.*) *Mill. ic. 245. f. 1.*
crassifolia. 8. O. fol. lanceolatis integerrimis subcarnosis, caule erecto. *Mant. 118.*
tenuissima. 9. O. fol. filiformibus carnosis, caule fruticoso. *Mant. 118. Flores non vidi.*
arborescens. 7. O. fol. oblongis integerrimis, caul. arborescente carnoso cicatricibus lanatis.

994. ERIOCEPHALVS. *Recept.* subvillosum. *Pappus* nullus. *Cal.* 10-phyllus, aequalis. *Radii* flosculi 5.
1310.

african. 1. E. fol. integris diuisisque, flor. corymbosis.
racemosus. 2. E. fol. linearibus indiuisis, flor. racemosis.
pectiniformis. 3. E. fol. planis pinnatis. Tanacetum fruticosum. *vid. Cotula. Sp. pl. 1183. Structura fructificationis adeo affinis reliquis Eriocephalis, vt demta lana & radii figura conueniat, vix genere separanda.*

995. FILAGO. *Recept.* nudum. *Pappus* nullus. *Cal.* imbricatus. *Floſculi feminei* inter ſquamas calycis locati.
1311.

acaulis. 1. F. flor. acaulibus ſeſſilibus, fol. floralibus maioribus.
germanica. 2. F. panic. dichotoma, flor. rotundatis axilaribus hirſutis, fol. acutis.
pyramidata. 3. F. caul. dichotomo, flor. pyramidatis pentagonis axillaribus, floſcul. femineis ſerratis.
montana. 4. F. caul. ſubdichotomo erecto, flor. conicis terminalibus axilaribusque.
gallica. 5. F. caul. dichotomo erecto, flor. ſubulatis axillaribus, fol. filiformibus.
aruenſis. 6. F. caule paniculato, flor. conicis lateralibus.
Leontopodium. 7. F. caule ſimpliciſſimo, capitulo terminali bracteis hirſutiſſimis radiato. *Fructificatio attente deſcribenda: plurima abſoluit D. Scopoli.*

996. MICROPVS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* nullus. *Cal.* calyculatus. *Radius* corollae nullus. *Floſculi feminei* a ſquamis calycinis inuoluti.
1314.

ſupinus. 1. M. caule procumbente, foliis geminis.
erectus. 2. M. caule erecto, calycibus edentulis ſolitariis.

POLYGAMIA SEGREGATA.

997. ELEPHANTOPVS. *Calyculus* 4-florus. *Corollulae* ligulatae, hermaphroditae. *Recept.* nudum. *Pappus* ſetaceus.
1313.

ſcaber. 1. E. fol. oblongis ſcabris.
tomentoſ. 2. E. fol. ouatis tomentoſis.

998. SPHAERANTHVS. *Calyc.* 8-flori. *Coroll.* tubulosae hermaphroditae & obsoletae femineae. *Recept.* squamosum. *Pappus.* nullus.
1314.

indicus. 1. S. fol. decurrentibus lanceolatis serratis, pedunc. crispatis,
africanus. 2. S. fol. decurentibus ouatis serratis, pedunc. teretibus. *Mant. 119.*
chinensis. 3. S. fol. sessilibus pinnatifidis. *Mant. 119.*

999. ECHINOPS. *Calyc.* 1-florus. *Coroll.* tubulosae, hermaphroditae. *Recept.* setosum. *Pappus* obsoletus.
1314.

sphaerocephalus. 1. E. capitulis globosis, fol. sinuatis pubescentibus.
spinosus. 4. E. capitulis insperfis spinis longis. *Mant. 119.*
Ritro. 2. E. capit. globoso, fol. pinnatifidis supra glabris.
strigosus. 3. E. capit. fasciculatis, cal. lateralibus sterilibus, fol. supra strigosis.

1000. GVNDELIA. *Calyc.* 0, 5-florus. *Coroll.* tubulosae masculae & hermaphroditae. *Recept.* paleaceum, *Pappus* nullus.
1315.

tournefortii. 1. GVNDELIA.

1001. STOEBE. *Calyc.* 1-florus. *Coroll.* tubulosae hermaphroditae. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus.
1315.

aethiopica. 1. STOEBE.

MONOGAMIA.

1003. SERIPHIVM. *Cal.* imbricatus. *Cor.* 1-petala, regularis *Sem.* 1, oblongum, infra corollam.
1316.

cinereum. 1. S. flor. verticillato-ſpicatis, fol. patentibus.
plumoſum. 2. S. flor. ſpicatis, fol. granulato-ouatis.
fuſcum. 3. S. flor. capitatis, fol. imbricatis.
corymbiferum. 4. S. flor. faſciculatis, fol. oblongis appreſſis *Mant. 119.*

1002. STRVMPFIA. *Cal.* 5-dentatus, ſuperus. *Cor* 5-petala. *Bacca* monoſperma.
1316.

maritima. 1. STRVMPFIA.

1004. CORYMBIVM. *Cal.* 2-phyllus, 1-florus, prismaticus. *Cor.* 1-petala, regularis. *Sem.* 1, infra corollulam, lanatum.
1317.

ſcabrum. 1. C. caule ſcabro. *Mant. 120. Pluk. alm. 73. t. 272. f. 5. Burm. afric. 189. t. 70. f. 1.* Corymbus *ſtrictus:* Floribus *geminis ſibi approximatis: bracteis 4 f. 5, linearibus.* Calyx. *clauatus: valuulis nauicularibus, non inuoluentibus. Dau. Royen.*
glabrum. 2. C. caule laeui, axillis lanatis. *Pluk. alm. 73. t. 272. f. 4.* Panicula *laxa, effuſa.* Flores *diſtincti: Bracteis 2 f. 3, minutis.* Calyx *cylindricus: valuula vna alteram amplexante. Dau. Royen.*

1005. JASIONE. *Cal.* communis 10-phyllus. *Cor.* 5-petala, regularis. *Capſ.* infera, bilocularis.
1317.

montana. 1. IASIONE.

1006. LOBELIA. *Cal.* 5-fidus. *Corolla* 1-petala, irregularis. *Capſula* infera, 2-ſ. 3-locularis.
1317.

* *Foliis integerrimis.*

plumieri. 1. L. fruteſcens, fol. ouali-oblongis integerrimis. *Jacq. amer. 219. Stamina diſtincta. Nux bilocularis.*
pinifolia. 2. L. fruticoſa, fol. linearibus confertis integerrimis.
Dortmanna. 3. L. fol. linearibus bilocularibus integerrimis, caule ſubnudo.
Tupa. 4. L. fol. lanceolatis integerrimis, racemo ſpicato.
kalmii. 5. L. caule erecto, fol. lanceolato-linearibus obtuſiuſculis alternis integerrimis, racemo terminali.
paniculat. 6. L. fol. linearibus integerrimis, panic. dichotoma.
cornuta. 7. L. fol. ouatis petiolatis, ſtam. longiſſimis.

* * *Caule erecto, fol. inciſis.*

Phyteuma. 8. L. fol. ouato-oblongis crenatis, caule ſubnudo ſpicato, antheris hirſutis diſtinctis.
bulboſa. 9. L. caule erecto, foliis inferioribus pedatis.
triquetra. 27. L. caule erecto, fol. lanceolatis dentatis, racemo terminali aphyllo. *Mant. 120.*
longiflora. 11. L. fol. lanceolatis dentatis, pedunc. breuiſſimis lateralibus, tubo corollae filiformi longiſſimo. *Jacq. amer. 219.*
aſſurgens. 19. L. fol. lanceolatis ſerratis inferne dentatis, racem. compoſitis terminalibus.
Cardinalis. 12. L. caule erecto, fol. lato-lanceolatis ſerratis, racemo terminali ſecundo.
ſiphilitica. 13. L. caule erecto, fol. ouato-lanceolatis ſubſerratis, calycum ſinubus reflexis.
ſurinamenſis. 14. L. caule ſuffruticoſo, fol. oblongis glabris ſerratis, flor. axillaribus pedunculatis.
inflata. 15. L. caule erecto, fol. ouatis ſubſerratis pedunculo longioribus, capſ. inflatis.
cliffortiana 16. L. caule erecto, fol. cordatis obſolete dentatis petiolatis, corymbo terminali.
vrens. 18. L. caule erectiuſculo, fol. inferioribus ſubrotundis crenatis; ſuperioribus lanceolatis ſerratis, flor. racemoſis.

* * * *Caule proſtrato, foliis inciſis.*

Laurentia. 19. L. caule proſtrato, fol. lanceolato-oualibus crenatis, caule ramoſo, pedunc. ſolitariis vnifloris longiſſimis. Rapuntium creticum minimum, bellidis folio, flore maculato. *Tournef. cor. 9. Bractea ſetacea in medio pedunculi.*

Erinus. 20. L. caule patulo, fol. lanceolatis ſubdentatis, pedunc. longiſſimis.

erinoides. 21. L. caulib. procumbentibus, fol. lanceolatis ſerratis, pedunc. lateralibus.

Zeylanica. 22. L. caul. procumbentibus, fol. ouatis ſerratis acutis: inferioribus obſuſis, pedunc. vnifloris, capſ. ſubvilloſis.

lutea. 23. L. caul. procumbentibus, fol. lanceolatis ſerratis, flor. ſeſſilibus ſubſpicatis.

hirſuta. 24. L. fol. oualibus crenatis lanatis, flor. lateralibus ſolitariis.

coronopif. 25. L. fol. lanceolatis dentatis, pedunc. longiſſimis.

comoſa. 26. L. fol. linearibus dentatis, ſpica terminali folioſa.

tenella. 28. L. caulibus proſtratis filiformibus truticuloſis, fol. ouato-lanceolatis glabris vtrinque bidentatis. *Mant. 120.*

1007. VIOLA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala, irregularis, poſtice cornuta. *Capſ.* ſupera, 3-valuis, 1-locularis.
1323.

* *Acaules.*

palmata. 1. V. acaulis, fol. palmatis quinquelobis dentatis indiuiſisque.

pedata. 2. V. acaulis. fol. pedatis ſeptempartis.

pinnata. 3. V. acaulis, fol. pinnatifidis.

lanceolat. 4. V. aculis, fol. lanceolatis crenatis.

primulifolia. 5. V. acaulis, fol. oblongis ſubcordatis, petiol. membranaceis.

hirta. 6. V. acaulis, fol. cordatis piloſo-hiſpidis.

paluſtris. 7. V. acaulis, fol. reniformibus.

odorata. 8. V. acaulis, fol. cordatis, ſtolonibus reptantibus.

* * *Cau-*

* * *Caulescentes.*

canina. 9. V. caule adultiore adscendente, fol. oblongo-cordatis.
montana. 11. V. caulibus erectis, fol. cordatis oblongis.
cenisia. 10. V. caul. filiformibus indiuisis prorepentibus, fol. ouatis integerrimis glabris, stipul. indiuisis.
canadens. 16. V. caule erecto, fol. cordatis acuminatis.
mirabilis. 17. V. caule triquetro, fol. reniformi-cordatis, flor. caulinis apetalis.
biflora. 18. V. caule bifloro, fol. reniformibus serratis.
uniflora. 19. V. caule vnifloro, fol. cordatis dentatis.

* * * *Stipulis pinnatifidis; stigmate vrceolato.*

tricolor. 15. V. caule triquetro diffuso, fol. oblongis incisis, stipul. pinnatifidis.
grandiflora. 25. V. caule triquetro simplici, fol. oblongiusculis, stipul. pinnatifidis. *Mant. 120.*
calcarata. 14. V. caule abbreuiato, fol. subouatis, stip. pinnatifidis, nectariis calyce longioribus.
cornuta. 13. V. caule elongato, fol. oblongo-ouatis, stip. pinnatifidis, nectariis subulatis corolla longioribus.
arboresc. 12. V. caule fruticoso, fol. lanceolatis integerrimis.

* * * * *Floribus erectis, nec resupinatis.*

enneasperma. 20. V. caule basi ramosissimo fol. lanceolato-linearibus integerrimis distantibus, calyc. postice aequalibus.
suffruticosa. 21. V. caule procumbente, fol. lanceolatis subserratis confertis, calyc. postice aequalibus.
Calceolaria. 22. V. caul. simplici hirsuto herbaceo, fol. lanceolatis pilosis, flor. solitariis.
oppositifolia. 23. V. caul. fruffruticoso brachiato, fol. oppositis, flor. racemosis.
Hybanthus. 24. V. arborescens scandens aculeata, fol. oblongis obtusis glabris.

1008. IMPATIENS. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 5-petala, irregularis, nectario cucullato. *Capſ.* ſupera, 5-valuis.
1328.

* *Pedunculis vniſloris.*

chinenſis. 1. I. pedunc. vnifloris ſolitariis, fol. oppoſitis ouatis, nectariis arcuatis.

latifolia. 2. I. pedunc. vnifloris ſolitariis, fol. ouatis: ſerraturis lanceolatis, nectariis flore longioribus.

oppoſitif. 3. I. pedunc. vnifloris aggregatis, fol. oppoſitis linearibus.

cornuta. 4. I. pedunc. vnifloris aggregatis, fol. lanceolatis, nectariis flore longioribus.

Balſamina. 5. I. pedunc. vnifloris aggregatis, fol. lanceolatis: ſuperioribus alternis, nectariis flore breuioribus.

* * *Pedunculis multiſloris.*

triflora. 6. I. pedunc. trifloris ſolitariis, fol. anguſto-lanceolatis.

noli tangere. 7. I. pedunc. multifloris ſolitariis, ſol. ouatis, geniculis caulinis tumentibus.

CLAS-

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

1009. ORCHIS. *Nectarium* corniculatum.
1010. SATYRIVM. *Nectarium* ſcrotiforme.
1011. OPHRYS. *Nectarium* ſubcarinatum.
1012. SERAPIAS. *Nectarium* ouatum, ſubtus gibbum.
5013. LIMODORVM. *Nectarium* pedicellatum.
1015. CYPRIPEDIVM. *Nectarium* inflato-ventricoſum.
1016. EPIDENDRVM. *Nectarium* turbinatum.
1014. ARETHVSA. *Nectarium* connatum cum corolla ringente.
1272. GVNNERA. 2-gyna. Amenti. *Cal.* 0. *Cor.* 0. *Sem.* 1.

TRIANDRIA.

1017. SISYRINCHIVM. 1-gyn. *Cal.* 0. *Cor.* 6-petala, plana. *Stigmata* 3. *Capſ.* 3-locularis, infera.
1018. FERRARIA. 1-gyn. *Cal.* 0. *Cor.* 6-petala, criſpa. *Stigma* cucullatum. *Capſ.* 3-locularis, infera.
1273. STILAGO. 1-gyn. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* 0. *Bacca.*

TETRANDRIA.

1019. NEPENTHES. 1-gyn. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* nulla. *Capſ.* 4-locularis.

PENTANDRIA.

1020. AYENIA. 1-gyn. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 5-cocca.
1021. PASSIFLORA. 3-gyn. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* pedicellata.

HEXANDRIA.

1022. ARISTOLOCHIA. 6-gyn. *Cal.* nullus. *Cor.* 1-petala. *Capſ.* 6-locularis.

* *Cleome.*

1024. PISTIA. 1-gyn. *Cal.* nullus. *Cor.* 1-petala. *Capſ.* 1-locularis.

DECANDRIA.

1024. KLEINHOVIA. 1-gyn. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Nectarium* ſtaminiferum. *Capſ.* 5-cocca-

1025. HELICTERES. 1-gyn. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 5, 1-loculares, polyſpermae.

DODECANDRIA.

1232. CYTINVS. 1-gyn. *Cal.* 4fidus. *Cor.* o. *Bacca* 8-locularis.

POLYANDRIA.

1927. XYLOPIA. 1-gyn. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* 6-petala. *Druppa* ſicca.

1026. GREWIA. 1-gyn. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* locularis.

1031. POTHOS. Spatha. *Cal.* nullus. *Cor.* 4-petala. *Bacca* 1-ſperma.

1029. DRACONTIVM. Spatha. *Cal.* nullus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* polyſperma.

1030. CALLA. Spatha *Cal.* nullus. *Cor.* nulla. *Stam.* mixta piſtillis.

1028. ARVM. Spatha. *Cal.* nullus. *Cor.* nulla. *Stam.* ſupra piſtilla.

1238. AMBROSINIA. Spatha. *Cal.* nullus. *Cor.* nulla. *Stamina* alterius lateris diſſepimenti, alterius *piſtilla.*

1032. ZOSTERA. Folium. *Cal.* nullus. *Cor.* nulla. *Sem.* alterna, nuda.

DIANDRIA.

1009. ORCHIS. *Nectarium* corniforme pone florem. 1330.

* *Corollae galea calcarata.*

bicornis. 1. O. bulbis indiuiſis, corollis galea bicalcarata; labio quinquepartito.

biflora. 2. O. bulbis indiuiſis, corollis galea vnicalcarata, alis patentibus; labio lanceolato acuminato.

cornuta. 3. O. bulbis indiuiſis, corollis galea vnicalcarata; alis patentibus; labio minimo ſubouato.

* * *Bulbis indiuiſis.*

ſancta. 4. O. bulbis indiuiſis? nectarii labio lanceolato quinquedentato: cornu incuruo, petalis conniuentibus.

ſuſannae. 5. O. bulbis indiuiſis, nectarii alis amplioribus ciliatis.

ciliaris. 7. O. bulbis indiuiſis, nectarii labio lanceolato ciliato: cornu longiſſimo.

habenaria. 6. O. bulbis . . . nectarii labio tripartito: lateralibus ſetaceis; cornu filiformi petalis decuplo longiore.

bifolia. 8. O. bulbis indiuiſis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longiſſimo, petalis patentibus.

flexuoſa. 9. O. bulbis indiuiſis, nectarii labio imbricato, petalis duobus occultatis filiformibus: ſcapo flexuoſo.

cucullata. 11. O. bulbis indiuiſis, nectarii labio trifido, petalis confluentibus, caule nudo.

globoſa. 13. O. bulbis indiuiſis, nectarii labio trifido: trilobo cornu breui petalis apice ſubulatis. *Bulbi fuſiformes. Spica denſiſſima breuis; Flores reſupinati, purpuraſcentes.*

pyramidalis. 12. O. bulbis indiuiſis, nectarii labio bicorni trifido aequali integerrimo, cornu longo, petalis ſublanceolatis.

coriophora. 14. O. bulbis indiuiſis, nectarii labio trifido reflexo crenato: cornu breui, petalis conniuentibus

cubitalis. 15. O. bulbis indiuiſis, nectarii labio trifido filiformi: intermedia ouata; cornu germinibus breuiore.

Morio. 16. O. bulbis indiuiſis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuſo adſcendente, petalis obtuſis conniuentibus.

maſcu-

maſcula. 17. O. bulbis indiuiſis, nectarii labio quadrilobio crenulato: cornu obtuſo, petalis dorſalibus reflexis. *Differt ab O. morione Petalis exterioribus acutioribus longioribus; Labelli lacinia media ſ. bifida lateralibus longiore.*

vſtulata. 18. O. bulbis indiuiſis, nectarii labio quadrifido punctis ſcabro: cornu obtuſo, petalis diſtinctis. *Oed. dan. t. 103.*

militaris. 19. O. bulbis indiuiſis, nectarii labio quinquefido punctis ſcabro: cornu obtuſo, petalis confluentibus.

papilionacea. 10. O. bulbis indiuiſis, nectarii labio indiuiſo crenato emarginato ampliato: cornu ſubulato, petalis conniuentibus.

burmanniana. 20. O. bulbis indiuiſis, nectarii labio multipartito lineari, fol. cordato-amplexicauli, ſcapo vnifloro.

* * * *Bulbis palmatis.*

latifolia. 21. O. bulbis ſubpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus.

incarnata. 23. O. bulbis palmatis, nectarii cornu conico: labio obſcure trilobo ſerrato, petalis dorſalibus reflexis. *Hall. emend. 178.*

ſambucina. 22. O. bulbis ſubpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio ouato ſubtrilobo, bracteis longitudine florum. *Fl. ſuec. 2. n. 803.*

maculata. 24. O. bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus breuiore: labio plano, petalis dorſalibus erectis. *Caulis non fiſtuloſus.*

cordatiſſima. 25. O. bulbis palmatis, nectarii cornu recuruo breuiore: labio trilobo, foliis linearibus.

conopſea. 26. O. bulbis palmatis, nectarii cornu ſetaceo germinibus longiore: labio trifido, petalis duobus patentiſſimis.

flaua. 27. O. bulbis palmatis, nectarii cornu filiformi longitudine germinis: labio trifido integerrimo.

* * * * *Bulbis faſciculatis.*

fuſceſcens. 28. O. bulbis faſciculatis, nectarii cornu longitudine germinis, labio ouato baſi dentato.

ſtraten-

ſtrateuma-tica. 29. O. bulbis faſciculatis, nectarii labio bilobo integerrimo: cornu longitudine germinis.

hyperborea. 33. O. bulbis faſciculatis, nectarii cornu longitudine germinis: labio lineari integerrimo truncato. *Mant. 121. Koenig.*

abortiua. 30. O. bulbis faſciculatis filiformibus, nectarii labio ouato integerrimo, caule aphyllo.

* * * * * *Bulbis etiamnum ignotis.*

pſycodes. 31. O. nectarii cornu ſetaceo longitudine germinis: labio tripartito ciliari.

ſpectabilis. 32. O. nectarii cornu longitudine germinis: labio ouali emarginato, caule aphyllo, fol. oualibus.

1010. SATIRIVM. 1337.

Nectarium ſcrotiforme ſ. inflato-didymum pone florem.

hircinum. 1. S. bulbis indiuiſis, fol. lanceolatis, nectarii labio trifido: intermedia lineari obliqua praemorſa.

viride. 2. S. bulbis palmatis, fol. oblongis obtuſis, nectarii labio lineari trifido: intermedia obſoleta. *Oed. dan. t. 77. Sequ. ver. 2. t. 16. f. 18.*

nigrum. 3. S. bulbis palmatis, fol. linearibus nectarii labio reſupinnato trilobo: intermedia maiore. *Sequ. ver. t. 15. f. 17.*

albidum. 4. S. bulbis faſciculatis, fol. lanceolatis, nectarii labio trifido acuto: intermedia obtuſa. *Oed. dan. t. 115.*

Epipogium. 5. S. bulbis compreſſis dentatis, caule vaginato, corollis reſupinatis: nectarii labio indiuiſo. Epipactis caule aphyllo, flore ſupinato: labello ouato-lanceolato, calcare ouato turgido. *Act. bernens. 5. p. 309.*

plantagineum. 6. S. bulbis ſubfibroſis, fol. caulinis ouatis petiolatis vaginantibus, nectarii labio integro.

repens. 7. S. bulbis fibroſis, fol. ouatis radicalibus, floribus ſecundis. Epipactis foliis petiolatis ouato-lanceolatis, floribus tetrapetalis hirſutis. *Hall. act. helv. 4. p. 114. Petala 3 pubeſcentia, conglutinata.*

capenſe. 8. S. bulbis . . . nectarii labio latiore obtuſo emarginato vtrinque vndulato.

1001. OPHRYS. *Nectarium* ſubtus ſubcarinatum. 1339.

* *Bulbis ramoſis.*

Nidus auis. 1. O. bulbis fibroſo-faſciculatis, caule vaginato aphyllo, nectarii labio bifido.

Corallorhiza. 2. O. bulbis ramoſis fleuxuoſis caule vaginato, aphyllo, nectarii labio trifido.

ſpiralis. 3. O. bulbis aggregatis oblongis. caule ſubfolioſo, flor. ſpirali-ſecundis, nectarii labio indiuiſo crenulato. *Segu. ver. t. 8. f. 9. δ.* Epipactis foliis plerisque ex lineari-lanceolatis. *Gmel. ſib. 2. p. 13. t. 3. f. 1. Petala exteriora 3 conglutinata.*

cernua. 4. O. bulbis faſciculatis, caule folioſo, flor. cernuis, nectarii labio oblongo integro acuto.

ouata. 5. O. bulbo fibroſo, caule bifolio, fol. ouatis, nectarii labio bifido.

cordata. 6. O. bulbo fibroſo, caule bifolio, fol. cordatis. *Act. helu. 2. p. 75. t. 6. Labellum bifidum baſi vtrinque dente notatum, quod non in O. ouata.*

* * *Bulbis rotundis.*

linifolia. 7. O. bulbo ſubrotundo, ſcapo nudo, fol. lanceolatis, nectarii labio integro, petalis dorſalibus linearibus. *Ehret. act. angl. 1764. n. 53. p. 81. t. 4. β.* Epipactis foliis binis ouatis, bulbis pyriformibus folioſa vagina cinctis. *Hall. act. 4. p. 120.* Bifolium bulboſum. *Dod. pempt. 292. Scapus nudus, triqueter. Folia radicalia neruoſa. Flores rubri, ſed Petala 3 anguſta, linearia, viridia.*

loeſelii. 8. O. bulbo ſubrotundo, ſcapo nudo trigono, nectarii labio ouato.

paludoſa. 9. O. bulbo ſubrotundo, ſcapo ſubnudo pentagono, foliis apice ſcabris, nectarii labio integro.

monophyllos. 10. O. bulbo rotundo, ſcapo nudo, folio ouato, nectarii labio integro.

Monorch. 11. O. bulbo globoſo, ſcapo nudo, nectarii labio trifido cruciato.

alpina. 12. O. bulbis ouatis, ſcapo nudo, fol. ſubulatis, nectarii labio indiuiſo obtuſo vtrinque vnidentato.

cam.

camtſchatea. 13. O. bulbis . . . ſcapo filiformi vaginato, racemo laxo, nectarii labio lineari bifido.

antropophora. 14. O. bulbis ſubrotundis, ſcapo folioſo, nectarii labio lineari tripartito: medio elongato bifido.

inſectifera. 15. O. bulbis ſubrotundis, ſcapo folioſo, nectarii labio ſubquinquelobo.

myodes. α. O. muſcae corpus referens, minor, galea & alis herbidis.

arachnites. β. O. araneum referens.

atrata. 19. O. bulbis . . . florum cucullo ſtaminifero bicorni. *Mant.* 121.

catholica. 16. O. bulbis fibroſis, flor. tripetalis: galea ventricoſa magna: labio cruciato, ſcapo folioſo.

circumflexa. 17. O. bulbis indiuiſis, flor. tripetalis: alis emarginatis; labio trifido lateralibus circumflexis.

caffra. 18. O. bulbis . . . nectarii labio reniformi latiſſimo emarginato.

1012. SERAPIAS. *Nectarium* ouatum, gibbum, 1344. labio ouato.

latifolia. 1. S. bulbis fibroſis, fol. ouatis amplexicaulibus, flor. pendulis. *Fl. ſuec.* 819. Serapias bulbis fibroſis, nectarii labio obtuſo crenato petalis aequali, fructibus pendulis. *Hudſ. angl.* 341. Serapias bulbis fibroſis, floribus ſecundis, labello planiuſculo, petalis ouatis. *Scop. carn.* 255. Serapias bulbis fibroſis, caule multifloro, floribus ſpicatis, nectarii labio petalis breuiore. *Ger. prov.* 132. Epipactis foliis amplexicaulibus ouato-lanceolatis, labello lanceolato. *Hall. act. helv.* 4. *p.* 108. Epipactis ſ. Helleborine. *Cam. epit.* 187. Helleborine floribus e viridi & purpureo variis labello acuminato, foliis breuiſſimis. *Hall. helv.* 275. Helleborine latifolia montana. *Bauh. pin.* 186. *Folia amplexicaulia. Spica multiflora, longa. Petioli longi. Flores fructusque penduli. Nectarium lineis nullis.*

longifolia. 2. S. bulbis fibroſis, fol. enſiformibus ſeſſilibus, flor. pendulis. Serapias bulbis fibroſis, nectariis labio obtuſo longitudine petalorum *Ger. prov.* 132. Serapias bulbis fibroſis, floribus ſparſis patulis, labello

concauo petalis longiore. *Scop. carn.* 256. Epipactis foliis enſiformibus, floribus pendulis labello obtuſo oris plicatis. *Hall. act. helv.* 4. *p.* 111. Helleborine anguſtifolia paluſtris ſ. pratenſis. *Bauh. pin.* 87. *Caulis altior. Spica longa multiflora. Flores fructusque penduli. Flores duplo majores petalis latioribus. Nectarium reliquis petalis cohaerens: cymba lineis purpureis. H.*

grandiflora. 6. S. bulbis fibroſis, fol. enſiformibus, flor. erectis, nectarii labio obtuſo petalis breuiore. *It. oel.* 144. *Hudſ. angl.* 341. Serapias bulbis fibroſis, caule paucifloro, flor. diſtantibus, nectarii labio petalis breuiore. *Ger. prov.* 132. Epipactis caule folioſo paucifloro, lineis laeuibus labelli obtuſi. *Hall. act. helv.* 4. *p.* 105. *Flores albi, magni Fructusque erectus; Labellum breue minus acutum lineis eminentibus. H.*

rubra. 7. S. bulbis fibroſis, fol. enſiformibus, flor. erectis: nectarii labio acuto. Epipactis caule folioſo paucifloro, lineis vndulatis labelli acutiſſimi. *Hall. act.* 4. *p.* 103. Helleborine longifolia, paucis purpureis floribus. *Hall. helv.* 274. Helleborine montana anguſtifolia purpuraſcens. *Bauh. pin.* 187. Elleborines genus 5. *Cluſ. pan.* 275. *Flores purpurei magni Fructusque erecti. Labellum longius acutum lineis vndulatis. H.*

Lingua. 2. S. bulbis ſubrotundis, nectarii labio trifido acuminato glabro petalis longiore.

cordigera. 4. S. bulbis ſubrotundis, nectarii labio trifido acuminato maximo baſi barbato.

1013. LIMODORVM. *Nectarium* monophyllum, concauum, pedicellatum, intra petalum infimum. 1346.

tuberoſum. 1. L. floribus ſeſſilibus racemoſis alternis.

altum. 2. L. floribus pedunculatis ſparſis. *Plum. ic.* 189. *diſtincta a praecedenti nulla in floribus barba et floribus ſparſis numeroſiſſimis.*

1014. ARETHVSA. *Nectarium* tubulosum intra corollae fundum: labio inferiore stylo adnato.
1346.

bulbosa. 1. A. radice globosa, scapo vaginato, spatha diphylla.
ophioglossoides. 2. A. radice fibrosa, scapi folio ouali, foliolo spathaceo lanceolato.
diuaricata. 3. A. radice subpalmata, scapi folio folioloque spathaceo lanceolatis, petalis exterioribus adscendentibus.

1015. CYRIPEDIVM. *Nectarium* ventricosum, inflatum, cauum.
1346.

Calceolus. 1. C. radicibus fibrosis, fol. ouato-lanceolatis caulinis. *Mill. ic. t.* 242.
bulbosum. 2. C. bulbo subrotundo, fol. subrotundo radicali. *Flos pentapetalus.*

1016. EPIDENDRVM. *Nectarium* turbinatum, obliquum, reflexum.
1347.

* *Scandentes.*

Vanilla. 1. E. scandens, fol. ouato-oblongis neruosis sessilibus caulinis, cirrhis spiralibus. *Plum. ic.* 188.
Flos aëris. 2. E. caule scandente tereti subramoso, fol. lanceolatis, petalis linearibus obtusis.

* * *Caule erecto folioso.*

tenuifol. 3. E. fol. caulinis subulatis canaliculatis.
spatulatum. 4. E. fol. caulinis oblongis alternis obtusis aueniis, nectarii labio bifido diuaricato.
furuum. 5. E. caulescens, fol. imbricatis lanceolatis, racem. axillaribus.
coccineum. 6. E. fol. caulinis ensiformibus obtusis, pedunc. vnifloris axillaribus confertis.
secundum. 7. E. fol. caulinis oblongis, spicis secundis, nectarii tubo longitudine corollae.
lineare. 8. E. fol. caulinis linearibus obtusis emarginatis, caule simplici.

punctatum. 10. E. fol. lanceolatis neruosis: vaginis imbricatis, scapo paniculato corollisque punctatis.

caudatum. 11. E. fol. lanceolatis neruosis, scapo paniculato, petalis maculatis caudatis: duobus longissimis.

ouatum. 9. E. fol. caulinis ouatis acutis amplexicaulibus neruosis, scapis paniculatis.

ciliare. 12. E. fol. oblongis aueniis, nectarii labio tripartito ciliato, intermedia lineari, caule bifolio.

nocturnum. 13. E. fol. oblongis aveniis, nectarii labio tripartito integerrimo: intermedia lineari, caule multifolio. *Catesbaei et Jacquini forte distinctae species.*

cucullatum. 14. E. fol. subulatis, scapo vnifloro, nectarii labio ouato ciliato acuminato, petalis elongatis.

* * * *Scapo nudo, foliis radicalibus.*

nodosum. 15. E. fol. vnico subradicali, spadice subquadrifloro.

carinatum. 16. E. fol. oblongis obtusis compressis articulatis.

aloifolium. 17. E. fol. radicalibus oblongis obtusis superne latioribus.

guttatum. 18. E. fol. radicalibus lanceolatis canaliculatis, petalis cuneiformibus retusis.

juncifolium. 19. E. fol. subulatis sulcatis, scapo petalisque punctatis: labio immaculato dilatato.

scriptum. 20. E. fol. ouato-oblongis trineruiis, flor. racemosis maculatis.

retusum. 21. E. fol. radicalibus linearibus apice bifariam retusis, flor. racemosis maculatis.

amabile. 23. E. fol. radicalibus lato-lanceolatis aveniis, petalis lateralibus orbiculatis.

cochleatum. 22. E. fol. oblongis geminis glabris striatis bulbo innatis, scapo multifloro, nectario cordato.

tuberosum. 24. E. fol. lato-lanceolatis neruosis membranaceis bulbo innatis, scapo vaginato, nectario cymbiformi bifido.

pusillum. 25. E. fol. ensiformibus subcarnosis, scapo paucifloro.

ensifolium. 26. E. caule tereti laeui, fol. ensiformibus striatis, petalis lanceolatis glabris: labio recuruato latiore.

moniliforme. 27. E. caule tereti articulato striato moniliformi nudo simpliciſſimo, foliis linearibus acutis.

ophioglossoides. 28. E. caule vnifolio, flor. racemosis secundis.

rusci-

ruſcifolium. 29. E. caule vnifolio, flor. e ſinu folii aggregatis.
graminif. 30. E. caule vnifolio, flor. e ſinu folii geminis.

1272. GUNNERA. Amentum ſquamis vnifloris. *Cal.* o. *Cor.* o. *Germen* 2-dentatum. *Styli* 2. *Sem.* 1.

perpenſa. 1. GUNNERA. *Mant.* 121.

TRIANDRIA.

1017. SISYRINCHIVM. Monogyna. *Spatha* diphylla. *Petala* 6, plana. *Capſ.* 3-locularis, infera.
1353.

Bermud. 1. S. fol. enſiformibus eneruiis.
palmifol. 2. S. fol. enſiformibus nervoſis. *Mant.* 122.

1018. FERRARIA. Monogyna. *Spathae* vniflorae. *Petala* 6, vndulato-criſpata. *Stigmata* cucullata. *Capſ.* 3-locularis, infera.
1353.

vndulata. 1. FERRARIA.

1273. STILAGO. Monogyna. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* o. *Bacca* globoſa.

Bunius. 1. STILAGO. *Mant.* 122.

TETRANDRIA.

1019. NEPENTHES. Monogyna. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* o. *Capſ.* 4-locularis.
1354.

deſtillatoria. 1. NEPENTHES.

PENTANDRIA.

1020. AYENIA. Monogyna. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* connata in ſtellam vnguibus longis. *Antherae* 5, ſub ſtella. *Capſ.* 5-locularis.
1354.

puſilla. 1. A. fol. cordatis glabris.
tomentoſ. 2. A. fol. ouato-ſubrotundis tomentoſis.
magna. 3. A. fol. cordatis pubeſcentibus, florum germine ſeſſili.

1021. PASSIFLORA. Trigyna. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Nectarium* corona. *Bacca* pedicellata.
1355.

* *Foliis indiuiſis.*

ſerratifol. 1. P. fol. indiuiſis ouatis ſerratis.
pallida. 2. P. fol. indiuiſis ouatis integerrimis: petiolis biglanduloſis.
cupraea. 3. P. fol. indiuiſis ouatis integerrimis: petiolis aequalibus.
tiliaefolia. 4. P. fol. indiuiſis cordatis integerrimis, petiolis aequalibus.
maliformis. 5. P. fol. indiuiſis cordato-oblongis integerrimis: petiolis biglanduloſis, inuolucris integerrimis.
quadrangularis. 6. P. fol. indiuiſis ſubcordatis integerrimis: petiolis ſexglanduloſis, caule membranaceo tetragono. *Iacq. amer.* 231. *t.* 143.
laurifolia. 7. P. fol. indiuiſis ouatis integerrimis: petiolis biglanduloſis, inuolucris dentatis. *Iacq. olſ.* 35.
multiflor. 8. P. fol. indiuiſis oblongis integerrimis, flor. confertis.

* * *Foliis bilobis.*

perfoliata. 9. P. fol. bilobis oblongis transverſis amplexicaulibus petiolatis ſubtus punctatis.
rubra. 10. P. fol. bilobis cordatis acuminatis.
normalis. 11. P. fol. bilobis baſi emarginatis: lobis linearibus obtuſis diuaricatis: intermedio obſoleto mucronato. *Brown. iam.* 328. *n.* 11.

Muru-

Ayeniae *Florem qui intelligat, ſeparet petala a baſi germinis.*

Murucuja. 12. P. fol. bilobis obtuſis baſi indiuiſis, nectariis monophyllis.

Veſpertilio. 13. P. fol. bilobis baſi rotundatis glanduloſisque: lobis acutis diuaricatis: ſubtus punctatis.

capſularis. 14. P. fol. bilobis cordatis oblongis petiolatis.

* * * *Foliis trilobis.*

rotundifolia. 15. P. fol. ſubtrilobis obtuſis ſubrotundis, ſubtus punctatis. *Petioli absque glandulis. Folia ſubtus inter neruos longitudinali ordine punctata. Iacq. obſ. 2. t. 46. f. 1.*

punctata. 16. P. fol. trilobis oblongis ſubtus punctatis: intermedio minore. *Flos albidus.* Petala *calyce breuiora.* Nectarii *ambitus exterior radiis* 30 *luteis, longitudine fere petalorum, clauatis. Intermedius ordo capillaris breuior. Intimus plicatus, truncatus, etiam viridis.* Receptaculum *tectum operculo concauo ſtriato albido.*

lutea. 17. P. fol. trilobis cordatis aequalibus obtuſis glabris integerrimis.

ſuberoſa. 18. P. fol. trilobis ſubpeltatis, cortice ſuberoſo.

holoſeric. 19. P. fol. trilobis: baſi vtrinque denticulo reflexo. *Petioli glandulis* 2 *oppoſitis. Foliorum lobi laterales breues: ſubtus pone ſinum lobi glandula obſoleta.*

hirſuta. 20. P. fol. trilobis villoſis, flor. oppoſitis.

foetida. 21. P. fol. trilobis cordatis piloſis, inuolucris multifido-capillaribus.

minima. 22. P. fol. trilobis integerrimis: lobis ſublanceolatis: intermedio productiore.

incarnat. 23. P. fol. trilobis ſerratis.

* * * * *Foliis multifidis.*

caerulea. 24. P. fol. palmatis integerrimis.

ſerrata. 25. P. fol. palmatis ſerratis.

pedata. 26. P. fol. pedatis ſerratis.

HEXANDRIA.

1022. ARISTOLOCHIA. Hexagyna. *Cal.* o. *Cor.* 1361. 1-petala, lingulata, integra. *Capſ.* 6-locularis, infera.

bilobata. 1. A. fol. bilobis, caule volubili.

trilobata. 2. A. fol. trilobis, caule volubili, flor. maximis. *Jacq. ſpec.* 8. *t.* 3. *Folia palmato-triloba. Caulis aromaticus.*

pentandra. 3. A. fol. cordatis haſtato-ſubtrilobis, caule volubili, bractea cordata amplexante.

peltata. 4. A. fol. reniformibus ſubpeltatis, caule volubili. *Iacq. ſpec.* 9. *t.* 4.

maxima. 5. A. fol. oblongis acuminatis, caule volubili, pedunc. multifloris. *Caulis verſus radicem ſuberoſus.*

bilabiata. 6. A. fol. ouato-oblongis trineruiis, caule volubili, corollis bilabiatis.

erecta. 7. A. fol. lanceolatis ſeſſilibus ſubhirſutis caule erecto, pedunc. ſolitariis vnifloris, flor. longiſſimis. †

arboreſc. 9 A. fol. cordato-lanceolatis, caule erecto fruticoſo.

caudata. 8. A. fol. cordatis acuminatis triplineruiis, caule volubili. Ariſtolochia ſcandens, florum flabellis maximis variegatis in appendicem longam tenuem deſinentibus. *Brown. jam.* 329.

odoratiſſima. 10. A. fol. cordatis, caule volubili fruticoſo, pedunc. ſolitariis, labio corollis maiore.

anguicida. 12. A. fol. cordatis acuminatis, caule volubili fruticoſo, pedunc. ſolitariis, ſtipulis cordatis.

maurorum. 14. A. fol. haſtatis integerrimis, caule infirmo ſimplici, flor. ſolitariis recuruatis.

indica. 11. A. fol. cordato-oblongis, caule volubili, pedunc. multifloris.

baetica. 13. A. fol. cordatis acutiuſculis, caule volubili, pedunc. ſubternis petiolo longioribus.

ſempervirens. 15. A. fol. cordato-oblongis vndatis, caule infirmo, flor. ſolitariis.

Serpentaria. 16. A. fol. cordato-oblongis planis, caulibus infirmis flexuoſis teretibus, flor. ſolitariis.

Piſtolochia. 17. A. fol. cordatis crenulatis ſubtus reticulatis petiolatis, flor. ſolitariis. *Bractea cordata, ſeſſilis, parua, inſidens baſi pedunculi.*

rotunda. 18. A. fol. cordatis ſubſeſſilibus obtuſis, caule infirmo, flor. ſolitariis.

longa. 19. A. fol. cordatis petiolatis integerrimis obtuſiuſculis, caule infirmo, flor. ſolitariis.

hirſuta. 21. A. fol. cordatis obtuſiuſculis hirtis, flor. ſolitariis pendulis recuruatis ſubtruncatis.

clematitis. 20. A. fol. cordatis, caule erecto, flor. axillaribus confertis.

1023. PISTIA. 1365. Monogyna. *Cal.* 0. *Cor.* 1-petala, lingulata, integra. *Antherae* 6. ſ. 8, filamento inſidentes. *Capſ.* 1-locularis, in fundo corollae.

ſtratiotes. 1. PISTIA: fol. obcordatis. Plantago aquatica. *Rumph. amb.* 6. *t.* 74.

DECANDRIA.

1024. KLEINHOVIA. 1365. Monogyna. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Nectarium* campanulatum, pedunculatum, ſtaminiferum. *Capſ.* inflata, 5-cocca.

hoſpita. 1. KLEINHOVIA.

1025. HELICTERES. 1366. Pentagyna. *Cal.* 1-phyllus, obliquus. *Petala* 5. *Nectarium* foliolis 5. *Capſulae* 5, intortae.

baruenſis. 5. H. decandra, fol. cordatis ſerratis, fruct. contorto apicibus rectis. *Mant.* 122.

ſiora. 1. H. decandra, fol. cordatis ſerratis, fruct. toto contorto. *Iacq. amer.* 236. Hellicteres villoſa, & fruticoſa, fol. cordatis acuminatis ſerratis. *Brown. jam.* 330.

anguſtifolia. 3. H. . . . fol. lanceolatis integerrimis, fructu ouato recto.
carthaginenſis. 2. H. polyandra, fol. cordatis ſerratis, fructu oblongo recto.
apetala. 4. H. dodecandra apetala, fol. quinquelobis, ſiliquis diuaricatis.

DODECANDRIA.

1232. CYTINVS. Monogynia. *Cal.* 4-fidus, ſuperus. *Cor.* o. *Antherae* 16, ſeſſiles. *Bacca* 8-locularis, polyſperma.

Hypociſtis. 1. CYTINVS. Aſarum Hypociſtis. *Sp. pl.* 633.

POLYANDRIA.

1027. XYLOPIA. Monogyna. *Cal.* 1-phyllus. *Petala* 6. *Stam.* exteriora 6 craſſiora. *Drupa* ſicca. 1367.

muricata. 1. X. pedunculis multifloris, fructibus muricatis.
glabra. 2. X. pedunculis ſubunifloris, fructibus glabris.

1026. GREWIA. Monogyna. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5: baſi ſquama nectarifera. *Bacca* 4-locularis. 1367.

occident. 1. G. fol. ſubouatis, flor. ſolitariis.
oriental. 2. G. fol. ſublanceolatis, flor. ſolitariis; *praecedenti affinis.*
aſiatica. 3. G. fol. cordatis. *Mant.* 122. Microcos lateriflora. *Spec. pl.* 734.
Microcos. 4. G. fol. ouato-oblongis, flor. paniculatis. Microcos paniculata. *Spl. pl.* 733.

1238, AMBROSINIA. *Spatha* monophylla diſſepimento diuiſa: *Stamina* interioris, *Piſtilla* exterioris lateris.

Baſſii. 1. AMBROSINIA. *Gen. plant.* 579.
Ariſarum potamogeiti folio. *Bocc. ſic.* 50. *t.* 26. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 544. *Raj. hiſt.* 1097. *Habitat* Panormi *et in* Barbaria. 24.

1028. ARVM. 1367. *Spatha* monophylla, cucullata. *Spadix* ſupra nudus, infere femineus, medio ſtamineus.

* *Acaulia: fol. compoſitis.*

Dracunculus. 1. A. fol. pedatis: foliolis lanceolatis integerrimis aequantibus ſpatham ſpadice longiorem.
Dracontium. 2. A. fol. pedatis. foliolis lanceolatis integerrimis ſuperantibus ſpatham ſpadice breuiorem.
pentaph. 3. A. acaule, fol. quinatis.
triphyllum. 4. A. acaule, fol. ternatis, flor. dioicis.

* * *Acaulia, fol. ſimplicibus.*

trilobatum. 10. A. acaule, fol. ſagittato-trilobis, flore ſeſſili.
Colocaſia. 5. A. acaule, fol. peltatis ouatis repandis: baſi emarginatis.
eſculentum. 6. A. acaule, fol. peltatis ouatis integerrimis: baſi emarginatis.
macrorrhizon. 7. A. acaule, fol. peltatis cordatis repandis: baſi bipartitis.
peregrinum. 8. A. acaule, fol. cordatis obtuſis mucronatis: angulis rotundatis.
diuaricatum. 9. A. acaule, fol. cordatis-haſtatis, diuaricatis. *Spatha reuoluta. Spadix ſubulatus.*
ſagittifolium. 11. A. acaule, fol. ſagittatis triangulis: angulis diuaricatis acutis.
maculatum. 12. A. acaule, fol. haſtatis integerrimis, ſpadice clauato.
virginic. 13. A. acaule, fol. haſtato-cordatis acutis: angulis obtuſis.

probo-

proboſcideum. 14. H. acaule. ſol. haſtatis, ſpatha declinata ſiliformi-ſubulata.

Ariſarum. 16. A. acaule, fol. cordatis oblongis, ſpathae apertura ouata. Ariſarum ſerpentinum. *Barr. ic. t.* 573. *Spatha ſuperne integra, ſubinflexa; inferne integra, nec conuoluta.*

ouatum. 17. A. acaule, fol. ouato-oblongis, ſpatha ſcabra.

tenuifol. 15. A. acaule, fol. lanceolatis, ſpadice ſetaceo declinato.

* * * * *Cauleſcentia.*

arboreſc. 18. A. cauleſcens rectum, fol. ſagittatis.

ſeguinum. 19. A. cauleſcens ſuberectum, fol. lanceolato-ouatis. *Mill. ic. t.* 295.

hederaceum. 20. A cauleſcens radicans, fol. cordatis oblongis acuminatis, petiolis teretibus.

lingulatum. 21. A. cauleſcens repens, fol. cordato-lanceolatis: petiolis marginato-membranaceis.

auritum. 22, A. cauleſcens radicans, fol. ternatis: lateralibus vnilobatis.

1029. DRACONTIVM. 1372. *Spatha* cymbiformis. *Spadix* tectus. *Cal.* o. *Petala* 5. *Baccae* polyſpermae.

poiyphyllum. 1. D. ſcapo breuiſſimo, petiolo radicato lacero, foliolis tripartitis: laciniis pinnatifidis.

ſpinoſum-ſoetidum. 2. D. fol. ſagittatis, pedunculis petiolisque aculeatis.

camtſch. 3. D. fol. ſubrotundis.

camtſch. 4. D. fol. lanceolatis.

pertuſum. 5. D. fol. pertuſis, caule ſcandente. *Mill. ic.* 197. *t.* 296.

1030. CALLA. 1374. *Spatha* plana. *Spadix* tectus floſculis. *Cal.* o. *Petala* o. *Baccae* polyſpermae.

aethiopica. 1. C. fol. ſagittato-cordatis, ſpatha cucullata, ſpadice ſuperne maſculo. *Lederm. microſc.* 37. *t.* 18, 19.

palu-

paluſtris. 2. C. fol. cordatis, ſpatha plana, ſpadice vndique hermaphrodito.

1031. POTHOS. *Spatha.* *Spadix* ſimplex, tectus. 1373. *Cal.* o. *Petala* 4. *Stam.* 4. *Baccae* diſpermae.

ſcandens. 1. P. petiolis latitudine foliorum, caule radicante.
acaulis. 7. P. fol. lanceolatis integerrimis eneruiis. *Sp. plant.* 1675.
lanceolata. 1. P. fol. lanceolatis integerrimis trineruiis, ſcapo apice triquetro.
crenata. 2. P. fol. lanceolatis crenatis.
cordata. 3. P. fol. cordatis.
pinnata. 4. P. fol. pinnatifidis.
palmata. 5. P. fol. palmatis.

1032. ZOSTERA. *Spadix* linearis, altero latere 1374. fructifero. *Cal.* o. *Cor.* o. *Stam.* alterna. *Sem.* ſolitaria, alterna.

marina. 1. *Z.* pericarpiis ſeſſilibus.
oceanica. 2. *Z.* pericarpiis pedicellatis oliuiformibus. *Mant.* 123.

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.

1203. CHARA. ♂ *Cal.* nullus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Stigma* 5-fidum. *Sem.* 1.

1034. ZANNICHELLIA. ♂ *Cal.* nullus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* o. *Pist.* 4. *Sem.* 4.

1035. CERATOCARPVS. ♂ *Cal.* 2-partitus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* o. *Styl.* 2. *Sem.* 1, *inferum.*

1036. ELATERIVM. ♂ *Cal.* o. *Cor.* hypocrateriform.
♀ *Cal.* o. *Cor.* hypocrateriform. *Capf.* infera, pulposa, 1-locularis, polyspermia.

1033. CYNOMORIVM. ♂ *Cal.* amenti. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* amenti. *Cor.* o. *Styl.* 1. *Sem.* 1, subrotundum.

* *Callitriche verna.*

DIANDRIA.

1037. ANGVRIA. ♂ *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala.
♀ *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Pomum* biloculare polyspermum.

1038. LEMNA. ♂ *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* o, *Styl.* 1. *Capf.* 1-locularis.

* *Gunnera.*

TRIANDRIA.

1042. ZEA. ♂ *Glum.* 2-flora. *Glum.* 2-valuis.
♀ *Glum.* 1-flora. *Gl.* 2-valuis. *Styl.* 1. *Sem.* 1, nudum, subrotundum.

1044. TRIPSACVM. ♂ *Glum.* 4-flora. *Glum.* 2-valuis.
♀ *Glum.* 2-f. 4-part. *Gl.* 2-valuis. *Styl.* 2. *Sem,* 1, gluma sinu perforata.

1043. Co-

1043. Coix. ♂ *Glum.* 2-flora. *Glum.* 2-valuis.
♀ *Glum.* 2-flora. *Gl.* 2-valuis. *Styl.* 2-fid. *Sem.* 1, tectum nuce.

1045. Olyra. ♂ *Glum.* 1-flora. *Glum.* 2-valuis.
♀ *Glum.* 1-flora. *Gl.* 2-valuis. *Styl.* 2-fid. *Sem.* 1, nudum.

1046. Carex. ♂ *Ament.* 1-florum. *Cor.* nulla.
♀ *Ament.* 1-florum. *Cor.* 1. *Styl.* 1. *Sem.* 1, tunicatum.

1041. Sparganivm. ♂ *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* nulla. *Sem.* 1-sperma.

1040. Typha. ♂ *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* capillaris. *Cor.* o. *Styl.* 1. *Sem.* 1, pappigerum.

1074. Axyris. ♂ *Cal.* 3-partitus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* o. *Styl.* 2. *Sem.* 1, subrotundum.

1050. Phyllanthvs. ♂ *Cal.* 3-partitus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 3-partitus. *Cor.* o. *Styl.* 3. *Capſ.* 3-cocca.

1048. Tragia. ♂ *Cal.* 3-partitus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Styl.* 3-fid. *Capſ.* 3-cocca.

1049. Hernandia. ♂ *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala.
♀ *Cal.* truncatus. *Cor.* 6-petala. *Drupa* excauata.

1039. Omphalea. ♂ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* nulla. *Anth.* immerſae receptaculo.
♀ *Cal.* 4-partitus. *Cor.* o. *Stig.* 3-fid. *Capſ.* 3-locul. 1-ſperma.

* *Amaranti varii.*

TETRANDRIA.

1054. Vrtica. ♂ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* nulla. *Nect.* cyatiforme.
♀ *Cal.* 2-valuis. *Cor.* o. *Stig.* villoſ. *Sem.* 1, ouatum.

1055. Morvs. ♂ *Cal.* 4-partitus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Styl.* 2. *Sem.* 1, baccatum.

1053. Bvxvs. ♂ *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 2-petala.
♀ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 3-pet. *Stigm.* 3. *Capſ.* 3-locularis.

1052. Be-

1052. BETVLA. ♂ *Ament.* 3-florum. *Cor.* 4-partita.
♀ *Ament.* 2-florum. *Cor.* o. *Styl.* 2.
Sem. 1. ouatum.

1051. CENTELLA. ♂ *Inuolucr.* 4-phyllum, multiflorum.
Petal. 4.
♀ *Inuolucr.* 2-phyllum. *Styli* 2.
Pericarp. inferum, 2-loculare.

1274. SERPICVLA. ♂ *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-petala.
♀ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.*
Nux toruloſa.

1275. CICCA. ♂ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o.
♀ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Styl.* 4-fid.
Capſ. 4-cocca.

* *Plantago vniflora.*

PENTANDRIA.

1277. NEPHELIVM. ♂ *Cal.* 5- dentatus. *Cor.* o.
Anth. bifidae.
♀ *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* o.
Styli 2, inter germina.

1056. XANTHIVM. ♂ *Cal.* comm. polyph. *Cor.* 5-fida.
Filam. connexa.
♀ *Cal.* nullus. *Cor.* o. *Styl.* 2.
Drupa 2-locularis.

1057. AMBROSIA. ♂ *Cal.* comm. 1-phyll. *Cor.* 5-fida.
♀ *Cal.* 1-flor. 2-phyll. *Cor.* o. *Styl.* 1.
Nux 5-dentata.

1058. PARTHENIVM. ♂ *Cal.* comm. 5-phyll. *Cor.* diſci ſuper.
♀ *Cal.* idem mari. *Cor.* radii ligulat.
Styl. 1. *Sem.* 1.

1059. IVA. ♂ *Cal.* comm. 5-phyll. *Cor.* diſci ſuper.
♀ *Cal.* idem mari. *Cor.* radii o.
Styl. 2. *Sem.* 1.

1060. AMARANTVS. ♂ *Cal.* propr. 5-phyll. *Cor.* nulla.
Stam. 3. ſ. 5.
♀ *Cal.* propr. 5-phyll. *Cor.* o. *Styl.* 3.
Capſ. circumſciſſa

1061. SOLANDRA. ♂ *Inuolucro* communi. *Petala* 5.
♀ *Inuolucro* eodem. *Petala* 6. *Styl.* 2.
Capſ. infera, dicocca.

1276. LEEA. ♂ *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-fida.
♀ *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-fida. *Styl.* 1.
Peric. 6-loculare. *Sem.* ſolitaria.

173. HARTOGIA. ♂ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
♀ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
Stam. 10 : 5 caſtratis. *Capſ.* 3.
Sem. ſolitaria.

HEXANDRIA.

1062. ZIZANIA. ♂ *Cal. Glum.* nulla. *Cor. Glum.* 2-valuis.
♀ *Cal. Glum.* nulla. *Cor. Glum.* 2-valuis.
Styl. 2. *Sem.* 1. corolla circumſciſſa.

1063. PHARVS. ♂ *Cal. Glum.* 1-flora. *Cor. Gl.* 2-valuis.
♀ *Cal. Glum.* 1-flora. *Cor. Gl.* 2-valuis.
Styl. 1. *Sem.* 2, . . .
* *Rumex ſpinoſus.*

HEPTANDRIA.

1064. GVETARDA. ♂ *Cal.* cylindric. *Cor.* 7-fida.
♀ *Cal.* cylindric. *Cor.* 7-fida. *Styl.* 1.
Drupa ſicca.

POLYANDRIA. (plura quam 7)

1067. SAGITTARIA. ♂ *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala.
Stam. 24. circiter.
♀ *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-pet. *Piſt.* 100.
Sem. numeroſa.

1066. MYRIOPHYLLVM. ♂ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* nulla. *Stam.* 8.
♀ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 0. *Piſt.* 4.
Sem. 4.

1065. CERATOPHYLLVM. ♂ *Cal.* ſub 7-partitus. *Cor.* nulla.
Stam. 18. circiter.
♀ *Cal.* ſub 7-partitus. *Cor.* 0. *Piſt.* 1.
Sem. 1.

1068. THELIGONVM. ♂ *Cal.* 2-fidus. *Cor.* nulla.
Stam. 12. circiter.
♀ *Cal.* 2-fidus. *Cor.* 0. *Piſt.* 1.
Sem. 1, corticatum.

1069. POTERIVM. ♂ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-partita.
Stam. 32 circiter.
♀ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-pet. *Piſt.* 2.
Sem. 2, obducta.

1072. FACVS. ♂ *Cal.* 5 fidus. *Cor.* nulla.
Stam. 12 circiter.
♀ *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 0. *Styl.* 3.
Capſ. 2-ſperma.

1070. QVERCVS. ♂ *Cal.* 5-fidus. *Cor.* nulla.
Stam. 10. circiter.
♀ *Cal.* integer. *Cor.* 0. *Styl.* 5.
Nux coriacea.

1071. IVGLANS. ♂ *Ament.* imbricat. *Cor.* 6-partita.
Stam. 18. circiter.
♀ *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-pet. *Styl.* 2.
Drupa coriacea.

1074. CORYLVS. ♂ *Ament.* imbricat. *Cor.* nulla.
Stam. 8.
♀ *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 0. *Styl.* 2.
Nux nuda.

1073. CARPINVS. ♂ *Ament.* imbricat. *Cor.* nulla.
Stam. 10.
♀ *Cal.* 6-fidus. *Cor.* 0. *Pist.* 2.
Nux nuda.

1075. PLATANVS. ♂ *Ament.* globos. *Cor.* obsoleta.
Anther. circumnata.
♀ *Ament.* globos. *Cor.* 5-pet. *Styl.* 1.
Sem. 1, pappoſum.

1076. LIQVIDAMBAR. ♂ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* nulla.
Stam. plurima.
♀ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 0. *Styl.* 2.
Caps. polyſperma.

MONADELPHIA.

1087. HVRA. ♂ *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* nulla.
Anther. 20, ſeſſiles.
♀ *Cal.* cylindricus. *Cor.* 0. *Pist.* 1.
Caps. 10-cocca.

1077. PINVS. ♂ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* nulla.
Stam. plurima.
♀ *Ament.* ſtrobilac. *Cor.* 0. *Pist.* 2.
Nuces 2, alatae.

1079. CVPRESSVS. ♂ *Amentum.* *Cor.* nulla.
Anther. 4, ſeſſiles.
♀ *Ament.* ſtrobilac. *Cor.* 0. *Stig.* 2.
Nux angulata.

1078. THVJA. ♂ *Amentum.* *Cor.* nulla.
Anther. 4.
♀ *Ament.* ſtrobilac. *Cor.* 0. *Pist.* 2.
Nux cincta ala.

1082.

1082. ACALYPHA. ♂ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* nulla. *Stam.* 12 circiter.
♀ *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 0. *Styl.* 3. *Capſ.* 3-cocca.

1081. DALECHAMPIA. ♂ *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* nulla. *Nectar.* lamellatum. *Stam.* multa.
♀ *Cal.* 10-phyllus. *Cor.* nulla. *Stylus* 1. *Capſ.* 3-cocca.

1080. PLUKENETIA. ♂ *Cal.* nullus. *Cor.* 4-petala. *Stam.* 8.
♀ *Cal.* nullus. *Cor.* 4-pet. *Styl.* 1. *Capſ.* 4-cocca.

279. CUPANIA. ♀ *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 5.
♀ *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Styl.* 3-fidus. *Capſ.* Seminibus 6, arillatis.

1083. CROTON. ♂ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 15.
♀ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0. *Styl.* 3. *Capſ.* 3-cocca.

1085. RICINUS. ♂ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* nulla. *Stam.* multa.
♀ *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 0. *Styl.* 3. *Capſ.* 3-cocca.

1084. JATROPHA. ♂ *Cal.* nullus. *Cor.* 5-fida. *Stam.* 10.
♀ *Cal.* nullus. *Cor.* 5-pet. *Styl.* 3. *Capſ.* 3-cocca.

1086. STERCULIA. ♂ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* nulla, *Stam.* 15. circiter.
♀ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 0. *Piſt.* 1. *Capſ.* 5.

1088. HIPPOMANE. ♂ *Cal.* 2-fidus. *Cor.* 0. *Antherae* 2, bifidae.
♀ *Cal.* 2-fidus. *Cor.* 0. *Stig.* 3-plex. *Drupa* 1-ſperma aut *Capſ.* 3-cocca.

1279. STILLINGIA. ♂ *Cal.* multiflorus. *Cor.* 1-petala. *Stam.* 2.
♀ *Cal.* vniflorus. *Cor.*... *Stylus* 3-fidus. *Germen* tricoccum inter calycem et corollam.

1278. GNETVM. ♂ *Amentum* ex calyculis peltatis. *Cor.* 0. *Anther.* 2.
♀ *Ament.* eiusdem. *Stylus* 3-fidus. *Drupa* 1-sperma.

SYNGENESIA.

1089. TRICHOSANTHES. ♂ *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida, ciliata! *Filam.* 3.
♀ *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fid. *Styl.* 3-f. *Pom.* oblongum.

1090. MOMORDICA. ♂ *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-fida. *Filam.* 3.
♀ *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-fid. *Styl.* 3-f. *Pom.* elasticum.

1092. CVCVMIS. ♂ *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida. *Filam.* 3.
♀ *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fid. *Styl.* 3-f. Pomum. *Sem.* argutis.

1091. CVCVRBITA. ♂ *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida. *Filam.* 3.
♀ *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fid. *Styl.* 3-f. Pomum. *Sem.* marginatis.

1094. SICYOS. ♂ *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-da. *Filam.* 3.
♀ *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fid. *Styl.* 3-f. *Drupa* monosperma.

1093. BRYONIA. ♂ *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Filam.* 3.
♀ *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-p. *Styl.* 3-f. *Bacca.*

GYNANDRIA.

1095. ANDRACHNE. ♂ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 5.
♀ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0. *Styl.* 3. *Capf.* 3-locul. 2-sperma.

MONANDRIA.

1034. ZANNICHELLIA. MASCVLI. *Cal.* 0. *Cor.* 0.
1375. FEMINEI. *Cal.* 1-phyllus *Cor.* 0. *Germina* circiter 4. *Sem.* totidem.

paluſtris. 1. ZANNICHELLIA.

1035. CERATOCARPVS. MASC. *Cal.* 2-partitus. *Cor.* 0. *Filamentum* longum.
1375. FEM. *Cal.* 2-phyllus, germini adnatus. *Cor.* 0. *Styli* 2. *Sem.* 2-corne, compreſſum.

arenarius. 1. CERATOCARPVS.

1033. CYNOMORIVM. MASC. *Cal.* Amentum imbricatum. *Cor.* 0.
1375. FEM. *Cal.* in eodem amento. *Cor.* 0. *Stylus* 1. *Sem.* 1, ſubrotundum.

coccineum. 1. CYNOMORIVM.

1203. CHARA. MASC. *Cal.* 0. *Coroll.* 0. *Anthera* germini ſubiecta.
1624. FEM. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 0. *Stigma* 5-fidum. *Sem.* 1. *vide mantiſſ. p. 23.*

tomentoſa. 1. C. aculeis caulinis ouatis.
vulgaris. 2. C. caul. laeuibus, frondibus interne dentatis.
hiſpida. 3. C. caul. aculeis capillaribus confertis.
flexilis. 4. C. caul. articulis inermibus diaphanis ſuperne latioribus.

1036. ELATERIVM. Masc. *Cal.* o. *Cor.* hypocrateriformis.
1375. Fem. *Cal.* o. *Cor.* hypocr. *Capſ.* infera, 1-locularis, 2-valuis.

carthaginenſe. 1. E. fol. cordatis angulatis.
trifoliatum. 2. E. fol. ternatis inciſis. *Mant.* 123.

DIANDRIA.

1037. ANGVRIA. Masc. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala.
1376. Fem. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Pomum* inferum, 2-loculare, polyſpermum.

trilobata. 1. A. fol. trilobis.
pedata. 2. A. fol. pedatis ſerratis.
trifoliata. 3. A. fol. ternatis integerrimis.

1038. LEMNA. Masc. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* nulla.
1376. Fem. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* o. *Stylus* 1. *Capſ.* vnilocularis.

triſulca. 1. L. fol. petiolatis lanceolatis.
minor. 2. L. fol. ſeſſilibus vtrinque planiuſculis, radic. ſolitariis.
gibba. 3. L. fol. ſeſſilibus ſubtus hemiſphaericis, radic. ſolitariis. *Varietas praecedentis ſecundum Gerardum 122.*
polyrhiza. 4. L. fol. ſeſſilibus, radic. confertis.

TRIANDRIA.

1040. TYPHA. Masc. Amentum cylindricum. *Cal.* obſoletus, 3-phyllus. *Cor.* o.
1377. Fem. Amentum, cylindricum, infra maſculos. *Cal.* capillo villoſo. *Cor.* o. *Sem.* 1, inſidens Pappo capillari.

latifolia. 1. T. fol. ſubenſiformibus, ſpica maſcula femineaque approximatis. *angu-*

angustifolia. 2. T. fol. semicylindricis, spica mascula femineaque remotis.

1041. SPARGANIVM. Masc. Amentum subrotundum. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 0. Fem. Amentum subrotundum. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 0. *Stigma* 2-fidum. *Drupa* exsucco, 1-sperma-
1378.

erectum. 1, S. fol. erectis triquetris.
natans. 2. S. fol. decumbentibus planis.

1042. ZEA. Masc. in distinctis spicis. *Cal.* Gluma 2-flora, mutica. *Cor* Gluma mutica, Fem, *Cal.* Gluma 2-valuis. *Cor.* Gluma 2-valuis. *Stylus* 1, filiformis, pendulus. *Sem.* solitaria, receptaculo oblongo immersa.
1378.

Mays. 1. Zea.

1044. TRIPSACVM. Masc. *Cal.* Gluma 4-flora. *Cor.* Gluma membranacea. Fem. *Cal.* Gluma sinubus perforatis. *Cor.* Gluma 2-valuis. *Styli* 2. *Sem.* 1.
1378.

dactyloides. A. T. spicis androgynis.
hermaphrod. B. T. spica hermaphrodita.

1043. COIX. Masc. in spicis remotis. *Cal.* Gluma 2-flora, mutica. *Cor.* Gluma mutica. Fem. *Cal.* Gluma 2-flora. *Cor.* Gluma mutica. *Stylus* 2-partitus. *Sem.* calyce ossificato tectum.
1378.

Lacryma. 1. C. feminibus ouatis.

1045. OLYRA. 1379. MASC. *Cal.* Gluma vniflora, aristata. *Cor.* Gluma mutica.
FEM. *Cal.* Gluma vniflora, patula, ouata. *Stylus* 2-fidus. *Sem.* cartilagineum.

latifolia. A. OLYRA.

1046. CAREX. 1379. MASC. Amentum imbricatum. *Cal.* 1-phyllus. *Cor*, 0.
FEM. Amentum imbricatum. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* 0. *Nectarium* inflatum, 3-dentatum. *Stigm.* 3. *Sem.* triquetrum, intra nectarium.

* *Spica vnica simplici.*

dioica. 1. C. spica simplici dioica.
capitata. 2. C. spica simplici androgyna ouata: superne mascula, capsulis imbricato-patulis.
pulicaris. 3. C. spica simplici androgyna: superne mascula, capsulis diuaricatis retroflexis.
squarrosa. 4. C. spica simplici androgyna: inferne mascula, capsulis imbricatis horizontalibus.

* * *Spicis androgynis.*

baldensis. 5. C. spicis ternis congestis sessilibus ouatis triquetris androgynis, inuolucro diphyllo.
arenaria. 6. C. spica composita, spiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis, culmo triquetro.
vliginosa. 7. C. spica composita, spiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis, culmo tereti.
leporina. 8. C. spica composita, spiculis ouatis sessilibus approximatis alternis androgynis nudis.
vulpina. 10. C. spica supradecomposita inferne laxiore, spiculis ouatis androgynis glomeratis: superne masculis.
brizoides. 9. C. spica composita districha nuda, spiculis androgynis oblongis contiguis, culmo nudo.

muri-

muricata. 11. C. ſpiculis ſubouatis ſeſſilibus remotis androgynis, capſulis acutis diuergentibus ſpinoſis.

loliacea. 13. C. ſpiculis ſubouatis ſeſſilibus remotis androgynis, capſulis ouatis teretiuſculis muticis diuaricatis.

remota. 14. C. ſpicis ouatis ſubſeſſilibus remotis androgynis, bracteis culmum aequantibus. Carex axillaris. *Sp. plant.* 1382. Carex anguſtifolia, caule triquetro. *Mich. gen. 70. t. 33. f. 16.*

elongata. 15. C. ſpiculis oblongis ſeſſilibus remotis androgynis, capſulis ouatis acutis.

caneſcens. 16. C. ſpiculis ſubrotundis remotis ſeſſilibus obtuſis androgynis, capſulis ouatis obtuſiuſculis.

paniculata. 17. C. racemo compoſito, ſpiculis androgynis. Carex anguſtifolia, caule triquetro, ſpica multiplici fuſca. *Mich. gen. 68. t. 33. f. 7.*

* * * *Spicis ſexu diſtinctis: femineis ſeſſilibus.*

flaua. 18. C. ſpicis confertis ſubſeſſilibus ſubrotundis: maſcula lineari, capſulis acutis recuruis.

pedata. 19. C. ſpicis femineis ſeſſilibus oblongis: inferiorè axillari, fol. ſubfiliformibus.

digitata. 20. C. ſpicis linearibus erectis: maſcula breuiore inferioreque, bracteis aphyllis, capſulis diſtantibus.

montana. 23. C. ſpicis femineis ſeſſilibus ſubſolitariis ouatis maſculae approximatis, culmo nudo, capſulis pubeſcentibus.

tomentoſa. 38. C. ſpicis femineis ſubpedunculatis, capſulis ſubgloboſis tomentoſis. *Mant.* 123.

globularis. 22. C. ſpica maſcula oblonga, feminea ſeſſili ouata folio florali breuiori approximata.

filiformis. 23. C. ſpica maſcula oblonga, femineis ſeſſilibus oblongis: inferiore foliolo proprio breuiore.

pilulifera. 24. C. ſpicis terminalibus confertis ſubrotundis: maſcula oblonga.

ſaxatilis. 25. C. ſpicis tribus ouatis ſeſſilibus alternis; maſcula oblonga. *Oed. dan. t. 159.*

* * * * * *Spicis ſexu diſtinctis, femineis pedunculatis.*

atrata. 26. C. ſpicis androgynis terminalibus pedunculatis: florentibus erectis; fructiferis pendulis. *Oed. dan. t. 138.*

limoſa. 27. C. ſpicis ouatis pendulis: maſcula longiore erectiore, radice repente. Gramen Cyperoides ſpica pendula minus. *Bauh. pin. 85.*

capillaris. 28. C. ſpicis pendulis: maſcula erecta, femineis oblongis diſtichis, capſulis nudis acuminatis. *Oed. dan. t. 168.*

palleſcens. 29. C. ſpicis pendulis: maſcula erecta, femineis ouatis imbricatis, capſulis confertis obtuſis.

panicea. 30. C. ſpicis pedunculatis erectis remotis: femineis linearibus, capſulis obtuſiuſculis inflatis.

follicularis. 31. C. ſpicis terminalibus pedunculatis: maſcula femineaque, capſulis ſubulatis longitudine ſpicae.

Pſ. Cyper. 32. C. ſpicis pendulis, pedunculis geminatis.

caeſpitoſa. 34. C. ſpicis erectis cylindricis ternis ſubſeſſilibus: maſcula terminali, culmo triquetro.

diſtans, 33. C. ſpicis remotiſſimis ſubſeſſilibus, bractea vaginali, capſulis angulatis mucronatis.

* * * * * *Spicis ſexu diſtinctis: maſculis pluribus.*

acuta. 35. C. ſpicis maſculis pluribus, femineis ſubſeſſilibus, capſulis obtuſiuſculis.

veſicaria. 36. C. ſpicis maſculis pluribus, femineis pedunculatis, capſulis inflatis acuminatis.

hirta. 37. C. ſpicis remotis: maſculis pluribus, femineis ſubpedunculatis erectis, capſulis hirtis.

* * * * * * *Spicis maſculis diſtinctis a flore femineo.*

lithoſperma. C. ſpicis paniculatis maſculis, flor. femineis ſolitariis, ſem. globoſis nitidis. Schoenus lithoſpermus. *Sp. plant. 65. Spicae maſculae paruae, multifloroe. Flores feminei ſolitarii, a maſculis remoti in eodem gramine. Stylus trifidus.*

1047. AXYRIS. 1389.

Masc. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* nulla. Fem. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 0. *Styli* 2. *Sem.* 1.

Ceratoid. 1. A. fol. lanceolatis tomentoſis, flor. femineis lanatis.
amarant. 2. A. fol. ouatis, caule erecto, ſpicis ſimplicibus.

hybri-

hybrida. 3. A. fol. ouatis, caule erecto, ſpicis conglomeratis.
proſtrata. 4. A. fol. obouatis, caule ſubdiuiſo, flor. capitatis.

1039. OMPHALEA. Masc. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Receptac.* ouatum, cui Antherae innatae.
1377. Fem. *Cal.* et *Cor.* maris. *Stigma* 3-fidum. *Capſ.* carnoſa, 3-locularis. *Sem.* 1.

diandra. A. O. fol. ouatis.
triandra. B. O. fol. oblongis.

1048. TRAGIA. Masc. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* o.
1390. Fem. *Cal* 5-partitus. *Cor.* o. *Stylus* 3-fidus. *Capſ.* 3-cocca, 3-locularis. *Sem.* ſolitaria.

volubilis. 1. T. fol. cordato-oblongis, caule volubili.
inuoluer. 2. T. bracteis femineis pentaphyllis pinnatifidis.
Mercurialis. 3. T. fol. ouatis.
vrens. 5. T. fol. lanceolatis obtuſis integerrimis.
Chamaelea. 4. T. fol. lanceolatis obtuſis integerrimis.

1049. HERNANDIA. Masc. *Cal.* 3-partitus. *Coroll.* 3-petala.
1391. Fem. *Cal.* truncatus, integerrimus. *Cor.* 6-petala. *Drupa* caua, ore aperta: nucleo mobili.

ſonora. 1. H. fol. peltatis. *Brown. iam.* 373. *Iacq. amer.* 245.
ouigera. A. H. foliis ouatis baſi petiolatis.

1050. PHYLLANTHVS. 1392. MASC. *Cal.* 3-partitus, campanulatus. *Cor.* o. FEM. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* o. *Styli* 3, bifidi. *Capſ.* 3-locularis. *Sem.* ſolitaria.

grandifol. 1. P. caule arboreo, fol. ouatis obtuſis integerrimis.
Epiphyllanthus. 2. P. fol. lanceolatis ſerratis: crenis floriferis. *Hanc Hermaphroditam pentandram corolla quinquefida facit Brown. 188; quod ſi hoc fructusque rite deſcriptus, quod vlterius examinent autoptae, vtique diſtincti generis erit haec 2 et Xylophylla chinenſium.*
Niruri. 3. P. foliol. pinnatis floriferis, flor. pedunculatis, caule herbaceo erecto.
Vrinaria. 4. P. foliol. pinnatis floriferis, flor. ſeſſilibus, caule herbaceo procumbente.
madraſp. 5. P. foliolis alternis cuneiformibus mucronatis.
Emblica. 6. P. fol. pinnatis floriferis, caule arboreo, fructu baccato.

TETRANDRIA.

1051. CENTELLA. 1393. MASC, *Involucr.* 4-phyllum, 5-florum. *Petala* 4. FEM. *Involucr.* 2-phyllum, 1-florum. *Petala* 4. *Germen* inferum. *Styli* 2. *Pericarp.* 2-loculare.

villoſa. 1 C. fol. cordatis.
glabrata. 2. C. fol. lanceolatis.

1274. SERPICVLA. MASC. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-petala. FEM. *Cal.* 4-partitus. *Peric.* Nux tomentoſa.

repens. 1. SERPICVLA. *Mant.* 124.

1275.

1275. CICCA. Masc, *Cal.* 4-phyllus *Cor.* nulla.
Fem. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* o. *Styli* 4. *Capſ.* 4-cocca.

diſticha. 1. Cicca. *Mant.* 124.

1052. BETVLA. Masc. *Cal.* 1-phyllus, 3-fidus, 3-florus. *Cor.* 4-partita.
1393. Fem. *Cal.* 1-phyllus, ſub 3-fidus, 2-florus. *Sem.* vtrinque membrana alata.

alba. 1. B. fol. ouatis acuminatis ſerratis.
nigra. 2. B. fol. rhombeo-ouatis acuminatis duplicato-ſerratis.
lenta. 3. B. fol. cordatis oblongis acuminatis ſerratis.
nana. 4. B. fol. orbiculatis crenatis.
pumila. 6. B. fol. obouatis crenatis. *Mant.* 124.
Alnus. 5. B. pedunculis ramoſis.

1053. BVXVS. Masc. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 2. *Germinis* rudimentum.
1394. Fem. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 3. *Styli* 3. *Capſ.* 3-roſtris, 3-locularis. *Sem.* 2.

ſemperuirens. 1. Bvxvs.

1054. VRTICA. Masc. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Nectarium* centrale, cyathiforme.
1395. Fem. *Cal.* 2-valuis. *Cor.* o. *Sem.* 1, nitidum.

* *Oppoſitifoliae.*

pilulifera. 1. U. fol. oppoſitis ouatis ſerratis, amentis fructiferis globoſis.
balearica. 2. U. fol. oppoſitis cordatis ſerratis: amentis fructiferis globoſis.

dodar-

dodartii. 3. U. fol. oppoſitis ouatis ſubintegerrimis, amentis fructiferis globoſis.

pumila. 4. U. fol. oppoſitis ouatis, racemis bipartitis breuiſſimis.

grandifolia. 7. U. fol. oppoſitis ouatis, ſtipulis cordatis indiuiſis, racemis paniculatis longitudine foliorum.

vrens. 5. U. fol. oppoſitis oualibus.

dioica. 6. U. fol. oppoſitis cordatis, racemis geminis.

cannabina. 8. U. fol. oppoſitis tripartitis inciſis.

alienata. 19. U. fol. oppoſitis ouatis integerrimis lineatis. Parietaria Zeylanica. *Sp. plant.* 1492. Caulis *palmaris, ſcaber, teres, rigidulus, erectiuſculus.* Rami *oppoſiti, horizontales, diffuſi,* Folia *petiolata, nutantia, ſcabra praeſertim margine.* Stipulae *vtrinque binae.* Flores *axillares, ſeſſiles;* Maſculi *bini. Cal. 4-partitus. Stam. 4, alba.* Femineus *maſculis adſidens, Stylo 1, longo, pubeſcente, albo. Fructus ouatus, emarginatus, ſulcatus 8 torulis. Semen glaberrimum, ouatum, atrum baſi alba.* Plantula *ſemperuirens. Ex floribus maſculis.* Vrtica, *ex Femineis et fructu* Parietaria; *adeoque intermedia.*

cylindrica. 9. U. fol. oppoſitis oblongis, amentis cylindricis ſolitariis indiuiſis ſeſſilibus.

parietaria. 11. U. fol. oppoſitis lanceolatis integerrimis: hinc anguſtioribus.

ciliaris. 10. U. fol. oppoſitis ouatis ciliatis, racemis diuaricatis. *Flum ic. 120. f. 2.*

* * *Alternifoliae.*

aeſtuans. 12, U. fol. alternis cordatis, racem. dichotomis, fruct. orbiculato-corymboſis.

capitata. 13. U. fol. alternis cordatis, glomerulis ſpicatis.

diuaricat. 14. U. fol. alternis ouatis, racemis compoſitis diuaricatis.

canadenſis. 15. U. fol. alternis cordato-ouatis, amentis ramoſis diſtichis erectis.

interrupta. 16. U. fol. alternis ouato-cordatis ſerratis petiolo ſubbreuioribus, ſpicis ſolitariis interruptis. *Rumph. amb. 6. t. 20.*

niuea. 12. U. fol. alternis ſuborbiculatis vtrinque acutis ſubtus tomentoſis. *Rumph. amb. 5. t. 79.*

baccifera. 18. U. fol. alternis cordatis dentatis aculeatis, caule fruticoſo, calyc. femineis baccatis.

1055. MORVS. MASC. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 0.
1398. FEM. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 0. *Styli* 2. *Cal.* baccatus. *Sem.* 1.

alba. 1. M. fol. oblique cordatis laeuibus.
nigra. 2. M. fol. cordatis ſcabris.
papyrifer. 3. M. fol. palmatis, fructibus hiſpidis.
rubra. 4. M. fol. cordatis ſubtus villoſis, amentis cylindricis.
indica. 5. M. fol. ouato-oblongis vtrinque aequalibus inaequaliter ſerratis.
tatarica. 6. M. fol. ouato-oblongis vtrinque aequalibus aequaliter ſerratis.
tinctoria. 7. M. fol. oblongis hinc productioribus, ſpinis axillaribus. *Iacqu. amer.* 247. *t.* 180.

PENTANDRIA.

1277. NEPHELIVM. MASC. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* nulla.
FEM. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 0. *Germina* 2. *Styli* 2 ſingulis. *Drupae* ſiccae, 2, muricatae, 1-ſpermae.

lappaceum. 1. NEPHELIVM. *Mant.* 125.

1056. XANTHIVM. MASC. *Cal.* communis imbricatus. *Cor.* 1-petalae, 5-fidae, infundibulif. *Recept.* paleaceum.
1400. FEM. *Cal.* inuolucrum 2-phyllum, 2-florum. *Cor.* 0. *Drupa* ſicca, muricata, 2-fida. *Nucleus* 2-locularis.

ſtrumar. 1. X. caule inermi, fol. cordatis trineruatis.
orientale. 2. X. caule inermi, fol. cuneiformi-ouatis ſubtrilobis. *Linn. dec.* 33. *t.* 17.
ſpinoſum. 3. X. ſpinis ternatis, fol. trilobis.

1057. AM-

1057. AMBROSIA. Masc. *Cal.* communis. 1-phyllus. *Cor.* 1-petalae, 3-fidae, infundibulif. *Recept.* nudum.
1401. Fem. *Cal.* 1-phyllus, integer, ventre 5-dentato, 1-florus, *Cor.* o. *Nux* e calyce indurato, 1-sperma.

trifida. 1. A. fol. trilobis serratis.
elatior. 2. A. fol. bipinnatifidis, racemis panniculatis terminalibus glabris.
artemisifolia. 3. A. fol. bipinnatifidis: primoribus ramulorum indivisis integerrimis.
maritima. 4. A. fol. multifidis, spicis solitaris pilosis subsessilibus.

1058. PARTHENIVM. Masc. *Cal.* communis, 5-phyllus. *Cor.* disci monopetalae.
1402. Fem. *Cor.* radii 5, singulae 2, masculae: intermedia feminea supera. *Sem.* nudum.

Hysteroph. 1. P. fol. composito-multifidis.
integrifol. 2. P. fol. ouatis crenatis.

1059. IVA. Masc. *Cal.* communis 3-phyllus. *Cor.* disci 1-petalae, 5-fidae. *Recept.* pilis distinctum.
1402. Fem. *Cal.* flosculi radii 5. *Cor.* o. *Styli* 2, longi. *Sem.* nudum, obtusum.

annua. 1. I. fol. lanceolato-ouatis, caule herbaceo.
frutesc. 2. I. fol. lanceolatis, caule fruticoso.

273. HARTOGIA. Masc. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5.
288. Fem. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 5. *Stamina* 5 ſterilia et 5 caſtrata. *Capſ.* 3. *Sem.* arillatum.

ciliaris. H. fol. lanceolatis ciliatis.
Dioſma ciliata. *Sp. pl.* 287.
Folia *lanceolata, acuta, ciliata margine et carina.* Petala *oblonga vnguibus vix calyce longioribus.*

lanceolata. H. foliis ellipticis.
Dioſma lanceolata. *Sp. pl.* 287.
Folia *obtuſiuſcula, pagina vtraque raris pilis.*

imbricata. H. foliis ouatis mucronatis imbricatis. *Mant.* 124.
Similis *H. ciliari.* Folia *ſubimbricata, carinata.* Petala *purpurea, ſubrotunda, vnguibus calyce triplo longioribus.*

capenſis. H. fol. linearibus triquetris ſubtus punctatis.
Hartogia capenſis. *Sp. pl.* 288.
Stamina *Sterilia huic fere petaloidea ſunt.*

pulchella. H. fol. ouatis obtuſis crenatis, flor. geminis axiliaribus.
Dioſma pulchella. *Sp. pl.* 288.
Flores *huic hermaphroditi, ſed* Fructus *trilocularis.* Germinis *cornua ſingula terminata glandulis duabus.*

1060. AMARANTHVS. Masc. *Cal.* 3-f. 5-phyllus.
1403. *Cor.* 0. *Stam.* 3-f. 5.
Fem. *Cal.* 3-f. 5-phyllus. *Cor.* 0. *Styli* 3. *Capſ.* 1-locularis, circumſciſſa. *Sem.* 1.

* *Triandri.*

albus. 9. A. glomerulis triandris axillaribus bipartitis, bracteis ſubulatis, fol. ouatis emarginatis lineatis ſtrictis. Blitum maritimum minus, calycibus aculeatis. *Till. piſ.* 25.

graeciſans. 10. A. glomerulis triandris axillaribus, fol. lanceolatis repandis obtuſis.

melancholicus. 4. A. glomerulis triandris axillaribus ſubrotundis ſeſſilibus, fol. lanceolatis acuminatis.

tricolor. 3. A. glomerulis triandris axillaribus ſubrotundis amplexicaulibus, fol. lanceolato-ouatis coloratis.

polygamus. 2, A. glomerulis diandris ſubſpicatis ouatis, flor. hermaphroditis femineisque, fol. lanceolatis.

gangeticus. 5. A. glomerulis triandris ſubſpicatis ouatis, fol. lanceolato-ouatis emarginatis.

mangoſtanus. 7. A. glomerulis triandris ſubſpicatis rotundatis, fol. rhombeis.

triſtis. 6. A. glomerulis triandris rotundatis ſubſpicatis, fol. ouato-cordatis emarginatis petiolo breuioribus.

liuidus. 8. A. glomerulis triandris ſubſpicatis rotundatis, fol. rotundato-ouatis retuſis.

oleraceus. 1. A. glomerulis triandris pentandrisque, fol. ouatis otuſiſſimis emarginatis rugoſis.

Blitum. 11. A. glomerulis lateralibus, floribus trifidis, fol. ouatis retuſis, caule diffuſo.

viridis. 12. A. glomerulis triandris, flor. maſculis trifidis, fol. ouatis emarginatis, caule erecto.

polygonoides. 13. A. glomerulis triandris axillaribus, fol. ouatis emarginatis, flor. femineis infundibuliformibus obtuſis.

* * *Pentandri.*

hybridus. 15. A. racemis pentandris decompoſitis congeſtis nudis, ſpiculis coniugatis.

paniculatus. 16. A. racemis pentandris ſupradecompoſitis: partialibus patentibus.

ſanguineus. 19. A. racemis pentandris compoſitis erectis: lateralibus patentiſſimis, fol. ouato oblongis.

retroflexus. 21. A. racemis pentandris lateralibus terminalibusque: caule flexuoſo villoſo, ramis recuruatis.

flauus. 18. A. racemis pentandris compoſitis: ſummo infimisque nutantibus, fol. obouatis mucronatis.

hypochondriacus. 20. A. racemis pentandris compoſitis confertis erectis, fol. ouatis mucronatis.

cruentus. 17. A. racemis pentandris decompoſitis remotis patulonutantibus, fol. lanceolato ouatis.

caudatus. 14. A. racemis pentandris decompoſitis cylindricis pendulis longiſſimis.

ſpino-

ſpinoſus. 22. A. racemis pentandris cylindricis erectis, axillis ſpinoſis. *Rumph. amb. 5. t. 83.*

1061. SOLANDRA. Masc. *Inuolucr.* 4-phyllum, 5-florum. *Petala* 5.
1407. Fem. *Inuolucro* eodem. *Petala* 6. *Styli* 2. *Capſ.* 2-cocca.

capenſis. 1. Solandra.

1276. LEEA. Masc. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-fida nectario cylindrico tubi.
Fem. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-fida cum nectario. *Peric.* ſexloculare. *Sem.* ſolitaria.

aequata. 1. L. caule tereti pubeſcente. *Mant.* 124.
criſpa. 2. L. caule angulato fimbriato. *Mant.* 124.

HEXANDRIA.

1062. ZIZANIA. Masc. *Cal.* o. *Cor.* Gluma 2-valuis, mutica, femineis mixta.
1408. Fem. *Cal.* o. *Cor.* Gluma 1-valuis, cucullata, ariſtata. *Stylus* 2-partitus. *Sem.* 1, corolla plicata veſtitum.

aquatica. 1. *Z.* paniculata effuſa.
terreſtris. 2. *Z.* paniculata ſubracemoſa.

1063. PHARVS. Masc. *Cal* Gluma 2-valuis, vniflora. *Cor.* Gluma biualuis.
1408. Fem. *Cal.* Gluma 2-valuis, 1-flora. *Cor.* Gluma vniualuis, longa, inuoluens. *Sem.* 1.

latifolius. 1. Pharvs.

HEPTANDRIA.

1064. GUETTARDA. Masc. *Cal.* cylindricus. *Cor* 7-fida, infundibuliformis.
1408. Fem. *Cal.* cylindricus. *Cor.* 7-fida. *Pist.* 1. *Drupa* sicca.

speciosa. 1. Guettarda.

POLYANDRIA. *Stamina ultra VII.*

1065. CERATOPHYLLVM. Masc. *Cal.* multipartitus. *Cor.* 0. *Stam.* 16-20.
1409. Fem. *Cal.* multipartitus. *Cor.* 0. *Pist.* 1. *Styl.* 0. *Sem.* 1, nudum.

demersum. 1. C. fol. dichotomo-bigeminis, fruct. trispinosis.
submersum. 2. C. fol. dichotomo-trigeminis, fruct. muticis.

1066. MYRIOPHYLLVM. Masc. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 0. *Stam.* 8.
1409. Fem. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 0. *Pist.* 4. *Stylus* 0. *Sem.* 4, nuda.

spicatum. 1. M. flor. masculis interrupte spicatis.
verticillatum. 2. M. flor. omnibus verticillatis hermaphroditis.

1067. SAGITTARIA. Masc. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Filamenta* fere 24.
1410. Fem. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Pist.* multa. *Sem.* multa, nuda.

sagittifol. 1. S. fol. sagittatis acutis,

obtu-

obtusifol. 2. S. fol. sagittatis obtusis, caul. ramoso.
lancifol. 4. S. fol. lanceolato-ouatis.
trifolia. 3. S. fol. ternatis.

1068. THELIGONVM. MASC. *Cal.* 2-fidus. *Cor.* 0. *Stam.* fere 12.
1411. FEM. *Cal.* 2-fidus. *Cor.* 0. *Pist.* 1. *Capsf.* coriacea, 1-locularis, 1-sperma.

Cynocrambe. 1. THELIGONVM.

1069. POTERIVM. MASC. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-partita. *Stam.* 30-40.
1411. FEM. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-partita. *Pist.* 2. *Bacca* e tubo corollae indurato.

Sanguis. 1. P. inerme, caulibus subangulosis.
hybridum. 2. P. inerme, caulibus teretibus strictis.
spinosum. 3. P. spinis ramosis.

1070. QVERCVS. MASC, *Cal.* 5-fidus fere. *Cor.* 0. *Stam.* 5-10.
1412. FEM. *Cal.* 1-phyllus, integerrimus, scaber. *Cor.* 0. *Styli* 2-5. *Sem.* 1, ouatum.

Phellos. 1. Q. fol. lanceolatis integerrimis glabris.
molucca. 2. Q. fol. lanceolato-ouatis glabris integerrimis.
Ilex. 3. Q. fol. ouato-oblongis indiuisis serratisque subtus incanis, cortice integro. β Quercus gramuntia. *Sp. pl.* 1413.
Suber. 5. Q. fol. ouato-oblongis indiuisis serratis subtus tomentosis, cortice ramoso fungoso.
coccifera. 6. Q. fol. ouatis indiuisis spinoso-dentatis vtrinque glabris.

Prinus. 7. Q. fol. ouatis vtrinque acuminatis ſinuato-ſerratis: denticulis rotundatis vniformibus:
nigra. 8. Q. fol. cuneiformibus obſolete trilobis.
rubra. 9. Q. fol. obtuſe ſinuatis ſetaceo-mucronatis.
alba. 10. Q. fol. oblique pinnatifidis: ſinubus angulisque obtuſis.
Eſculus. 11. Q. fol. pinatifidis: laciniis lanceolatis remotis acutis, poſtice angulatis.
Robur. 12. Q. fol. deciduis oblongis ſuperne latioribus: ſinubus acutioribus, angulis obtuſis.
Aegilops. 13. Q. fol. ouato-oblongis glabris ſerrato-repandis.
Cerris. 14. Q. fol. oblongis lyrato-pinnatifidis: laciniis transuerſis acutis; ſubtus ſubtomentoſis.

1071. JVGLANS. MASC. *Cal.* 1-phyllus, ſquamiformis. *Cor.* 6-partita. *Filamenta* 18.
1413. FEM. *Cal.* 4-fidus ſuperus. *Cor.* 4-partita *Styli* 2. *Drupa* nucleo ſulcato.

regia. 1. J. foliolis oualibus glabris ſubſerratis ſubaequalibus. *Habitat in* Perſia. *D. Lerche.*
alba. 2. J. foliolis ſeptenis lanceolatis ſerratis: impari ſeſſili.
nigra. 4. J. foliolis quindenis lanceolatis: exterioribus minoribus, gemmis ſuperaxillaribus.
cinerea. 3. J. foliolis vndenis lanceolatis baſi altera breuiore.
baccata. B. J. foliolis ternis.

1072. FAGVS. MASC. *Cal.* 5-fidus, campanulatus.
146. *Cor.* 0. *Stam.* 12.
FEM. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 0. *Styli* 3. *Capſ.* (Calyx antea) muricata, 4-valuis. *Sem.* 2.

Caſtanea. 1. F. fol. lanceolatis acuminato-ſerratis ſubtus nudis.

pumi-

pumila. 2. F. fol. lanceolato-ouatis acute ferratis ſubtus tomentoſis, amentis filiformibus nodoſis.
yluatica. 3. F. fol. ouatis obſolete ferratis.

1073. CARPINVS. MASC. *Cal.* 1-phyllus: ſquama ciliata. *Cor.* 0. *Stam.* 20.
1416. FEM. *Cal.* 1-phyllus: ſquama ciliata. *Cor.* 0. *Germina* 2. *Styli* ſingulis 2. *Nux* ouata.

Betulus. 1. C. ſquamis ſtrobilorum planis.
Oſtrya. 2. C. ſquamis ſtrobilorum inflatis.

1074. CORYLVS. MASC. *Cal.* 1-phyllus, 3-fidus, ſquamiformis, 1-florus. *Cor.* *Stam.* 8.
1417. FEM. *Cal.* 2-phyllus, lacerus, *Cor.* 0. *Styli* 2. *Nux* ouata.

Auellana. 1. C. ſtipulis ouatis obtuſis.
Colurna. 2. C. ſtipulis linearibus acutis.

1075. PLATANVS. MASC. *Cal.* Amentum globoſum. *Cor.* vix manifeſta. *Antherae* filamentum circumnatae.
1417. FEM. *Cal.* Amentum globoſum. *Cor.* polypetala. *Styli* ſtigmate recuruo. *Sem.* ſubrotunda, ſtylo mucronata, baſi pappoſa.

orientalis. 1. P. fol. palmatis.
occident. 2. P. fol. lobatis.

1076. LIQUIDAMBAR. 1418. MASC. *Cal.* communis 4-phyllus. *Cor.* 0. *Filam.* numerosa.
FEM. *Cal.* in globum, 4-phylli. *Cor.* 0. *Styli* 2. *Capſ.* multae in globum, biualues, polyſpermae.

ſtyraciflua. 1. L. fol. palmato-angulatis: lobis indiuiſis acutis.
peregrina. 2. L. fol. oblongis alternatim ſinuatis.

ADELPHIA.

1077. PINVS. 1418. MASC. *Cal.* 4-phylus. *Cor.* 0. *Stam.* plurima. *Antherae* nudae:
FEM. *Cal.* ſtrobili: ſquama 2-flora. *Cor.* 0. *Piſt.* 1. *Nux* ala membranacea excepta.

* *Foliis pluribus ex eadem baſi vaginali.*

ſylueſtris. 1. P. fol. geminis: primordialibus ſolitariis glabris.
Pinea. 2. P. fol. geminis: primordialibus ſolitariis ciliatis.
Taeda. 3. P. fol. trinis. *Obſ.* Pinus fol. trinis longiſſimis *et* Pinus fol. trinis, ſtrobilis longioribus: ſquamis rigidioribus *Milleri*, *diuerſae ſunt ſpecies a Taeda; ſed qua nota?*
Cembra. 4. P. fol. quinis laeuibus.
Strobus. 5. P. fol. quinis margine ſcabris, cortice laeui.
Cedrus. 6. P. fol. faſciculatis acutis.
Larix. 7. P. fol. faſciculatis obtuſis.

* * *foliis ſolitariis et baſi diſtinctis.*

Picea. 8. P. fol. ſolitariis emarginatis.
Balſamea. 9. P. fol. ſolitariis ſubemarginatis: ſubtus linea duplici punctata.
canadenſis. 10. P. fol. ſolitariis linearibus obtuſiuſculis ſubmembranaceis.

Abies.

Abies. 11. P. fol. ſolitariis ſubulatis mucronatis laeuibus bifariam verſis.
orientał. 12. P. fol. ſolitariis tetragonis.

1078. THVJA. Masc. *Cal.* Amenti ſquama. *Cor.* o. *Stam.* 4.
1421. Fem. *Cal.* ſtrobili: ſquama 2-flora. *Cor.* o. *Piſt.* 1. *Nux* 1, cincta ala emarginata.

occident. 1. T. ſtrobilis laeuibus: ſquamis obtuſis.
orientalis. 2. T. ſtrobilis ſquarroſis: ſquamis acutis.
cupreſſoid. 4. T. ſtrobilis tetragono-globoſis. *Mant.* 125.
aphylla. 3. T. ſtrobilis quadriualuibus, fol. turbinatis vaginantibus, hinc mucronatis.

1079. CVPRESSVS. Masc. *Cal.* Amenti ſquama, *Cor* o. *Antherae* 4, ſeſſiles absque filamentis.
1422. Fem. *Cal.* ſtrobili: ſquama 1-flora *Cor.* o. *Styli?* puncta concaua. *Nux* angulata.

ſemperu. 1. C. fol. imbricatis, frondibus quadrangulis.
diſticha. 2. C. fol. diſtichis patentibus.
Thyoides. 3. C. fol. imbricatis, frondibus ancipitibus.
juniperoid. 4. C. fol. oppoſitis decuſſatis ſubulatis patulis-

1080. PLVKENETIA. Masc. *Cal.* o. *Petala* 4-*Stam.* 8. *Nectaria* 4, barbata.
1423. Fem. *Cal.* o. *Petala* 4, *Stylus* longiſſimus ſtigmate peltato 4-lobo. *Capſ.* 4-cocca.

volubilis. 1. Plvkenetia.

1081. DALECHAMPIA. 1423.

MASC. *Inuolucr. commune* 4-partitum. *Perianthia* 6-phylla. *Cor.* o. *Nectarium* lamellatum. *Stam.* monadelpha, polyandra.

FEM. *Inuolucr. commune* 3-phyllum. *Perianthium* 10-phyllum. *Cor.* o. *Stylus* 1. *Capſ.* 3-cocca.

ſcandens. 1. DALECHAMPIA.

1082. ACALYPHA. 1423.

MASC. *Cal.* 3-ſ. 4-phyllus. *Cor.* o. *Stam.* 8-16.

FEM. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* o. *Styli* 3. *Capſ.* 3-cocca, 3-locularis. *Sem.* 1.

virginica. 1. A. inuolucris femineis cordatis inciſis, fol. ouato-lanceolatis petiolo longioribus.

virgata. 2. A. ſpicis femineis inuolucris cordatis ſerratis; maſculis diſtinctis aphyllis, fol. lanceolato-ouatis.

indica. 3. A. inuolucris femineis cordatis ſubcrenatis, fol. ouatis petiolo breuioribus.

auſtralis. 4. A. inuolucris femineis integerrimis, fol. lanceolatis obtuſis.

1083. CROTON. 1424.

MASC. *Cal.* cylindricus, 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 10-15.

FEM. *Cal.* polyhyllus. *Cor.* o. *Styli* 3, bifidi. *Capſ.* 3-locularis. *Sem.* 1.

variegatum. 3. C. fol. lanceolatis integerrimis glabris pictis petiolatis.

Caſcarilla. 4. C. fol. lanceolatis acutis integerrimis petiolatis ſubtus tomentoſis, caule arboreo.

Caſta-

caſtaneif. 1. C. fol. lanceolatis obtuſis ſerratis petiolatis glabris.
paluſtre. 2. C. fol. ouato-lanceolatis plicatis ſerratis ſcabris.
glabellum. 5. C. fol. ouatis obtuſiuſculis integerrimis laeuibus, fructibus pedunculatis.
tinctorium. 6. C. fol. rhombeis repandis, capſulis pendulis, caule herbaceo. *Cal.* 5-*phylus.* *Petala* 5, *lanceolata.* *Stam.* 8, *monadelphia.*
glandulo-ſum. 7. C. fol. oblongis ſerratis baſi biglanduloſis, fructibus ſeſſilibus.
argenteum. 8. C. fol. cordato-ouatis ſubtus tomentoſis integris ſerratis. *Fructus capitulum Bracteis* 3, *oualibus*, *hirſutis dentatis.*
ſ. biferum. 9. C. fol. rhombeo-ouatis acuminatis integerrimis glabris. *Foliola latiora quam longa*, *inuoluta*; *baſis folii glandulis* 2.
T glium. 10. C. fol. ouatis glabris acuminatis ſerratis, caule arboreo.
lucidum. 11. C. fol. oblongis ſubſerratis glabris oppoſitis ſubterminalibus articulorum.
Laccifer-um. 12, C. fol. ouatis tomentoſis ſerrulatis petiolatis, calycibus tomentoſis.
balſamifer-um. 22. C. fol. ouato-lanceolatis ſcabris integerrimis ſubtus tomentoſis. *Mant.* 125.
aromaticum. 14. C. fol. cordatis ſcabris ſubſerratis petiolatis, caule arboreo
humile. 16. C. fol. cordatis integerrimis ſcabris ſubciliatis ſubtus tomentoſis, caule fruticoſo.
Ricinocarpos. 17. C. fol. ſubcordatis crenatis, pedunc. racemoſis oppoſitifoliis, caule herbaceo.
moluccan. 15. C. fol. cordatis angulatis ſcabris ſubtus tomentoſis.
flauens. 13. C. fol. cordatis oblongis integerrimis vtrinque tomentoſis, ramulis denſius tomentoſis. *Brown. iam.* 347. *n.* 3.
haſtatum. 18. C. fol. trilobo-haſtatis lanceolatis dentatis.
lobatum. 19. C. fol. inermi-ſerratis, inferioribus quinquelobis; ſuperioribus trilobis.
ſpinoſum. 20. C. fol. palmatis quinquelobis trilobisque ſpinoſo-ſerratis, flor. cauli adpreſſis ſubſeſſilibus.
virens. 21. C. fol. ternatis ſerratis lanceolatis.

279. CVPANIA. Masc. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 5.
290. Fem. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Styl.* 3-fidus. *Capſ.* 3-locularis. *Sem.* bina.

americana. 1. Cvpania. *Flores non vidi; e figuris Plumieri monoicos eſſe iudico; Stamina non noui.*

1084. JATROPHA. Masc. *Cal.* 0. *Cor.* 1-petala, infundibuliformis. *Stam.* 10: alterna breuiora.
1428. Fem. *Cal.* 0. *Cor.* 5-petala, patens. *Styli* 3, bifidi. *Capſ.* 3-locularis. *Sem.* 1.

goſſypifolia. 1. J. fol. quinquepartitis; lobis ouatis integris: ſetis glanduloſis ramoſis.
moluccan. 2. J. fol. ouatis integerrimis ſubdentatis.
Curcas. 3. J. fol. cordatis angulatis.
multifida. 4. J. fol. multipartitis laeuibus, ſtipulis ſetaceis multifidis.
Manihot. 5. J. fol. palmatis: lobis lanceolatis integerrimis laeuibus.
Janipha. 8. J. fol. palmatis: lobis integerrimis: intermediis vtrinque ſinu lobatis. *Mant.* 126.
vrens. 6. J. fol. palmatis dentatis aculeatis.
herbacea. 7. J. aculeata, fol. trilobis, caule herbaceo.

1085. RICINVS. Masc. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 0. *Stam.* numeroſa.
1430. Fem. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 0. *Styli* 3, bifidi. *Capſ.* 3-locularis. *Sem.* 1.

communis. 1. R. foliis peltatis ſubpalmatis ſerratis.
Tanarius. A. R. foliis peltatis repandis.
Mappa. B. R. foliis peltatis indiuiſis.

1086. STERCVLIA. 1430. MASC. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Filamenta* 15.
FEM. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Germen* columnae insidens. *Capſ.* 5-locularis, polyſperma.

Balanghas. 1. *S.* fol. ouatis integerrimis petiolatis, flor. paniculatis.
foetida. 2. S. fol. digitatis.

1088. HIPPOMANE. 1431. MASC. *Amentum. Perianth.* 2-fidum. *Cor.* o.
FEM. *Perianth.* 3-fidum. *Cor.* o. *Stigma* 3-partitum. *Drupa* ſ. *Capſ.* 3-cocc.

Mancinella. 1. H. fol. ouatis ſerratis baſi vniglanduloſis. *Fructus Drupa Semine carioſo.*
biglanduloſa. 2. H. fol. ouato-oblongis baſi biglanduloſis. *Capſula* 3-*cocca.*
ſpinoſa. 3. H. fol. ſubouatis dentato-ſpinoſis.

1279. STILLINGIA. MASC. *Cal.* hemiſphaericus, multiflorus. *Cor.* tubuloſa, eroſa.
FEM. *Cal.* 1-florus, inferus. *Cor.* ſupera. *Styl.* 3-fidus. *Capſ.* 5-cocca.

ſylvatica. 1. STILLINGIA. *Mant.* 126.

1278. GNETVM. MASC. *Amenti* ſquama. *Cor.* o. *Filament.* 1. antheris binis.
FEM. *Amenti* eiusdem. *Cor.* o. *Stylus* ſtigmate 3-fido. *Drupa* monoſperma.

Gnemon. 1. GNETVM. *Mant.* 125.

1087. HVRA. Masc. Amentum imbricatum. *Perianth.* truncata. *Cor.* o. *Filam.* cylindrica, apice peltata, cincta. *Anth.* plurimis geminatis.
1413. Fem. *Cal.* o. *Cor.* o. *Stylus* infundibuliformis. *Stigma* 12-fidum. *Capſ.* 12-locularis. *Sem.* 1.

crepitans. 1. Hvra. Amentum *maſculum e diuaricatura ramorum, oblongum, cernuum.* Squamis *oblongis: intra ſingulas.* Peryanthium *cylindricum, truncatum, breuiſſimum.* Cor. o. Filamentum *ſanguineum, longum, truncatum, rigidum, ſub apice bis terue verticillatum tuberculis:* Antherae 2, *ſingulo tuberculo immerſae, ouales, bifidae.*

SYNGENESIA.

1089. TRICHOSANTHVS. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita, ciliata. *Filam.* 3.
1432. Fem. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita, ciliata. *Stylus* 3-fidus. *Pomum* oblongum,

Anguina. 1. T. pomis teretibus oblongis incuruis.
neruifolia. 2. T. pomis ouatis acutis, fol. cordatis oblongis trineruiis dentatis.
cucumerina. 3. T. pomis ouatis acutis, fol. cordatis angulatis.
amara. 4. T. pomis turbinato-ouatis.

1090. MOMORDICA. MASC. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 6-
1433. partita. *Filamenta* 3.
FEM. *Cal.* 3-fidus. *Cor.* 5-partita. *Stylus* 3-fidus. *Pomum* elaſtice diſſiliens.

Balſamina. 1. M. pomis angulatis tuberculatis, fol. glabris patenti-palmatis.
Charantia. 2. M. pomis angulatis tuberculatis, fol. villoſis longitudinaliter palmatis.
operculata. 3. M. pomis angulato-tuberculatis apice deciduo operculatis, fol. lobatis.
Luffa. 4. M. pomis oblongis: ſulcis catenulatis, fol. inciſis.
cylindric. 5. M. pomis cylindricis longiſſimis, fol. angulis acutis.
trifolia. 6. M. pomis ouatis muricatis, fol. ternatis dentatis.
pedata. 7. M. pomis ſtriatis, fol. pedatis ſerratis.
Elaterium. 8. M. pomis hiſpidis, cirrhis nullis.

1091. CVCVRBITA. MASC. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.*
1434. 5-fida. *Filamenta* 3.
FEM. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida. *Piſt.* 5-fidum. *Pomi* ſemina margine tumido.

lagenaria. 1. C. fol. ſubangulatis tomentoſis baſi ſubtus biglanduloſis, pomis lignoſis.
ouifera. 6. C. fol. lobatis, pomis obouatis, cirrhis ſepteno-digitatis. *Mant.* 126.
Pepo. 2. C. fol. lobatis, pomis laeuibus.
verrucoſ. 3. C. fol. lobatis, pomis nodoſo-verrucoſis.
Melopepo. 4. C. fol. lobatis, caule erecto, pomis depreſſis nodoſis.
Citrullus. 5. C. fol. multipartitis.

1092. CVCVMIS. MASC. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Filamenta* 3.
1435. FEM. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Pist.* 3-fidum. *Pomi* semina arguta.

Colocynth. 1. C. fol. multifidis, pomis globosis glabris.
propheta-rum. 2. C. fol. cordatis quinquelobis denticulatis obtusis, pomis globosis spinoso-muricatis.
Anguria- 3. C. fol. palmato-sinuatis, pomis globosis echinatis.
acutangu-lus. 4. C. fol. rotundato-angulatis, pomis angulis decem acutis. *Fructus operculatus: angulis decem integris acutis, vnilocularis. Semina nigra, quasi masticata vt in Anguria.*
Melo. 6. C. foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis. *Habitat in* Calmucchia.
Dudaim. 6. C. foliorum angulis rotundatis, pomis sphaericis vmbilico retuso.
Chate. 7. C. hirsutus, foliorum angulis integris rotundatis, pomis fusiformibus vtrinque attenuatis hirtis.
sativus, 8. C. foliorum angulis rectis, pomis oblongis scabris.
angui- 10. C. foliis lobatis, pomis cylindricis longissimis laeuibus contortuplicatis.
nus.
flexuosus. 9. C. foliis angulato-sublobatis, pomis cylindricis sulcatis curuatis.
madera- 11. C. fol. cordatis integris denticulatis, pomis globo-
spatanus. sis glabris.

1093. BRYONIA. MASC. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Filamenta* 3.
1438. FEM. *Cal.* dentatus. *Cor.* 5-partita. *Stylus* 3-fidus. *Bacca* subglobosa, polysperma.

alba. 1. B. fol. palmatis vtrinque calloso-scabris.
palmata. 2. B. fol. palmatis lacubus quinquepartitis: laciniis lanceolatis repando-serratis.
grandis. 7. B. fol. cordatis angulatis basi subtus glandulosis. *Mant.* 126.

cordi-

cordifol. 3. B. fol. cordatis oblongis quinquelobis dentatis ſcabris, petiolis bidentatis. *(excluſo Rumphio)*
laciniosa. 4. B. fol. palmatis: laciniis lanceolatis ſerratis, petiolis ſcaberrimis. *Fructus ſeſſiles lineis 6 lacteis.*
africana. 5. B. fol. palmatis quinquepartitis vtrinque laeuibus: laciniis pinnatifidis.
cretica. 6. B. fol. palmatis ſupra calloſo-punctatis.

1094. SICYOS. MASC. *Cal.* 5-dentatus, *Cor.* 5-partita. *Filamenta* 3.
1439. FEM. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Stylus* 3-fidus. *Drupa* 1-ſperma.

angulata. 1. S. fol. angulatis.
laciniata. 2. S. fol. laciniatis.

GYNANDRIA.

1095. ANDRACHNE. MASC. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 5, *Styli* rudimento inſerta.
1439. FEM. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0. *Styli* 3. *Capſula* 3-locularis. *Sem.* 2.

Teleph. 1. A. procumbens herbacea.
fruticoſa. 2. A. erecta arborea.

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

MONANDRIA.

1096. NAJAS- ♂ *Cal.* 2-fidus: *Cor.* 4-fida. *Filam.* nullum,
♀ *Cal.* nullus. *Cor.* 0. *Pist.* 3. *Capſ.* 1-locularis.

DIANDRIA.

1097. VALLISNERIA. ♂ *Spat.* multiflora. *Cal-Cor.* 3-partita.
♀ *Spat.* 1-flora. *Cal.* 3-par. *C.* 3-pet. *Pist.* 1. *Capſ.* 1-locularis,

1090. CECROPIA. ♂ *Spat.* recept. comm. *Cor.* nulla.
♀ *Spat.* recept. comm. *Cor.* 0. *Pist.* 1. *Bacca* 1-ſperma-

1098. SALIX. ♂ *Ament.* ſquama. *Cor.* nulla. *Stam.* 2, raro 5.
♀ *Ament.* ſquama. *Cor.* 0. *Stig.* 2. *Capſ.* 2-valuis. *Sem.* pappoſa.

TRIANDRIA.

1100. EMPETRVM. ♂ *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala.
♀ *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-pet, *Styl.* 9. *Bacca* 9-ſperma.

1101. OSYRIS. ♂ *Cal* 3-fidus. *Cor.* nulla,
♀ *Cal,* 3-fidus. *Cor.* 0. *Styl.* 1. *Bacca* 1-ſperma.

1280. CATVRVS. ♂ *Cal.* 0. *Cor.* 3-fida.
♀ *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 0. *Styl.* 3. *Capſ.* 3-cocca.

1102. EXCOECARIA. ♂ *Ament.* ſquama. *Cor.* nulla
♀ *Ament.* ſquama. *Cor.* 0. *Stvl.* 3. *Capſ.* 3-cocca.

* *Carex dioica.* * *Valeriana dioica.*

TETRANDRIA.

1106. HIPPOPHAE. ♂ *Cal.* 2-partitus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 2-fidus. *Cor.* 0. *Pist.* 1. *Bacca,* 1-ſperma: arillo truncato.

1103. TRO-

1103. TROPHIS. ♂ *Cal.* nullus. *Cor.* 4-petala.
♀ *Cal.* nullus. *Cor.* o. *Styl.* bifid.
Bacca 1-ſperma.

1105. VISCVM. ♂ *Cal.* 4-partitus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Stig.* obtuſ.
Bacca 1-ſperma, infera.

1104. BATIS. ♂ *Amentum.* *Cor.* nulla.
♀ *Inuol.* 2-phyllum. *Cor.* o *Stig.* 2-fid.
Bacca 2-ſperma.

1107. MYRICA. ♂ *Ament.* ſquama. *Cor.* nulla.
♀ *Ament.* ſquama. *Cor.* o. *Styl.* 2.
Baccca 1-ſperma.

* *Vrticae variae.* * *Morus nigra.*

* *Rhamnus.*

PENTANDRIA.

1113. IRESINE. ♂ *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 5-petala.
Nectar. 5-phyllum.
♀ *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 5-pet. *Styl.* 2.
Capſ. polyſperma.

1115. CANNABIS. ♂ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* o. *Styl.* 2.
Nux.

1116. HVMVLVS. ♂ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* o. *Styl.* 2.
Sem. calyce alatum.

1108. PISTACIA. ♂ *Cal.* 5-fidus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 3-fidus. *Cor.* o. *Styl.* 3.
Drupa ſicca.

1117. ZANONIA. ♂ *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 5-partita.
♀ *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 5-part. *Styl.* 3.
Bacca infera, 3-loc.

1112. SPINACIA. ♂ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 4-fidus. *Cor.* o. *Styl.* 4.
Sem. 1, calycinum.

1114. ACNIDA. ♂ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 2 phyllus. *Cor.* o. *Styl.* 5.
Sem. 1, calyce veſicario.

1110. ANTIDESMA. ♂ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. *Stig.* 5.
Bacca 1-ſperma.

1111. ASTRONIVM. ♂ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Nectar.* glandulis 5.
♀ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Styli.* 3. *Sem.* 1.

1281. CANARIVM. ♂. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 3-petala.
♀ *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 3-petata. *Stigma* ſeſſile. *Drupa.*

1109. ZANTHOXYLON. ♂ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Piſt.* 5. *Capſ.* 1-ſperma.

1118. FEWILLEA. ♂ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-fida. *Nectarium.* Filamentis 5.
♀ *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-fid. *Styl.* 5. *Bacca* infera.

* *Phylica dioica.* * *Rhamnus Alaternus.*

* *Salix pentandra.*

HEXANDRIA.

1120. SMILAX. ♂ *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* o. *Styl.* 3. *Bacca* ſupera, 3-loc.

1119. TAMVS. ♂ *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* o. *Styl.* 3-fid. *Bacca* infera, 3-loc.

1122. DIOSCOREA. ♂ *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* o. *Styl.* 3. *Capſ.* ſupera, 3-loc.

1121. RAJANIA. ♂ *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* nulla
♀ *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* o. *Styl.* 3. *Sem.* inferum ala aurita.

* *Rumex. Acetoſa, Acetoſella, aculeata.*

OCTANDRIA.

1123. POPVLVS. ♂ *Ament.* lacerum. *Cor.* o. *Nect.* ovat. *Stam.* 8-16.
♀ *Ament.* lacerum. *Cor.* o. *Stig.* 4-fid. *Capſ.* 2-valuis. *Sem.* pappoſa.

1124. RHODIOLA. ♂ *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-petala.
♀ *Cal.* 4-partitus. *Cor.* o. *Piſt.* 4. *Capſ.* 4, polyſpermae.

* *Laurus nobilis. Acer rubrum. Loranthus europaeus.*

ENNE-

ENNEANDRIA.

1125. MERCVRIALIS. ♂ *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* nulla.
Stam. 9-12.
♀ *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 0. *Styl.* 2.
Capſ. 2-cocca.

1126. HYDROCHARIS. ♂ *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala.
♀ *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-pet. *Styl.* 6.
Capſ. infera, 6-locul.

* *Laurus, an omnis?*

DECANDRIA.

1127. CARICA. ♂ *Cal.* ſubnullus. *Cor.* 5-fida.
♀ *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-pet. *Stig.* 3.
Bacca polyſperma.

1128. KIGGELARIA. ♂ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala.
Nectar. glandulae 5.
♀ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-pet. *Styl.* 5.
Capſ. 5-valuis.

1129. CORIARIA. ♂ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
♀ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-pet. *Styl.* 5.
Bacca 5-ſperma, petalina.

1130. SCHINVS. ♂ *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala.
♀ *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala.
Bacca 3-cocca.

* *Lychnis dioica,* * *Cucubalus otites.*
* *Guilandina dioica.* * *Phytolacca dioica.*

DODECANDRIA.

1131. MENISPERMVM. ♂ *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 12-petala.
♀ *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 6-petala.
Bacca 3-cocca.

1132. DATISCA. ♂ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* nulla.
Antherae ſeſſiles, 15.
♀ *Cal.* 2-dentatus, ſuperus. *Cor.* 0.
Capſ. 1-locularis, polyſperma.

ICOSANDRIA.

* *Spiraea Aruncus.* * *Rubus chamaemorus.*

POLYANDRIA.

1282. CIMICIFVGA. ♂ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0. *Stam.* 20.
♀ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0. *Stam.* ſterilia.
Capſ. 4-7, polyſpermae.

1133. CLIFFORTIA. ♂ *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 0. *Styl.* 2. *Capſ.* 2-cocca, infera.
* *Clematis dioica.* * *Thalictrum dioicum.*

MONADELPHIA.

1134. JVNIPERVS. ♂ *Ament.* *Cor.* nulla. *Stam.* 3.
♀ *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-pet. *Styl.* 3. *Bacca* infera, 3-ſperma, calycina.

1135. TAXVS. ♂ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* nulla. *Anther.* 8-fidae.
♀ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 0. *Styg.* 1. *Bacca* 1-ſperma, recutita.

1136. EPHEDRA. ♂ *Ament.* 2-fidum. *Cor.* nulla. *Stam.* 7.
♀ *Cal.* imbricatus. *Cor.* 0. *Piſt.* 2. *Bacca* 2-ſperma, calycina.

1188. CISSAMPELOS. ♂ *Cal.* nullus. *Cor.* 4-petala. *Stam.* 4.
♀ *Cal.* nullus. *Cor.* 0. *Stig.* 3. *Bacca* 1-ſperma.

1137. ADELIA. ♂ *Cal.* 3-partitus. *Cor.* nulla. *Stam.* 20.
♀ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 0. *Styl.* 3. *Capſ.* 3-cocca.

* *Napaea dioica.*

SYNGENESIA.

1131. RVSCVS. ♂ *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* nulla. *Stam.* 5.
♀ *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 0. *Piſt.* 1. *Bacca* 3-loc. 2-ſperma.

* *Gnaphalium dioicum.*

GYNANDRIA.

1140. CLVTIA. ♂ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 5.
♀ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-pet. *Styl.* 3. *Capſ.* 3-cocca.

MONANDRIA.

1096. NAJAS. Masc. *Cal.* cylindricus, 2-fidus. *Cor.* 4-fida. *Filamentum* nullum.
1441. Fem. *Cal.* o. *Cor.* o. *Pist.* 1. *Capſ.* ouata, vnilocularis.

marina. 1. Najas.

DIANDRIA.

1097. VALLISNERIA. Mas. *Spatha* 2-partita. *Spadix* tectus floſculis. *Cor.* 3-partitae.
1441. Fem. *Spatha* 2-fida 1-flora. *Cal.* 3-partitus, ſuperus. *Cor.* 3-petala. *Styli* 3. *Capſ.* 1-locularis, polyſperma.

ſpiralis. 1. Vallisneria.

1099. CECROPIA. Masc. *Spatha* caduca. *Amenta* imbricata ſquamis turbinatis, ſubtetragonis. *Cor.* o.
1449. Fem. vt in mare. *Germina* imbricata. *Styl.* 1. *Stigma* lacerum. *Bacca* monoſperma.

peltata. a. Cecropia. *Jacq. obſ. 2. t. 46. f. 4.*

1099. SALIX. Masc. *Amenti* ſquamae. *Cor.* o. *Glandula* baſeos nectarifera.
1442. Fem. *Amenti* ſquamae. *Cor.* o. *Stylus* 2-fidus. *Capſ.* 1-locularis, 2-valuis. *Sem.* pappoſa.

* *Foliis glabris ſerratis.*

hermaph. 1. *S.* fol. ſerratis glabris, flor. hermaphroditis diandris.

triandra. 2. S. fol. ſerratis glabris, flor. triandris.
pentandr. 3. S. fol. ſerratis glabris, flor. pentandris.
phylicif. 4. S. fol. ſerratis glabris lanceolatis: crenis vndatis.
vitellina. 5. S. fol. ſerratis ouatis acutis glabris: ſerraturis cartilagineis, petiolis calloſo-punctatis.
amygdalina. 6. S. fol. ſerratis glabris lanceolatis petiolatis, ſtipulis trapeziformibus.
haſtata. 7. S. fol. ſerratis glabris ſubouatis acutis ſeſſilibus, ſtipulis ſubcordatis.
aegyptiaca. 12. S. fol. ſubſerratis lanceolato-ouatis nudis venoſis, petiolis ſimplicibus exſtipulatis. Biedmuſk. *Brun. it. 191. t. 72.*
fragilis. 8. S. fol. ſerratis glabris ouato-lanceolatis, petiolis dentato-glanduloſis.
babylonica. 9. S. fol. ſerratis glabris lineari-lanceolatis, ramis pendulis.
purpurea. 10. S. fol. ſerratis glabris lanceolatis: inferioribus oppoſitis.
Helix. 11. S. fol. ſerratis glabris lanceolato-linearibus: ſuperioribus oppoſitis obliquis.
myrſinit. 13. S. fol. ſerratis glabris ouatis venoſis.
arbuſcula. 14. S. fol. ſubſerratis glabris ſubdiaphanis ſubtus glaucis, caule ſuffruticoſo.
herbacea. 16. S. fol. ſerratis glabris orbiculatis. *Oed. dan. t. 11.*
retuſa. 15. S. fol. ſubſerratis glabris obouatis obtuſiſſimis. *Folia venis parallelis.*

* * *Foliis glabris integerrimis.*

reticulat. 17. S. fol. integerrimis glabris ouatis obtuſis.
myrtill. 18. S. fol. integris glabris ouatis acutis.
glauca. 19. S. fol. integerrimis ſubtus tenuiſſime villoſis ouato-oblongis.

* * * *Foliis integerrimis, villoſis.*

aurita. 20. S. fol. integerrimis vtrinque villoſis obouato appendiculatis.
lanata. 21. S. fol. vtrinque lanatis ſubrotundis acutis.
lapponum. 22. S. fol. integerrimis hirſutis lanceolatis.
arenaria. 23. S. fol. integris ouatis acutis ſupra ſubvilloſis ſubtus tomentoſis.

incubacea. 24. S. fol. integerrimis lanceolatis: ſubtus villoſis nitidis, ſtipulis ouatis acutis.

repens. 25. S. fol. integerrimis lanceolatis vtrinque ſubuilloſis: caule repente.

fuſca. 26. S. fol. integerrimis ouatis ſubtus villoſis nitidis.

roſmarini-folia 27. S. fol. integerrimis lanceolato-linearibus ſtrictis ſeſſilibus ſubtus tomentoſis.

* * * * *Foliis ſubſerratis, villoſis.*

caprea. 28. S. fol. ouatis rugoſis ſubtus tomentoſis vndatis ſuperne denticulatis.

viminalis. 29. S. fol. ſubintegerrimis lanceolato-linearibus longiſſimis acutis ſubtus ſericeis, ramis virgatis.

cinerea. 30. S. fol. ſubſerratis oblongo-ouatis ſubtus ſubuilloſis, ſtipulis dimidiato-cordatis.

alba. 29. S. fol. lanceolatis acuminatis ſerratis vtrinque pubeſcentibus: ſerraturis infimis glandulosis.

TRIANDRIA.

1100. EMPETRVM. Mas. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala. *Stam.* longa. 1350.

Fem. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala. *Styli* 9. *Bacca* 9-ſperma.

album. 1. E. erectum. *Differt a ſequenti ramulis pubeſcentibus, foliis longioribus ſupra ſcabriuſculis, ſubtus canaliculatis.*

nigrum. 2. E. procumbens.

1101. OSYRIS. Mas. *Cal.* 3-fidus. *Cor.* o. 1450.

Fem. *Cal.* 3-fidus. *Cor.* o. *Stylus* o. *Stigma* ſubrotundum. *Drupa* 1-locularis.

alba. 1. Osyris.

1102.

1102. EXCOECARIA. 1451. MAS. *Amentum* nudum. *Cal.* 0. *Cor.* 0.
FEM *Amentum* nudum. *Cal.* 0. *Cor.* 0. *Styli* 3. *Capſ.* tricocca.

Agallocha, A. EXCOECARIA.

1280. CATVRVS. MAS. *Cal.* 0. *Cor.* 3-fida.
FEM. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 0. *Styli* 3. *Capſ.* 2-cocca.

ſpiciflorus. 1. B. ſpicis axillaribus pendulis. *Mant. 127.*
ramiflorus. 2. B. flor. lateralibus ſeſſilibus. *Mant. 127.*

TETRANDRIA.

1103. TROPHIS. 1451. MAS. *Cal.* 0. *Cor.* 4-petala.
FEM. *Cal.* 0. *Cor.* 0. *Stylus* 2-partitus. *Bacca* 1-ſperma.

americana. A. TROPHIS. *obſ. Bucephalon* racemoſum. *Sp. plant. 1661. huius generis; an ſpeciei?*

1104. BATIS. 1451. MAS. *Amentum* 4-fariam imbricatum. *Cal.* 0. *Cor.* 0.
FEM. *Amentum* ouatum: inuolucro 2-phyllo. *Cal.* 0. *Cor.* 0. *Stigma* bilobum, ſeſſile. *Baccae* coadunatae, 4-ſpermae.

maritima. A. BATIS.

1105. VISCVM. 1451. MAS. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 0. *Filamenta* 0. *Antherae* calyci adnatae.
FEM. *Cal.* 4-phyllus, ſuperus. *Styli* 0. *Cor.* 0. *Bacca* 1-ſperma. *Sem.* cordatum.

album. 1. V. fol. lanceolatis obtuſis, caule dichotomo, ſpicis axilaribus.

rubrum.

rubrum. 2. V. fol. lanceolatis obtuſis, ſpicis lateralibus.
purpur. 3. V. fol. obouatis, racemis lateralibus.
opuntoid. 4. V. caule prolifero ramoſiſſimo aphyllo compreſſo.
verticill. 5. V. caule verticillato, fol. ouatis trineruiis obtuſis.
terreſtre. 6. V. caule herbaceo tetragono brachiato, fol. lanceolatis.

1106. HIPPOPHAE. MAS. *Cal.* 2-partitus. *Cor.* o.
1452. FEM. *Cal.* 2-fidus. *Cor.* o.
Styl. 1. *Bacca* monoſperma.

Rhamnoid. 1. H. fol. lanceolatis.
canadenſ. 2. H. fol. ouatis.

1107. MYRICA. MAS. *Amenti* ſquama lunata *Cor.* o.
1453. FEM. *Amenti* ſquama lunata. *Cor.* o.
Styli 2. *Bacca* 1-ſperma.

Gale. 1. M. fol. lanceolatis ſubſerratis, caule ſuffruticoſo.
cerifera. 2. M. fol. lanceolatis ſubſerratis, caule arboreſcente.
quercifol. 4. M. fol. oblongis oppoſite ſinuatis.
cordifol. 5. M. fol. ſubcordatis ſerratis ſeſſilibus.
trifoliata. 3. M. fol. ternatis dentatis.

PENTANDRIA.

1108. PISTACIA. MAS. Ammenti *Cal.* 5-fidus *Cor.* ☉.
1454. FEM. diſtincta. *Cal.* 3-fidus. *Cor.* o.
Styl. 3. *Drupa* monoſperma.

trifolia. 1. P. fol. ſubternatis ſimplicibusque.
narbonen. 2. P. fol. pinnatis ternatisque ſuborbiculatis.
vera. 3. P. fol. impari-pinnatis: foliolis ſubouatis recuruis. *e Syria in Italiam intulit L. Vitellius, poſtea Caeſar factus, cum Legatus in ea prouincia eſſet. Plin. XIII. 5.*
Terebint. 4. P. fol. impari-pinnatis: foliolis ouato-lanceolatis.
Lentiſc. 5. P. fol. abrupte pinnatis: foliolis lanceolatis.

1109. ZANTHOXYLVM. Mas. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o.
1455. Fem. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Pist.* 5. *Capsf.* 5, monospermae.

clava herculis. 1. *Z.* foliis pinnatis. *Brownio Cal. 5-dentatus. Cor. 5-partita laciniis conchatis. Stam. 5. Styli* o. *Stigm. 5. Capsula 5 cocca; aliter alii; vlterius commendanda autoptis.*

trifoliatum. 2. *Z.* foliis ternatis. *Sp. pl. t. 270.*

1111. ASTRONIVM. Mas. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
1456. Fem. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Styli* 3. *Sem.* vnicum.

graueolens. 1. Astronivm. *Arbor foliis pinnatis.*

1281. CANARIVM. Mas. *Cal.* 2-phyllus *Cor.* 3-petala.
Fem. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Stygma* sessile *Drupa* Nuce trigona.

commune. 1. Canarivm. *Mant. 127.*

1118. ANTIDESMA. Mas. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. *Antherae* 2-fidae.
1455. Fem. *Cal.* 5-phyllus, *Cor.* o. *Stygmata* 5. *Bacca* cylindrica, 1-sperma.

alexiter. 1. Antidesma.

1113. IRESINE. MAS. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Nectaria* 5.
1456. FEM. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stigmata* 2, seſſilia. *Capſ.* seminibus tomentoſis.

Celoſia. A. IRESINE.

1112. SPINACIA. MAS. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o.
1456. FEM. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* o. *Styli* 4. *Sem.* 1, intra calycem induratum.

oleracea. 1. S. fructibus seſſilibus.
fera. 2. S. fructibus pedunculatis.

1114. ACNIDA. MAS. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* nulla.
1457. FEM. *Cal.* 2-phyllus *Cor.* o. *Styli* 5. *Sem.* 1, calyce ſucculento tectum.

cannabina. 1. ACNIDA.

1115. CANNABIS. MAS. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o.
1457. FEM. *Cal.* 1-phyllus, integer, latere hians. *Cor.* o. *Styli* 2. *Nux* 2-valuis, intra calycem clauſum.

ſatiua. 1. CANNABIS. *Rumph. amb. 5. t. 180.*

1116. HVMVLVS. MAS. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o.
1457. FEM. *Cal.* 1-phyllus, oblique patens, integer. *Cor.* o. *Styli* 2. *Sem.* 1, intra calycem foliatum.

Lupulus. 1. HVMVLVS.

1117.

1117. ZANONIA. MAS. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 5-partita.
1457. FEM. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 5-partita. *Styli* 3. *Bacca.* 3-locularis, infera. *Sem.* 2.

indica. 1. ZANONIA.

1118. FEVILLEA. MAS. *Cal.* 5-fidus, *Cor.* 5-fida. *Stam.* 5. *Nectar.* filamenta 5, conniuentia.
1457. FEM. *Cal.* 5-fidus. *Styli* 3. *Pomum* durum, 3-loculare, corticosum.

trilobata. 1. F. fol. lobatis subtus punctatis. Trichosanthes *punctata* fol. quinquelobis obtusis incisis subtus glandulosо-punctatis. *Sp. plant. 1432. Dioicam statuit D. Brown.*
cordifol. 2. F. fol. cordatis angulatis; *an specie distincta?*

HEXANDRIA.

1119. TAMVS. MAS. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* o.
1458. FEM. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* o. *Stylus* 3-fidus. *Bacca* 3-locularis, infera. *Sem.* 2.

commun. 1. T. fol. cordatis indiuisis.
cretica. 2. T. fol, trilobis. *Varietas praecedentis. Ger. 136.*

1120. SMILAX. MAS. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* o.
1458. FEM. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* o. *Styli* 3. *Bacca* 3-locularis. *Sem.* 2.

* *Caule aculeato, angulato.*

aspera. 1. S. caule aculeato angulato, fol. dentato-aculeatis cordatis nouemneruiis.
excelsa. 2. S. caule aculeato angulato, fol. inermibus cordatis nouemneruiis.

Ceila-

zeilanic. 3. S. caule aculeato angulato, fol. inermibus: caulinis cordatis; rameis ouato-oblongis.

Sarſaparilla. 4. S. caule aculeato angulato, fol. inermibus ouatis retuſo mucronatis trineruiis.

* * *Caule aculeato, tereti.*

China. 5. S. caule aculeato teretiuſculo, fol. inermibus ouato-cordatis quiqueneruiis.

rotundifolia. 6. S. caule aculeato tereti, fol. inermibus cordatis acuminatis ſeptemneruiis.

laurifolia. 7. S. caule aculeato tereti, fol. inermibus ouato lanceolatis trineruiis.

tamnoides. 8. S. caule aculeato-tereti, fol. inermibus cordatis oblongis ſeptemneruiis.

caduca. 9. S. caule aculeato tereti, fol. inermibus ouatis trineruiis.

* * * *Caule inermi, angulato.*

bona nox 10. S. caule inermi angulato, fol. ciliato-aculeatis.

herbacea. 11. S. caule inermi angulato, fol. inermibus ouatis, ſeptemneruiisl

* * * * *Caule inermi, tereti.*

lanceolat. 12. S. caule inermi tereti, fol. inermibus lanceolatis.

Pſeudo-China. 13. S. caule inermi tereti, fol. inermibus: caulinis cordatis; rameis ouato-oblongis quinqueneruiis.

1121. RAJANIA. 1461.

MAS. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* 0. FEM. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* 0. *Styli* 3. *Fructus* ſubrotundus, ala obliqua, inferus.

haſtata. 1. R. fol. haſtato-cordatis.

cordata. 2. R. fol. cordatis ſeptemneruiis.

quinquefolia. 3. R. fol. quinis ouato-oblongis.

1122. DIOSCOREA. 1462. MAS. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* o. FEM. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* o. *Styli* 3. *Capſ.* 3-locularis, compreſſa. *Sem.* 2, membranacea.

pentaph. 1. D. fol. digitatis. *Rumph. amb. 5. t. 127.*
triphylla. 2. D. fol. ternatis. *Rumph. amb. 5. t. 128.*
aculeata. 3. D. fol. cordatis, caule aculeato bulbifero. *Rumph. amb 5. t. 126.*
alata. 4. D. fol. cordatis, caule alato bulbifero.
bulbifera. 5. D. fol. cordatis, caule laeui bulbifero. *Rumph. amb. 5. t. 124.*
ſatiua. 6. D. fol. cordatis alternis, caule laeui tereti. *Rumph. amb. 5. t. 180.*
villoſa. 7. D. fol. cordatis alternis oppoſitisque, caule laeui. *Rumph. amb. 5. t. 162?*
oppoſitifolia. 8. D. fol. oppoſitis ouatis acuminatis. *Rumph amb. 5. t. 120.*

OCTANDRIA.

1123. POPVLVS. 1463. MAS. Amenti *Cal.* lamina lacera. *Cor.* turbinata, obliqua, integra. FEM. Amenti *Cal.* & *Cor.* maris. *Stygma* 4-fidum. *Capſ.* 2-locularis. *Sem.* multa, pappoſa.

alba. 1. P. fol. ſubrotundis dentato-angulatis ſubtus tomentoſis.
tremula. 2. P. fol. ſubrotundis dentato-angulatis vtrinque glabris. *Petioli apice compreſſi, vnde Folia tremula. Gouan.*
nigra. 3. P. fol. deltoidibus acuminatis ſerratis.
balſamifera. 4. P. fol. ouatis ſerratis ſubtus albidis, ſtipulis reſinoſis. Populus foliis ſubcordatis inferne incanis, ſuperne atrouiridibus. *Mill. dict. 7.* Tacamahaca foliis crenatis. *Pluk. alm. 360. t. 281. f. 2. Mill. dict. app. Trew. Ehret. t. 46. Folia ouato-oblonga, ſubtus alba ſuperficie vix conſpicue tomentoſa venis nudis reticulata.*
heterophylla. 5. P. fol. cordatis: iunioribus villoſis.

1124. RHODIOLA. 1465. MAS. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-petala.
FEM. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 0. *Nectaria* 4. *Pist.* 4. *Capsula.* 4, polyspermae.

Rosea. 1. RHODIOLA.

ENNEANDRIA.

1125. MERCVRIALIS. 1465. MAS. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 0. *Stam.* 9-f. 12. *Antherae* globosae, didymae.
FEM. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 0. *Styli* 2. *Capsf.* dicocca, 2-locularis, 1-sperma.

perennis. 1. M. caule simpliciſſimo, fol. scabris.
ambigua. 2. M. caule brachiato, fol. glabriusculis, flor. verticillatis: femineo masculisque.
annua. 3. M. caule brachiato, fol. glabris, flor. spicatis.
tomentos. 4. M. caule subfruticoso, fol. tomentosis.

1126. HYDROCHARIS 1466. MAS. *Spatha* 2-phylla. *Cal.* 3-fidus. *Cor.* 3-petala *Filamenta* 3 interiora stylifera.
FEM. *Cal.* 3-fidus. *Cor.* 3-petala *Styli* 6. *Capsf.* 6-locularis, polyspermа, infera.

Morsus. 1. HYDROCHARIS.
ranae.

DECANDRIA.

1127. CARICA. 1466. MAS. *Cal.* subnullus. *Cor.* 5-fida, infundibuliformis. *Filamenta* in tubo corollae: alterna breuiora. FEM. *Cal.* 5-dentatus *Cor.* 5-petala. *Stigmata* 5. *Bacca* 1-locularis, polyſperma.

Papaya. 1. C. foliorum lobis ſinuatis. *Rumph. amb. 1. t. 50. 51. Trew. ehret. t. 7. Hugh. barb. 181. t. 14. 15.*

Poſopoſa. 2. C. foliorum lobis integris.

1128. KIGGELARIA. 1466. MAS. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala: glandulae 5 trilobae. *Antherae* apicibus perforatae FEM. *Cal.* & *Cor.* maris. *Styli* 5. *Capſ.* 1-locularis, 5-valuis, polyſperma.

africana. 1. KIGGELARIA.

1130. SCHINUS. 1467. MAS. *Cal.* 5-fidus. *Petala.* 5. FEM. *Flos* maris. *Bacca* 3-cocca.

Molle. 1. S. fol. pinnatis: foliolis ſerratis impari longiſſimo, petiolis aequalibus.

Areira. 2. S. fol. pinnatis: foliolis integerrimis aequalibus, petiolis aequalibus.

1129. CORIARIA. 1467. MAS. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala, calyci ſimillima, connexa. *Antherae* bipartitae. FEM. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* maris. *Styli* 5. *Sem.* 5, petalis ſuccu-lento-baccatis tecta.

myrtyfolia. 1. C. fol. ouato-oblongis. Coriaria hermaphroditica. *Turr. farſet. 13. (femina). femina gaudet Antheris ſterilibus. Ger. 341.*

ruſcifol. 2. C. fol. cordato-ouatis ſeſſilibus.

DODE-

DODECANDRIA.

1132. DATISCA. 1469. MAS. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0. *Antherae* ſeſſiles, longae, 15.
FEM. *Cal.* 2-dentatus. *Cor.* 0. *Styli* 3. *Capſ.* 3-angularis, 3-cornis, 1-locularis, peruia, polyſperma, infera.

Cannabin. 1. D, caule laeui.
hirta. 2. D. caule hirſuto.

1131. MENISPERMVM. 1468. MASC. *Petala* 4 exteriora; 8 interiora. *Stam.* 16.
FEM. *Cor.* maris. *Stam.* 8. ſterilia. *Baccae* binae monoſpermae.

canadenſ. 1. M. fol. peltatis cordatis ſubrotundo-angulatis.
virginicum. 2. M. fol. peltatis cordatis lobatis.
carolinum. 3. M. fol. cordatis ſubtus villoſis.
Coccullus. 4. M. fol. cordatis retuſis mucronatis, caule lacero.
criſpum. 5. M. fol. cordatis exquiſitis, caule quadrangulo criſpo.
orbiculat. 6. M. fol. orbiculatis ſubtus villoſis.
hirſutum. 7. M. fol. lanceolato-ouatis villoſis.
myoſotoid. 8. M. fol. lineari-lanceolatis hirſutis.

POLYANDRIA.

1282. CIMICIFVGA. MAS. *Cal.* ſub 5-phyllus. *Cor.* 0. *Stam.* 20
FEM. *Cal.* ſubpentaphyllus. *Cor.* 0. *Stam.* 20 ſterilia. *Capſ.* 4-7, polyſpermae.

foetida. 1. CIMICIFVGA. Actaea cimicifuga. *Sp. pl. 722. Similis Actaeae racemoſae.* Cal. *3-phyllus, concauus, caducus, intra quem foliola duo oppoſita (ſaepius), calycinis ſimillima. Herbae odor teterrimus. Figura in diſſ. Aphonini.*

1133. CLIFFORTIA. MAS. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 0. *Stam.* fere 30.
1469. FEM. *Cal.* 3-phyllus, ſuperus. *Cor.* 0. *Styli* 2. *Capſ.* 2-locularis. *Sem.* 1.

ilicifolia. 1. C. fol. ſubcordatis dentatis
ruſcifol. 2. C. fol. lanceolatis integerrimis. *Folia floralia vtrinque ſpina marginali prope terminalem armata.*
polygonif. 3. C. fol. linearibus piloſis.
trifoliata. 4. C. fol. ternatis: intermedio tridentato.

MONADELPHIA.

1134. JVNIPERVS. MAS. *Amenti* Calyx ſquamae. *Cor.* 0. *Stam.* 3.
1470. FEM. *Cal.* 3-partitus. *Petala* 3. *Styli* 3. *Bacca* 3-ſperma, tribus tuberculis calycis inaequalis.

thurifera. 3. I. fol. quadrifariam imbricatis acutis.
barbadenſis. 6. I. fol. omnibus quadrifariam imbricatis: iunioribus ouatis, ſenioribus acutis.
bermudiana. 7. I. fol. inferioribus ternis: ſuperioribus binis decurrentibus ſubulatis patulis acutis.
chinenſis. I. fol. patentibus confertis: caulinis ternis, rameis quaternis. *Mant. 127.*
Sabina. 9. I. fol oppoſitis erectis decurrentibus: oppoſitionibus pyxidatis.
virginiana. 8. I. fol. ternis baſi adnatis: iunioribus imbricatis; ſenioribus patulis. *(excluſo Plukenetio).*
commun. 1. I. fol. ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus.
Oxycedr. 2. I. fol. ternis patentibus mucronatis, bacca breuioribus.
phoenicea. 9. I. fol. ternis obliteratis imbricatis obtuſis.
lycina. 4. I. fol. ternis vndique imbricatis ouatis obtuſis.

1135. TAXVS. Mas. *Cal.* 3-phyllus gemmae. *Cor.* o.
1472. *Stamina* multa. *Antherae* peltatae, 8-fidae.
Fem. *Cal.* 3-phyllus gemmae. *Cor.* o. *Stylus* o. *Sem.* 1, calyculo baccato, integerrimo.

baccata. 1. T. fol. approximatis.
nucifera. 2. T. fol. diſtantibus.

1136. EPHEDRA. Mas. *Amenti* Calyx 2-fidus. *Coroll* o. *Stamina* 7. *Antherae* 4. inferiores; 3 Superiores.
1471. Fem. *Cal.* 2-partitus, 5-tuplex. *Cor.* o. *Piſt.* 2. *Sem.* 2, calyce baccato tecta.

diſtachya. 1. E. pedunculis oppoſitis: amentis geminis.
monoſtachia. 2. E. pedunculis pluribus: amentis ſolitariis, *nimis affinis praecedenti.*

1138. CISSAMPELOS. Mas. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Nectarium* rotatum. *Stam.* 4: filamentis connatis.
1473. Fem. *Cal.* monophyllus, ligulato-ſubrotundus. *Cor.* o. *Styli* 3. *Bacca.* 1-ſperma.

Pareira. 1. C. fol. peltatis cordatis emarginatis. *Forte femina ſequentis.*
Caapeba. 2. C. fol. baſi petiolatis integris.
Smilacin. 3. C. fol. cordatis acutis angulatis.

1137. ADELIA. MAS. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* o. *Stam.* plurima, basi coalita.
1473. FEM. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Styli* 3, laceri. *Capsj.* 3-cocca.

Bernardia 1. A. fol. oblongis tomentosis serratis.
Ricinella. 2. A. fol. obouatis integerrimis.
Acidoton. 3. A. ramis flexuosis, spinis gemmaceis.

SYNGENESIA.

1139. RVSCVS. MAS. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* o. *Nectarium* centrale, ouatum, apice perforatum.
1474. FEM. *Calyx*, *Corolla* & *Nectarium* maris. *Stylus* 1. *Bacca* 3-locularis *Sem.* 2.

aculeat. 1. R. fol. supra floriferis nudis.
Hypoph. 2. R. fol. subtus floriferis nudis.
Hypogl. 3. R. fol. subtus floriferis sub foliolo.
androgyn. 4. R. fol. margine floriferis.
racemos. 5. R. racemo terminali hermaphroditico. Laurus alexandrina angustifolia ramosa, fructu ad extremum ramoso. *Morif. hist. 3. p. 541. s. 13. t. 5. f. 14. Calyx cum corolla coalita fere in totum & deciduus. Hort. cliff. 466. Fructus monospermus. Hall. goeb. 78. Flos hermaphroditus.*

GYNANDRIA.

1140. CLVTIA. MAS. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
1475. FEM. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Styli* 3. *Capsj.* 3-locularis. *Sem.* 1.

alatern. 1. C. fol. subsessilibus lineari-lanceolatis, flor. solitariis erectis.

pulchel-

pulchella. 2. C. fol, ouatis integerrimis, flor. lateralibus.
retuſa. 4. C. fol. oualibus retuſis, flor. racemoſis axillaribus.
Eluteria. 5. C. fol. cordato-lanceolatis. *Decandra generis dubii.*
polygonoi-des. 3. C. fol. lanceolatis, flor. axillaribus plurimis.
ſtipularis. C. fol. oualibus ſubtus tomentoſis. *Mant. 127.*
androgyn. C. fol. ellipticis, flor. lateralibus binis. *Mant. 128.*

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

1141. MVSA. ☿ *Cal.* nullus. *Cor.* 2-petala. *Stam.* 6. 1. fertil. *Pist.* 1. *Bacca* infera.
☿ *Cal.* nullus. *Cor.* 2-petala. *Stam.* 6. 5. perfect. *Pist.* 1. *Bacc.* nulla.

1146. HOLCVS. ☿ *Glum.* 1-flora. *Glum.* 2-valu. *Stam.* 3. *Styl.* 2. *Sem.* 1.
♂ *Glum.* 1-flor. *Glum.* 2-valu. *Stam.* 3.

1149. CENCHRVS. ☿ *Glum.* 2-flor. *Glum.* 3-valu. *Stam.* 3. *Styl.* 2-fid. *Sem.* 1.
♂ *Involuc.* idem. *Glum.* 2-valu. *Stam.* 3.

1148. ISCHAEMVM. ☿ *Glum.* 2-flor. *Glum.* 2 valu. *Stam.* 3. *Styl.* 2. *Sem.* 1.
♂ *Glum.* eadem. *Glum.* 2-valu. *Stam.* 3.

1150. AEGILOPS. ☿ *Glum.* 3-flor. *Glum.* 3-arist. *Stam.* 3. *Styl.* 2. *Sem.* 1.
♂ *Glum.* 3-flor. *Glum.* 3-arist. *Stam.* 3.

1145. ANDROPOGON. ☿ *Glum.* 1-flor. *Glum.* basi arist. *Stam.* 3. *Styl.* 2. *Sem.* 1.
♂ *Glum.* 1-flor. *Glum.* basi arist. *Stam.* 3.

1147. APLVDA. ☿ *Cal.* Gluma communis floſculo femineo ſeſſili; maſculis pedunculatis.
☿ *Cal.* 0. Gluma 2-valu. *Styl.* 1. *Sem.* 1.
♂ *Cal.* 0. Glum. 2-valu. *Stam.* 3.

1151. VALANTIA. ☿ *Cal.* nullus. *Cor.* 4-partita *Stam.* 4. *Styl.* 2-fid. *Sem.* 1.
♂ *Cal.* null. *Cor.* 3-ſ. 4-part. *St.* 3-ſ. 4.

1142. OPHIOXYLON. ☿ *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-fida. *Stam.* 3. *Pist.* 1.
♂ *Cal.* 2-fidus. *Cor.* 5-fida. *Stam.* 2.

1143. CELTIS. ☿ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* nulla. *Stam.* 5. *Styl.* 2. *Drupa.*
♂ *Cal.* 6-partitus. *Cor.* nulla. *Stam.* 6.

1144. VERATRVM. ☿ *Cal.* nullus. *Cor.* 6-petala. *Stam.* 6. *Pist.* 3. *Capſ.* 3.
♂ *Cal.* nullus. *Cor.* 6-petala. *Stam.* 6.

1155. ACER. ☿ *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 8. *Styli.* 2. *Capſ.* 2-cocca alata.
♂ *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 8.

1157. GOUANIA. ☿ *Cal.* 5-fidus, ſuperus. *Cor.* 0. *Stam.* 5. *Styl.* 3-fidus. *Fructus* 3-queter, 3-partibilis.
♂ *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 0. *Stam.* 5.

1156. BEGONIA. ☿ *Cal.* Germen. *Cor.* 5-petala. *Stam.* pl. *Styl.* 3. *Capſ.* 3-cocca.
♂ *Cal.* nullus. *Cor.* 4-petala. *Stam.* pl.

1158. MIMOSA. ☿ *Cal.* 5-dent. *Cor.* 5-fid. *Stamina* 4-100. *Piſt.* 1. *Legum.*
♂ *Cal.* 5-dent. *Cor.* 5-fida. *Stamina* 4-100.

1233. TERMINALIA. ☿ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 0. *Stam.* 10. *Drupa* infera.
♂ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 1. *Stam.* 10.

1154. CLVSIA. ♀ *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 4. ſ. 6-petala. *Antherae* aggreg. *Stig.* 4. 6. *Capſ.* 6-loc. polyſperma.
♂ *Cal.* 4-ſ. 6-phyll. *Cor.* 6-petala. *Stam.* pl.

1152. PARIETARIA. ☿ *Cal.* 4-fidus. *Cor.* nulla. *Stam.* 4. *Styl.* 1. *Sem.* 1.
♀ *Cal.* 4-fidus. *Cor.* nulla. *Styl.* 1. *Sem.* 1.

1153. ATRIPLEX. ☿ *Cal.* 5-phyll. *Cor.* nulla. *Stam.* 5. *Styl.* 2-fid. *Sem.* 1.
♀ *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* nulla. *Styl.* 1-fid. *Sem.* 1.

* *Aeſculus. Mammea. Jacq. Euphorbia. Melothria.*

DIOECIA.

1166. PANAX. ☿ *Vmbell. Cal.* 5-d. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 5. *Styl.* 2. *Bacc.* 2-ſperm.
♂ *Vmbell. Cal.* integ. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 5.

1161. DIOSPYOS. ☿ *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida. *Stam.* 8. *Styl.* 4-fid. *Bacca* 8-ſperma.
♂ *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida. *Stam.* 8.

MIMOSAE *Species difficilime omnium Generis charactere combinantur.*
Aliae Calice corollaque *4-fida, 5-fida, polypetala, apetala.*
Aliae Staminibus *4, 5, 10, plurimis, ſubdiadelphis.*
Aliae Legumine *membranaceo, alato, baccato, articulato.*

1163. NYSSA. ☿ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* nulla. *Stam.* 5. *Pist.* 1. *Drupa* infera.
♂ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* nulla. *Stam.* 10.

1160. FRAXINVS. ☿ *Cal.* o-f. 4-part. *Cor.* o-f. 4-pet. *Stam.* 2. *Pist.* 1. *Sem.* 1.
♀ *Cal.* o-f. 4-part. *Cor.* o-f. 4-pet. *Pist.* 1. *Sem.* 1.

1164. ANTHOSPERMVM. A. ♂ *Cal.* 4-fidus. *Cor.* nulla *Stam.* 4.
♀ *Cal.* 4-fid. *Cor.* nulla. *Styl.* 2. *Peric.* inferum.
B. ♂ *Cal.* 4 fid. *Cor.* nulla. *Stam.* 4.

1165. ARCTOPVS. A. ♂ *Vmbella.* *Cor.* 5-petala. *Stam.* 5.
♀ *Vmb.* eiusdem. *Cor.* 5-petala *Styl.* 2. *Sem.* 1, biloculare.
B. ♂ *Inuol.* maxim. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 5.

1159. GLEDITSIA. A. ☿ *Cal,* 4-fidus. *Cor.* 4-petala. *Stam.* 6. *Pist.* 1. *Legum.*
♂ *Cal.* 3 phyll. *Cor.* 3-petala. *Stam.* 6.
B. ♀ *Cal.* 5-phyll. *Cor.* 5-petala. *Pist.* 1. *Legumen.*

1163. PISONIA. A. ☿ *Cal.* nullus. *Cor.* 5-fida. *Stam.* 6. *Pist.* 1. *Capf.* 5-valuis.
B. ♂ *Cal.* nullus. *Cor.* 5-fida. *Stam.* 6.
♀ *Cal.* nullus. *Cor.* 5-fida. *Pist.* 1. *Capf.* 5-valuis.

* *Ilex Aquifolium.*
Rhamnus Alaternus. Guilandina.

TRIOECIA.

1167. CERATONIA. A. ☿ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o *Stam.* 5. *Styl.* 1. *Legum.* coriaceum, polyfperm.
B. ♂ *Cal.* 5-partitus *Cor.* o. *Stam.* 5.
♀ *Cal.* fub 5-dent. *Cor.* o. *Stylus* 1. *Legum.* coriaceum, polyfperm.

1168. FICVS. *Recept.* commune turbinatum, conniuenti-clauſum, carnoſum.
A. ♀ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Pist.* 1. *Sem.* 1.
B. ♂ *Cal.* 3-partitus. *Cor.* o. *Stam.* 3.
C. ♂ & ♀ intra item Receptaculum commune, diſtinctis fructificationibus partialibus.

MONOE-

MONOECIA.

1141. MVSA. HERMAPHRODITVS. *Cal.* spatha. *Cor.* 2-petala: altero erecto, 5-dentato; altero nectarifero, concauo, breuiore. *Filamenta* 6, horum 5 perfecta. *Stylus* 1. *Germen* inferum, abortiens.

1477.

HERMAPHRODITA. *Calyx*, *Corolla*, *Filamenta*, *Pistillum* hermaphroditi, filamento vnico perfecto. *Bacca* oblonga, 3-quetra, infera.

paradisiaca. 1. M. spadice nutante, floribus masculis persistentibus.
sapientum. 2. M. spadice nutante, floribus masculis deciduis.
Troglodytarum. 4. M. spadice erecto, spathis deciduis. *Fructus polyspermus est.*
Bihai. 3. M. spadice erecto, spathis persistentibus. *Fructus trispermus describitur.*

1142. OPHIOXYLON. HERMAPHROD. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-fida, infundibulif. *Stam.* 5. *Pist.* 1.

1478.

MASC. *Cal.* 2-fidus. *Cor.* 5-fida, infundibulif. ore nectario cylindrico. *Stam.* 2.

serpentinum. 1. OPHIOXYLON. Radix mustelae. *Rumph. amb. 7. p. 26. t. 16.* Tjouanna. *Rheed. mal. 6. p. 81. t. 7. hanc potius refert quam Ophiorrhizam: at* Rex amoris. *Rumph. amb. 2. p. 129. t. 41. diuersa arbor est.*

1143. CELTIS. HERMAPHROD. *Cal.* 5-partitus. *Corol.* 0. *Stam.* 5. *Styli* 2. *Drupa* 1-sperma.
1478. MASC. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* 0. *Stamina* 6.

australis 1. C. fol. ouato-lanceolatis.
orientalis. 2. C. fol. oblique cordatis serratis: subtus villosis.
occidental. 3. C. fol. oblique ouatis serratis acumunatis.

1144. VERATRVM. HERMAPHROD. *Cal.* 0. *Cor.* 6-petala. *Stam.* 6. *Pist.* 3. *Capsi.* 3, polyspermae.
1479. MASC. *Cal.* 0. *Cor.* 6-petala. *Stam.* 6. *Pist.* rudimentum.

album. 1. V. racemo supradecomposito, corollis erectis.
nigrum. 2. V. racemo composito, corollis patentissimis.
luteum. 3. V. racemo simplicissimo, fol. sessilibus.

1145. ANDROPOGON. HERMAPHD. *Cal.* Gluma vniflora. *Cor.* Gluma basi aristata. *Stam.* 3. *Styli* 2. *Sem.* 1.
1480. MASC. *Cal.* & *Cor.* prioris. *Stam.* 3.

caricosum. 1. A. spica solitaria imbricata, sem. hirsutis: aristis nudis contortis.
contortum. 2. A. spica solitaria, flor. inferioribus muticis.
diuaricatum. 3. A. spica oblonga, flor. lanatis remotis diuaricatis: arista flexuosa nuda.
gryllus. 5. A. paniculae pedunculis simplicissimis trifloris: flosculo hermaphrodito aristato ciliato basi barbato.
nutans. 4. A. panicula nutante: aristis tortuosis laeuibus, glumis calycinis hirsutis.

alope-

alopecuroi-des. 8. A. panicula laxa, rachi lanata, floſculo vtroque ariſta tortuoſa.

diſtachyum. 9. A. ſpicis binis terminalibus, culmo indiuiſo. *Ger. prou. 106. t. 3. f. 2. Calycis valuula exterior ſubtruncata apice ſcarioſo pubeſcente.*

Schoenanthus 10. A. paniculae ſpicis coniugatis ouato oblongis, rachi pubeſcente, floſculis ſeſſilibus ariſtata tortuoſa. *Rumph. amb. 5. t. 72.*

virginicum. 11. A. paniculae ſpicis coniugatis, pedunculis ſimplicibus, rachi lanata, floſculis muticis: maſculo tabeſcente.

bicorne. 12. A. paniculae ſpicis coniugatis, pedunculis ramoſiſſimis, rachi lanata, floſculis ariſta caduca, maſculo tabeſcente.

hirtum. 13. A. paniculae ſpicis coniugatis, calycibus hirſutis.

inſulare. 6. A. panicula laxa glabra, floſculis geminis muticis, pedicello altero breuiore, calyc. lanatis. *Sloan. iam. t. 14. f. 2.*

Nardus. 14. A. paniculae ramis ſupradecompoſitis proliferis.

muticum. 15. A. ſpicis digitatis ſubternis: floſculis alternis ſeſſili muticis.

Iſchoemum. 16. A. ſpicis digitatis plurimis, floſculis ſeſſilibus: ariſtato muticoque, pedicellis lanatis.

faſciculatum. 17. A. ſpicis digitatis plurimis erectiuſculis articulatis laeuibus: floſculis vtrinque ariſtatis.

polydactylon. 18. A. ſpicis faſciculatis, petalis exterioribus ariſtatis; floſculi inferioris ciliato-barbatis.

1146. HOLCVS. 1483.

HERMAPHROD. *Cal.* Gluma 1-ſ. 2-flora. *Cor.* Gluma ariſtata. *Stam.* 3. *Styli* 2. *Sem.* 1.

MASC. *Cal.* Gluma 2-valuis. *Cor.* 0. *Stam.* 3.

ſpicatus. 1. H. glumis biſloris muticis, floribus geminis penicillo inuolucratis, ſpica ouato-oblonga.

Sorghum. 2. H. glumis villoſis, ſeminibus ariſtatis.

halepenſis. 4. H. glumis glabris, flor. hermaphroditis muticis; ſemineo ariſtato.

ſaccharatus. 3. H. glumis glabris, ſeminibus muticis. *Rumph. amb. 5. t. 75.*

mollis. 6. H. glumis bifloris nudiuſculis: floſculo hermaphrodito mutico; maſculo ariſta geniculata. *Calyces acuminati magis quam in reliquis.*

lanatus. 5. H. glumis bifloris villoſis: floſculo hermaphrodito mutico; maſculo ariſta recurua.

laxus. 8. H. glumis bifloris glabris muticis acuminatis, panicula filiformi debili.

ſtriatus. 10. H. glumis bifloris ſtriatis muticis acuminatis, panicula conferta oblonga.

odoratus. 7. H. glumis trifloris muticis acuminatis: floſculo hermaphrodito diandro.

latifolius. 9. H. glumis trifloris: floſculo primo inermi, duobus margine aculeatis, fol. ſubouatis.

1147. APLVDA. *Cal.* Gluma communis biualuis: floſculo *femineo* ſeſſili, *maſculisque* pedunculatis.
1486. FEM. *Cal.* o. *Cor.* biualuis. *Styl.* 1. *Sem.* 1, tectum.
MASC. *Cal.* o. *Cor.* biualuis. *Stam.* 3.

mutica. 1. A. fol. lanceolatis, floſculis omnibus muticis.

ariſtata. A. A. fol. lanceolatis floſculis maſculis muticis; ſeſſili ariſta terminali.

Zeugites. B. A. fol. ouatis, floſculis maſculis muticis; ſeſſili ariſta terminali.

1148. ISCHAEMVM. HERMAPHROD. *Cal.* Gluma 2-flora. *Cor.* 2-valuis. *Stam.* 3. *Styli* 2. *Sem.* 1.
1487. MACS. *Cal.* & *Cor.* vt in priore. *Stam.* 3.

muticum. 1. I. ſeminibus muticis.

ariſtatum. 2. I. ſeminibus ariſtatis.

1149. CEN-

1149. CENCHRVS. *Inuolucrum* laciniatum, echinatum, 2-florum. *Cal.* Gluma biflora; altero maſculo, altero hermaphrodito.
1487. HERMAPHROD. *Cor.* Gluma mutica. *Stam.* 3. *Sem.* 1.
MASC. *Cor.* Gluma mutica *Stam* 3.

racemoſ. 1. C. panicula ſpicata, glumis muricatis ſetis ciliaribus. Agroſtis panicula ſpicata, glumis echinatis. *Ger. prou. 83. quod omnes flores ſunt hermaphroditi. Glumae abſoluta floreſcentia rubent. Gou.*
lappacea. 2. C. paniculae ramis ſimpliciſſimis, corollis retrorſum hiſpidis, calycibus triualuibus bifloris.
capitatus. 3. C. ſpica ouata ſimplici. *Culmi geniculo vnico. Gou.*
echinata. 3. C. ſpica oblonga conglomerata.
tribuloides. 4. C. ſpica glomerata, glumis femineis globoſis muricato-ſpinoſis hirſutis.
fruteſc. 5. C. capitulis lateralibus ſeſſilibus, fol. mucronatis, caule fruticoſo.

1150. AEGILOPS. HERMAPHROD. *Cal.* Gluma ſubtriflora, cartilaginea. *Cor.* Gluma terminata triplici ariſta. *Stamina* 3. *Styli* 2. *Sem.* 1.
1489. MACS. *Cal.* & *Cor.* Gluma, vt in priore. *Stam.* 3.

ouata. 1. Æ. ſpica ariſtata, calyc. omnibus triariſtatis
caudata. 2. Æ. ſpica ariſtata, calyc. omnibus biariſtatis.
triuncial. 4. Æ. ſpica ariſtata, calyc. inferioribus biariſtatis.
ſquarroſa. 3. Æ. ſpica ſubulata ariſtis longiore.
incuruata. 4. Æ. ſpica ſubulata mutica laeui incurua, calyc. vniflori.

1151. VALANTIA. HERMAPHROD. *Cal.* o. *Cor.* 4-partita. *Stam.* 4. *Stylus* 2-fidus. *Sem.* 1.
1490. MASC. *Cal.* o. *Cor.* 3-f. 4-partita. *Stam.* 4-f. 3. *Piſtillum* obſoletum.

muralis. 2. V. flor. maſculis trifidis germini hermaphroditici glabro inſidentibus. *Caulis & Folia glabra.*

hiſpida. 1. V. flor. maſculis trifidis germini hermaphroditici hiſpido inſidentibus. *Caules hiſpidi. Folia ſcabra.*

Cucullaria. 3. V. fructificationibus ſingulis bractea ouata deflexa obtectis.

Aparine. 4. V. flor. maſculis trifidis pedicellatis hermaphroditici pedunculo inſidentibus.

articulat. 5. V. flor. maſculis quadrifidis, pedunc. dichotomis aphyllis, fol. cordatis. *Folia glabra, ſubciliata margine ſcabro: Floralia ſeſſilia, ſubcordata: baſi inuoluta, abſoluto flore arcte reflexa fructumque occultantia; maturo fructu caulis florifer cum foliis ſecundum articulos diſcedit.*

Cruciata. 6. V. flor. maſculis quadrifidis, pedunc. diphyllis.

glabra. 7. V. flor. maſculis quadrifidis, pedunc. dichotomis aphyllis, fol. oualibus ciliatis.

hypocarpia. 8. V. flor. omnibus quadrifidis inferis, pedunc. nudis vnifloris.

1152. PARIETARIA. HERMAPHROD. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* o. *Stamina* 4. *Styl.* 1. *Sem.* 1, ſuperum, elongatum.
1452. FEM. *Cal.* 4-fidus. *Coroll.* o. *Stam.* o. *Stylus* 1. *Sem.* 1. ſuperum, elongatum.

indica. 6. P. fol. lanceolatis, caule erecto. *Mant. 128.*

officinalis. 1. P. fol. lanceolato-ouatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. *Flores feminei tetragoni, pyramidati.*

luſita-

luſitanic. 3. P. fol. ouatis obtuſis, caulibus filiformibus ſtriatis laeuibus procumbentibus. Parietaria ocymi folio tragi. *Bocc. ſicc.* 47. *t.* 24. *f. A. Flores maſculi gemini, tubuloſi, cylindrici, ore mucronato conniuentes. Flos femineus intermedius ouatus.*

judaica. 2. P. fol. ouatis, caulibus erectiuſculis, calycibus trifloris, corollis maſculis elongato-cylindricis.

cretica. 3. P. fol. ſubouatis, inuolucris fructiferis quinquefidis compreſſis: laciniis lateralibus maioribus.

microphylla. 5. P. fol. oppoſitis integerrimis obouatis minoribusque immixtis ovatis.

1153. ATRIPLEX. HERMAPHROD. *Cal.* 5-phyllus. 1492. *Cor.* 0. *Stam.* 5. *Stylus* 2-partitus. *Sem.* 1- depreſſum. FEM. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 0. *Stam.* 0. *Stylus.* 2-partitus. *Sem.* 1, compreſſum.

Halimus. 1. A. caule fruticoſo, fol. deltoidibus integris.

portulac. 2. A. caule fruticoſo, fol. obouatis.

glauca. 3. A. caule ſuffruticoſo procumbente, fol. ouatis ſeſſilibus integerrimis: inferioribus ſubdentatis.

roſea. 4. A. caule herbaceo, fol. incanis ſerratis, fructibus quadrangularibus dentatis.

ſibirica. 5. A. caule herbaceo. fol. deltoidibus angulatis, calyc. fructus extus muricatis.

tatarica. 6. A. caule herbaceo, fol. deltoidibus ſinuato-dentatis vndulatis alternis. Atriplex maritima noſtras procerior. *Pluk. alm.* 60. *altitudo humana.*

hortenſis. 7. A. caule erecto herbaceo, fol. triangularibus.

laciniata. 8. A. caule herbaceo, fol. deltoideis dentatis ſubtus argenteis.

haſtata. 9. A. caule herbaceo, Cal. valuulis femineis magnis deltoidibus ſinuatis.

patula. 7. A. caule herbaceo patulo, fol. ſubdeltoideo-lanceolatis, calycibus ſeminum diſco dentatis.

littoralis. 8. A. caule herbaceo erecto, fol. omnibus linearibus integerrimis.

pedunculata. β. A. caule herbaceo diuaricate, fol. lanceolatis obtusis integris, calycibus femineis pedunculatis. *Sp. pl.* 1675.

1283. TERMINALIA. MASC. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 0. *Stam.* 10.
HERMAPHROD. *Flos* masculi. *Stylus* 1. *Drupa* infera, cymbiformis.

Catappa. 1. TERMINALIA. *Mant.* 128.

1154. CLVSIA. MASC. *Cal.* 4-s. 6-phyllus: foliolis oppositis, imbricatis. *Cor.* 4-s. 6-petala. *Stam.* numerosa. 1495.
FEM. *Cal.* & *Cor.* vt in masculis. *Nectarium* ex antheris coalitis germen includens. *Capsf.* 5-locularis, 5-valuis, pulpa farcta.

rosea. 1. C. fol. aueniis, corollis hexapetalis.
alba. 2. C. fol. aueniis, corollis pentapetalis.
flaua. 3. C. fol. aueniis, corollis tetrapetalis.
venosa. 4. C. fol. venosis. *Iacq. amer.* 273.

1155. ACER. HERMAPHROD. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 8. *Pist.* 1. *Capsf.* 2. s. 3, monospermae, ala terminatae. 1495.
MASC. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stamina.* 8.

semper-virens. 10. A. fol. ouatis integerrimis semperuirentibus. *Mant.* 128.
tataricum. 1. A. fol. cordatis indiuisis serratis: lobis obsoletis, flor. racemosis.
Pseudo-platanus. 2. A. fol. quinquelobis inaequaliter serratis, flor. racemosis. *Duham. arb.* 1. *t.* 36. *f.* 1.
rubrum.

rubrum. 3. A. fol. quinquelobis ſubdentatis ſubtus glaucis, pedunculis ſimpliciſſimis aggregatis. *Dioica.*

ſaccharin. 4. A. fol. quinquepartito-palmatis acuminato-dentatis.

platanoides. 5. A. fol. quinquelobis acuminatis acute dentatis glabris, flor. corymboſis.

penſyluanicum. 6. A. fol. trilobis acuminatis ſerrulatis, flor. racemoſis.

campeſtr. 7. A. fol. lobatis obtuſis emarginatis.

monſpeſſ. 8. A. fol. trilobis integerrimis glabris.

creticum. A. A. fol. trilobis integerrimis pubeſcentibus.

Negundo. 9. A. fol. compoſitis, flor. racemoſis.

1157. GOVANIA. HERMAPHROD. *Cal.* 5-fidus. *Coroll.* 0. *Antherae* 5, ſub calyptra tectae. *Stylus* 3-fidus. *Fructus* inferus, tripartibilis.
1163. MASC. ſimilis, absque germine ſtigmateque.

domingenſis. 1. G. fol. glabris. *Iacq. amer.* 264. *Huius generis videtur. Pluk. phyt.* 263. *f.* 3.

1156. BEGONIA. HERMAPHROD. *Calycis* loco Germen. *Cor.* 5-petala. *Stam.* plura (an 6?) *Styl.* 3. *Capſ.* 3-cocca.
1497. MASC. *Cal.* nullus. *Cor.* 4-petala. *Stam.* plura.

obliqua. 1. BEGONIA. *Iacq. obſ.* 2. *t.* 35.

1158. MIMOSA. HERMAPHROD. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida. *Stam.* 5-f. plura. *Piſt.* 1. *Legumen.*
1498. MASC. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida. *Stam.* 5, 10, plura.

* *Foliis ſimpliciter pinnatis.*

Inga. 1. M. inermis, fol. pinnatis 5-jugis: petiolo marginato-articulato.

fagifolia. 2. M. inermis, fol. pinnatis 2-jugis: petiolo marginato. *Jacq. amer.* 264. *t.* 164. *Folia interdum triiuga.*

nodoſa. 3. M. inermis, fol. pinnatis 2-jugis: pinnis interioribus minoribus, petiolo lineari.

* * *Foliis bigeminis ſ. tergeminis.*

bigemina. 4. M. inermis, fol. bigeminis acuminatis.

Vng. cati. 6. M. ſpinoſa, fol. bigeminis obtuſis. *Plum. ic. t.* 4.

tergemin. 5. M. inermis, fol. tergeminis. *Iacq. amer.* 265. *flor. monadelphi, polyandri.*

* * * *Foliis coniugatis (ſimulque pinnatis.)*

latifolia. 7. M. inermis, fol. coniugatis: pinnis terminalibus oppoſitis; lateralibus alternis.

purpurea. 9. M. inermis, fol. coniugatis pinnatis: pinnis intimis minoribus. *Plum. ic.* 10. *f.* 1.

reticulata. 43. M. ſpinis ſtipularibus, fol. coniugatis: foliolis ſexiugis, petiolis glandula aculeoque terminatis.

viua. 11. M. inermis, fol. coniugatis pinnatis: partialibus quadriiugis ſubrotundis, caule herbaceo inermi.

circinalis. 8. M. aculeata, fol. coniugatis pinnatis: pinnis aequalibus, ſtipulis ſpinoſis.

cineraria. 10. M. aculeata. fol. coniugatis pinnatis: pinnis aequalibus, aculeis incuruis.

caſta. 12. M. aculeata, fol. coniugatis pinnatis; partialibus triiugis ſubaequalibus.

ſenſitiua. 13. M. aculeata, fol. coniugatis pinnatis: partialibus biiugis: intimis minimis.

pudica. 14. M. aculeata, fol. ſubdigitatis pinnatis: caule hiſpido.

* * * * *Foliis duplicato-pinnatis.*

Entada. 16. M. inermis, fol. bipinnatis cirrho terminatis: partialibus quinqueiugis. Mimoſa inermis, fol. bipinnatis: partialibus propriisque ſexiugis oblongis. *Iacq. amer. 265. t. 183.*

ſcandens. 15. M. inermis, fol. coniugatis cirrho terminatis: foliolis biiugis. Phaſeolus noui orbis ſ. Fabo purgatrix latiſſima cordis figura. *Pluk. phyt. 211. f. 6.*

plena. 17. M. inermis, fol. bipinnatis, ſpicis pentandris: inferioribus plenis.

vir-

virgata. 19. M. inermis erecta angulata, fol. bipinnatis, ſpicis decandris: inferioribus caſtratis maſculis, caule erecto angulato.

punctata. 18. M. inermis, fol. bipinnatis, ſpicis erectis, floribus decandris: inferioribus caſtratis.

pernambuc. 20. M. inermis, fol. bipinnatis, ſpicis cernuis pentandris: inferioribus caſtratis, caule decumbente.

arborea. 21. M. inermis, fol. bipinnatis: pinnis dimidiatis acutis, caule arboreo. *Flores faſciculati; monopetali, quinquefidi, monadelphi, polyandri. Stamina carnea, longiſſima. Variat glabra foliolis* 12-14; *pinnis* 27.

Lebbeck. 22. M. inermis, fol. bipinnatis quadriiugis: pinnis ouali-oblongis, floribus monadelphis faſciculatis, caule arboreo.

vaga. 23. M. inermis, fol. bipinnatis: pinnis exterioribus maioribus incuruatis pubeſcentibus.

latiſiliqua. 24. M. inermis, fol. bipinnatis: partialibus 5-iugis, ramulis flexuoſis, gemmis globoſis.

polyſtachya. 22. M. inermis, fol. bipinnatis: partialibus pinnisque 6-iugis oblongis. *Plum. ic. 12.*

muricata. 26. M. inermis, fol. bipinnatis: partialibus quinqueiugis: propriis multiiugis, caule muricato. *Plum. ic. 11.*

peregrina. 25. M. inermis, fol. bipinnatis: partialibus 16-iugis: pinnis 40-iugis, glandula baſeos petiolari.

glauca. 27. M. inermis, fol. bipinnatis: partialibus 6-iugis: pinnis plurimis, glandula inter infima. *Decandra, apetala. Spicae globoſae magnae, pedunculatae. Flores albi.*

cinerea. 28. M. ſpinis ſolitariis, fol. bipinnatis, flor. ſpicatis. *Folia decem-iuga: Foliola 22-iuga.*

corniger. 29. M. ſpinis ſtipularibus geminis connatis, fol. bipinnatis. *Iacq. amer. 266.*

horrida. 30. M. ſpinis ſtipularibus longitudine foliorum, fol. bipinnatis: partialibus 6-iugis, ramis laeuibus.

tortuoſa. 31. M. ſpinis ſtipularibus, fol. bipinnatis quadriiugis: glandula inter infima, pinnis 16-iugis, ſpicis globoſis

farneſiana. 33. M. ſpinis ſtipularibus diſtinctis, fol. bipinnatis: partialibus 8-jugis, ſpicis globoſis peſſilibus. *Sata in horto farneſiano primum 1611; nunc hortis communis ob flores amoroſiacos.*

nilotica. 34. M. ſpinis ſtipularibus patentibus, fol. bipinnatis: partialibus extimis glandula interſtinctis: ſpicis globoſis pedunculatis. *Sp. pl.* 31, 28. *Glandula inter extimum par foliorum partialium.*

nigra. 37. M. aculeata laeuis, fol. bipinnatis oppoſite aculeatis: ſpina erecta inter ſingula partialia.

aſperata. 38. M. aculeata hirta, fol. bipinnatis oppoſite aculeatis; ſpina erecta inter ſingula partialia.

ſenegal. 32. M. ſpinis ternis: intermedia reflexa, fol. bipinnatis, flor. ſpicatis.

caſſia. 35. M. aculeata, fol. bipinnatis, pinnis ouali-oblongis oblique acuminatis.

pennata. 36. M. aculeata, fol. bipinnatis numeroſiſſimis linearibus, panicula aculeata, capitulis globoſis.

Intſia. 39. M. aculeata, fol. bipinnatis: pinnis incuruis, caul. angulato.

ſemiſpinoſa. 40. M. aculeata, fol. bipinnatis, articulis caulinis ſuperne aculeatis.

quadriualuis. 41. M. aculeata, fol. bipinnatis, caule quadrangulo aculeis recuruis, leguminibus quadriualuibus.

tenuifol. 37. M. aculeata, fol. bipinnatis: partialibus 20-jugis: pinnis multiiugis.

Ceratonia, 42. M. aculeata, fol. bipinnatis quinqueiugis: partialibus triiugis: pinnis trineruiis.

tamarindifolia. 43. M. aculeata, fol. bipinnatis quinqueiugis: partialibus 10-jugis, petiolis inermibus.

DIOECIA.

¶159. GLEDITSIA. 1509. HERMAPHROD. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-petala. *Stam.* 6. *Piſtill.* 1. *Legumen.*

MASC. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Stam.* 6.

FEM. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Piſt.* 1. *Legumen.*

triacanth. 1. G. caule ſpinis triplicibus axillaribus.

inermis. 2. G. caule inermi. 1160.

1160. FRAXINVS. HERMAPHROD. *Cal.* o-f. 4-partitus. *Cor.* o-f. 4-petala. *Stam.* 2. *Pift.* 1. *Sem.* 1, lanceolatum.
1509. FEM. *Pift.* 1, lanceolatum.

excelfior. 1. F. fol. ferratis, flor. apetalis.
Ornus. 2. F. foliolis ferratis, flor. corollatis.
americ. 3. F. foliolis integerrimis, petiolis teretibus.

1161. DIOSPYROS. HERMAPHROD. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* vrceolata, 4-fida. *Stam.* 8. *Stylus* 4-fidus. *Bacca* 8-fperma.
1510. MASC. *Cal. Cor. Stam.* prioris.

Lotus. 1. D. foliorum paginis difcoloribus.
virginiana. 2. D. foliorum paginis concoloribus. *Mill. fig. t.* 126.

1163. NYSSA HERMAPHROD. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Stam.* 5. *Pift.* 1. *Drupa* infera.
1511. MASC. *Cal.* 5-partitus. *Corollae* o. *Stamina* 10.

aquatica. 1. NYSSA.

1164. ANTHOSPERMVM. HERM. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* o. *Stam.* 4. *Pift.* 2. *Germen* inferum.
511. MASC. & FEM. in eadem vel diftincta planta.

aethiopic. 1. A. fol. laeuibus.
ciliare. 2. A. foliis carina margineque ciliatis.

1165. ARCTOPVS. Masc. *Vmbella* composita. *Involucra* 5-phylla. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 5. *Pist.* 2, abortientia.
1512. Androg. *Vmbella* simplex. *Involucrum* 4-partitum, spinosum, maximum, continens flosculos masculos in disco plurimos. Femineos 4, in radio. Masc. *Petala* 5. *Stam.* 5. Fem. *Petala* 5. *Styli* 2. *Sem.* 1, 2-loculare, inferum.

echinatus. 1, Arctopvs.

1162. PISONIA. Hermaphrod. *Cal.* vix vllus. *Cor.* campanulata, 5-fida. *Stam.* 5-s. 6. *Pist.* 1. *Capsul.* 1-locularis, 1-sperma, 5-valuis.
1511. Masc. & Fem. nunc in eadem, nunc in diuersa planta.

aculeata. 1. P. spinis axillaribus patentissimis. *Iacq. amer.* 274.
inermis. 2. P. caule inermi. *Iacq. amer.* 275.

1166. PANAX. Hermaphrod. Vmbella. *Cal.* 5-dentatus, superus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 5. *Styli* 2. *Bacca* disperma.
1512. Masc. Vmbella. *Cal.* integer. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 5.

quinquef. 1. P. fol. ternis quinatis.
trifolium. 2. P. fol. ternis ternatis.
fruticosum. 3. P. fol. supradecompositis dentato-ciliatis, caule fruticoso.

TRI-

TRIOECIA.

1197. CERATONIA. *Hermaph. Cal.* 5 - partitus. *Cor.* nulla. *Stamina* quinque. *Stylus* filiformis. *Legumen* coriaceum, polyſpermum.
1513. DIOICA. *Mas* & *Femina* diſtincta.

Siliqua. 1. CERATONIA.

1168. FICVS. *Receptaculum* commune turbinatum, carnoſum, conniuens, occultans floſculos vel in eodem vel diſtincto.
1513. MASC. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 0. *Stam.* 3.
FEM. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 0. *Piſt.* 1. *Sem.* 1.

Carica. 1. F. fol. palmatis.
Sycommorus. 2. F. fol. cordatis ſubrotundis integerrimis. *Haſſelqv. it.* 495.
religioſa. 3. F. fol. cordatis oblongis integerrimis acuminatiſſimis,
benjamina. F. fol. ouatis acuminatis tranſuerſe ſtriatis margine laeui.
benghalenſis. 4. F. fol. ouatis integerrimis obtuſis, caule inferne radicato.
indica. 5. F. fol. lanceolatis integerrimis petiolatis, pedunculis aggregatis, ramis radicantibus.
racemoſa. 6. F. fol. ouatis integerrimis acutis impreſſo-punctatis, caule arboreo. *Folia adſperſa punctis albidis.*
retuſa. F. fol. obouatis oblongis obtuſiſſimis, ramis angulatis, fructibus ſeſſilibus.
pumila. 8. F. fol. oblongo-ouatis acutis integerrimis ſubtus reticulatis, caule articulato repente. *Folia ouato-oblonga, acuminata, petiolata: ſubtus valde reticulata, ſupra herbacea. Ramuli ad folia cincti ſtria eleuata. Pedunculi axillares, filiformes, ſolitarii. Calyx inferus, triphyllus.*
maculata. 7. F. fol. oblongis acuminatis ſerratis.

CLAS-

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

* *Fructificationes ſpicatae.*

1169. EQUISETVM. *Spica* ſparſa. Fructif. peltatae, baſi valvulatae.
1170. ONOCLEA. *Spica* diſticha. Fructif. 5-values.
1171. OPHIOGLOSSVM. *Spica* articulata. Fructif. circumſciſſae.
1172. OSMVNDA. *Spica* racemoſa. Fructif. 2-values.

* * *Fructificationes frondoſae, in pagina* * *inferiore.*

1173. ACROSTICHVM. *Macula* Diſcum totum occupans.
1179. POLYPODIVM. *Puncta* Diſci diſtincta.
1176. HEMIONITIS. *Lineae* Diſci decuſſantes.
1178. ASPLENIVM. *Lineae* Diſci ſubparallelae, variae.
1175. BLECHNVM. *Lineae* Diſci coſtae vtrinque adjacentes.
1177. LONCHITIS. *Lineae* Marginis ad ſinus.
1174. PTERIS. *Lineae* Marginis ad peripheriam.
1180. ADIANTHVM. *Maculae* apicum margine reflexo obtectae.
1181. TRICHOMANES. *Fr.* ſolitariae Margini ipſi inſertae.

* * *Fructificationes radicales,*

1182. MARSILEA. *Fruct.* 4-capſularis.
1183. PILVLARIA. *Fruct.* 4-locularis.
1184. ISOETES. *Fruct.* 2-locularis.

MVSCI.

* *Acalyptrati.*

1185. LYCOPODIVM. *Anthera* 2-valuis, ſeſſilis.
1186. PORELLA. *Anthera* pertuſa poris.
1187. SPHAGNVM. *Anthera* ore laeui.
1189. PHASCVM. *Anthera* ore ciliato.

* * *Calyptrati diclini.*

1191. SPLACHNVM. *Anth.* cum Apophyſi maxima.
1192. POLYTRICVM. *Anth.* cum Apophyſi minima, marginata.
1193. MNIVM. *Anth.* ſine Apophyſi.

* * * *Calyptrati monoclini.*

1194. BRYVM. *Anth.* pedunculo terminali e tuberculo.
1195. HYPNVM. *Anth.* pedunculo laterali e Perichaetio.

1190. FON-

1190. FONTINALIS. *Anth.* ſeſſilis, Perichaetio imbricato obuoluta.
1188. BVXBAVMIA. *Anth.* pedunculata, altero latere membranacea.

ALGE.

* *Terreſtres.*

1198. MARCHANTIA. *Fl.* calyce communi peltato, ſubtus, florido.
1196. JVNGERMANNIA. *Fl.* calyce ſimplici, 4-valui.
1197. TARGIONIA. *Fl.* calyce 2-valui.
1201. ANTHOCEROS. *Fl.* calyce lubuloſo. *Anther.* ſubulata, biualuis.
1199. BLASIA. *Fr.* cylindrica, tubuloſa.
1200. RICCIA. *Fr.* Cranulis frondi innatis.
1202. LICHEN. *Fr.* receptaculo laeui nitido.
1208. BYSSVS. Subſtantia lanuginoſa.

* *Tremella.*

* * *Aquatica.*

1204. TREMELLA. *A.* gelatinoſa.
1206. VLVA. *A.* membranacea.
1205. FVCVS. *A.* coriacea.
1207. CONFERVA. *A.* capillaris.

FVNGI.

* *Pileati.*

1209. AGARICVS. Pileus ſubtus lamelloſus.
1210. BOLETVS. Pileus ſubtus poroſus.
1211. HYDNVM. Pileus ſubtus echinatus.
1212. PHALVS. Pileus ſubtus laeuis.

* * *Pileo deſtituti.*

1213. CLATHRVS. *F.* cancellatus.
1214. HELVELLA. *F.* turbinatus.
1215. PEZIZA. *F.* campanulatus.
1216. CLAVARIA. *F.* oblongus.
1217. LYCOPERDON. *F.* globoſus.
1218. MVCOR. *F.* veſicularis ſtipitatus.

FILI-

FILICES.

1169. EQVISETVM. *Spica* fructificationibus peltatis, baſi dehiſcentibus multiualui.
1516.

ſyluaticum. 1. E. caule ſpicato, frondibus compoſitis.
aruenſe. 2. E. ſcapo fructificante nudo; ſterili frondoſo.
paluſtre. 3. E. caule angulato, frondibus ſimplicibus.
fluuiatil. 4. E. caule ſtriato, frondibus ſubſimplicibus.
limoſum. 5. E. caule ſubnudo laeui.
hyemale. 6. E. caule nudo ſcabro baſi ſubramoſo.
giganteum 7. E. caule ſtriato arboreſcente, frondibus ſimplicibus ſtrictis ſpiciferis.

1170. ONOCLEA. *Spica* diſticha: Fructificat. quinqueualuibus.
1517.

ſenſibilis. 1. ONOCLEA.

1171. OPHIOGLOSSVM. *Spica* articulata, diſticha: articulis transuerſim dehiſcentibus.
1518.

vulgatum. 1. O. frond. ouata.
luſitanic. 2. O. frond. lanceolata.
reticulat. 4. O. frond. cordata.
palmatum. 5. O. frond. palmata baſi ſpicifera.
pendulum. 3. O. frondibus linearibus longiſſimis indiuiſis.
ſcandens. 6. O. caul. flexuoſo tereti, frond. conjugatis pinnatis: foliolis vtrinque ſpiciferis.
flexuoſum. 7. O. caul. flexuoſo angulato, frond. diphyllis: pinnis trifido-palmatis.

1172. OSMVNDA. *Spica* ramoſa: Fructific. globoſis.
1519.

* *Scapis inſidentibus cauli ad baſin frondis.*

zeilanica. 1. O. ſcapo caulino ſolitario, frond. verticillatis lanceolatis indiuiſis.

Luna-

Lunaria. 2. O. scapo caulino solitario, frond. pinnata solitaria.
virginica. 3. O. scapo caulino solitario, frond. supradecompositа.
phyllitid. 4. O. scap. caulinis geminis, frond. pinnata, caule laeui.
hirta. 5. O. scap. caulinis geminis, frond. pinnata, caule hirto.
hirsuta. 6. O. scap. caulinis geminis, frond. bipinnata hirsuta.
adianth. 7. O. scap. caulinis geminis, frond. supradecompositа.

* * *Scapis nudis, e radice enatis.*

verticillata. 8. O. scap. radicatis: racemis verticillatis, frond. supradecompositа.
ceruina. 9. O. scap. radicato, frond. pinnata: pinn. integerrimis.
bipinnat. 10. O. scap. radicato, frond. pinnata: pinn. pinnatifidis.
filiculifol. 11. O. scap. radicato paniculato, frond. supradecompositа.

* * * *Fronde ipsa fructificationes ferente.*

regalis. 12. O. frond. bipinnatis apice racemiferis.
claytoniana. 13. O. frond. pinnatis: pinn. pinnatifidis apice coarctato fructificantibus.

* * * * *Frondibus aliis foliaceis, aliis fructificantibus.*

cinnamomea. 14. O. frond. pinnata: pinn. pinnatifidis, scap. hirsutis, racem. oppositis compositis.
Struthiopteris. 15. O. frond. pinnatis: pinn. pinnatifidis, scap. fructificante disticho.
Spicant. 16. O. frond. lanceolatis pinnatifidis: laciniis confluentibus integerrimis parallelis.
crispa. 17. O. frond. supradecompositis: pinn. alternis subrotundis incisis.

1173. ACROSTICHVM. *Fructific.* discum totum frondis tegentes.
1525.

* *Fronde simplici indiuisa.*

lanceolat. 1. A. frond. lineari-lanceolatis acutis, furculo scandente.
citrifolium. 2. A. frond. lanceolato-ouatis integerrimis, furculo scandente.
heterophyllum. 3. A. frond. integerrimis glabris petiolatis; sterilibus subrotundis; fertilibus linearibus.
crinitum. 4. A. frond. ouatis obtusis hirsutis supra crinitis.

puncta-

punctatum. 5. A. frond. cordato-lingulatis acuminatis integerrimis ſupra punctatis.

* * *Fronde ſimplici diuiſa.*

ſeptentr. 6. A. frond. nudis linearibus laciniatis.

pectinatum. 7. A. nudum ſimpliciſſimum, ſpica lunata ſecunda adſcendente compreſſa.

dichotomum. 8. A. nudum dichotomum, ſpic. ſecundis adſcendentibus reflexis compreſſis.

digitatum. 9. A. ſtipit. nudis triquetris, frond. digitata lineari integerrima aequali.

ferrugineum. 10. A. frond. pinnatifidis: pinn. linearibus acutis patentibus integerrimis connatis, ſtipite laeui.

polypodioides. 11. A. frond. pinnatifidis: pinn. linearibus obtuſis integerrimis patentibus coronatis, ſtipite ſquamoſo.

* * * *Fronde pinnata.*

aureum. 12. A frond. pinnata: pinn. alternis linguiformibus integerrimis glabris.

rufum. 13. A. frond. pinnatis: pinn. oblongo-ouatis integerrimis pubeſcentibus.

ſorbifol. 14. A. frond. pinnatis: pinn. oblongo-ouato-integris ſerratis acutis, ſtipit. ſquamoſis.

areolatum. 17. A. frond. pinnatis: pinn. alternis linearibus apice ſerratis.

marginatum. 15. A. frond. pinnatis: pinn. oblongis integerrimis vndulatis acuminatis, ſtipit. nudo.

ſanctum. 16. A. frond. pinnatis lanceolatis: pinn. lineari-lanceolatis inciſo-ſerratis: ſerraturis infimis maioribus.

platyneuros. 18. A. frond. pinnatis: pinnis alternis ouatis crenatis ſeſſilibus ſurſum arcuatis.

trifoliat. 19. A. frond. pinnatis. foliol. ternatis lanceolatis.

* * * * *Frond. ſubbipinnata.*

ſiliquoſum. 20. A. frond. pinnatis: pinn. alternis ſurſum pinnulatis linearibus: inferioribus bipartitis.

thalictroides. 21. A. frond. pinnatis: pinnis alternis vtrinque pinnatifidis: ſterilibus latioribus.

marantae. 22. A. frond. ſubbipinnatis: pinn. oppoſito-coadunatis ſubtus hirſutiſſimis: baſi ſubdentatis.

iluen-

ilueſe. 23. A. frond. ſubbipinnatis : pinn. oppoſito-coadunatis obtuſis ſubtus hirſutis baſi integerrimis.

ebeneum. 24. A. frond. pinnatis: pinn. ſeſſilibus oblongis ſinuatis: ſummis breuiſſimis integerrimis.

Thelypteris. 25. A. frond. pinnatis: pinn. pinnatifidis integerrimis. *Polypodium* 9. *Hall. emend.* 3. *an potius Polypodii ſpecies?*

furcatum. 26. A. dichotomum, foliolis pinnatis: pinnis parallelis lanceolatis approximatis integerrimis.

* * * * * *Fronde bipinnata.*

aculeatum. 30. A. frond. ſupradecompoſitis: pinn. bifidis, ſtipit. aculeatis.

cruciatum. 27. A. frond. bipinnatis: foliol. oppoſitis lanceolatis: infimis cruciatim appendiculatis.

barbarum. 28. A. frond. bipinnatis: foliol. oppoſitis: pinn. lanceolatis obtuſis ſerratis ſeſſilibus alternis.

calomelanos. 29. A. frond. bipinnatis: pinn. alternis lanceolatis acuminatis pinnatifidis.

1174. PTERIS *Fructificationes* in lineis marginalibus. 1530.

* *Frondibus ſimpliciſſimis.*

piloſelloides. 1. P. frond. ſterilibus obouatis: fertilibus lanceolatis longioribus, furcul. repentibus.

lanceolata. 2. P. frond. ſimplicibus lanceolatis ſubangulatis glabris: apice fructificante.

lineata. 3. P. frond. ſimplicibus linearibus integerrimis longitudinaliter fructificantibus.

tricuſpid. 4. P. frond. ſimplicibus linearibus apice trifido.

furcata. 5. P. frond. ſimplicibus dichotomis ſubtus hiſpidis: apicibus fructificantibus.

quadrifoliata. 6. P. frond. quaternata ſubrotunda integerrima, furcul. repentibus.

* * *Frondibus ſimpliciter pinnatis ſ. compoſitis.*

arborea. 5. P. frond. pinnatis: foliol. pinnatifidis, caudice arboreo aculeato.

grandifolia. 7. P. frond. pinnatis: pinn. opppoſitis ovato-linearibus acuminatis integerrimis.

longi-

longifolia. 8. P. frond. pinnatis : pinn. linearibus repandis: baſi cordatis.

vittata. 9. P. frond. pinnatis : pinn. linearibus rectis baſi rotundatis.

ſtipularis. 10. P. frond. pinnatis : pinn. linearibus ſeſſilibus, ſtipulis lanceolatis.

trichomanoides. 11. P. frond. pinnatis : pinn. ſubouatis obtuſis repandis ſubtus hirſutis.

cretica. 20. P. frond. pinnatis : pinn. oppoſitis lanceolatis ſerrulatis baſi anguſtatis : infimis ſubtripartitis. *Mant.* 130.

* * * *Frondibus ſubbipinnatis ſ. ramoſis.*

pedata. 12. P. frond. quinquangulis trifoliatis : pinn. pinnatifidis : lateralibus bipartitis.

aquilina. 13. P. frond. ſupradecompoſitis : foliol. pinnatis: pinn. lanceolatis : infimis pinnatifidis ; ſuperioribus minoribus.

caudata. 14. P. frond. ſupradecompoſitis, pinn. linearibus : infimis baſi pinnato-dentatis ; terminalibus longiſſimis.

mutilata. 15. P. frond. decompoſitis : foliolis pinnatis: infimis ſemipinnatifidis ; terminalibus baſeosque longiſſimis.

atropurpurea. 16. P. frond. decompoſitis pinnatis : pinn. lanceolatis : terminalibus longioribus.

biaurita. 17. P. frond. pinnatis : pinn. pinnatifidis : infima bipartita.

heterophylla. 19. P. frond. bipinnatis : pinnis ouato-oblongis ſerratis obtuſis, frondibus fertilibus integerrimis.

ſemipinnata. 18. P. frond. ſubbipinnatis : foliolis lateralibus loboque infimo ſemipinnatifidis.

1175. BLECHNVM. 1534.

Fructific. in lineis duabus, coſtae frondis approximatis, parallelis.

occidentale. 1. B. fronde pinnatis : pinn. lanceolatis oppoſitis baſi emarginatis.

orientale. 2. B. frond. pinnatis : pinn. linearibus alternis.

auſtrale. 3. B. frond. pinnatis : pinn. ſubſeſſilibus cordato-lanceolatis integerrimis : infimis oppoſitis. *Mant.* 130.

1176. HE-

1176. HEMIONITIS. 1535. *Fructific.* in lineis decuſſatis.

lanceolat. 1. H. frond. lanceolatis integerrimis.
paraſitic. 3, H. frond. ouatis acuminatis, ſurcul. paleaceis repentibus.
palmata. 2. H. frond. palmatis hirſutis.

1177. LONCHITIS. 1536. *Fructific.* in lineolis, ſub frondis ſinubus.

hirſuta. 1. L. frond. pinnatifidis obtuſis integerrimis, ſurcul. ramoſis hirſutis.
aurita. 2. L. frond. pinnatis: pinn. infimis bipartitis, ſurculis indiuiſis aculeatis.
repens. 3. L. frond. pinnatis: pinn. alternis ſinuatis, ſurculis ramoſis aculeatis.
pedata. 4. L. frond. pedatis: pinn. pinnatifidis ſerrulatis.

1178. ASPLENIVM. 1536. *Fructific.* in lineolis diſci frondis ſparſis.

* *Fronde ſimplici.*

rhizophylla. 1. A. frond. cordato-enſiformibus indiuiſis: apice filiformi radicante.
Hemionitis. 2. A. frond. ſimplicibus cordato-haſtatis quinquelobis integerrimis, ſtipit. laeuibus.
Scolopendrium. 3. A. frond. ſimplicibus cordato-lingulatis integerrimis, ſtipit. hirſutis.
nidus. 4. A. frond. ſimplicibus lanceolatis integerrimis glabris.
ſerratum. 6. A. frond. ſimplicibus lanceolatis ſerratis ſubſeſſilibus.
plantagineum. 5. A. frond. ſimplicibus ouato-lanceolatis ſubcrenatis, ſtipit. tetragono.
biſolium. 7. A. frond. binatis: foliol. lanceolatis ſubſinuatis connatis.

* * *Fronde pinnatifida.*

Ceterach. 8. A. frond. pinnatifidis: lobis alternis confluentibus obtuſis. *Folia ſubtus adeo ſquamoſa, vt fructificationes non conſpiciantur.*

obtuſifolium. 9. A. frond. ſubpinnatis: pinnis obtuſis ſinuatis decurrentibus alternis.

* * * *Fronde pinnata.*

nodoſum. 12. A. frond. pinnatis: pinn. oppoſitis lanceolatis integerrimis.

ſalicifolium. 11. A. frond. pinnatis: pinn. falcato-lanceolatis crenatis: baſi ſurſum angulatis.

Trichomanoides. 19. A. frond. pinnatis; pinn. ſubrotundis crenatis.

dentatum, 20. A. frond. pinnatis: pinn. cuneiformibus obtuſis crenato-emarginatis.

marinum. 21. A. frond. pinnata: pinn. obouatis ſerratis ſuperne gibbis obtuſis: baſi cuneatis.

cultrifolium. 10. A. frond. pinnatis: pinn. falcato-lanceolatis inciſo-ſerratis: baſi deorſum angulatis.

pygmeum. 18. A. frond. pinnatis: pinn. ſubrotundis quinis ternisue.

rhizophorum. 17. A. frond. pinnatis apice radicantibus: pinn. ouatis repando-ſubauritis ouatis: minimis remotis integerrimis.

monanthemum. 20. A. frond. pinnatis: pinn. trapetziis obtuſis ſuperne crenatis, linea fructificationis vnica. *Mant.* 130.

Rutamuraria. 22. A. frond. alternatim decompoſitis: foliol. cuneiformibus crenulatis.

Adiant, nigrum. 23. A. frond. ſubtripinnatis: fol. alternis: pinn. lanceolatis inciſo-ſerratis. *Oed. dan.* 250.

Trich. ramoſum. 24. A. frond. duplicato-pinnatis: pinn. obouatis crenatis: foliol. inferioribus minoribus.

marginatum. 13. A. frond. pinnatis: pinn. oppoſitis cordato-lanceolatis ſubmarginatis integerrimis.

ſquamoſum. 14. A. frond. pinnatis: pinn. acuminatis inciſis, ſtipit. ſquamoſo.

ſtriatum. 15. A. frond. pinnatis: pinn. pinnatifidis obtuſis crenatis: terminali acuminata.

eroſum. 16. A. frond. pinnatis: pinn. trapetzio-oblongis ſtriatis eroſis baſi auctis.

1179. POLYPODIVM. *Fructific.* in punctis subrotundis, sparsis per discum frondis.
1542.

* *Fronde indiuisa.*

lanceolatum. 1. P. frond. lanceolatis integerrimis glabris, fructificat. solitariis, furcul. nudis.

lycopodioides. 2. P. frond. lanceolatis integerrimis glabris, fructificat. solitariis, surc. squamoso-repente.

pilosellioides. 3. P. frond. lanceolatis integerrimis hirtis: sterilibus ouatis; fertilibus lanceolatis, fructificat. solitariis.

heterophyllum. 4. P. frond. crenatis glabris: sterilibus subrotundis sessilibus; fertilibus lanceolatis, fructificat. solitariis.

crassifol. 5. P. frond. lanceolatis glabris integerrimis, fructificat. serialibus.

phyllitidis. 6. P. frond. lanceolatis glabris integerrimis, fructificat. sparsis.

comosum. 7. P. frond. lanceolatis glabris integerrimis: apice multifido, fructificat. sparsis.

trifurcatum. 8. P. frond. lanceolatis glabris repando-sinuatis: apice trilobis.

* * *Fronde pinnatifida lobis coadunatis.*

crispatum. 9. P. frond. pinnatifidis glabris: lobis semiorbiculatis crenatis.

suspensum. 10. P. frond. pinnatifidis glabris: lobis semiouatis acutis.

asplenifol. 11. P. frond. pinnatifidis pilosis: lobis semiouatis acutis.

scolopendroides. 12. P. frond. pinnatifidis lanceolatis: lobis obtusiusculis: infimis remotis.

vulgare. 13. P. frond. pinnatifidis: pinn. oblongis subserratis obtusis, radic. squamata.

virginianum. 14. P. frond. pinnatifidis: pinn. oblongis subserratis obtusis, radic. laeui.

Otites. 15. P. frond. pinnatifidis: lobis lanceolatis alternis obtusis distantibus.

pectinatum. 16. P. frond. pinnatis lanceolatis: lobis approximatis ensiformibus parallelis acutis horizontalibus, radice nuda.

taxifol. 17. P. frond. pinnatis: lobis approximatis ensiformibus parallelis acutis adscendentibus, radic. hirta.

ſtruthionis. 18. P. frond. pinnatis: lobis approximatis enſiformibus repandis horizontalibus.

ſquamatum. 19. P. frond. pinnatifidis ſcabris: pinn. lanceolatis diſtantibus horizontalibus integerrimis.

loriceum. 20. P. frond. pinnatifidis ſcabris: pinn. lanceolatis diſtantibus horizontalibus repandis.

alatum. 21. P. frond. pinnatifidis laeuibus: pinn. oblongis diſtantibus dentatis.

cambricum. 22. P. frond. pinnatifidis: pinn. lanceolatis lacero-pinnatifidis ſerratis.

aureum. 23. P. frond. pinnatifidis laeuibus: pinn. oblongis diſtantibus: infimis patulis; terminali maxima, fructif. ſerialibus.

quercifolium. 24. P. frond. ſterilibus ſeſſilibus breuioribus obtuſis ſinuatis; fructificantibus alterno-pinnatis lanceolatis.

* * * *Fronde trifoliata: pedunculo foliolis tribus.*

trifoliat. 25. P. frond. ternatis ſinuato-lobatis: intermedia maiore.

* * * * *Fronde pinnata.*

Lonchitis. 27. P. frond. pinnatis: pinnis lunulatis ciliato, ſerratis declinatis, ſtipit. ſtrigoſis.

exaltatum. 29. P. frond. pinnatis: pinn. enſiformibus integris: baſi inferiore introrſum, ſuperiore ſurſum gibbis.

auriculatum. 28. P. frond. pinnatis: pinn. falcato-lanceolatis ſerratis: baſi truncatis ſurſum auritis.

vnicum. 26. P. frond. pinnatis: pinn. enſiformibus ſerratis; ſeraturis ſemiouatis ouato-neruoſis.

triangul. 30. P. frond. pinnatis: pinn. triangularibus dentatis.

cordifolium. 33. P. frond. pinnatis: pinn. cordatis obtuſis integerrimis, repandis.

ſimile. 31. P. frond. pinnatis: pinn. lanceolatis integerrimis diſtantibus: ſupremis minoribus, punctis ſerialibus.

diſſimile. 32. P. frond. pinnatis: pinn. lanceolatis ſubpubeſcentibus confluentibus: inferioribus diſtinctis, punctis ſparſis.

reticulatum. 34. P. frond. pinnatis: pinn. oblongis integerrimis: anaſtomoſibus rectangulis, punctis rectangulis approximatis.

cicu-

Maratti G. F. vera florum exiſtentia in dorſiferis. *Romae 1760. Oct. t. 1.*

cicutarium. 35. P. frond. ternatis: foliol. bipinnatis basi laciniatis obtuse incisо-serratis acuminatis: infimis gibbosioribus.

fontanum. 39. P. frond. pinnatis laciniatis: foliol. subrotundis argute incisis, stipit. laeui. Acrosticum frondibus subpinnatis: pinnis alternis cuneiformibus incisis. *Ger. prou. 71.* Filicula saxatilis omnium minima. *Tournef. inst. 71.*

* * * * * *Fronde subbipinnata.*

phegopteris. 36. P. frond. subbipinnatis, foliol. infimis reflexis: paribus pinnula quadrangulari coadunatis.

retroflexum. 37. P. frond. subbipinnatis: foliol. infimis reflexis: pinn. laceris.

fragrans. 38. P. frond. subbipinnatis lanceolatis: foliol. confertis: lobis obtusis serratis, stipite paleaceo.

parasiticum. 40. P. frond. semi-bipinnatis lanceolatis: lobulis rotundatis integerrimis striatis.

varium. 41. P. frond. lateralibus bipinnatis: foliolo infimo pinnatifido.

crispatum. 42. P. frond. subbipinnatis: foliol. ouato-oblongis: pinnis obtusiusculis apice acuto serratis.

F. mas. 43. P. frond. bipinnatis: pinn. obtusis crenulatis, stipit. paleaceo. *Flores reniformes.*

F. femin. 44. P. frond. bipinnata: pinnul. lanceolatis pinnatifidis acutis. *Flores ouati, subciliati, solitarii.*

aculeatum. 45. P. frond. bipinnatis: pinn. lunulatis ciliato-dentatis, stipit. strigoso.

rhaeticum 46. P. frond. bipinnatis: foliol. pinnisque remotis lanceolatis: serraturis acuminatis.

noueboracense. 47. P. frond. bipinnatis: pinn. oblongis integerrimis parallelis, stipite laeui.

pubescens. 48. P. frond. bipinnatis pilosis: pinn. lanceolato-ouatis subincisis acutis: extimis confluentibus.

marginale. 49. P. frond. bipinnatis: pinn. basi sinuato-repandis, fructificat. marginalibus.

bulbiferum. 50. P. frond. bipinnatis: foliol. remotis: pinn. oblongis obtusis serratis subtus bulbiferis.

F. fragile. 51. P. frond. bipinnatis; foliol. remotis: pinn. subrotundis incisis.

regium. 52. P. frond. bipinnatis: foliol. ſuboppoſitis: pinn. alternis laciniatis.

leptophyllum. 53. P. frond. bipinnatis: ſterilibus breuiſſimis: pinnis cuneiformibus lobatis. *β.* Polypodium luſitanicum. *Sp. plant.* 1556.

Baromez. 54. P. frond. bipinnatis: pin. pinnatifidis lanceolatis ſerratis, radicibus lanatis,

* * * * * * *Spinis ſparſis aculeata aut arboreſcentia.*

arboreum. 55. P. frond. bipinnatis ſerratis, caudice arboreo inermi.

ſpinoſum. 56. P. frond. bipinnatis ſerratis, caudice arboreo aculeato.

horridum. 57. P. frond. ſupradecompoſitis, pinn. ſemiſagittatis: baſi connexis, apice ſerratis, caudice aculeato.

pyramydale. 58. P. frond. ſupradecompoſitis: pinn. terminalibus lanceolatis longiſſimis ſerratis, ſtipit. inferne aculeato.

aſperum. 59. P. frond. ſupradecompoſitis: pinn. obtuſis apice ſerratis: terminalibus acuminatis, caudic. arboreo aculeato.

muricat. 60. P. frond. bipinnatis: pinn. ouatis denticulato-ſpinoſis.

villoſum. 61. P. frond. bipinnatis hirſutis; pinn. oblongis obtuſis terminalibus acuminatis.

decuſſatum. 62. P. frond. bipinnatis: pinn. horizontalibus integerrimis obtuſis: terminalibus lanceolatis.

* * * * * * * *Fronde ſupradecompoſita.*

Dryopter. 63. P. frond. ſupradecompoſitis: foliol. ternis bipinnatis.

ſpeluncae. 64. P. frond. ſupradecompoſitis piloſis: foliol. lanceolatis pinnatis: pinn. oppoſitis pinnatifidis.

1180. ADIANTVM. 1556.

Fructific. in maculis terminalibus, ſub replicato margine frondis.

* *Fronde ſimplici.*

reniform. 1. A. frond. reniformibus ſimplicibus ſtipitatis multifloris.

philippenſe. 2. A. frond. reniformibus ſimplicibus alternis petiolatis lobatis multifloris.

* * *Fron-*

* * *Fronde compoſita.*

radiatum. 3. A. frond. digitata : foliol. pinnatis : pinn. vnifloris.

pedatum. 4. A. frond. pedatis : foliol. pinnatis : pinn. antice gibbis inciſis fructificantibus.

lanceæ. 5. A. frond. pinnatis : pinnis oppoſitis oblongis terminalibus triangulari-haſtatis. †

trilobum. 6. A. frond. compoſitis : pinn. tripartitis obtuſis inciſis multifloris.

ſerrulatum. 7. A. frond. pinnatis : pinn. obtuſis obouatis ſerratis vnifloris.

* * * *Fronde decompoſita.*

flabellulatum. 8. A. frond. decompoſitis : pinnis alternis rhombeis rotundatis multifloris, ſtipit. ſupra pubeſcentibus.

trifoliatum, 9. A. frond. decompoſita : foliol. alternis ternatis linearibus vnifloris.

chuſanum. 10. A. frond. decompoſitis : pinn. alternis pinnatifidis : lobis inaequalibus.

Capillus veneris. 12. A. frond. decompoſitis : foliol. alternis : pinn. cuneiformibus lobatis pedicellatis.

villoſum. 13. A. frond. bipinnatis, pinn. rhombeis antice extusque fructificantibus, ſtipit. villoſo.

pulverulentum. 14. A. frond. bipinnatis : pinn. oualibus antice truncatis, vnifloris, ſtipit. hirto.

criſtatum, 11. A. frond. bipinnatis : foliol. infimis bipartitis : pinn. lunatis ſuperne multifloris.

* * * * *Fronde ſupradecompoſita.*

clauatum. 15. A. frond. ſupradecompoſitis : foliol. alternis : pinn. cuneiformibus integerrimis alternis vnifloris.

aculeatum. 16. A. frond. ſupradecompoſitis : pinn. palmatis multifloris, ſtipit. aculeato.

trapeziforme. 17. A. frond. ſupradecompoſitis : foliol. alternis : pinn. rhombeis inciſis vtrinque fructificantibus.

hexagonum. 18. A. frond. ſupradecompoſitis : pinn. ſexangularibus emarginatis integerrimis vtrinque vnifloris.

pteroides, 20. A. frond. ſupradecompoſita : pinn. ouatis integris crenulatis, ſtipit. laeui. *Mant. 130.*

aethiopicum. 19. A. frond. ſupradecompoſitis : pinn. rotundatis integris crenulatis, petiolulis capillaribus.

1181. TRICHOMANES. 1560. *Fructific.* ſolitariae, ſtylo ſetaceo terminatae, margini ipſi frondis inſertae.

* *Fronde ſimplici.*

membran. 1. T. frond. ſimplicibus oblongis laceris.
crifpum. 2. T. frond. pinnatifidis lanceolatis: pinn. parallelis ſubſerratis.
polypodioides. 3. T. frond. lanceolatis pinnatifidis repandis, flor. ſolitariis terminalibus.

* * *Fronde compoſita.*

hirſutum. 4. T. frond. pinnatis: pinn alternis pinnatifidis pilloſis.
pyxidiferum. 5. T. frond. ſubbipinnatis: pinn. alternis confertis lobatis linearibus.
tunbrig. 6. T. frond. pinnatis: pinn. oblongis dichotomis decurrentibus dentatis
adiantoides. 7. T. frond. pinnatis: pinn. enſiformibus acuminatis inciſo-ſerratis: ſerraturis bifidis.

* * * *Fronde ſupradecompoſita.*

ſcandens. 8. T. frond. ſupradecompoſitis: foliol. alternis: pinn. alternis oblongis ſerratis.
chinenſe. 9. T. frond. ſupradecompoſita: foliis pinnisque alternis lanceolatis; pinnis laciniis cuneiformibus.
canarienſe. 10. T. frond. ſupradecompoſitis tripartitis: foliol. alternis: pinnis alternis pinnatifidis.
capillaceum. 11. T. frond. ſupradecompoſitis: pinn. filiformibus linearibus unifloris.

1182. MARSILEA. 1562. Flores *Maſculi* ſupra frondem.
Fructif. *Feminea* ad radicem, ſubrotunda, quadricapſularis.

nutans. 1. M. fol. oppoſitis ſimplicibus.
quadrif. 2. M. fol. quaternis.

1183. PILVLARIA. Flores *Maſculi* ad latus frondis,
1563. Fructif. *Feminea* ad radicem, globoſa, quadrilocularis.

globulif. 1. PILVLARIA.

1184. ISOETES. Fl. Maſculi *Anthera*, intra baſin frondis.
1563. Fl. Feminei *Capſula* bilocularis intra baſin frondis.

lacuſtris. ISOETES.

MUSCI.

1185. LYCOPODIVM. *Anthera* biualuis, ſeſſilis.
1563. *Calyptra* nulla.

linifol. 1. L. fol. alternis remotis lanceolatis, flor. axillaribus.
nudum. 2. L. fol. ſubnullis, ſpicis dichotomis: flor. diſtantibus.
Phlegmaria. 3. L. fol. verticillato-quaternis, ſpicis terminalibus dichotomis.
clauatum. 4. L. fol. ſparſis filamentoſis, ſpic. teretibus pedunculatis geminis.
rupeſtre. 5. L. fol. ſparſis filamentoſis, ſpic. terminalibus tetragonis.
Selaginoides. 6. L. fol. ſparſis ciliatis lanceolatis, ſpic. ſolitariis terminalibus folioſis. *Flor. dan, t. 70.*
alopecuroides. 7. L. fol. ſparſis ciliatis linearibus, ſpic. terminalibus folioſis.
inundat. 8. L. fol. ſparſis integerrimis, ſpic. terminalibus folioſis.
Selago. 9. L. fol. ſparſis octoſariis, caule dichotomo erecto faſtigiato, flor. ſparſis.
obſcurum. 10. L. fol. ſparſis decurrentibus, ſarmentis repentibus, ſurculis erectis dichotomis.
annotinum. 11. L. fol. ſparſis quinquefariis ſubſerratis, ſurculis annotino-articulatis, ſpic. terminalibus glabris erectis. *Flor. dan. t. 127.*

cernuum. 12. L. fol. ſparſis curuatis, caul. ramoſiſſimo, ſpic. nutantibus.
Bryopter. 13. L. fol. ſparſis imbricatis, ramulis conuolutis.
ſanguinolentum. 14. L. fol. quadrifariis imbricatis, caul. repentibus dichotomis, ſpic. ſeſſilibus tetragonis.
alpinum. 15. L. fol. quadrifariam imbricatis acutis, caul. erectis bifidis, ſpic. ſeſſilibus teretibus. *Fl. dan. t. 79.*
complanatum. 16. L. fol. bifariis connatis: ſuperficialibus ſolitariis, ſpic. geminis pedunculatis.
carolinianum. 17. L. fol. bifariis patulis: ſuperficialibus ſolitariis, ſcapis longiſſimis monoſtachyis.
helueticum. 18. L. fol. bifariis patulis: ſuperficiebus diſtichis, ſpicis geminis pedunculatis.
apodum. 19. L. fol. bifariis alternis minoribus, caul. repente, ſpic. ſeſſilibus.
ſtabellatum. 20. L. fol. bifariis: ſuperficialibus diſtichis, caul. erecto tereti.
canaliculatum. 21. L. fol. bifariis ſuperficialibus diſtichis, caul. erecto canaliculato.
plumoſum. 22. L. fol. bifariis patentibus: ſuperficialibus ſemiouatis ciliatis, ſurc. erectiuſculis, ſpic. terminalibus tetragonis ſeſſilibus.
ornithopodiodes. 23. L. fol. bifariis patentibus: ſuperficialibus diſtichis, ſurc. repentibus, ſpic. ſeſſilibus.
denticulatum. 24. L. fol. bifariis: ſuperficialibus imbricatis, ſurc. repentibus, flor. ſparſis.

1186. PORELLA. 1569.

Anthera multilocularis, foraminoſa, non operculata. *Calyptra* nulla.

pinnata. 1. PORELLA.

1187. SPHAGNVM. 1569.

Anthera operculata: ore laeui. *Calyptra* nulla.

paluſtre. 1. S. ramis deflexis.
alpinum. 2. S. ſubramoſum erectum.
arboreum. 3. S. ramoſum repens, antheris ſecundis lateralibus.

1189. PHASCVM. *Anthera* operculata: ore ciliata.
1570. *Calyptra* minuta.

acaulon. 1. PH. acaule, anthera ſeſſili, fol. ouatis acutis.
ſubulatum. 2. PH. acaule, anthera ſeſſili, fol. ſubulato-ſetaceis patulis.
cauleſc. 3. PH. cauleſcens erectum, fol. lanceolatis alternis.
repens. 4. PH. cauleſcens repens, antheris lateralibus ſeſſilibus.

1190. FONTINALIS. *Anthera* operculata. *Calyptra*
1571. ſeſſilis, perichaetio incluſa.

antipyretica. 1. F. fol. complicato-carinatis trifariis acutis, antheris lateralibus.
minor. 2. F. fol. ouatis concauis trifariis acutis paſſim geminis, antheris terminalibus.
ſquamoſa. 3. F. fol. imbricatis ſubulato-lanceolatis, antheris lateralibus.
pennata. 4. F. fol. biſariis patentibus, antheris lateralibus.

1188. BVXBAVMIA. *Anthera* operculata, hinc
1570. membranacea. *Calyptra* caduca (*Schmidel.*); intra operculum ſacculus pollinis.

aphylla. BVXBAVMIA.

1191. SPLACHNVM. *Anthera* inſidens Apophyſi
1572. maxime coloratae. *Calyptra* caduca.
Stella feminea in diſtincto indiuiduo.

rubrum. 1. S. vmbraculo orbiculari hemiſphaerico.
luteum. 2. S. vmbraculo orbiculari plano.
ampullac. 3. S. vmbraculo ampullaceo obouato.
vaſculoſum. 4. S. vmbraculo ampullaceo ſubgloboſo.

1192. PO-

PHASCVM acaulon, *obſeruante D. Schmiedelio*, & ſubulatum, *obſeruante D. Schrebero gerunt Calyptram, adeoque poſſent commode Bryis aſſociari.*

1192. POLYTRICHVM. *Anthera* operculata, apophyſi minimae inſidens. *Calyptra* villoſa. *Stella* feminea in diſtincto indiuiduo.

1573.

commune. 1. P. caule ſimplici, anthera parallelipippeda.
alpinum. 2. P. caule ramoſiſſimo, pedunculis terminalibus.
vrniger. 3. P. caule ramoſiſſimo, pedunculis axillaribus.

1593. MNIVM. *Anthera* operculata. *Calyptra* laeuis. *Fem.* capitulum nudum, puluerulentum, remotum.

1574.

pellucid. 1. M. caule ſimplici, fol. ouatis.
fontanum. 2. M. caule ſimplici geniculis inflexo.
paluſtre. 3. M. caule dichotomo, fol. ſubulatis.
androgyn. 4. M. caule ramoſo, androgynum.
hygromet. 5. M. acaule, anthera nutante, calypt. reflexa tetragona.
purpur. 6. M. caule dichotomo: axillis pedunculiferis, anth. erecta, fol. carinatis.
ſetaceum. 7. M. anth. erectis, opercul. filiformibus longitudine antherarum.
cirrhatum. 8. M. fol arefactione reuolutis.
annotinum 9. M. fol. ouatis acuminatis pellucidis, pedunc. ſubradicalibus, antheris nutantibus.
hornum. 10. M. anth. pendulis, pedunc. curuato, ſurculo ſimplici, foliolis margine ſcabris.
capillare. 19. M. antheris pendulis, fol. ouatis ſetiferis carinatis, pedunculis longiſſimis. *Bryum capillare. Sp. pl.* 1586.
crudum. 11. M. anth. pendulis, calypt. recuruata, fol. pellucidis.
pyriforme. 12. M. anth. pendulis turbinatis, ſtipite filiformi, flor. femineis ſetiferis.
polytrich. 13. M. calyptra villoſa.
ſerpillif. 14. M. pedunc. aggregatis, fol. patentibus pellucidis.

pun-

punctatum. α. M. pedunc. aggregatis, fol. obouatis integerrimis obtusis punctatis.
cuspidatum. β. M. pedunc. aggregatis, fol. alternis acutis serratis.
proliferum. γ. M. pedunc. aggregatis, fol. rosaceo-congestis lanceolatis acutis.
undulatum. δ. M. pedunc. aggregatis, fol. oblongis undulatis.
triquetr. 15. M. fol. trifariis patulis subulato-lanceolatis carinatis
trichom. 16. M. fol. distichis integerrimis.
fissum. 17. M. fol. distichis bifidis.
cungerm. 18. M. fol. distichis, pinnis subtus auriculatis.

1594. BRYVM. 1579.

Anthera operculata. *Calyptra* laeuis. *Filamentum* e tuberculo terminali ortum.

* *Antheris sessilibus.*

apocarp. 1. B. anth. sessilibus terminalibus, calypt. minima. *Vaill. t. 27. f. 15.*
striatum. 2. B. anth. sessilibus sparsis, calyptr. striatis sursumue pilosis.

* * *Antheris pedunculatis erectis.*

pomifor. 3. B. anth. erectis sphaericis.
pyriforme. 4. B. anth. erectis obouatis, calyptr. subulata, surc. acaulibus. fol. ouatis muticis.
extinctorium. 5. B. anth. erecta oblonga minori, calyptris laxis aequalibus.
subulat. 6. B. anth. erectis subulatis, surc. acaulibus.
rurale. 7. B. anth. erectiusculis, fol. piliferis recuruis.
murale. 8. B. anth. erectis, fol. piliferis rectiusculis, surc. simplicibus caespitosis.
scoparium. 9. B. anth. erectiusculis, pedunc. aggregatis, fol. secundis recuruatis, caule declinato.
undulatum. 10. B. anth. erectiusculis, pedunc. subsolitariis, fol. lanceolatis carinatis vndulatis patentibus serratis.
glaucum. 11. B. anth. erectiusculis: operculo arcuato, fol. erectis imbricatis, surc. ramosis.
albidum. 12. B. anth. erectis, fol. lingulatis obtusiusculis patulis.
pellucidum. 13. B. anth. erectiusculis, fol. recuruis acutis, caul. hirsuto.

aciculare. 14. B. anth. erectis: operculo aciformi, fol. erectis subsecundis.
flexuos. 15. B. anth. erectis, fol. setaceis, pedunc. flexuosis.
heterom. 16. B. anth. erectis, fol. setaceis secundis.
tortuos. 15. B. anth. erectis, fol. setaceis imberbibus: arefactione retortis.
truncat. 18. B. anth. erectis subrotundis: operc. mucronato.
viridulum. 19. B. anth. erectis ouatis, fol. lanceolatis acuminatis imbricato-patulis.
paludos. 20. B. acaulon, fol. setaceis, anth. obtusissimis patulis.
hypnoid. 21. B. anth. erectis, surc. erectiusculo, ramis lateralibus breuibus fertilibus.
verticillatum. 22. B. anth. erectis, pedunc. arcfactione confertis, fol. piliferis, surc. fastigiatis.
aestiuum. 23. B. anth. erectis subrotundis axillaribus, fol. subulatis distantibus.
Celsii. 24. B. anth. erectiusculis, pedunc. longissimis, fol. setaceis, surc. acaulibus.
trichodes. 25. B. anth. erectiusculis: ore ciliato absque annulo, pedunc. longissimo.
squarrosum. 26. B. anth. obliquis, fol. quinquefariis imbricatis recuruis, caul. ferrugineo-tomentoso.

* * * *Antheris nutantibus.*

argent. 27. B. anth. pendulis, surc. cylindricis imbricatis laeuibus.
puluinat. 28. B. anth. subrotundis, pedunc. reflexis, fol. piliferis.
caespiticium. 29. B. anth. pendulis, fol. lanceolatis acuminato-setaceis, pedunc. longissimis.
carneum. 30. B. anth. pendulis subglobosis, fol. acutis alternis.
simplex. 31. B. anth. nutantibus oblongis, fol. subulatis, surc. simplicissimo: medio pedunculifero.

1595. HYPNVM. 1587.

Anthera operculata. *Calyptra* laeuis. *Filamentum* laterale ortum e perichaetio.

* *Frondibus pinnatis.*

spiniforme. 1. H. frond. simplicissima: foliolis patentibus subulatis, pedunc. radicalibus.

taxi-

taxifolium. 2. H. frond. ſimpliciſſima pinnata lanceolata baſi pedunculifera.

denticulatum. 3. H. frond. pinnata ſimplici: pinnis duplicatis baſi pedunculifera.

bryoides. 4. H. frond. ſimpliciſſima pinnata lanceolata apice pedunculifera.

acacioid. 5. H. frond. pinnata ramoſa apice pedunculifera.

adiantoid. 6. H. frond. pinnata ramoſa erecta medio pedunculifera.

complanatum. 7. H. frond. pinnata ramoſa: foliolis imbricatis acutis complicatis compreſſis.

cornipodioides. 8. H. frond. pinnata ramoſa, fol. patentiſſimis ouatis carinatis mucronatis.

* * *Surculis vagis.*

lucens. 9. H. ſurc. ramoſis, frond. ſubpinnatis: foliolis punctatis.

rugoſum. 43. H. ſurc. vagis erectiuſculis: fol. ſecundis recuruatis baſi rugoſis. *Mant.* 131.

vndulatum. 10. H. ſurc. ramoſis, frond. ſubpinnatis: fol. vndulatis complicatis.

criſpum. 11. H. ſurc. ramoſis, frond. ſubpinnatis: fol. vndulatis planis.

triquetr. 12. H. ramis vagis recuruis, fol. ouatis recuruatis patulis.

rutabulum. 13. H. ram. vagis ſubrepentibus, fol. ouatis mucronatis imbricatis.

* * * *Surculis pennatis.*

filicinum. 14. H. ſurc. pennatis: ramulis diſtantibus, fol. imbricatis incuruis acutis ſecundis.

prolifer. 15. H. ſurc. proliferis plano-pinnatis, pedunc. aggregatis.

delicatulum. 16. H. ſurc. ſubproliferis plano-pinnatis cuſpidatis, pedunc. aggregatis.

parietin. 17. H. ſurc. plano-pinnatis continuatis, pedunc. aggregatis. (*et 4. t.* lege: *et 4. Vaill. pariſ. t. 28. f. 1. etc.*)

praelongum. 18. H. ſurc. ſubpinnatis decumbentibus: ramul. remotis, fol. ouatis, antheris cernuis.

criſta caſtrenſ. 19. H. ſurc. pinnatis: ramul. approximatis: apicibus recuruis.

abieti-

abietinum. 20. H. furc. pinnatis teretiuſculis remotis inaequalibus.
plumoſum. 21. H. furc. pinnatis repentibus, ramis confertis, fol. imbricatis ſubulatis, antheris erectis.

* * * * *Foliis reflexis.*

cupreſſiforme. 22. H. furc. ſubpinnatis, fol. ſecundis recuruis apice ſubulatis.
auuncum. 23. H. furc. erectiuſculo-ſubramoſis, fol. ſecundis recuruis ſubulatis, ram. recuruatis.
ſcorpioides. 24. H. ram. vagis procumbentibus recuruis, fol. ſecundis acuminatis.
viticuloſum. 25. H. furc. repentibus, ram. vagis teretibus, fol. patulis acuminatis.
ſquarroſum. 26. H. ram. vagis, fol. lanceolatis complicato-carinatis quinquefariam recuruatis. *Buxbaumii figura optima.*
paluſtre. 27. H. furc. repentibus, ramis confertis erectis, fol. ouatis ſecundis, anth. erectiuſculis.
loreum. 28. H. furc. reptantibus, ram. vagis erectis, fol ſecundis, antheris ſubrotundis.

* * * * * *Surculis dendroidibus ſ. faſciculatis.*

dendroides. 29. H. furc. erecto, ram. faſciculatis terminalibus ſimpliciuſculis, anth. erectis.
alopecurum. 30. H. furc. erecto, ram. faſciculatis terminalibus ſubdiuiſis, anth. ſubnutantibus.

* * * * * * *Surculis teretiuſculis.*

curtipendulum. 31. H. furc. vagis teretibus, fol. ouatis acutis patulis, anth. pendulis.
purum. 32. H. furc. pinnato-ſparſis ſubulatis, fol. ouatis obtuſis conniuentibus.
illecebr. 33. H. furc. ramisque vagis teretibus erectiuſculis obtuſis.
riparium. 34. H. furc. teretibus ramoſis, fol. acutis patulis diſtantibus.
cuſpidat. 35. H. furc. vagis: apice foliis conuolutis acuminato.

* * * * * * * *Surculis confertis.*

ſericeum. 36. H. furc. repente, ram. confertis erectis, fol. ſubulatis, anth. erectis.

veluti

velutinum. 37. H. ſurc. repente, ram. confertis erectis, fol. ſubulatis, anth. ſubnutantibus.

ſerpens. 38. H. ſurc. repentibus, ram. filiformibus, fol. obliteratis.

ſciuroid. 39. H. ſurc. erectis ramoſis incuruatis.

myoſuroides. 40. H. ſurc. ramoſiſſimis: ram. ſubulatis vtrinque attenuatis teretibus.

clauellatum. 41. H. repens, ram. erectis confertiſſimis, anth. incuruis: opercul. inflexis. *Dill. t. 85.*

julaceum. 42. H. ram. erectis teretibus imbricatis obtuſis, perichaetiis longitudine fere pedunculorum.

ALGAE.

1196. JVNGERMANNIA. Masc. pedunculatus, nudus. *Antherae* 4-valuis.
1597. Fem. ſeſſilis, nudus, ſeminibus ſubrotundis.

* *Frondibus pinnatis ſecundis.*

aſplenioides. 1. I. frond. ſimpliciter pinnatis: fol. pinnatis ouatis ſubciliatis.

viticuloſ. 2. I. frond. ſimpliciter pinnatis: fol. planis nudis linearibus. *Ger. prou. 40.*

polyanthos. 3. I. frond. ſimpliciter pinnatis: fol. integerrimis imbricatis conuexis.

lanceolata. 4. I. frond. ſimpliciter pinnatis lanceolatis apice floriferis, fol. integerrimis.

bidentata. 5. I. frond. ſimpliciter pinnatis apice floriferis, fol. bidentatis.

bicuſpidata. 6. I. frond. ſimpliciter pinnatis medio floriferis, fol. bidentatis.

quinquedentata. 7. I. frond. pinnatis ramoſis apice floriferis, foliol. quinquedentatis.

* * *Frondibus pinnatis: pinnulis articulatis ſuperne tectis.*

vndulata. 8. I. frond. ſupra bipinnatis apice floriferis; fol. ſubrotundis integerrimis vndulatis *Specimen meum conuenit cum figura Vaillantiana, minus cum Dilleniana.*

niana. Folia *diſtiche poſita, integerrima, patentia, approximata, minime imbricata, ſed vtrinque duplici ordine poſita, alterna, magnitudine aequalia, vt inferiora non minora ſint ſuperioribus, nec inferiora cum ſuperioribus baſi coadunata, ſed alterna & diſtincta; omnia leuiter vndulata.*

nemorea- 9. I. frond. ſupra bipinnatis apice floriferis; fol. ciliatis.
reſupinata. 10. I. frond. ſupra bipinnatis inferne floriferis; fol. crenulatis imbricatis rotundis.
albicans. 11. I. frond. ſupra bipinnatis apice floriferis: fol. linearibus recuruatis.
trilobata. 12. I. frond. ſubtus bipinnatis, fol. quadratis obſolete trilobis.
reptans. 13. I. frond. ſubtus bipinnatis apice reptantibus, fol. quadridentatis.

* * * *Frondibus imbricatis.*

complanata. 14. I. ſurc. repentibus: fol. inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ram. aequalibus.
dilatata. 15. I. ſurc. repentibus, fol. inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ram. apice latioribus.
amariſci. 16. I. fol. imbricatis ſerie duplici: ſuperioribus ſubrotundis conuexis obtuſis quadruplo maioribus.
platyphylla. 17. I. ſurc. procumbentibus ſubtus imbricatis, fol. cordatis acutis.
ciliaris. 18. I. ſurc. repentibus, fol. duplicato-imbricatis: inferne auriculatis ciliatis.
varia. 19. I. ſurc. erectiuſculis bifariam imbricatis, fol. bipartitis.

* * * * *Surculis vndique imbricatis: foliolis ſparſis.*

iulacea. 20. I. ſurc. teretibus, fol. vndique imbricatis, flor. pedunculatis.
rupeſtris. 21. I. ſurc. teretibus, fol. ſubulatis ſecundis.
trichoph. 22. I. ſurc. teretibus, fol. capillaceis aequalibus.
alpina. 23. I. ſurc. teretibus, fol. ouatis patentibus: calyc. imbricatis.

* * * * * *Acaules frondibus ſimplicibus.*

epiphylla. 24. I. aculis, foliolo frondi innato.
pinguis. 25. I. acaulis, frond. oblonga ſinuata pingui.

multi-

muldifid. 26. I. acaulis, frond: bipinnatifida.
furcata. 27. I. acaulis, frond. lineari ramosa : extremitatibus furcatis obtusiusculis.
pusilla. 28. I. acaulis, frond. subpinnatifida : lobis imbricatis, perichaetio plicato.

1197. TARGIONIA. 1603. *Calyx* biualuis, includens globum.

hypophyll. 1. TARGIONIA.

1198. MARCHANTIA. 1603. MASC. *Cal.* peltatus, subtus tectus Corollis 1-petalis. *Antherae* multifidae. FEM. *Calyx* sessilis, campanulatus, polyspermus.

polymorp. 1. M. cal. communi decemfido. *Ex Antheris floriferis exit Lana lutea, quae sponte mouetur in Antheram, dum Pollen atomi instar exstillat. Acad. Reg. Sc. Paris.*
chenopod. 2. M. cal. communi dimidiato palmato quadrifido.
cruciata. 3. M. cal. communi quadripartito: laciniis tubulosis.
tenella. 4. M. cal. communi hemisphaerico apiculato : margine lamellis radiato.
hemisphaerica. 5. M. cal. communi quinquefido hemisphaerico, perichaetio nullo.
conica. 6. M. cal. commun. quinqueloculari subouato.
androgyn. 7. M. cal. communi integro hemisphaerico.

1199. BLASIA. 1605. MASC? *Cal.* cylindricus granis repletus.
FEM.? *Cal.* nudus. Fructu subrotundo, foliis immerso, polyspermo.

pusilla. 1. BLASIA.

1200. RICCIA. 1605. *Cal.* o. nisi cauitatem vesicularem intra folii substantiam. *Cor.* o. *Anthera* cylindrica, sessilis, germini imposita. *Pist. Germen* turbinatum. *Stylus* filiformis antheram perforans. *Peric.* sphaericum, coronatum anthera emarcida. *Sem.* hemisphaerica, pedicellata. *Obseruante J. C. D. Schrebero.*

crystallin. 1. R. frond. superficie papillosis.
minima. 2. R. frond. glabris bipartitis acutis.
glauca. 3. R. frond. glabris canaliculatis bilobis obtusis.
fluitans. 4. R. frond. dichotomis lineari-filiformibus.
natans. 5. R. frond. obcordatis ciliatis. Lichen paruus vernus cordiformis ima parte fimbriatus, lentis palustris modo aquis innatans. *Dill. musc. 536. t. 78. f. 18. Rai. angl. 116.* Lens palustris, roris solis foliis cordatis. *Pet. mus. 652. Habitat in stagnis* Angliae, Germaniae. *D. Schmiedel.*

1210. ANTHOCEROS. 1606. Masc. *Cal.* sessilis, cylindricus, integer. *Anthera* subulata, longissima, 2-valuis.
Fem. *Cal.* 6-partitus. *Sem.* 3.

punctatus. 1. A. frond. indiuisis sinuatis punctatis.
laeuis. 2. A. frond. indiuisis sinuatis laeuibus.
multifid. 3. A. frond. bipinnatifidis linearibus.

1202. LICHEN. 1606. Masc. *Receptaculum* subrotundum, planiusculum, nitidum.
Fem. *Farina* foliis adspersa.

A * *Leprosi tuberculati.*

scriptus. 1. L. leprosus albicans, lineolis nigris ramosis characteriformibus.

geopra-

geopraph. 2. L. leprosus flauescens, lineolis nigris mappam referens.

byssoides. 90. L. leproso-farinaceus, peltis stipitatis subgloboſis. *Mant. 133.*

lacteus. 86. L. leprosus albus, tuberculis concoloribus hemisphaericis. *Mant. 132.*

rupicola. 85. L. leprosus albidus, tuberculis pallidis albo-marginatis. *Mant. 132.*

pertusus. 82. L. leprosus: verrucis subteſſellatis laeuigatis pertusis poro vno alteroue cylindrico. *Mant. 131.*

rugosus. 3. L. leprosus albicans, lineolis simplicibus punctisque nigris confertis.

sanguinarius. 4. L. leprosus cinereo-virescens, tuberculis atris. *Tubercula subgloboſa, magna, non nitida.*

fusco-ater. 5. L. leprosus fuscus, tuberculis atris.

calcarius. 6. L. leprosus candidus, tuberculis atris.

atro-virens. 7. L. leprosus viridis margine tuberculisque atris.

cinereus. 87. L. leprosus tuberculis nigris albo-marginatis. *Mant. 132.*

atro-albus. 8. L. leprosus niger, tuberculis atro alboque mixtis. *Difficile dicere quinam color conſtituat cruſtam.*

ventosus. 9. L. leprosus flauus, tuberculis rubris.

fagineus. 10. L. lebrosus albus, tuberculis albis farinaceis.

carpineus. 11. L. leprosus cinereus, tuberculis albidis rugoſis.

corallinus. 83. L. leprosus ramosus, teres fasciculatus fastigiatus confertiſſimus albus. *Mant. 131.*

ericetorum. 12. L. leprosus candidus, tuberculis incarnatis. *Huius duplicem varietatem reperit D. Zoega:* Dilleniana *sub iuniperis, Pelta ſtipitata, inſtar minuti Agarici, pileo conuexo;* Noſtra in *Sphagno Pelta ſeſſili plana.*

B. * *Leprosi scutellati.*

candelar. 13. L. cruſtaceus flauus, scutellis luteis. Lichen. cruſtoſum orbiculis & scutellis flauis. *Dill. muſc. 136. t. 18. f. 18.*

gelidus. 91. L. cruſtaceus albicans, peltis tuberculoſis rugoſis teſtaceis. *Mant. 133.*

tartareus. 14. L. cruſtaceus exalbido-virescens, scutellis flauescentibus: margine albo.

pallaſcens. 15. L. cruſtaceus albicans, ſcutellis pallidis.
ſubfuſcus. 16. L. cruſtaceus albicans, ſcutellis nigris: iunioribus vrceolatis cauis.
Parellus. 89. L. cruſtaceus albus, peltis concauis obtuſis pallidis. *Mant. 132.*
vpſalienſ. 17. L. cruſtaceus, foliolis ſubulatis ſtriatis.

C. * *Imbricati.*

centrifugus. 18. L. imbricatus, foliolis obſolete multifidis laeuibus albidis centrifugis, ſcutellis ruſo fuſcis.
ſaxatilis. 19. L. imbricatus, foliolis ſinuatis ſcabris lacunoſis, ſcutellis badiis.
omphalodes. 20. L. imbricatus, foliolis multifidis glabris obtuſis incanis, punctis vagis eminentibus.
oliuaceus. 21. L. imbricatus, foliolis lobatis nitidis liuidis. *Peltae orbiculatae. eleuatae, membranaceae, vndique liberae.*
fahlunenſis. 22. L. imbricatus, foliolis linearibus dichotomis planiuſculis acutis nigris, ſcutellis atris.
ſtygius. 23. L. imbricatus, foliolis palmatis recuruis atris. *Scutella orbiculata, nigra, concaua, margine obtuſo crenulato.*
criſpus. L. imbricatus, foliis lobatis truncatis crenatis atrouiridibus, ſcutellis concoloribus. *Hudſ. angl. 447. n. 26.* Lichenoides gelatinoſum atrouirens criſpum & rugoſum. *Dill. muſc. 139. t. 19. f. 23.*
criſtatus. 24. L. imbricatus dentato-ciliatus, ſcutellis folio maioribus.
parietinus. 25. L. imbricatus, foliolis criſpis fuluis, peltis concoloribus fuluis.
phyſodes. 26. L. imbricatus: laciniis obtuſis ſubinflatis.
ſtellaris. 27. L. imbricatus: foliolis oblongis laciniatis anguſtis cinereis, ſcutellis pullis.

D. * *Foliacei.*

ciliaris. 28. L. foliaceus erectiuſculus: laciniis linearibus ciliatis, ſcutellis pedunculatis crenatis.
Islandicus. 29. L. foliaceus adſcendens laciniatus: marginibus eleuatis ciliatis.
riualis. 30. L. foliaceus adſcendens laciniatus criſpus glaber lacunoſus albus margine eleuato.

pulmo-

pulmonarius. 31. L. foliaceus laciniatus obtusus glaber : supra lacunosus; subtus tomentosus.

furfuraceus 32. L. foliaceus decumbens furfuraceus : laciniis acutis; subtus lacunosis atris.

ambullaceus. 33. L. foliaceus planiusculus lobatus crenatus, peltis globosis inflatis.

leuromeles. 34. L. foliaceus linearis ramosus nigro subciliatus, peltis subpedunculatis radiatis.

farinaceus. 35. L. foliaceus erectus compressus ramosus: verrucis marginalibus farinosis,

calicaris. 36. L. foliaceus erectus linearis ramosus lacunosus conuexus mucronatus.

fraxineus. 37. L. foliaceus rectus oblongus lanceolatus sublaciniatus lacunosus glaber, scutellis subpedunculatis.

fuciformis. 38. L. foliaceus rectiusculus laeuis subtomentosus ramosus: laciniis lanceolatis.

prunastri. 39. L. foliaceus erectiusculus lacunosus : subtus tomentosus albus. *Varietas Dill. musc. 159. t. 21. f. 54. Vaill. paris. t. 20. f. 7.*

Juniper. 40. L. foliaceus laciniatus crispus fuluus, peltis liuidis.

caperatus. 41. L. pallide viridis rugosus margine vndulatus. *Glauescente-luteus parum foliaceus, raro scutella proferens.*

glaucus. 42. L. foliaceus depressus lobatus glaber: margine crispo farinaceo. *Folia papyro tenuiora, albo-cinerascente glauca.*

fascicularis. 93. L. foliaceus gelatinosus tuberculis turbinatis fasciculatis fronde maioribus. *Mant. 133.*

E. * *Coriacei.*

aquaticus. 43. L. coriaceus repens lobatus obtusus, peltis hemisphaericis maximis.

resupinatus. 44. L. coriaceus repens lobatus, peltis marginalibus posticis.

venosus. 45. L. coriaceus repens ouatus planus: subtus venosus villosus, peltis marginalibus horizontalibus.

aphtosus. 46. L. coriaceus repens lobatus obtusus planus, verrucis sparsis, pelta marginali adscendente. *Folia siccata sunt glauca, virentia vero saturate viridia.*

arcticus. 47. L. coriaceus repens lobatus obtusus planus laeuis: subtus auenius villosus.

caninus. 48. L. coriaceus repens lobatus obtusus planus: subtus venosus villosus, pelta marginali adscendente *Folia quasi farina cinerea sunt tecta.*

syluaticus. L. coriaceus repens laciniatus lacunosus, peltis marginalibus adscendentibus. *Hudſ. angl. 453. n. 47.* Lichen polyschides villosum & scabrum, peltis paruis. *Dill. musc. 199. t. 27. f. 101.*

horizontalis. 88. L. coriaceus repens planus subtus auenius, peltis marginalibus horizontalibus. *Hudſ. angl. 453. n. 48. Mant. 132.*

perlatus. L. coriaceus repens lobatus glaber subtus ater, scutellis pedunculatis integris. *Hudſ. angl. 448. n. 31.* Lichenoides glaucum perlatum subtus nigrum & cirrosum. *Dill. musc. 147. t. 20. f. 39.*

saccatus. 49. L. foliaceus repens subrotundus: peltis depressis subtus saccatis: Lichen *immersus* foliaceus repens subrotundus planus, peltis immersis. *Hudſ. angl. 453. n. 49.*

croceus. 50. L. coriaceus repens subrotundus planus: subtus venosus villosus croceus, peltis sparsis adnatis.

F. * *Vmbillicati, squalentes quasi caligine.*

miniatus. 51. L. vmbilicatus gibbus punctatus subtus fuluus.

vellens. 52. L. vmbilicatus subtus hirsutissimus.

pustulat. 53. L. vmbilicatus subtus lacunosus, furfure nigro adspersus.

proboscid. 54. L. vmbilicatus, peltis turbinatis truncatis perforatis.

deustus. 55. L. vmbilicatus vndique laeuis. *Dill. musc. 219. t. 30. f. 117.*

polyphyll. 56. L. vmbilicatus polyphyllus vndique laeuis atro-uirens crenatus.

polyrrhizus. 57. L. vmbilicatus polyphyllus vtrinque laeuis polyrhizos. *Folia cinereo-glauca laeuia, subtus hirta.*

G. * *Scyphiferi.*

cocciferus. 58. L. scyphifer simplex integerrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis.

cornucopioides. 59. L. scyphifer simplex folio breuior, tuberculis coccineis.

pyxi-

pyxidat. 60. L. ſcyphifer ſimplex crenulatus, tuberculis fuſcis.
fimbriat. 61. L. ſcyphifer ſimplex denticulatus, ſtipite cylindrico.
gracilis. 62. L. ſcyphifer ramoſus denticulatus filiformis.
digitatus. 63. L. ſcyphifer ramoſiſſimus: ramis cylindricis, calycibus integris nodoſis.
cornutus. 64. L. ſcyphifer ſimpliciuſculis ſubuentricoſus, calycibus integris.
deformis. 65. L. ſcyphifer ſimpliciuſculus ſubuentricoſus, calycibus dentatis.

H. * *Fruticuloſi.*

rangiferinus. 66. L. fruticuloſus perforatus ramoſiſſimus, ramulis nutantibus.
vncialis. 67. L. fruticuloſus perforatus, ramulis breuiſſimis acutis.
ſubulatus. 68. L. fruticuloſus ſubdichotomus, ramis ſimplicibus ſubulatis.
globiferus. 92. L. fruticuloſus ſolidus laeuis, tuberculis globoſis cauis terminalibus. *Mant. 133.* Lichen *globoſus* fruticuloſus ſolidus ramoſiſſimus, ramulis teretibus acutis furcatis, tuberculis terminalibus globoſis. *Hudſ. angl. 460. n. 75.*
paſchalis. 69. L. fruticuloſus ſolidus tectus, foliolis cruſtaceis.
fragilis. 70. L. fruticuloſus ſolidus, ramulis teretibus obtuſis.
Roccella. 71. L. fruticuloſus ſolidus aphyllus ſubramoſus, tuberculis alternis.

J. * *Filamentoſi.*

plicatus. 72. L. filamentoſus pendulus, ramis implexis, ſcutellis radiatis.
barbatus. 73. L. filamentoſus pendulus ſubarticulatus, ramis patentibus.
diuaricatus. L. filamentoſus pendulus angulatus articulatus intus tomentoſus, ramis diuaricatis, peltis orbiculatis ſeſſilibus. Lichen filamentoſus pendulus, loris lacunoſis glabris. *Scop. carn. 75.* Uſnea mollis, ramis longis compreſſis. *Dill. muſc. 62. t. 12. f. 5. Habitat* in Heluetiae, Misniae *cacuminibus Arborum acifoliarum. D. Schreber.*
Vſnea. L. filamentoſus pendulus compreſſus ramoſus laeuis. *Mant. 131.*
iubatus. 74. L. filamentoſus pendulus: axillis compreſſis.

lanatus. 75. L. filamentoſus ramoſiſſimus decumbens implicatus opacus.

pubeſcens. 79. L. filamentoſus ramoſiſſimus decumbens implexus nitidus. *Habitat in rupibus noſtris planiuſculis, quas imbres diluunt.*

chalybeiformis. 77. L. filamentoſus ramoſiſſimus diuaricatus decumbens implicato-flexuoſus.

hirtus. 78. L. filamentoſus ramoſiſſimus erectus, tuberculis farinaceis ſparſis.

vulpinus. 79. L. filamentoſus ramoſiſſimus erectus faſtigiatus inaequali-anguloſus.

articulatus. 80. L. filamentoſus articulatus, ramulis tenuiſſimis punctatis.

floridus. 86. L. filamentoſus ramoſus erectus, ſcutellis radiatis.

1204. TREMELLA. *Fructificationes* vix manifeſtae, 1625. in corpore gelatinoſo.

iuniperin. 1. T. ſeſſilis membranacea auriformis fulua.

Noſtoc. 2. T. plicata vndulata.

lichenoides. 4. T. erecta plana: margine criſpo lacinulato. *Dill. muſc. t. 19. f. 32. 34. 35.*

verrucoſa. 5. T. tuberculoſa ſolida rugoſa. *Dill. muſc. t. 10. f. 16.*

difformis. 8. T. ſubrotunda ſinuata difformis gelatinoſa.

hemiſph. 6. T. hemiſphaerica ſparſa.

purpurea. 7. T. ſubgloboſa ſeſſilis ſolitaria glabra.

adnata. 9. T. rotunda imbricata liuida.

1205. FVCVS. Masc. *Veſiculae* villis intertextae. 1626. Fem. *Veſiculae* adſperſae granis immerſis apice prominulis. *Sem.* ſolitaria.

ouarius. 36. F. caule filiformi ramoſo, fol. confertis ouatis fornicatis. *Habitat in O. Aſiatico* Folia *conferta in racemum, retrorſum fornicata, membranacea, purpurascentia, parua. Fructificationes non vidi.*

natans.

natans. 13. F. caule filiformi ramoſo, fol. lanceolatis ſerratis, fructificationibus globoſis pedunculatis. *Fructificationes in aliis muticae, in aliis filo breui ariſtatae; in quibusdam indiuiduis ex alis foliorum racemi breuiſſimi filiculis minutis verrucoſis.*

acinarius. 14. F. caule filiformi ramoſo, fol. linearibus i tegerrimis, fructificationibus globoſis pedunculatis. *Praecedenti affinis.*

lendigerus. 15. F. caule filiformi ramoſo, fol. lanceolatis ſerratis, fructific. racemoſis, filiculoſis tuberculoſis. *Racemi aphylli praeter vnum alterumue foliolum erectum.*

turbinatus. 16. F. caule filiformi ſubramoſo, fructific. racemoſis; vna veſiculari turbinata folio cordato crenato peltata. *Racemi praecedentis ſimillimi e filiculis verrucoſis, ſed obtuſioribus; in quouis Racemo ſ. corymbo* Veſica *magna, pedunculata, turbinata, terminata folio adnato, horizontali, cordato, obtuſiſſimo; Folia, praeter veſicularia dicta, in meis exemplaribus nulla viſa ſunt. Creſcit etiam in O. Sumatram alluente.*

ſerratus. 1. F. fronde plana dichotoma ſerrato-dentata, fructific. terminalibus tuberculoſis.

volubilis. 6. F. fronde plana ſpirali perfoliata repando-dentata.

veſiculoſus. 2. F. fronde plana dichotoma integerrima: veſiculis axillaribus geminis; terminalibus tuberculatis.

diuaricatus. 8. F. fronde plana dichotoma integrrrima, axillis diuaricatis: veſiculis axillaribus geminis. *Praecedente tenuior.* Veſiculae *axillares geminae, paſſimque ſolitariae.*

exciſus. 10. F. fronde lineari dichotoma hinc canaliculata, axillis diuaricatis punctata.

inflatus. 7. F. fronde plana dichotoma integerrima punctata ouato-lanceolata inflata: apice diuiſo. *Semel aut his tantum bifidus eſt.*

ceranoides. 3. F. fronde plana dichotoma integerrima punctata lanceolata, fructific. tuberculatis bifidis terminalibus. *Praecedenti affinis, ſed anguſtior magisque ramoſus, vtrinque punctis impreſſis adſperſus.*

ſpiralis. 6. F. fronde plana dichotoma integerrima punctata: inferne lineari canaliculata, fructif. tuberculatis geminis. *Frons membranacea, plana, ſed inferne*

anguſtior, hinc canaliculata. Fructific. *terminales, geminae, pedunculatae, oblongae, craſſiuſculae. Dum creſcit in mari contortus eſt in ſpiram.*

canalicula-tus. 45. F. fronde plana dichotoma integerrima canaliculata lineari: fructific. tuberculatis bipartitis obtuſis. *Dichotomus multoties, laeuis, anguſtus & linearis, latere altero conuexo; altero canaliculato. Veſiculae terminales bipartitae ſ. geminae, ſeſſiles, tuberculis adſperſae perforatis.*

diſtichus. 46. F. fronde plana dichotoma integerrima lineari: fructif. tuberculatis mucronatis. *Differt a praecedente, quod frons minime altero latere canaliculata, quodque Veſiculae, ſiliquae inſtar, longae & acuminatae. Koenig.*

nodoſus. 11. F. fronde compreſſa dichotoma, fol. diſtichis integerrimis veſiculis innatis ſolitariis dilatatis. *Folia lanceolata, obtuſa, angulis frondis diſtiche inſidentia.* Veſiculae *ouatae, medio ramorum innatae, ramis latiores.*

ſiliquoſus. 17. F. fronde compreſſa ramoſa, fol. diſtichis alternis integerrimis, fructif. pedunculatis oblongis mucronatis. *Frons filiformis, compreſſa, flexuoſa, vtrinque angulis dentata rudimentis petiolorum aut fructificationum. Fructificationes fuſiformes, alternae, roſtratae, pedunculatae. Folia lanceolata, fructificationibus minora.*

ſiliculoſus. F. fronde filiformi-compreſſa, fol. alternis ſubſerratis, fructif. ſubgloboſis pedunculatis mucronatis. *Frons filiformis, parum compreſſa, vix ramoſa. Folia lineari-lanceolata, ſubſerrata aut dentata. Pedunculi ex alis foliorum filiformes, foliis fere longiores.*

elongatus. 9. F. fronde filiformi compreſſa dichotoma articulata geniculis tumidiuſculis. *Frons ad dichotomias tumidiuſcula & articulata, vbi per exſiccationem diſcedit, vt articuli ſaepe ſoluantur.*

loreus. 47. F. fronde filiformi compreſſa dichotoma vndique vtrinque tuberculata. *Frons dichotoma, elongata, linearis, compreſſa, adſperſa vndique tuberculis eleuatis obſoletis.*

abrotanifo-lius. 21. F. fronde filiformi compreſſa bipinnata: apicibus veſiculoſis dilatatis terminatis fructificationibus hinc tuberculatis. Fucus pinnatus, ramis dichotomis: extremitatibus dilatato-veſiculoſis. *Loeſl. it. 174.*

foenicu-

foeniculaceus. 20. F. fronde filiformi ramosissima, vesiculis ouatis terminatis foliolis multipartitis obtusis apice fructificantibus. *β.* Fucus barbatus. *Sp. pl. 19. Statura Lichenis vsneae; ramulis copiosissimis, capillaribus, terminatis vesicula, saepius prolifera, vltima terminata aliquot foliolis apice tuberculatis.*

granulatus. 18. F. fronde filiformi ramosissima, ramulis acuminatis, vesiculis subrotundis cumulatis ramis, foliisque acutis omnibus innatis. *Vesiculae absque ordine confertae, contiguae, cumulatae, tam ramis, quam vltimis apicibus s. foliis innatae.*

Selaginoides. 36. F. fronde filiformi ramosissima: ramis dichotomis, fol. subulatis alternis basi vesiculosis. *Mant. 134.*

concatenatus. 12. F. fronde filiformi ramosissima: ramulis dichotomis, vesiculis moniliformibus distantibus innatis fol. subulatis. *F. filiformis, oppositе vel alternatim ramosissimus, vltimis ramulis saepe dichotomis. Vesiculae ouatae, caule ramulisque innatae, remotae cum folio subulato ad latus cuiusuis vesiculae.*

aculeatus. 34. F. fronde filiformi compressa ramosissima: dentibus marginalibus subulatis alternis erectis. *Refert caudam equinam: e Norvegia D. Gunnerus.*

lycopodioides. 35. F. fronde filiformi tereti subramosa, obtecta vndique setis. *Frons erecta, parum ramosa, vix pedalis, vndique more Lycopodii tecta foliolis setaceis, semipollicaribus.*

muscoides. 23. F. fronde tereti ramosissima: ramis sparsis spinis mollibus alternis.

hirsutus. 33. F. fronde filiformi tereti dichotoma obtecta vndique hirsutie. *Mant. 134. Facies fere Spongiae. Hirsuties vestiens tam parua, vt oculis non distinguatur.*

discors. 48. F. fronde tereti inermi aculeatissima, foliis distichis subpinnatis lineari-lanceolatis serratis. *Caulis palmaris, teres, vndique vestitus ramentis s. aculeis inermibus, confertissimis: Folia distiche posita, plana, laeuia, lineari- lanceolata, serrata & haec saepe parum pinnata.*

Tendo. 32. F. fronde filiformi simplici tenacissima subdiaphana.
Filum. 31. F. fronde filiformi subfragili opaca.

lano-

lanoſus. 49. F. frond. capillaceis dichotomis ramoſiſſimis ſcabris. *Habitat in O. Islandico. Koenig. Refert Lanam atram, palmaris, oculo armato ſcaber punctis ſubuerticillatis.*

faſtigiatus. 29. F. fronde filiformi dichotoma ramoſiſſima faſtigiata obtuſa.

furcellat. 30. F. fronde filiformi dichotoma ramoſiſſima acuminata.

palmatus. 26. F. fronde palmata plana.

digitatus. 39. F. fronde palmata, foliolis enſiformibus, ſtirpe tereti. *Mant. 134.*

eſculentus. 40. F. fronde ſimplici indiuiſa enſiformi, ſtirpe pinnata folium percurrente. *Mant. 135.*

ſaccharinus. 25. F. fronde ſubſimplici enſiformi, ſtirpe tereti breuiſſima.

ſanguineus. 44. F. frond. membranaceis ouato-oblongis integerrimis petiolatis, caule tereti ramoſo. *Mant. 136.*

ciliatus. 43. F. frond. membranaceis lanceolatis proliferis ciliatis. *Mant. 136.*

criſpus. 38. F. frond. ſubmembranaceis dichotomis: laciniis dilatatis. *Mant. 134. Laciniae ſuperne latiores, apice obtuſe dentatae.*

criſpatus. 50. F. frond. membranaceis ſublinearibus ramoſiſſimis criſpis coloratis. *Tenerrimus, ſanguineus.*

alatus. 42. F. frond. membranaceis ſubdichotomis neruoſis: laciniis alternis decurrentibus bifidis. *Mant. 135.*

dentatus. 41. F. frond. membranaceis eneruiis alternatim pinnatifidis: ſinubus obtuſis, laciniis apice eroſis. *Mant. 135.*

rubens. 27. F. frond. membranaceis oblongis vndulatis ſinuatis, ſtirpe tereti ramoſa.

vittatus. 51. F. frond. membranaceis diuiſis enſiformibus dentato-criſpatis.

ramentaceus. 54. F. frond. filiformibus ſimplicibus, hinc ramentis foliaceis confertis. *Stipites palmares, ſimplices, ab altero tantum latere ramentis foliaceis, confertis, linearibus, coloratis.*

plumoſus. 37. F. frond. cartilagineis lanceolatis bipinnatis plumoſis, caule filiformi compreſſo ramoſo. *Mant. 134. Similis ſequenti, ſed Hypni inſtar pinnatus; paruus.*

carti-

cartilagineus. 24. F. frond. cartilaginea compreſſa ſupradecompoſito-pinnata: laciniis linearibus. Frutices marini. *Seb. muſ. 3. t. 102. f. 1. 2. Habitat ad C. B. S. copioſiſſima, incruſtata.*

gigartinus. 52. F. fronde cartilaginea filiformi-compreſſa dichotoma, fructif. globoſis pedunculatis terminalibus ſubiacente ariſta. *Erectus, rigidus, palmaris, diaphanus, filiformis, compreſſus, coloratus, parce lateribus ramuloſus pro fructificationibus. Fructif. globoſae, paruae inſtar ſeminis Braſſicae minoris, breui pedicello ſ. ramulo inſidentes, ſub ſemine exſerto in mucronem ſemine longiorem.*

ſpermophorus. 53. F. fronde membranacea dichotoma compreſſa capillacea, fructif. pedunculatis lateralibus, fol. linearibus multifidis. *Stipes palmaris, laxus, filiformis, compreſſo-membranaceus, dichotomus in ramos capillares copioſiſſimos. Pedunculi laterales, ſolitarii, fructificatione globoſa, magnitudine ſeminis Thymi. Ad baſin ſtipitis folia linearia, membranacea, caule latiora, varie multifida, obtuſa. Koenig.*

conferuoides. 22. F. frond. membranaceis linearibus compreſſis ramoſi, fructif. ſparſis ſeſſilibus ſubrotundis. *Koenig.*

1206. VLVA. *Fructificationes* in membrana diaphana. 1632.

pauonia. V. plana reniformis ſeſſilis decuſſatim ſtriata. Fucus pauonius. *Sp. pl. 2. p. 1630.*

vmbilicalis. 7. V. plana orbicularis ſeſſilis peltata coriacea.

inteſtinal. 1. V. tubuloſa ſimplex.

compreſſa. 2. V. tubuloſa ramoſa compreſſa.

conferu. 3. V. filiformis articulata: articulis alternatim compreſis.

latiſſima. 4. V. oblonga plana vndulata membranacea viridis. *Frons magnitudine folii Muſae.*

Lactuca. 5. V. palmata prolifera membranacea: ramentis inferne anguſtatis. Fucus ſcoparius. *Strom. ſordm. 93.*

lanceolata. V. lanceolata plana. Tremella marina porrifolio. *Dill. muſc. 46. t. 9. f. 5. Habitat in Oceano.*

labyrin-

labyrinthi-formis. 6. V. cellulis labyrinthiformibus prominentiisque clauatis. *Vandell. therm. 120. t. 2.*
Linza. 8. V. fronde oblonga bullata.
prunifor. 9. V. ſubgloboſa ſolitaria intus ſucculenta.
granulata. 10. V. globoſa farcta viridis. *Mant. 136.*

1207. CONFERVA. 1633.

Tubercula inaequalia, in fibris capillaribus, longiſſimis.

* *Filamentis ſimplicibus, aequalibus, geniculis deſtitutis.*

riuularis. 1. C. filamentis ſimpliciſſimis aequalibus longiſſimis.
fontinalis. 2. C. filamentis ſimpliciſſimis aequalibus digito breuioribus.

* * *Filamentis ramoſis, aequalibus.*

bulloſa. 3. C. filamentis aequalibus ramoſis, bullas aereas includentibus.
canalicul. 4. C. filamentis aequalibus baſin verſus ramoſioribus.
amphibia. 5. C. filamentis aequalibus ramoſis: exſiccatione coeuntibus in aculeos.
littoralis. 6. C. filamentis aequalibus ramoſiſſimis elongatis ſcabriuſculis.
aeruginoſa. 7. C. filamentis ramoſis mollibus digito breuioribus viridiſſimis.
dichotom. 8. C. filamentis aequalibus dichotomis.
ſcoparia. 9. C. filamentis proliferis faſtigiatis hirtis.
cancellata. 10. C. filis ramoſis: filamentis alternis breuibus multipartitis digitatis.

* * * *Filamentis anaſtomoſantibus.*

reticulata. 11. C. filamentis reticulato-coadunatis.

* * * * *Filamentis nodoſis.*

fluuiatilis. 12. C. filis ſimpliciſſimis ſetiformibus rectis: geniculis craſſioribus angulatis.
gelatinoſa. 13. C. filis ramoſis moniliformibus, articulis globoſis gelatinoſis.

* * * * * *Fi-*

* * * * * *Filamentis geniculatis.*

capillaris. 14. C. filis geniculatis ſimplicibus: articulis alternatim compreſſis.
corallin. 15. C. filis geniculatis dichotomis.
catenata. 16. C. filis geniculatis: articulis cylindricis.
polymorp. 17. C. filamentis geniculatis, ramis faſciculatis.
vagabunda. 18. C. filamentis geniculatis flexuoſis, ramis ramulisque breuioribus.
glomerata. 19. C. filamentis geniculatis, ramulis breuioribus multifidis.
rupeſtris. 20. C. filamentis geniculatis ramoſiſſimis viridibus.
aegagropila. 21. C. filamentis geniculatis ramoſiſſimis e centro confertiſſimis globum conſtituentibus.

1208. BYSSVS. *Lanugo* aut *Puluis* ſimpliciſſimus. 1637.

* *Filamentoſae.*

flos aquae. 1. B. filamentis plumoſis natantibus.
cancellata. B. filis exacte vndique cancellata: Byſſus cancellata. *Lederm. micr. t. 72. Habitat in aquis dulcibus; natans tanquam mucor vireſcenti-luteus.*
phoſphor. 2. B. lanuginoſa violacea lignis adnaſcens.
velutina. 3. B. capillacea viridis: filamentis ramoſis.
aurea. 4. B. capilacea puluerulenta, fructificationibus ſparſis, filamentis ſimplicibus ramoſisque.
cryptarum. 5. B. capillacea perennis cinerea tenax rupi innata.

* * *Puluerulentae.*

antiquit. 6. B. puluerulenta atra.
ſaxatilis. 7. B. puluerulenta cinerea rupes operiens.
Jolithus. 8. B. puluerulenta ſanguinea ſaxis innaſcens.
candelar. 9. B. puluerulenta flaua lignis adnaſcens.
botryoid. 10. B. puluerulenta viridis.
incana. 11. B. puluerulenta incana, farinae inſtar ſtrata.
lactea. 12. B. puluerulento-cruſtacea albiſſima.

FVNGI.

1209. AGARICVS. *Fungus* horizontalis, subtus lamellosus. 1639.

* *Stipitati, pileo orbiculato.*

Chantar. 1. A. stipitatus, lamellis ramosis decurrentibus.

quinquepartitus. 2. A. stipitatus, pileo subflauescente partito, lamellis albidioribus interne dentato-connexis.

integer. 3. A. stipitatus, lamellis omnibus magnitudine aequalibus.

muscarius. 4. A. stipitatus, lamellis dimidiatis solitariis, stipite voluato: apice dilatato, basi ouata. *Mich. gen. t. 78. f. 2.*

dentatus. 5. A. stipitatus, pileo conuexo, lamellis basi mucrone dentatis.

delicicsus. 6. A. stipitatus, pileo testaceo scabro lutescente.

lactifluus. 7. A. stipitatus, pileo plano succo lactescente, lamellis ruffis, stipite longo carneo.

piperatus. 8. A. stipitatus, pileo planiusculo lactescente: margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis.

campestris. 9. A. stipitatus, pileo conuexo squamato albido, lamellis ruffis.

georgii. β. A. stipitatus, pileo flauo conuexo, lamellis albis. *Fl. suec.* 1210.

violaceus. 10. A. stipitatus, pileo rimoso: margine violaceo tomentoso, stipite caerulescente lana ferruginea.

cinnam. 11. A. stipitatus, pileo sordide flauo, lamellis luteoruffis.

viscidus. 12. A. stipitatus, pileo purpurascente-fusco viscido, lamellis fusco-purpurascentibus.

equestris. 13. A. stipitatus, pilleo pallido: disco stellatim luteo, lamellis sulphureis.

mammosus. 15. A. stipitatus, pileo conuexo acuminato grisco, lamellis conuexis griseis crenatis, stipite nudo.

clypeatus. 16. A. stipitatus, pileo hemisphaerico viscido acuminato, lamellis albis, stipite longo cylindrico albo.

extinctorius. 17. A. stipitatus, pileo campaniformi albido lacero, lamellis niueis, stipite subbulboso subulato nudo.

crinitus. 25. A. stipitatus, pileo infundibuliformi piloso, lamellis aequalibus, stipite filiformi.

fimeta-

fimetarius. 18. A. ſtipitatus, pileo campanulato lacero, lamellis nigris lateraliter flexuoſis, ſtipite fiſtuloſo.
campanulatus. 19. A. ſtipitatus, pileo campanulato ſtriato pellucido, lamellis adſcendentibus, ſtipite nudo.
ſeparatus. 20. A. ſtipitatus. pileo laeui liuido, lamellis nigricantibus ſeparatis, ſtipite bulboſo voluato.
fragilis. 21. A. ſtipitatus, pileo conuexo viſcido pellucido lamellisque luteis, ſtipite nudo.
vmbelliferus. 22. A. ſtipitatus, pileo plicato membranaceo, lamellis baſi latioribus.
androſaceus. 23. A. ſtipitatus albus, pileo plicato membranaceo, ſtipite nigro.
clauus. 24. A. ſtipitatus, pileo luteo conuexo ſtriato, lamellis ſtipiteque albis.

** *Paraſitici, acaules, dimidiati.*

Quercin. 25. A. acaulis, lamellis labrynthiformibus.
Betulinus. 26. A. acaulis coriaceus villoſus: margine obtuſo, lamellis ramoſis anaſtomoſantibus.
Alneus. 27. A. acaulis, lamellis bifidis puluerulentis.

1210. BOLETVS. *Fungus* horizontalis, ſubtus poroſus. 1645.

* *Paraſitici acaules.*

Fauus. 5. B. acaulis ſubpuluinatus ſcaber ſetis erectis ramoſis, poris patulis angulatis.
ſuberoſus. 1. B. acaulis puluinatus albus laeuis, poris acutis difformibus.
fomentarius. 2. B. acaulis puluinatus inaequalis obtuſus, poris teretibus aequalibus glaucis.
igniarius. 3. B. acaulis puluinatus laeuis, poris tenuiſſimis.
ſanguineus. 6. B. acaulis ſubmembranaceus ruber, poris impalpabilibus.
verſicol. 4. B. acaulis, faſciis dicoloribus poris albis.
ſuaueol. 7. B. acaulis, ſuperne laeuis, ſalicinus.

** *Stipitati.*

perennis. 8. B. ſtipitatus perennis, pileo vtrinque planiuſculo,

viſcidus. 9. B. ſtipitatus, pileo puluinato viſcido, poris teretibus conuexis immerſis diſtinctis, ſtipite lacero.

luteus. 10. B. ſtipitatus, pileo puluinato ſubuiſcido, poris rotundatis conuexis flauiſſimis, ſtipite albido. Pilſen. *Müller oratio de Suampe. Hafn.* 1763. 4: *to.*

bouinus. 11. B. ſtipitatus, pileo glabro puluinato marginato, poris compoſitis acutis: porulis angulatis breuioribus.

granulatus. 12. B. ſtipitatus, pileo viſcido puluinato, poris teretibus ſubangulatisque truncatis: angulo granulato.

ſubtomentoſus. 13. B. ſtipitatus, pileo flauo ſubtomentoſo, poris ſubangulatis difformibus ſuluis planis, ſtipite flauo.

ſubſquamoſus. 14. B. ſtipitatus, pileo albido, poris difformibus oblongo-flexuoſis niueis.

1211. HYDNVM. *Fungus* horizontalis, ſubtus echinatus. 1647.

imbricat. 1. H. ſtipitatum, pileo conuexo imbricato.

repandum. 2. H. ſtipitatum, pileo conuexo laeui flexuoſo.

tomentoſ. 3. H. ſtipitatum, pileo plano-infundibuliformi.

auriſcalp. 4. H. ſtipitatum, pileo dimidiato.

paraſitic. 5. H. acaule arcuato-rugoſum tomentoſum.

1212. PHALLVS. *Fungus* ſupra reticulatus, ſubtus laeuis. 1648.

eſculent. 1. PH. pileo ouato celluloſo, ſtipite nudo rugoſo.

impudic. 2. PH. voluatus ſtipitatus, pileo celluloſo.

1213. CLATHRVS. *Fungus* ſubrotundus, cancellatus. 1648.

* *Acaules.*

cancellat. 1. C. acaulis ſubrotundus. *Col. echp. 1. p.* 337. *t.* 336. *Barr. ic.* 1265.

* * *Stipitati.*

denudat. 2. C. ſtipitatus, capitulo oblongo voluato.

nudus. 3. C. ſtipitatus, capitulo oblongo axi longitudinali adnato,

recurvitus. 4. C. ſtipitatus, capitulo globoſo, glande ouali.

1214.

1214. HELVELLA. *Fungus* turbinatus.

1649.

* *Stipitata.*

mitra. 1. H. pileo deflexo adnato lobato difformi.

* * *Acaulis.*

pineti. 2. H. acaulis.

1215. PEZIZA. *Fungus* campanulatus, ſeſſilis.

1649.

lentifer. 1. P. campanulata lentifera.
punctata. 2. P. turbinata truncata, diſco punctato.
cornucop. 3. P. infundibuliformis, diſco patente ſinuato punctato.
acetabul. 4. P. cyathiformis: extus angulata venis ramoſis.
cyathoid. 5. P. cyathyformis: margine obtuſo erecto.
cupularis. 6. P. globoſo-campanulata: margine crenato.
ſcutellat. 7. P. plana: margine conuexo piloſo.
cochleata. 8. P. turbinata cochleata.
Auricula. P. concaua rugoſa auriformis. Eluela ſeſſilis membranacea rugoſa et criſpa, forma concaua. *Gledit. fung. 39.* Tremella ſeſſilis membranacea auriformis cinerea. *Sp. pl.* 1625. *Fl. ſuec.* 1137. *authoritate Cl. Gleditſchii ad Fungus arboreos hanc ſpeciem referre cogor, qui antea eum Dillenio pro Lichene habui. Vaill. pari. t. 11. f. 8.*

1216. CLAVARIA. *Fungus* laeuis, oblongus.

1651.

* *Indiuiſae.*

piſtillaris. 1. C. clauaeformis ſimpliciſſima.
militaris. 2. C. clauata integerrima capite ſquamoſo.
ophiogloſ. 3. C. clauata integerrima compreſſa obtuſa.

* * *Ramoſae.*

digitata. 4. C. ramoſa lignea nigra.
Hypoxyl. 5. C. ramoſo-cornuta compreſſa.
coralloid. 6. C. ramis confertis ramoſiſſimis inaequalibus.
faſtigiat. 7. C. ramis confertis ramoſiſſimis faſtigiatis obtuſis luteis.
muſcoid. 8. C. ramis ramoſis acuminatis inaequalibus luteis.

1217. LYCOPERDON. *Fungus* ſubrotundus, *Seminibus* farinaceis repletus. 1653.

* *Solida, ſubterranea abſque radice.*

Tuber. 1. L. globoſum ſolidum muricatum, radice deſtitutum.
ceruinum. 2. L. globoſum ſolidiuſculum centro farinifero, radice deſtitutum.

* * *Puluerulenta, radicata ſupra terram,*

Bouiſta. 3. L. ſubrotundum: lacerato-dehiſcens.
aurantium. 4. L. ſphaeroidale baſi rugoſum ſtipitatum: laciniis obtuſe emarginatis dehiſcens.
ſtellatum. 5. L. volua multifida patente, capitulo glabro: ore acuminato plicato.
Carpobolus. 6. L. volua multifida, fructu globoſo ex ſeminibus combinatis.
radiatum. 7. L. diſco hemiſphaerico, radio colorato.
pedunculatum. 8. L. ſtipite longo, capitulo globoſo glabro: ore cylindrico integerrimo.

* * * *Parаſitica, in farinam fateſcentia.*

piſiformis. 11. L. globoſum ſcabrum: ore perforato. *D. Blom.*
Epidendr. 9. L. cortice farinaque purpurea.
epiphyllum. 10. L. aggregatum paraſiticum: ore multifido lacero; puluere fuluo.

1218. MVCOR. *Fungus* veſiculis ſtipitatis. 1655.

* *Perennes.*

ſphaerocephalus. 1. M. perennis, ſtipite filiformi nigro, capitulo globoſo cinereo.
lichenoides. 2. M. perennis, ſtipite ſubulato nigro, capitulo lenticulari cinereo.
Embolus. 3. M. ſeta nigra, villo fuſco.
fuluus. 4. M. perennis pallidus, pileo fuluo.
furfuraceus. 5. M. perennis viridis, foliis furfuraceis, ſtipite filiformi, capitulo globoſo.

* * *Fu-*

** *Fugaces.*

Mucedo. 6. M. ſtipitatus, capſula globoſa. *Mich. gen. t. 95. f. 2, 4.*

leproſus. 7. M. ſetaceus, ſeminibus radicalibus.

glaucus. 8. M. ſtipitatus, capitulo ſubrotundo aggregato.

cruſtac. 9. M. ſtipitatus, ſpicis digitatis.

ceſpitoſus. 10. M. ſtipite ramoſo, ſpicis ternatis.

Eryſiphe. 11. M. albus, capitulis fuſcis ſeſſilibus.

ſepticus. 12. M. vnctuoſus flauus.

APPENDIX.

PALMAE ſpathaceae, tripetalae.

* *Flabellifoliae.*

1219.	CHAMAEROPS.	dioica.	*Drupae* tres.
1220.	BORASSVS.	dioica.	*Drupa* 3-ſperma.
1221.	CORYPHA.	.....	*Drupa* 1-ſperma.

* * *Pennatifoliae.*

1222.	CYCAS.	dioica.	*Drupa* 1-ſperma, ſicca, 2-valuis.
1224.	PHOENIX.	dioica.	*Drupa* 1-ſperma.
1227.	ZAMIA.	dioica.	*Spadix* ouatus ex calycibus (*forma Cupreſſi aut Equiſeti fructificationis.*)
1284.	ELAIS.	dioica.	*Drupa* 1-ſperma, coriacea. *Cal.* et *Cor.* 6-partita.
1225.	ARECA.	monoica.	*Drupa* 1-ſperma, calyce imbricata.
1226.	ELATE.	monoica.	*Drupa* 1-ſperma.
1223.	Cocos.	monoica.	*Drupa* 1-ſperma, coryacea.

* * * *Bipennatifoliae.*

1228.	CARYOTA.	monoica.	*Drupa* 2-ſperma.

PAL-

PALMAE.

1219. CHAMAEROPS. HERMAPHR. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala. *Stam.* 6. *Pist.* 3. *Drupae* 3, monospermae.
1657. MASCVL. dioici, vt in hermaphrodito.

humilis. 1. CH. frond. palmatis plicatis, stipit. spinosis.

1220. BORASSVS. MASC. *Cal.* .. *Cor.* 3-partita. *Stam.* 6.
1657. FEMIN. *Cal.* .... *Cor.* 3-partita. *Styli* 3. *Drupa* 3-sperma.

flabellif. 1. B. frond. palmatis plicatis cucullatis, stipit. serratis.

1221. CORYPHA. .... *Cal.* .... *Cor.* 3-petala. *Stam.* 6. *Pist.* 1.
1657. ... *Drupa* 1-sperma.

umbracul. 1. C. frond. pinnato-palmatis plicatis filoque interiectis: vix *floret ante 30. s. 40. aetatis annum.* HM.

1222. CYCAS. ... *Drupa* sicca nucleo biualui.
1658.

circinalis. 1. C. frond. pectinatis circinalibus: foliolis linearibus planis.

1223. COCOS. MASC. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala. *Stam.* 6.
1658. FEMIN. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 3-petala. *Stigm.* 3. *Drupa* coriacea.

nucifera. 1. C. inermis, frond. pinnatis: foliolis replicatis enformibus.

guineenſis. 2. C. aculeata tota, frond. diſtantibus, rad. repente. *Mant.* 137.

1224. PHOENIX. MASC. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala. *Stam.* 3.
1658. FEM. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala. *Piſt.* 1. *Drupa* ouata.

dactylifera. 1. PH. frond. pinnatis: foliolis complicatis enſiformibus.

1284. ELAIS. MASC. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 6-fida. *Stam.* 6.
FEM. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 6-petala. *Stigmata* 3. *Drupa* fibroſa. *Nux* 1, triualuis.

guineenſis. E. frond. pinnatis: ſtipitibus dentato-ſpinoſis diuergentibus: denticulis ſupremis recuruatis. *Mant.* 137.

1225. ARECA. MASC. *Cal.* . . . *Cor.* 3-petala. *Stam.* 9.
1659. FEM. *Cal.* . . . *Cor.* 3-petala. *Drupa* calyce imbricato.

Cathecu. 1. A. frond. pinnatis: foliolis replicatis oppoſitis praemorſis.
oleracea. 2. A. foliolis integerrimis. *Iacq. amer.* 278. *t.* 170.

1226. ELATE. MASC. *Cal.* . . . *Cor.* 3-petala. *Stam.* 3.
1659. FEM. *Cal.* . . . *Cor.* 3-petala. *Piſt.* 1. *Drupa* ouata, acuminata.

ſylueſtris. 1. E. frond. pinnatis: foliolis oppoſitis.

1227.

127. ZAMIA. *Fructificatio* obscura, structura flor. 1659. Equiseti.

pumila. 1. ZAMIA.

1228. CARYOTA. MASCVL. *Cal.* communis. *Cor.* 3-partita. *Stam.* plurima. FEMIN. *Cal.* idem. *Cor.* 3-partita. *Pist.* 1. *Bacca* 2-sperma. 1650.

urens. A. C. frond. bipinnatis: foliolis cuneiformibus oblique praemorsis.

ADDEN-

O Domine DEVS!

Multa feciſti Mirabilia Tua!
Cogitationibus Tuis non eſt ſimilis Tibi!
Annunciaui et locutus ſum;
Plura ſunt, quam vt narrare poſſum.
Dauid. Pſalm. XL. 6.

ADDENDA.

curuatum. PANICVM panicula racemoſa, glumis curuatis obtuſis neruoſis.
Habitat in Suratte.
Culmi *filiformes*, *laeues*. Folia *lanceolata*, *laeuia*, *ſubtus quinqueneruia*, *margine ſcabra*, *vaginis profunde ſtriatis*. Panicula *erecta*, *anguſta*: *ramis ſubramoſis*; *racemoſis*. Calyces florentes *ſubſubulati*, *extrorſum curuati*, *ſtriati*, *mutici*: *valuula extima ſub curuatura*, *minutiſſima*, *membranacea*, *cordata*, *acuta*. Cal. fruteſcentes *triplo maiores fiunt*; *ouales*, *gibbi*, *obtuſiſſimi*, *profundi multiſulcati*, *purpuraſcentes*. Corolla *calyce dimidio breuior*, *membranacea*.

ſpadicea. FESTVCA floribus paniculatis ſecundis quinquefloris: floſculo vltimo ſterili, foliis laeuibus.
Gramen alpinum latifolium, panicula heteromalla ſpadicea, locuſtis pinnatis. *Scheuch. gram.* 278.
Habitat Monſpelii. *Gouan.*
Altitudo *quadripedalis*. Panicula *heteromala*. Flores *magni vt in Feſt. elatiore*: *floſculis magis diſtantibus*, *acutis*, *baſi ſubnodoſis*: *Floſculus vltimus ſaepius ſterilis*. Stamina *violacea*.

lucida. RVBIA foliis ſenis ſeſſilibus ellipticis perennantibus lucidis, caule laeui.
Habitat in Maiorca. *D. Richard.* 2.
Planta *ſemperuirens*, *ſimilis Rubiae peregrinae*. Folia *margine tantum retrorſum ſcabra*, *non carinata*. Flores *paniculati*, *pallidi*, *mucronati*, *quinquefidi*.

infeſta. SCANDIX vmbellulis confertiſſimis hemiſphaericis, ſemine exteriore hiſpido.
Habitat . . . *D. Zoega* ☉.
Caulis *erectus*, *vix pedalis*, *ſcaber*. Folia *Scand. Cerefolii*. Vmbella vniuerſalis *quinquefida*; Partiales *hemiſphaericae*, *confertae*. Inuolucella *heptaphylla*, *ſubulata*, *non reflexa*. Flores *ſubradiati*, *albi*: Floſculi *circiter ſex fertiles*, *reliqui maſculi*. Stamina *floſculis longiora*: *Antheris purpuraſcentibus*. Semina *bina*, *ſed exterius ſemen hiſpidum ſpinis articulatis*; *Interius ſemen ſcabrum tantum*, *vti fructus ſeu bina ſemina floris centralis*.

Bunius

Bunius. CARVM vmbellis ſeptemfidis, foliis radicalibus bipinnatis linearibus, caulinis ſubſetaceis.
Daucus petroſelini vel coriandri folio. *Bauh. pin.* 150.
Saxifraga montana minor petroſelini ſ. coriandri folio. *Moriſ. hiſt. 3. p. 274. ſ. 9. t. 2. f. 16.*
Bunius. *Dalech. hiſt.* 774.
Habitat in Pyraeneis. *D. Gouan.*
Semina *oblongiuſcula, ſulcata coſtis 3 dorſalibus membranaceo-compreſſis.* Flores *albi. aequales, abortiui.* Inuolucrum *ſaepius vno foliolo ſubulato.* Vmbellae *ſeptemfidae.* Vmbellulae *ſeptemflorae.*

ericoides. PASSERINA foliis ſubtriquetris nudis, corollis tubi globoſis.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.
Frutex *quaſi medius inter P. filiformem et hirſutam.* Folia *oppoſita, ouato-linearia, laeuia, obtuſa; Floralia vero quaterna, baſi paulo latiora.* Ramuli *incani, vix tomentoſi.* Flores *ſeſſiles, ſolitarii, laterales.* Corollae *tubus globoſus, inflatus, limbo ſuo fere latior, vnde et Ericam refert flore.* Semen *nigrum, nitidum, ouatum.*

faſciculata. ARENARIA caule erecto ſtricto, floribus faſciculatis, petalis breuiſſimis, foliis ſubulatis.
Habitat Monſpelii. *D. Gouan.* ⊙.
Caulis *vix palmaris, erectus, ſtrictus, rigidulus, ſubpubeſcens: Ramis alternis, breuibus.* Folia *linearia, acuminata, erecta, internodiis longiora, ſubcanaliculata, ſubciliata.* Flores *faſciculati: faſciculis terminalibus, dichotomis*: pedunculis *breuiſſimis, ſolitariis, e dichotomia ſublateralibus.* Calyx *erectus: foliolis ſubulatis, acuminatis, ſtriatis, ſubciliatis, longis inaequalibus.* Petala *ouato-oblonga, alba, omnium minutiſſima.* Stamina 10, *alba: Antheris didymis, globoſis.* Styli 3, *longitudine* $\frac{1}{3}$ *calycis ſ, petalis duplo longiores.* Capſula *calyce dimidio breuior.*

Planta diſtincta ab Alſine mucronata, quae tenera, debilis, longa; accedit figura aliquatenus ad Hall. helu. t. 7. f. 2. ſed Folia Caulis Floresque longiora, rigidiora, craſſiora (in mea) omnia.

ſtella

Stella. ASTRAGALVS cauleſcens diffuſus, capitulis pedunculatis lateralibus, leguminibus rectis ſubulatis mucronatis.

Aſtragalus annuus maritimus procumbens latifolius, floribus pediculo inſidentibus. *Tournef. inſt. 416.*

Aſtragalus hirſutus, corniculis plurimis vno pediculo ſtelliformiter adaptis. *Pluk- phyt. 79. f. 4.*

Glauci leguminoſae affinis. *Bauh. prodr. 150.*

Stella leguminoſa. *Bauh. hiſt. 2. p. 350.*

Habitat in Europae *auſtralis potiſſimum maritimis. D. Gouan.* ☉.

Planta *ſimillima A. ſeſameo, diſtinguenda Capitulis longe pedunculatis Leguminibusque plurimis.*

ſtricta. COTVLA foliis alternis pinnatifidis, caule erecto, floribus radiatis.

Habitat in Æthiopia. *D. Burmannus.*

Caulis *pedalis.* Folia *pinnatifida, acuta, punctata.* Flores *terminales, ſolitarii, pedunculati, magni.*

OBSERVANDA.

pinnata. VERONICA *non modo Racemo terminali, nec laterali, ſed etiam calyce aequali, fructu breuiore, nec calycis foliolis duobus exterioribus ſ. proximis maioribus, differt a* Veronica *multifida.*

alternifolius. CYPERVS *Culmo triquetro nudo; nec veſtito vaginis foliorum altero latere truncatis, altero folium ferentibus. Foliis ſeſſilibus baſi quaſi adglutinatis; nec baſi vaginatis. Pedunculis proliferis: ſpicis ouatis; nec Pedunculis ſimplicibus alternatim ſpicatis more Bromi pinnati: Spicis linearibus longis; differt a* Cypero ſpathaceo (*de quo vide omiſſa.*)

marilandica. SPIGELIA caule tetragono. Lonicera marilandica. *Syſt. nat. 12. p. 166. Plantam (de qua dubitabam. Sp. pl. 2. p. 247.) genuinam Spigeliae ſpeciem eſſe docuit, ſpecimen cum fructu miſſum a D. Hope; itaque* Spigelia *anthelmia* foliis ſummis quaternis *diſtinguitur.*

alternifolia. 9. ACHYRANTHES *ex nuperis obſeruationibus cultura hauſtis, forte mera varietas* Achyranthis muricatae.

ELLI-

ELLISIA *deſcripta fuit Fructificatione mutuata ; in hac emendanda :* Bacca *adde* didyma. Sem. bina in ſingulo loculo, *nec vno ſupra alterum.*

IXIA Corolla monopetala: *Tubus* filiformis. *Petala* ſex &c. *adeoque* Ixia hirſuta *pag. 79. hirſuta.* Wachendorfia hirſutiſſima, vmbella bifida racemoſa *dicenda.*

RESTIO. Dioecia : Triandria.

Mas.

Cal. *Spica* ouata, vndique imbricata Squamis membranaceis, ouatis, vnifloris.

Cor. Propria: *Petala* ſex, ouato-oblonga, ſubaequalia, ſquamis calycis breuiora, membranacea, perſiſtentia.

Stam. *Filamenta* tria, capillaria. *Antherae* oblongae, erectae.

Femina.

Cal. *vt in Mare.*

Cor. *vt in Mare.*

Pist. *Germen* ſubrotundum, ſexſulcatum. *Styli* tres, ſubulati, erecti, perſiſtentes. *Stigmata* filiformia, marceſcentia.

Per. *Capſula* ſubrotunda, ſexplicata: plicis paribus approximatis, roſtrata ſtylis conuergentibus, trilocularis.

Sem. nonnulla, oblongo-cylindrica, obtuſa.

dichotomus. RESTIO Schoenus capenſis *pag. 80. Gramen ſaepe ſterile, quaſi viuiparum e foliis minutiſſimis aliquot pilis interſtinctis.*

OMISSA.

ſpathaceus. 4. CYPERVS culmo vaginis foliorum veſtito, pedunculis pinnatis lateralibus. Schoenus ſpathaceus. *Sp. pl. 2. p. 63.*

cortuſoid. 7. PRIMVLA fol. petiolatis cordatis ſublobatis crenatis.

limonifolia. 33. CAMPANVLA ramis patentibus indiuiſis, fol. radicalibus ellipticis laeuibus integerrimis, flor. ſeſſilibus ternis.

hiſpida. 16. ARENARIA fol. ſubulatis ſubtus hiſpidis.

Maſtichina. 8. THYMVS flor. verticillatis, calyc. lanugiñoſis: dentibus ſetaceis piloſis.

Peril-

Perilloides. MENTHA caule ſolitario herbaceo. Ocymum fruteſcens. *Sp. pl.* 832. *diſtinguenda a Perilla; cuius ſynonyma ad Mentham ſpectant, quamuis ſimillima, ſpicis ſecundis et Staminibus corolla fere breuioribus.*

EXCLVDENDA.

capenſis.	SCHOENVS.	*pag.*	80.	§. 17.	*qui* Reſtio.
pumila.	AGROSTIS.	....	90.	§. 19.	*priori loco.*
mariland.	LONICERA.	....	166.	§. 10.	*quae* Spigelia.
Leuiſanus.	BRVNIA.	....	182.	§. 5.	*quae* Protea.
tomentoſ.	RHVS.	....	218.	§. 11.	*priori loco.*
alpina.	SCVTELLARIA.	....	403.	§. 9.	*poſteriore loco.*
ſtyracifol.	HEDYSARVM.	....	493.	§. 6.	*poſteriore loco.*

IN-

INDEX GENERVM.

Abrus. 472
Acalypha. 694
Acanthus. 427
Acer. 674
Achillea. 566
Achras. 251
Achyranthes. 186
Acnida. 653
Aconitum. 371
Acorus. 249
Acroſtichum. 685
Actaea. 359
Adanſonia. 456
Adelia. 662
Adenanthera. 294
Adiantum. 694
Adonis. 376
Adoxa. 278
Ægilops. 671
Ægopodium. 217
Æſchynomene. 492
Æſculus. 259
Æthuſa. 213
Agaricus. 722
Agaue. 249
Ageratum. 537
Agrimonia. 329
Agroſtema. 319
Agroſtis. 90
Aira. 91
Aiuga. 387
Aizoon. 347
Albuca. 241
Alcea. 459
Alchemilla. 129
Aldrouanda. 225
Alethris. 248
Aliſma. 257
Allionia. 114
Allium. 237
Alophyllus. 265
Aloë. 248
Alopecurus. 89
Alpinia. 50
Alſine. 221
Alſtroemeria. 249
Althaea. 459
Alyſſum. 435
Amaranthus. 625
Amaryllis. 236
Ambroſia. 624
Ambroſinia. 603
Amellus. 567
Amethyſtea. 63
Ammannia. 126
Ammi. 206
Amomum. 50
Amorpha. 477
Amygdalus. 341
Amyris. 266
Anabaſis. 196
Anacardium.
Anacyclus. 564
Anagallis. 153
Anagyris. 287
Anaſtatica. 431
Anchuſa. 145
Andrachne.
Andromeda. 299
Andropogon. 668
Androſace. 150
Andryala. 525
Anemone. 374
Anethum. 216
Angelica. 211
Anguria. 614
Annona. 473
Anthemis. 565
Anthericum. 244
Antideſma. 652
Antirrhinum. 409
Anthoceros. 708
Anthoholyza. 76
Anthoſpermum. 679

Anthoxanthum. 67
Anthyllis. 480
Antichorus. 264
Aphanes. 129
Aphyllanthes. 237
Apium. 217
Apluda. 670
Apocynum. 192
Aquartia. 121
Aquilegia. 371
Arabis. 443
Arachis. 480
Aralia. 222
Arbutus. 300
Arctium. 528
Arctopus. 680
Arctotis. 578
Arduina. 180
Areca. 730
Arenaria. 312
Arethusa. 595
Aretia. 150
Argemone. 360
Aristida. 120
Aristolochia. 600
Arnica. 559
Artedia. 205
Artemisia. 541
Arum. 693
Arundo. 100
Asarum. 325
Asclepias. 193
Ascyrum. 511
Aspalathus. 475
Asparagus. 245
Asperugo. 148
Asperula. 116
Asphodelus. 244
Asplenium. 689
Aster. 553
Astragalus. 498
Astrantia. 203
Astronium. 652
Athamanta. 207
Athanasia. 540
Atractylis. 532
Atragene. 376
Atraphaxis 253
Atriplex. 673
Atropa. 271
Auena. 99
Auerrhoa. 315
Auicenia. 426
Axyris. 618
Ayenia. 598
Azalea. 154

Baccharis. 547
Baeckea. 274
Balota. 395
Banisteria. 314
Barlena. 424
Bartsia. 404
Batis. 650
Bauhinia. 288
Begonia. 675
Bellis. 560
Bellonia. 164
Berberis. 252
Bessena. 413
Beta. 195
Betonica. 394
Betula. 621
Bidens. 534
Bignonia. 415
Biscutella. 437
Biserrula. 500
Bixa. 362
Blaeria. 121
Blakea. 326
Blasia. 707
Blechnum. 688
Blitum. 52
Bobartia. 85
Bocconia. 325
Boerhauia. 51
Boletus. 723
Bombax. 457
Bontia. 426
Borassus. 729

Borbonia. 473
Borago. 147
Bosea. 197
Brabeium. 127
Brassica. 444
Briza. 94
Bromelia. 232
Bromus. 97
Brossaea. 169
Browallia. 421
Brownaea. 452
Brunfelsia. 177
Brunia. 182
Bryonia. 640
Bryum. 701
Bubon. 212
Bucephalon. 650
Buchnera. 420
Bucida. 302
Buddleia. 121
Bufonia. 129
Bulbocodium. 237
Bunias. 446
Bunium. 206
Buphthalmum. 568
Bupleurum. 203
Burmannia. 233
Burseria. 252
Butomus. 281
Buxbaumia. 699
Buxus. 621
Byssus. 721
Byttneria. 181

Cacalia. 535
Cachrys. 208
Caesalpinia. 290
Cactus. 338
Calamus. 250
Calea. 540
Calendula. 577
Calla. 604
Callicarpa. 120
Calligonum. 370
Callisia. 79
Callitriche. 52
Calophyllum. 363
Caltha. 381
Calycanthus. 353
Cambogia. 361
Camellia. 465
Cameraria. 191
Camocladia. 74
Campanula. 159
Camphorosma. 128
Canarium. 652
Canna. 50
Cannabis. 653
Capparis. 358
Capraria. 418
Capsicum. 174
Cardamine. 438
Cardiospermum. 277
Cardicus. 529
Carex. 616
Carica. 658
Carisa. 189
Carlina. 532
Carpesium. 547
Carpinus. 631
Carthamus. 533
Carum. 216
Caryophyllus. 365
Caryota. 731
Cassia. 288
Cassine. 219
Cassyta. 281
Catananche. 527
Catesbaea. 120
Caturus. 650
Caucalis. 205
Ceanothus. 180
Cecropia. 647
Cedrela. 183
Celastrus. 181
Celosia. 187
Celsia. 414
Celtis. 663
Cenchrus. 671
Centaurea. 572

Centella. 620
Centunculus. 123
Cephalanthus. 111
Ceraſtium. 320
Ceratocarpus. 613
Ceratonia. 681
Ceratophyllum. 628
Cerbera. 189
Cercis. 287
Cerinthe. 147
Ceropegia. 191
Ceſtrum. 177
Chaerophyllum. 214
Chaleas. 293
Chamaerops. 729
Chara. 613
Cheiranthus. 441
Chelidonium. 359
Chelone. 408
Chenopodium. 194
Cherleria. 313
Chiococca. 165
Chionanthus. 56
Chironia. 175
Chlora. 267
Chondrilla. 526
Chryſanthemum. 561
Chryſobalanus. 342
Chryſocoma. 539
Chryſogonum. 577
Chryſophyllum. 177
Chryſoſplenium. 303
Cicca. 621
Cicer. 489
Cichorium. 527
Cicuta. 313
Cimicifuga. 659
Cinchona. 164
Cineraria. 556
Cinna. 52
Circaea. 56
Ciſſampelos. 661
Ciſſus. 124
Ciſtus. 365
Citharexylon. 416
Citrus. 508
Clathrus. 714
Clauaria. 765
Claytonia. 185
Clematis. 376
Cleome. 447
Cleonia. 404
Clerodendrum. 426
Clethra. 301
Cliffortia. 660
Cinopodium. 398
Clitoria. 484
Cluſia. 674
Clutia. 662
Clypeola. 437
Cneorum. 73
Cnicus. 530
Coccoloba. 276
Cochlearia. 434
Cocos. 729
Codon. 292
Coffea. 165
Coix. 615
Colchicum. 256
Coldenia. 130
Colliſonia. 67
Columnea. 427
Colutea. 490
Comarum. 353
Combretum. 265
Cometes. 127
Commelina. 79
Connarus. 452
Conferua. 720
Conium. 260
Conocarpus. 167
Conuallaria. 246
Conuoluulus. 155
Conyza. 547
Copaifera. 302
Corchorus. 369
Cordia. 176
Coreopſis. 570
Coriandrum. 213
Coriaria. 658

Coris. 168
Coriſpermum. 52
Cornucopiae. 85
Cornus. 124
Cornutia. 418
Coronilla. 491
Corrigiola. 220
Cortuſa. 151
Corylus. 631
Corymbium. 582
Corypha. 729
Coſtus. 50
Cotula. 564
Cotyledon. 316
Crambe. 446
Craniolaria. 412
Craſſula. 225
Crataegus. 342
Crataeua. 326
Crepis. 524
Creſcentia. 416
Creſſa. 197
Crinum. 236
Crithmum. 208
Crocus. 75
Crotalaria. 477
Croton. 624
Crucianella. 119
Crucita. 129
Cucubalus. 308
Cucumis. 640
Cucurbita. 639
Cuminum. 212
Cunila. 63
Cunonia. 302
Cupania. 636
Cupreſſus. 633
Curatella. 370
Curcuma. 50
Cuſcuta. 129
Cyanella. 243
Cycas. 729
Cyclamen. 151
Cymbaria. 412
Cynanchum. 192
Cynara. 531
Cynogloſſum. 146
Cynometra. 291
Cynomorium. 613
Cynoſurus. 95
Cyperus. 81
Cypripedium. 595
Cyrilla. 182
Cytinus. 603
Cytiſus. 489

Dactylis. 95
Dais. 297
Dalechampia. 634
Daphne. 271
Datiſca. 650
Datura. 170
Daucus. 206
Decumaria. 326
Delphinium. 370
Delima. 364
Dentaria. 438
Dialium. 56
Dianthera. 60
Dianthus. 307
Diapenſia. 150
Dictamnus. 292
Digytalis. 414
Dillenia. 373
Diodia. 116
Dioſcorea. 659
Dioſma. 182
Dioſpyros. 676
Dipſacus. 111
Dirca. 271
Dodartia. 423
Dodecatheon. 151
Dolichos. 482
Doronicum. 559
Dorſtenia. 127
Draba. 432
Dracaena. 246
Drachocephalon. 401
Dracontium. 604
Droſera. 225

Dryas. 352
Drypis. 221
Duranta. 425

Ebenus. 480
Echmophora. 204
Echinops. 581
Echites. 190
Echium. 148
Ehretia. 176
Elaeagnus. 127
Eleocarpus. 363
Elais. 730
Elate. 730
Elaterium. 614
Elatine. 278
Elephantopus. 580
Elliſia. 169
Eluela.
Elymus. 100
Empetrum. 649
Ephedra. 661
Epidendrum. 595
Epimedium. 124
Epigaea. 300
Epilobium. 264
Epimedium. 124
Equiſetum. 684
Eranthemum. 56
Erica. 268
Erigeron. 549
Erinus. 420
Eriocaulon. 103
Eriocephalus. 579
Eriophorum. 84
Erithalis. 167
Eruum. 488
Eryngium. 201
Erysimum. 441
Erythrina. 473
Erythronium. 241
Erythroxylum. 315
Ethulia. 536
Eugenia. 340
Euclaulus. 222
Euonymus. 183
Eupatorium. 536
Euphorbia. 330
Euphraſia. 405
Exacum. 122
Excoecaria. 650

Fagara. 125
Fagonia. 295
Fagus. 630
Ferraria. 597
Ferula. 209
Feſtuca. 96
Fewillea. 654
Ficus. 681
Filago. 580
Flagellaria. 254
Fontinalis. 699
Forsköhlea. 321
Fragaria. 349
Frankenia. 253
Fraxinus. 679
Fritillaria. 240
Fuchſia. 119
Fucus. 714
Fumaria. 469

Galanthus. 234
Galax. 183
Galega. 496
Galenia. 274
Galeopſis. 393
Galium. 117
Garcinia. 326
Gardenia. 189
Garidella. 313
Gaura. 264
Gaulteria. 300
Genipa. 168
Geniſta. 474
Gentiana. 199
Geoffraea. 490
Geranium. 452
Gerardia. 408
Geropogon. 518

Geſne-

Geſnera. 409
Gethyllis. 325
Geum. 352
Ginora. 329
Gladiolus. 76
Glaux. 188
Glechoma. 393
Gleditſia. 678
Glinus. 334
Globularia. 111
Glorioſa. 241
Glycine. 484
Glycyrrhiza. 490
Gmelina. 417
Gnaphalium. 543
Gnetum. 637
Gnidia, 272
Gomphrena. 197
Gorteria. 571
Goſſypium. 462
Gouania. 675
Gratiola. 61
Grewia. 602
Grias. 362
Grielum. 318
Griſſea. 265
Gronouia. 184
Guaiacum. 291
Guettarda. 628
Guilandina 291
Gundelia. 581
Gunnera. 597
Gypſophila. 306

Haemanthus. 234
Haematoxylon. 393
Haleſia. 326
Halleria. 416
Hamamebis. 120
Hamellia. 165
Hartogia. 625
Haſſelquiſtia. 209
Hebenſtretia. 420
Hedera. 184
Heſyolis. 115
Hedyſarum. 493
Heiſteria. 297
Helenium. 560
Helianthus. 569
Helicteres. 601
Heliocarpus. 329
Heliophila. 442
Heliotropium. 144
Helleborus. 381
Helonias. 257
Heluella. 725
Hemerocallis. 249
Hemionitis. 689
Heracleum. 410
Hermannia. 451
Hernandia. 619
Herniaria. 194
Heſperis. 442
Heuchera. 198
Hibiſcus. 463
Hieracium. 522
Hillia. 253
Hippocratea. 75
Hippocrenis. 492
Hippomane. 637
Hippophae. 651
Hipparis. 52
Hiraea, 315
Hirtella. 183
Holcas. 669
Holoſteum. 103
Hordeum. 101
Hopea. 509
Horminum. 401
Hottonia. 152
Houſtonia. 117
Hugonia. 452
Humulus. 653
Hudſonia. 327
Hura. 638
Hyacinthus. 247
Hydnum. 724
Hydrangea. 302
Hydraſtis. 381
Hydrocharis. 657

Hydrocotyle. 202
Hydrolea. 198
Hydrophyllum. 152
Hymenaea. 288
Hyoſcyamus. 170
Hyoſeris. 525
Hypecoon. 130
Hypericum. 509
Hypnum. 702
Hypochaeris. 526
Hypoxis. 242
Hyſſopus. 389

Jacquinia. 175
Jaſione. 582
Jambolifera. 266
Jaſminum. 55
Jatropha. 636
Iberis. 435
Ilex. 130
Illecebrum. 187
Illicium. 335
Impatiens. 586
Imperatoria. 215
Indigofera. 496
Inula. 557
Ipomoea. 158
Iris. 77
Ireſine. 653
Iſatis 446
Iſchaemum. 670
Iſnarda. 126
Iſoetes. 697
Iſopyrum. 380
Itea. 183
Iva. 624
Juglans. 630
Juncus. 250
Jungermannia. 705
Juniperus. 660
Juſſiaea. 297
Juſticia. 59
Ixia. 75
Ixora. 120

Kaempferia. 51
Kalmia. 298
Kiggelaria. 658
Kleinhouia. 601
Knautia. 114
Knoxia. 117
Königia. 104
Krameria. 128
Kunia. 167

Lachnaea. 273
Lactuca. 520
Laetia. 363
Lagerſtroemia. 365
Lagoecia. 185
Lagurus. 99
Lamium. 393
Lantana. 417
Lapſana. 526
Laſerpitium. 209
Lathraea. 460
Lathyrus. 486
Lauatera. 461
Lauandula. 390
Laugeria. 177
Laurus. 280
Lawſonia. 267
Leea. 627
Lechea. 103
Lecythis. 363
Ledum. 299
Lemna. 614
Leontice. 245
Leontodon. 521
Leonurus. 396
Lepidium. 433
Leucadendrum. 110
Leucojum. 234
Leyſera. 560
Lichen. 708
Liguſticum. 210
Liguſtrum. 5
Lilium. 20
Limeum. 39
Limodorum. 94

Limonia. 296
Limoſella. 421
Linnaea. 421
Linum. 223
Lippia. 423
Liquidambar. 632
Liriodendron. 373
Liſianthus. 154
Lithoſpermum. 145
Lobelia. 583
Loeflingia. 74
Loeſelia. 418
Lolium. 100
Lonchitis. 689
Lonicera. 165
Loaſa. 364
Loranthus. 252
Lotus. 504
Ludwigia. 125
Lunaria. 438
Lupinus. 481
Lychnis. 319
Lyccium. 177
Lycoperdon. 726
Lycopodium. 697
Lycopus. 63
Lycopſis. 148
Lygeum. 85
Lyſimachia. 152
Lythrum. 328

Macrocnemum. 163
Magnatia. 373
Mahernia. 227
Malachra. 458
Malope. 462
Malpygia. 314
Malua. 459
Mammea. 362
Mangifera. 183
Manulea. 419
Maranta. 50
Marchantia. 707
Marcgrauia. 358
Marrubium. 395
Marſilea. 696
Martynia. 412
Matricaria. 563
Matthiola. 168
Medeola. 256
Medicago. 505
Melaleuca. 509
Melampodium. 577
Melampyrum. 406
Melanthium. 256
Melaſtoma. 298
Melia. 294
Melianthus. 428
Melica. 92
Melicocca. 266
Meliſſa. 400
Melittis. 402
Melochia. 451
Melothria. 74
Memecylon. 267
Menais. 167
Meniſpermum. 659
Mentha. 391
Mentzelia. 364
Menyanthes. 152
Mercurialis. 657
Meſembryanthemum. 344
Meſpilus. 343
Meſſerſmidia. 149
Meſua. 465
Michelia. 374
Microcos. 602
Micropus. 580
Milium. 89
Milleria. 576
Momoſa. 675
Mimulus. 423
Mimuſops. 265
Minuartia. 104
Mirabilis. 168
Mitchella. 120
Mitella. 305
Mnium. 700
Moehringia. 275
Mollugo. 104

Molucella. 398
Momordica. 693
Monarda. 64
Monnieria. 469
Monotropa. 296
Monsonia. 508
Montia. 103
Moraea. 78
Morina. 67
Morinda. 166
Morisona. 465
Morus. 623
Mucor. 726
Muntingia. 361
Musa. 667
Musaenda. 168
Myagrum. 431
Myginda. 131
Myosotis. 144
Myosurus. 227
Myrica. 651
Myriophyllum. 628
Myrsine. 181
Myrtus. 340

Naias. 647
Nama. 198
Napaea. 459
Naniffus. 234
Nardus. 84
Nauclea. 163
Nepenthes. 597
Nepeta. 390
Nephelium. 623
Nerium. 189
Necorada. 321
Nicotiana. 171
Nigella. 372
Nigrina. 154
Nitraria. 327
Niffolia. 472
Nolana. 149
Nychanthes. 55
Nymphaea. 361
Nyssa. 679

Obolaria. 422
Ochria. 362
Ocymum. 402
Oenanthe. 212
Oenothera. 263
Olax. 73
Oldenlandia. 126
Olea. 156
Olyra. 616
Omphatea. 619
Onoclea. 684
Ononis. 478
Onopordon. 531
Onosma. 147
Ophiorhiza. 153
Ophioglossum. 684
Ophioxylon. 667
Ophrys. 591
Orchis. 589
Origanum. 399
Ornithogalum. 242
Ornithopus. 492
Orobanche. 422
Orobus. 485
Orontium. 250
Ortegia. 74
Oruala. 393
Oryza. 253
Osbeckia. 263
Osmites. 571
Osmunda. 684
Osteospermum. 578
Olyris. 649
Othanna. 579
Ouiada. 425
Oxalis. 318

Paederota. 59
Paederia. 189
Paeonia. 370
Panax. 680
Pancratium. 235
Panicum. 86
Papauer. 360
Parietaria. 672

Paris. 278
Parkinſonia. 288
Parnaſſia. 221
Parthenium, 624
Paſpalum. 86
Paſſerina. 273
Paſſiflora. 598
Paſtinaca. 217
Patagonula. 176
Pauetta. 120
Pauſſinia. 277
Pectis. 561
Pedalium. 427
Pedicularis. 407
Peganum. 327
Peltaria. 437
Penaea. 121
Pentapetes. 456
Penthorum. 317
Peplis. 253
Perdicium. 559
Pergularia. 191
Perilla. 392
Periploca. 192
Peteſia. 120
Petiueria. 257
Petrea. 417
Peucedanum. 208
Peziza. 725
Phaca. 497
Phalaris. 85
Phallus. 724
Pharnacium. 220
Pharus. 627
Phaſcum. 699
Phaſeolus. 481
Phaellandrium. 213
Philadelphus. 339
Phyllyrea. 55
Phleum. 88
Phlomis. 397
Phlox. 155
Phoenix. 730
Phryma. 404
Phylica. 180
Phyllanthus. 620
Phyllis. 201
Phyſalis. 172
Phytheuma. 162
Phytolacca. 321
Pieris. 519
Pilularia. 697
Pimpinella. 217
Pinguicula. 61
Pinus. 632
Piper. 67
Piſcidia. 473
Piſonia. 680
Piſtacia. 651
Piſtia. 601
Piſum. 485
Plantago. 122
Platanus. 631
Plectronia. 183
Plinia. 365
Plukenetia. 633
Plumbago. 154
Plumineria. 190
Poa. 92
Podophyllum. 359
Poinciana. 290
Polemonium. 159
Polianthes. 247
Polycarpon. 104
Polycnemum. 74
Polygala. 470
Polygonum. 275
Polymnia. 576
Polypodium. 691
Polypremum. 121
Polytrichum. 700
Pontederia. 233
Populus. 656
Porella. 698
Portlandia. 164
portulaca. 328
Potamogeton. 130
Potentilla. 350

Poterium. 629
Pothos. 605
Praſium. 404
Prenanthes. 521
Primula. 150
Prinos. 251
Prockia. 368
Proſopis. 293
Protea. 110
Proſerpinaca. 103
Prunella. 404
Prunus. 341
Pſidium. 339
Pſoralea. 500
Pſychotria. 164
Ptelea. 125
Pteris. 687
Pterocarpus. 473
Pteroma. 538
Pulmonaria. 146
Punica. 341
Pyrola. 301
Pyrus. 344

Quaſſia. 295
Quercus. 629
Queria. 105
Quiſqualis. 297

Raiania. 655
Randia. 154
Ranunculus. 378
Raphanus. 445
Rauvolfia. 188
Reaumuria. 372
Reſeda. 329
Reſtio. 735
Rhacoma. 123
Rhamnus. 178
Rheedia. 358
Rheum. 281
Rhexia. 263
Rhinanthus. 405
Rhizophora. 325
Rhodiola. 657
Rhododendron. 299
Rhodora.
Rhus. 217
Ribes. 184
Riccia. 708
Richardia. 251
Ricinus. 636
Ricotia. 438
Riuina. 128
Robinia. 490
Roëlla. 162
Rondeletia. 163
Roridula. 185
Roſa. 349
Roſmarinus. 64
Royenia. 302
Rubia. 119
Rubus. 349
Rudbeckia. 570
Ruellia. 424
Rumex. 254
Rumphia. 73
Ruppia. 131
Ruſcus. 662
Ruta. 293

Saccharum. 85
Sagina. 131
Sagittaria. 628
Salicornia. 51
Salix. 647
Salſola. 196
Saluadora. 128
Saluia. 64
Sambucus. 219
Samyda. 301
Samolus. 163
Sanguinaria. 359
Sanguiſorba. 124
Sanicula. 202
Santalum. 266
Santolina. 540
Sapindus. 277

Saponaria. 307
Saraca. 469
Sarothra. 221
Sarracena. 361
Satureja. 389
Satyrium. 590
Saururus. 259
Sawageſia. 185
Saxifraga. 303
Scabioſa. 112
Scabrita. 215
Scandix. 313
Scheuchzeria. 255
Schinus. 658
Schmidelia. 274
Schoenus. 80
Schrebera. 198
Schwalbea. 406
Schwenkia. 6
Scilla. 243
Scirpus. 82
Scleranthus. 306
Sloanea. 362
Scolymus. 527
Scoparia. 123
Scorpiurus. 492
Scorzonera. 519
Scrophularia. 413
Scutellaria. 403
Secale. 101
Securidaca. 472
Sedum. 316
Seguieria. 369
Selago. 419
Selinum. 207
Semperuiuum. 355
Senecio. 550
Septas. 259
Serapias. 593
Seriola. 526
Seriphium. 582
Serpicula. 620
Serratula. 528
Seſamum. 423
Seſeli. 215
Seſuuium. 343
Sherardia. 116
Sibbaldia. 227
Sibthorpia. 421
Sicyos. 641
Sida. 457
Sideritis. 391
Sideroxylon. 178
Sigesbeckia. 567
Silene. 309
Silphium. 576
Sinapis. 444
Siphonanthus. 119
Siſon. 212
Siſymbrium. 439
Siſyrinchium. 597
Sium. 211
Smilax. 654
Smyrnium. 216
Solandra. 627
Solanum. 172
Soldanella. 151
Solidago. 556
Sonchus. 519
Sophora. 287
Sorbus. 343
Sparganium. 615
Spartium. 474
Spathelia. 219
Spergula. 321
Spermacoce. 115
Sphaeranthus. 581
Sphagnum. 698
Spigelia. 153
Spilanthus. 533
Spinacia. 653
Spiraea. 347
Splachnum. 699
Spondias. 316
Stachys. 394
Staehelina. 538
Stapelia. 194
Staphylaea. 219

Statice. 222
Stellaria. 311
Stellera. 273
Stemodia. 422
Sterculia. 637
Steris. 197
Stewartia. 464
Stapa. 99
Stillago, 597
Stoebe. 581
Stillingia. 637
Stratiotes 373
Strumfia. 582
Strutiola. 127
Stychnos. 175
Styrax. 301
Subularia. 432
Suriana. 318
Symphytum. 147
Symplocos. 369
Syringa. 56
Swertia. 199
Swietenia. 294

Tabernaemontana. 191
Tagetes. 560
Tamarindus. 73
Tamarix. 219
Tamus. 654
Tanacetum. 541
Tarchonanthus. 539
Targionia. 707
Taxus. 661
Telephium. 220
Terminalia. 674
Tetracera. 371
Tetragonia. 344
Tetragonotheca. 576
Teucrium. 387
Thalia. 51
Thalictrum. 377
Thapfia. 216
Thea. 365
Theligonum. 629
Theobroma. 508
Theophraſte. 153
Theſium. 188
Thlaſpi. 434
Thryallis. 296
Thuia. 633
Thymbra. 389
Thymus. 399
Tiarella. 305
Tilia. 363
Tillaea. 132
Tillandſia. 232
Tinus. 281
Toluifera. 293
Tomex. 125
Tordylium. 204
Torenia, 413
Tormentilla. 352
Tournefortia. 149
Tozzia. 406
Trachelium. 163
Tradeſcantia. 233
Tragia. 619
Tragopogon. 518
Trapa. 126
Tremella. 714
Trewia. 362
Trianthema. 297
Tribulus. 296
Trichilia. 294
Trichomanes. 696
Trichoſanthes. 638
Trichoſtema. 403
Tridax. 567
Trientalis. 259
Trifolium. 501
Triglochin. 256
Trigonella. 505
Trillium. 256
Triopteris, 315
Trioſteum. 166
Triplaris. 103
Tripſacum. 615
Triticum. 102

Trium-

Triumfetta. 327
Trollius. 380
Tropaeolum. 263
Trophis. 650
Tulipa. 241
Turnera. 220
Turritis. 443
Tuſſilago. 550
Typaea. 614

Ulex. 476
Ulmus. 198
Ulua. 719
Uniola. 94
Urena. 462
Urtica. 621
Utricularia. 61
Uuaria. 374
Uvularia. 241

Vaccinium. 267
Valantia. 672
Valeriana. 72
Valliſneria. 647
Vandellia. 422
Varronia. 176
Vateria. 364
Velezia. 198
Vella. 441
Verratrum. 668
Verbaſcum. 169
Verbena. 62
Verbeſina. 567
Veronica. 57
Viburnum. 218
Vicia. 487
Vinca. 189
Viola. 584
Viſcum. 650
Vitex. 426
Viris. 184
Volkameria. 425

Wachendorfia. 79
Waltheria. 451
Weinmannia. 274
Winterania. 326

Xanthium. 623
Xeranthemum. 546
Ximenia. 265
Xylopia. 602
Xyris. 79

Yucca. 248

Zamia. 731
Zannichellia. 613
Zanonia. 654
Zanthoxylon. 652
Zea. 615
Zinnia. 561
Zizania. 627
Zizophora. 64
Zoegaea. 571
Zoſtera. 605
Zygophyllum. 295

ER-

ERRATA.

Pag. 143.	*Lin.* 17.	Paraaſia	*lege*	Parnaſſia.
— —	— 23.	Crdſſula	—	Craſſula.
— 146.	— 13.	lto	—	lato-
— 175.	— 5.	Cyſt.	—	Eychſt.
— 190.	— 27.	206.	—	306.
— 202.	— 12.	Hydrocotylae	-	Hydrocotyle.
— 347.	— 17.	erenata	—	crenata.
— 390.	— 16.	flor. racemulis: raceminis *lege* floribus racemoſis: racemis.		
— 487	— 36.	Craeca *lege* Cracca.		
— 528.	num. 15tus deleatur.			
— 445.	*lin.* 14.	quarroſum *lege* ſquarroſum.		

MANTISSA.

Pag. 29. *Lin.* 1. ſpina *lege* ſpica.

MAN-

CAR. A LINÉE

MANTISSA

PLANTARVM.

GENERVM

EDITIONIS VI.

ET

SPECIERVM

EDITIONIS II.

DIANDRIA	Monogynia	DIALIAM 1240.
TRIANDRIA	Trigynia.	KOENIGIA 1241.
TETRANDRIA	Monogynia	SCABRITA 1242.
		COMETES 1243.
		STRVTHIOLA 1244.
PENTANDRIA	Monogynia	MESSERSMIDIA 1245
		NIGRINA 1246,
		CYRILLA 1247.
		LISIANTHVS 1248.
		PLECTRONIA 1249.
		ARDVINA 1250.
		CARISSA. 1251.
		PAEDERIA 1252.
		PERGVLARIA 1253.
	Digynia	STERIS 1254.
	Pentagynia	MAHERNIA 1255.
HEXANDRIA	Monogynia	DRACAENA 1256.
OCTANDRIA	Monogynia	ANTICHORVS 1257.
		CHLORA 1258.
	Digynia	SCHMIDELIA 1259.
DECANDRIA	Monogynia	PROSOPIS 1260.
		CHALCAS 1261.
	Pentagynia.	FORSKOHLEA 1262.
DODECANDRIA	Monogynia	HVDSONIA 1263.
DIDYNAMIA	Angiospermia	MANVLEA 1264.
		VANDELLIA 1265.
MONADELPHIA	Polyandria	MALACHRA 1266.
DIADELPHIA	Hexandria	SARACA 1267.
POLYADELPHIA	Pentandria	MONSONIA 1268.
	Polyandria	MELALEVCA 1269.
		HOPEA 1270.
SYNGENESIA	Polyg. frustran.	ZOEGEA 1271.
GYNANDRIA	Diandria	GVNNERA 1272.
	Triandria	STILAGO 1273.
MONOECIA	Tetrandria	SERPICVLA 1274.
		CICCA 1275.
	Pentandria	LEEA 1276.
		NEPHELIVM 1277.
	Adelphia	GNETVM 1278.
		STILLINGIA 1279.
DIOECIA	Triandria	CATVRVS 1280.
	Pentandria	CANARIVM 1281.
	Polyandria	CIMICIFVGA 1282.
POLYGAMIA	Monoecia	TERMINALIA 1283.
APPENDIX	Palmae	ELAIS 1284.

II. DIANDRIA.

MONOGYNIA.

1240. DIALIVM.

CAL. nullus.
COR. *Petala* quinque, aequalia, ſeſſilia, elliptica, obtuſa, decidua.
STAM. *Filamenta* duo, conica, breuiſſima, ſita ad receptaculi latus ſuperius. *Antherae* oblongae, obtuſae, quaſi ex duabus coalitae.
PIST. *Germen* ſuperum, ouatum. *Stylus* ſubulatus, declinatus, longitudine ſtaminum. *Stigma* ſimplex, adſcendens verſus apicem antherarum.
PER. *Legumen?*
SEM.

III. TRIANDRIA.

TRIGYNIA.

1241. KOENIGIA.

CAL. *Perianthium* tripartitum: foliolis ouatis, concauis, perſiſtentibus.
COR. nulla.
STAM. *Filamenta* tria, capillaria, calyce breuiora. *Antherae* ſubrotundae.
PIST. *Germen* ouatum. *Styli* nulli. *Stigmata* tria (ſaepe duo), approximata, villoſa, colorata.
PER. nullum.
SEM. vnicum, ouatum, longitudine calycis.

IV. TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

1242. SCABRITA. XLVII.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubuloſum, truncatum, integerrimum, perſiſtens.

Cor. monopetala hypocrateriformis. *Tubus* cylindricus, longitudine calycis. *Limbus* quadripartitus, patens Lobis bilobis.
Stam. Filamenta quatuor, in medio tubi, breuiſſima. *Antherae* oblongae, longitudine tubi.
Pist. *Germen* ſuperum, ſubouatum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stigmata* duo, acuta.
Per. nullum.
Sem. duo, parallela, appreſſa, obouata, apice biloba, extus conuexa.

1243. COMETES. XXXVIII.

Cal. *Inuolucrum* triflorum (floribus ſeſſilibus), tetraphyllum: Foliolis oblongis, aequalibus, patulis, ciliato-hiſpidis.
Perianthium tetraphyllum: foliolis oblongis, aequalibus, longitudine inuolucri.
Cor. nulla.
Stam. *Filamenta* quatuor, capillaria, longitudine perianthii. *Antherae* ſubrotundae.
Pist. *Germen* ſubrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine floris. *Stigma* trifidum.
Per. *Capſula* tricocca.
Sem. ſolitaria.
Obs. Affinitas *Dalechampiae.*

1244. STRVTHIOLA. XXXI.

Cal. nullus.
Cor. monopetala, marceſcens. *Tubus* filiformis elongatus. *Limbus* quadripartitus, planus, tubo breuior: Laciniis ouatis.
Nectarium Glandulae octo, ouatae, fauci circumpoſitae, peniciilo proprio cinctae.
Stam. *Filamenta* quatuor, breuiſſima, intra tubum occultata. *Antherae* lineares.
Pist. *Germen* ouatum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stigma* capitatum.
Per. coriaceum, ouatum, vniloculare.
Sem. vnicum, acutiuſculum.
Obs. Affinis *Paſſerinae.*

V. PEN-

V. PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

245. MESSERSMIDIA. XLI.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum laciniis ſublinearibus, erectum, perſiſtens.
COR. monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindricus, rudis, calyce longior, baſi globoſus. *Limbus* quinquefidus, plicatus, lateribus membranaceus, *Faux* nuda.
STAM. *Filamenta* quinque, minuta, in inferiore tubi parte. *Antherae* ſubulatae, erectae, intra medium tubi.
PIST. *Germen* ſubouatum. *Stylus* cylindricus, breuiſſimus, perſiſtens. *Stigma* capitatum, ouatum.
PER. *Bacca* ſicca, ſuberoſa, cylindrico-rotundata vmbilico retuſo, cincto dentibus 4 obtuſis; bipartibilis.
SEM. bina intra vtramque partem pericarpii, oblonga, oſſea, incurua, extrorſum rotundata, introrſum angulata.

246. NIGRINA.

CAL. *Perianthium* monophyllum, ouatum, inflatum, quinquedentatum, perſiſtens.
COR. monopetala, infundibuliformis, longitudine vix calycis. *Tubus* patulus. *Limbus* quinquepartitus, obtuſus, patulus.
STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, longitudine tubi, cuius baſi inſerta. *Antherae* oblongae, obtuſae, baſi acutae bipartitaeque.
PIST. *Germen* ſuperum, conicum. *Stylus* filiformis, longitudine corollae. *Stigma* obtuſum.
PER. *Capſula?* ouata, bilocularis.
SEM. plurima.

247. CYRILLA. *authore DD. Garden.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: foliolis lanceolatis, acuminatis, perſiſtentibus.

Cor. *Petala* quinque, ſeſſilia, lanceolata, acuminata, patentia, diſco villoſa.
Stam. *Filamenta* quinque, ſubulata, erecta, longitudine corollae. *Antherae* ſubcordatae, incumbentes.
Pist. *Germen* ouatum. *Stylus* filiformis, ſuperne craſſior, compreſſus, ſuperne bifidus, perſiſtens. *Stigmata* diſtantia, glanduloſa.
Per. *Capſula* ſubrotundo-ouata, obtuſa, ſtylo mucronata, bilocularis, biualuis.
Sem. plurima, angulata, parua.

1248. LISIANTHVS. *Brown. jam. t. 9.* XLVIII.

Cal. *Perianthium* quinquepartitum: foliolis lanceolatis, carinatis, margine membranaceis, breuiſſimis, perſiſtentibus.
Cor. Monopetala, infundibuliformis. *Tubus* longus, ſubuentricoſus, baſi intra calycem coarctata. *Limbus* quinquepartitus: Laciniis lanceolatis, tubo breuioribus, recuruatis.
Stam. *Filamenta* quinque, filiformia, tubo longiora. *Antherae* ouales, incumbentes.
Pist. *Germen* oblongum, acuminatum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum, perſiſtens. *Stigma* capitatum, bilobum.
Per. *Capſula* oblonga, acuminata, bilocularis.
Sem. numeroſa.

1249. PLECTRONIA.

Cal. *Perianthium* monophyllum, turbinatum, obſolete quinquedentatum, clauſum ſinubus ſ. ſquamis 5 villoſis; perſiſtens.
Cor. *Petala* quinque, lanceolata, ſeſſilia, calycis fauci inſerta.
Stam. *Filamenta* quinque, breuiſſima. *Antherae* geminatae, ſubrotundae, ſingulae obtectae ſquamis calycinis.
Pist. *Germen* inferum. *Stylus* filiformis, calyce breuior. *Stigma* ouatum.
Per. *Bacca* oblonga, bilocularis. *Burm.*
Sem. ſolitaria, oblonga, compreſſa. *Burm.*

1250. ARDVINA. *authore Millero.* † XXX.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, erectum, acutum, paruum, perſiſtens.
COR. Monopetala, infundibuliformis: *Tubus* cylindricus, ſuperne ſubincuruatus. *Limbus* quinquepartitus, acutus, patens.
STAM. *Filamenta* quinque, ſimplicia, tubo inferiori inſerta, eoque breuiora. *Antherae* oblongae, intra faucem corollae.
PIST. *Germen* ſuperum, ouatum *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stigma* bifidum, craſſiuſculum.
PER *Bacca* globoſo-oualis, bilocularis.
SEM. ſolitaria, oblonga, dura.

1251. CARISSA. XXX.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, acutum, minimum, perſiſtens.
COR. Monopetala, infundibuliformis. *Tubus* cylindricus, fauce ventricoſior, limbo longior. *Limbus* quinquepartitus, planus: laciniis oblongis.
STAM. *Filamenta* quinque, breuiſſima, in ſummo tubi. *Antherae* oblongae, intra faucem.
PIST. *Germen* ſubrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* ſimpliciuſculum.
PER. *Baccae* binae, oblongae, biloculares. *Rumph.*
SEM. 7 ſ. 8, oualia, compreſſa.

1252. PARDERIA. XXX.

CAL. *Perianthium* monophyllum, turbinatum, quinquedentatum, perſiſtens.
COR. Monopetala, infundibuliformis, intus hirſuta: *Limbus* quinquefidus, paruus.
STAM. *Filamenta* quinque, ſubulata, breuiſſima, e medio tubi. *Antherae* oblongae, corolla breuiores.
PIST. *Germen* ſubrotundum. *Stylus* capillaris, bifidus, longitudine corollae. *Stigmata* ſimplicia.
PER. *Bacca* fragilis, ouata, inflata. *Rumph.*
SEM. duo, ouata.

DIGYNIA.

1253. PERGVLARIA. XXX.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, erectum, acutum, perſiſtens.
COR. Monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* cylindricus, calyce longior. *Limbus* quinquepartitus, planus: Laciniis oblongis.
Nectaria quinque, ſemiſagittata, erecta, compreſſa, attenuata in mucronem, incurua, baſi exteriore dente nutante.
STAM. *Filamenta* vix vlla. *Antherae* quinque, corpuſculo truncato ſtigmatis immerſae.
PIST. *Germina* duo, ouata, acuminata. *Styli* nulli. *Stigmatis* loco corpuſculum truncatum.
PER. *Folliculi* bini.
SEM.
OBS. Affinis *Periplocae graecae.*

1254. STERIS.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum: laciniis oblongis, acutis, perſiſtentibus.
COR. Monopetala rotata, quinquepartita, patens, calyce paulo longior.
STAM. *Filamenta* quinque, ſubulata, erecta, longitudine calycis. *Antherae* ſagittatae.
PIST. *Germen* ſubrotundum. *Styli* duo, filiformes, longitudine ſtaminum. *Stigmata* obtuſa.
PER. *Bacca* globoſa, vnilocularis.
SEM. plurima, oblonga.

PENTAGYNIA.

1255. MAHERNIA. XXXVII.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, campanulatum: dentibus ſubulatis, longioribus; perſiſtens.
COR. *Petala* quinque, cordata, oblonga, patentia, calyce duplo longiora.
Nectaria quinque, obcordata, pedicellata, germen cingentia, calyce breuiora.

STAM.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, nectario insidentia, calyce breuiora. *Antherae* oblongae, acuminatae, erectae.
PIST. *Germen* subpedicellatum, obouatum, quinquangulum. *Styli* quinque, setacei, erecti, longitudine petalorum. *Stigmata* simplicia.
PER. *Capsula* ouata, quinquelocularis, quinqueualuis.
SEM. nonnulla, reniformia.
OBS. Affinitas summa *Hermanniae*, sed transpositio.

VII. HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

1256. DRACAENA. *authore Vandelio.* XI.

CAL. nullus.
COR. *Petala* sex, oblonga, erectiuscula, aequalia, vnguibus cohaerentia.
STAM. *Filamenta* sex, vnguibus inserta, subulata, medio crassiora, basi membranacea longitudine vix corollae. *Antherae* oblongae, incumbentes.
PIST. *Germen* ouatum, sexstriatum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* trifidum, obtusum.
PER. *Bacca* ouata, sexsulcata, trilocularis.
SEM. solitaria, ouato-oblonga, apice incuruata.
OBS. Character fere *Asparagi*, habitus diuersus.

VIII. OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

1257. ANTICHORVS. XXXVII.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum, patentissimum: foliolis lanceolatis, acuminatis, deciduis.
COR. *Petala* quatuor, obouata, obtusa, longitudine calycis.
STAM. *Filamenta* octo, setacea, erecta, corolla breuiora. *Antherae* subrotundae.
PIST. *Germen* superum, ouatum. *Stylus* cylindricus, longitudine staminum. *Stigma* obtusum.
PER. *Capsula* subulata, quadrilocularis, quadriualuis.
SEM. plurima, truncata, quadrifariam superimposita.
OBS. Affinitas *Corchori*.

1258. CHLORA. XX.

CAL. *Perianthium* octophyllum: foliolis linearibus, patulis, perſiſtentibus.
COR. Monopetala, hypocrateriformis. *Tubus* calyce breuior, germen veſtiens. *Limbus* octopartitus: laciniis lanceolatis, tubo longioribus.
STAM. *Filamenta* octo, breuiſſima, fauci inſidentia. *Antherae* lineares, erectae, laciniis breuiores.
PIST. *Germen* ouato oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi: *Stigmata* quatuor, oblonga, cylindrica.
PER. *Capſula* ouato-oblonga, vnilocularis, compreſſiuſcula, biſulca, biualuis: valuulis latere incuruatis.
SEM. numeroſa. minuta.
OBS. Affinitas *Gentianae*.

DIGYNIA.

1259. SCHMIDELIA.

CAL. *Perianthium* diphyllum: foliolis ſubrotundis, coloratis, corolla maioribus.
COR. *Petala* quatuor, ſubrotunda, ſeſſilia.
STAM. *Filamenta* octo, ſimplicia, longitudine floris. *Antherae* ſubrotundae.
PIST. *Germina* duo, pedicellata, compreſſa, flore longiora. *Styli* ſimplices, breues. *Stigmata* ſimplicia.
PER. duo, pedicellata . . .
SEM. ſolitaria?

X. DECANDRIA.

MONOGYNIA.

1260. PROSOPIS. XXXIII.

CAL. *Perianthium* monophyllum, hemiſphaericum, ſubquadridentatum.
COR. *Petala* quinque, lanceolata, ſeſſilia, aequalia.
STAM. *Filamenta* decem, filiformia, aequalia. *Antherae* didimae, obtuſae.
PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine petalorum. *Stigma* ſimplex.

PER.

PER. *Legumen* longum, inflatum, vniloculare.
SEM. plura, rotundato-oblonga, colorata.

1261. CHALCAS.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, minimum: foliolis ſubulatis, erectis, perſiſtentibus.
COR. Pentapetala, campanulata. *Petala* oblongiuſcula, maiuſcula, unguibus inſidentia.
STAM. *Filamenta* decem, ſubulata, erecta, corolla breuiora. *Antherae* ſubrotundae.
PIST. *Germen* ſubrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* capitato-verrucoſum.
PER. *Bacca* oblonga. *Rumph.*
SEM. duo, tomentoſa.
OBS. *an Affinis* Trichogamilae *Brown?*

PENTAGYNIA.

1262. FORSKOHLEA. LIII.

CAL. *Perianthium* ſubpentaphyllum, erectum: foliolis lineari-lanceolatis, erectis, parallelis, acutis perſiſtentibus.
COR. *Petala* decem, rudia, ſpatulata, concaua, erecta, marceſcentia, calyce dimidio breuiora, unguibus longitudine limbi.
STAM. *Filamenta* decem, filiformia, intra ſingula petala ſingula, longitudine petali. *Antherae* didymae, ſubrotundae, elaſticae.
PIST. *Germina* quinque, diſtantia, oblonga, lanata. *Styli* ſetacei, corolla longiores. *Stigmata* ſimplicia.
PER. nullum.
SEM. quinque, oblonga, ſubcompreſſa, vtrinque attenuata, lana intertexta.
OBS. *Numerus in quibusdam floribus minuitur aut augetur. Flos extricatu difficillimus.*

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

1263. HVDSONIA.

CAL. *Perianthium* triphyllum, tubuloſum, cylindricum: ore patulo: Foliolis lanceolato-linearibus, obtuſis. COR.

COR. nulla.
STAM. *Filamenta* quindecim, capillaria, calyce breuiora. *Antherae* subrotundae.
PIST. *Germen* ouatum. *Stylus* filiformis, longitudine calycis. *Stigma* obtusum.
PER. *Capsula* cylindrica, calyce dimidio breuior, vnilocularis, triualuis.
SEM. tria, hinc rotundata, inde angulata.

XIV. DIDYNAMIA.

ANGIOSPERMIA.

1264. MANVLEA. XL.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: foliolis linearibus, erectis, aequalibus, persistentibus.
COR. monopetala irregularis. *Tubus* cylindricus, fauce fere latiore. *Limbus* quinquepartitus, subulatus, patens: Laciniis superioribus 4 basi connatis: intermediis duabus magis connatis; infima reflexa.
STAM. *Filamenta* quatuor, breuissima. *Antherae* superiores 2 in fauce; inferiores 2 oblongiusculae, intra tubum.
PIST. *Germen* superum, subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum inferiorum. *Stigma* simplex.
PER. *Capsula* ouata, longitudine calycis, bilocularis, biualuis.
SEM. plurima.

1265. VANDELLIA. *authore Cl.* Brown. XL.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulosum, quadripartitum: laciniis subulatis, aequalibus: suprema subbifida; persistens.
COR. monopetala, ringens: *Tubus* longitudine calycis. *Limbus* paruus: *Labio superiore* ouato, integro; *Lab. inferiore* dilatato, bilobo.
STAM. *Filamenta* quatuor: 2 e disco labii inferioris, arcuata sursum; 2 e fauce, altiora. *Antherae* ouatae, per paria connexae.

PIST.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigmata* duo, ouata, membranacea, reflexa.
PER. *Capſula* oblonga, vnilocularis.
SEM. plurima.

XVI. MONADELPHIA.

POLYANDRIA.

1266. MALACHRA.

CAL. *Perianthium commune* ſubquinque-florum, triphyllum, magnum: foliolis cordatis, acutis, perſiſtentibus: *Paleae* ſetaceae, Perianthiis proprius interiectae geminae, iisque longiores. *Proprium* monophyllum, campanulatum, quinquefidum, paruum, perſiſtens.
COR. (propria) *Petala* quinque, obouata, integra.
STAM. *Filamenta* plura, capillaria, inferne connata in cylindrum. *Antherae* ſubreniformes.
PIST. *Germen* orbiculatum. *Stylus* cylindricus, quinquefidus. *Stigmata* obtuſa.
PER. nullum.
SEM. quinque, ſubrotunda, inde angulata.

XVII. DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

1267. SARACA.

CAL. nullus.
COR. monopetala, infundibuliformis. *Limbus* quadripartitus: Laciniis ouatis, patentibus; ſuperiore remotiore. *Faux* margine eleuato.
STAM. *Filamenta* ſex, ſetacea, declinata, fauci inſidentia: ab vtroque latere terna baſi inter ſe connata. *Antherae* calcaneo inſtructae.
PIST. *Germen* pedicellatum, oblongum, compreſſum, longitudine ſtaminum. *Stylus* ſubulatus, declinatus, longitudine germinis. *Stigma* obtuſum,
PER. *Legumen?*
SEM.

XVIII.

XVIII. POLYADELPHIA.

PENTANDRIA.

1268. MONSONIA. XIV.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum. erectum: Foliolis lanceolatis, ſub apice mucronatis, aequalibus, perſiſtentibus.
COR. *Petala* quinque, obouata, aequalia, calyce longiora.
STAM. *Filamenta* quinque, lanceolata, calyce breuiora, ſemitrifida. *Antherae* ſingulis filamentis tres, oblongae.
PIST. *Germen* pentagonum, breue. *Stylus* columnaris, longitudine ſtaminum. *Stigmata* quinque, oblonga.
PER. *Capſula* pentagona, quinquelocularis.
SEM. ſolitaria?

POLYANDRIA.

1269. MELALEVCA. XL.

CAL. *Perianthium* ſuperum, quinquepartitum: Laciniis rotundatis, euaneſcentibus, perſiſtentibus.
COR. *Petala* quinque, ſubrotunda, minuta.
STAM. *Filamenta* vltra viginti, ſetacea, erecta, longiſſima, connata in corpora quinque, e 6. ſ. 7. ſingula. *Antherae* oblongae, incumbentes.
PIST. *Germen* inferum, turbinatum. *Stylus* filiformis, erectus, longitudine ſtaminum. *Stigma* acutum.
PER. *Capſula* colorata, ſubrotunda, veſtita. *Calyce baccato* vrceolato, integerrimo, praeputii inſtar, trilocularis, triualuis.
SEM. numeroſa, decumbentia, oblonga, introrſum acuminata, extrorſum truncata.
OBS. Affinitas *Ginorae*.

1270. HOPEA. *authore* Gardenio †.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, quinquefidum: laciniis ouatis, obtuſis, perſiſtentibus.
COR. *Petala* quinque, oblonga, concaua, baſi mediantibus ſtaminum faſciculis connexa.

STAM.

STAM. *Filamenta* plurima, ſetacea, corolla longiora, baſi connata in quinque corpora. *Antherae* quadrangulares.

PIST. *Germen* inferum, ſubrotundum. *Stylus* ſenſim incraſſatus, longitudine corollae perſiſtens. *Stigma* craſſiuſculum, oblique depreſſum.

PER. *Drupa* ſicca, ouali cylindrica, gibba, calyce coronata.

SEM. *Nux* glabra, trilocularis, apice obtuſis protracta.

OBS. *Nuclei loculamenta 2 ſaepe abortiunt et obliterantur. Affinitas* Styracis *videtur.*

XIX. SYNGENESIA.

POLYGAMIA FRVSTRANEA.

1271. ZOEGEA. XLIX. α.

CAL. *Perianthium Commune* ouatum, imbricatum: Squamis lanceolatis, ciliatis: intimis ſcarioſis, lanceolatis, longioribus.

COR. *Communis* radiata. *Corollulae Hermaphroditae* plurimae in diſco. *Feminae* pauciores in radio. *Propria Hermaphroditi* monopetala: *Tubo* filiformi; *Limbo* quinquepartito: laciniis lanceolatis, erectis.

Feminei monopetala, ligulata, plana, ſubquinquedentata.

STAM. Hermaphroditis *Filamenta* quinque, breuia. *Anthera* cylindrica.

PIST. Hermaphroditis. *Germen* breue. *Stylus* capillaris, longiſſimus, erectus. *Stigma* breue, bifidum.

Femineis *Germen* breue. *Stylus* nullus. *Stigma* nullum.

PER. nullum. *Calyx* immutatus, conniuens.

SEM. *Hermaphroditis* ſolitaria. *Pappus* ſetaceus. *Femineis* nulla.

REC. ſetoſum.

OBS. Affinitas *Centaureae* ſumma, ſed Florum Corollae radius planus.

XX. GY-

XX. GYNANDRIA.

DIANDRIA.

1272. GVNNERA.

CAL. *Amentum* verticillatum : ſquamis monophyllis, vnifloris, ſetaceis, longitudine floris, perſiſtentibus.
Perianthium nullum, niſi cruſta feminis bidentata.
COR. nulla.
STAM. *Filamenta* duo, breuiſſima, oppoſita, inſidentia germinis lateribus extra dentes. *Antherae* oblongae.
PIST. *Germen* ouatum, apice bidentatum. *Styli* duo, breues, ſubulati, inter dentes germinis. *Stigmata* ſimplicia.
PER. nullum.
SEM. vnicum, ouatum, cruſta perianthina corticatum.

TRIANDRIA.

1273. STILAGO.

CAL. *Perianthium* monophyllum, hemiſphaericum, ſubintegerrimo-trilobum.
COR. nulla.
STAM. *Filamenta* tria, germini inſidentia, patentia, calyce longiora.
PIST. *Germen* ſuperum, ſubrotundum. *Stylus* cylindricus, perſiſtens, ſtaminibus breuius. *Stigma* verrucoſum.
PER. *Bacca* globoſa.
SEM. - - - -

XXI. MONOECIA.

TETRANDRIA.

1274. SERPICVLA. XV.

♂. *Maſculi* flores ſolitarii, pedunculati.
CAL. *Perianthium* minimum, quadripartitum, erectum, acutum, perſiſtens.
COR. *Petala* quatuor, oblonga, obtuſa, ſeſſilia.

STAM.

STAM. *Filamenta* quatuor, breuiſſima. *Antherae* oblongae longitudine petalorum.

♀ *Feminei* floreſ in eadem planta.

CAL. *Perianthium* ſuperum, quadripartitum, minimum, perſiſtens.

COR.

PIST. *Germen* inferum, ouatum, ſulcatum. *Stylus* . . . *Stigma* . . .

PER. *Nux* cylindrica, exarata toruliis octo cartilagineis, vnilocularis, decidua.

SEM. vnicum, oblongum.

1275. CICCA. XXXVIII.

♂ *Maſculi* flores ſparſi.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: foliolis ſubrotundis, concauis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quatuor, ſetacea. *Antherae* ſubgloboſae, longitudine calycis.

♀ *Feminei* flores ſparſi in eadem planta.

CAL. vt in Maſculis.

COR. nulla.

PIST. *Germen* ſubrotundum. *Styli* quatuor, bipartiti. ſubulati, longitudine germinis. *Stigmata* acuta, perſiſtentia.

PER. *Capſula* ſubgloboſa, tetracocca, elaſtica.

SEM. ſolitaria.

OBS. Affinitas *Phyllanthi*.

PENTANDRIA.

1276. LEEA. *authore D. Dav. Royeno.*

♂ *Maſculi* flores.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, quinquefidum.

COR. Monopetala. *Tubus* longitudine calycis. *Limbus* quinquefidus, aequalis: laciniis ſaccatis. *Nectarium* baſi interioris corollae adnatum, corolla dimidio breuius, cylindricum, quinquefidum lobis bifidis.

STAM. *Filamenta* quinque, nectario breuiora. *Antherae* oblongae, incumbentes.

PIST. *Germen* nullum. *Stylus* ſimplex. *Stigma* obſoletum.

♀ *Feminei* flores ſaepius in eadem planta.
CAL. vt in Maſculis.
COR. vt in Maſculis.
Nectarium vt in Maſculis, ſed duplicatum: interiore minore.
PIST. *Germen* ſuperum ouatum. *Stylus* ſimplex. *Stigma* lacerum.
PER. . . . globoſum, ſexloculare.
SEM. ſolitaria.

1277. NEPHELIVM. XXXVIII.

♂ *Maſculi* flores in racemo ſpicato.
CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, quinquedentatum.
COR. nulla.
STAM. *Filamenta* quinque, ſubulata, calyce longiora. *Antherae* obtuſae, baſi bipartitae.
♀ *Feminei* flores in eodem racemo.
CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, quadridentatum dentibus 2 oppoſitis remotioribus, marceſcens.
COR. nulla.
PIST. *Germina* duo, ſubrotunda, muricata, calyce maiora. *Styli* bini, filiformes, recurui, inter germina enati. *Stigmata* craſſiuſcula, obtuſa.
PER. - - - bina, ouata, vnilocularia, tecta ſetis ſubulatis.
SEM. ſolitaria, ſubrotunda.

ADELPHIA.

1278. GNETVM.

AMENTVM e *Verticillis* remotis, calloſis, incraſſatis, ſubtus ſuffultis Calyculo partiali.
Calyculus partialis peltatus, orbiculatus, planus, integerrimus, continet *Floſculos* ſeſſiles: *Maſculos* inferius, *Femineos* ſuperius ejusdem verticilli.
♂ CAL. *Squama* ouata, minuta, colorata.
COR. nulla.
STAM. *Filamentum* vnicum, filiforme, ſquama longius. *Antherae* geminae, connexae.

♀ CAL.

♀ CAL. *Squama* lacera, rudis.
COR. nulla.
PIST. *Germen* ouatum, receptaculo verticilli immersum, longitudiue ſtaminum. *Stylus* conicus, breuis. *Stigma* trifidum, acutum.
PER. *Drupa* ouata, vnilocularis.
SEM. *Nux* oblonga, ſtriata.
OBS. *Dioicam* ſtatuit Rumphius; mea monoica erat, vidi etiam Amentum mere maſculum, proprio pedunculo inſidens iuxta femineum floſculum.

1279. STILLINGIA. *authore Alex. Garden.*

♂ *Maſculi* flores in Spicam amentaceam digeſti.
CAL. *Perianthium* multiflorum (7-florum), coriaceum, hemiſphaericum, vrceolatum, integerrimum.
COR. Monopetala, fiſtuloſo-infundibuliformis, ſen ſim ampliata, calyce multo anguſtior: ore indiuiſo, lacero-ciliato.
STAM. *Filamenta* duo, filiformia, corolla, duplo longiora, apice diuaricata, baſi leuiſſime coalita. *Antherae* reniformi-didymae.
♀ *Feminei* flores pauci, ad baſin ejuſdem ſpicae.
CAL. *Perianthium* vniflorum, caeterum vt in Maſculis.
COR. ſupera.
PIST. *Germen* ſubrotundum, inter calycem & corollam. *Stylus* filiformis. *Stigmata* tria, diſtincta, recurvata.
PER. *Capſula* tricocca, ſubturbinata, ſubtrigona, trilocularis, calyce ampliato cincta baſi.
SEM. ſolitaria, oblonga, ſubtrigona, intus exciſa hilo transuerſo.

XXII. DIOECIA.

TRIANDRIA.

1280. CATVRVS.

♂. *Mas.*
CAL. nullus.
COR. Monopetala. tubuloſa, ſemitrifida, Laciniis ouatis, concauis, acutis, perſiſtentibus.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, corolla longiora. *Antherae* ſubrotundae.

♀. *Feminei.*

CAL. *Perianthium* tripartitum: Foliolis ouatis, planis, perſiſtentibus.

COR. nulla.

PIST. *Germen* villoſum, *Styli* tres, longi, pinnato-multifidi, colorati. *Stigmata* acuta.

PER. *Capſula* ſubrotunda, tricocca, trilocularis.

SEM. ſolitaria, rotunda.

OBS. *Flores maſculos minus diſtincte vidi.*

PENTANDRIA.

1281. CANARIVM.

♂ *Maſ.*

CAL. *Perianthium* diphyllum: Foliolis ouatis, concauis perſiſtentibus.

COR. *Petala* tria, oblonga, petala, calyciformia.

STAM. *Filamenta* quinque, breuiſſima. *Antherae* oblongae, longitudine petalorum.

♀ *Femina.*

CAL. vt in Mare: Foliolis reflexis.

COR. vt in Mare.

PIST. *Germen* ouatum. *Stylus* vix vllus. *Stigma* capitatum, trigonum.

PER. *Drupa* ſicca, ouata, acuminata, baſi cincta membrana crenata.

SEM. *Nux* ouata, trigona, acuta.

POLYANDRIA.

1282. CIMICIFVGA. — XXVI. δ.

♂ *Maſ.*

CAL. *Perianthium* foliolis 4. ſ. 6, ſubrotundis, concauis, obtuſiuſculis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* plura (18. ſ. 20), filiformia, calyce longiora. *Antherae* ſubrotundae, didymae.

♀. *Femina.*

CAL. vt in mare, deciduus.

COR. nulla.

STAM.

STAM. *Filamenta* plura (14 f. 22), filiformia, calycis longitudine, desinentia in *Antheras* steriles, obouatas, emarginatas, depressas.

PIST. *Germina* 4-7, oblonga, obtusa, longitudine calycis. *Styli* subulati, recuruati, emarginati, breues. *Stigmata* conuexa, longitudinalia styli.

PER. *Capsulae* totidem, distinctae, erectae, futura interiore dehiscentes.

SEM. plurima, duplici serie futurae adnexa, obtecta squamis exstantibus.

OBS. Affinis *Actaeae*, *sed Petala nulla; Capsulae plures, Semina squamata et sexus separare cogunt.*

XXIII. POLYGAMIA.

MONOECIA.

1283. TERMINALIA.

♂ *Masculi* flores superiores racemi.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, stellatum, acutum, fundo hispido.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, longitudine calycis. *Antherae* subrotundae: interiores bifidae.

☿. *Hermaphroditus* flos vnus alterue inferior racemi.

CAL. vt in Masculis.

COR. nulla.

STAM. vt in Masculis.

PIST. *Germen* inferum, conico-subulatum. *Stylus* simplex, subulatus. *Stigma* acutiusculum.

PER. *Drupa* oualis, cymbiformis: latere superiore depresso, bisulcato.

SEM. *Nux* ouali-oblonga, laeuis, basi obtusa.

XXIV. PALMAE.

ELAIS. *Jacqu.*

♂. MAS.

CAL. *Perianthium* hexaphyllum: foliolis concauis, erectis.

COR. Monopetala, sexfida, erecta, acuta, longitudine calycis.

STAM. *Filamenta* ſex, ſubulata, longitudine corollae. *Antherae* oblongae, acutae.

♀. FEMINA.

GAL. vt in Mare.

COR. Hexapetala.

PIST. *Germen* ouatum. *Stylus* craſſiuſculus. *Stigmata* tria, reflexa.

PER. fibroſum, ouatum, ſubangulatum, oleoſum.

SEM. *Nux* ouata, ſubtrigona, foraminibus tribus, trivaluis, vnilocularis.

ADDITAMENTA.

SACCHARVM ex alio ſpecimine pro ſaccharo dato.

CAL. Gluma biualuis, vniflora: valuulis lanceolatis, inuolutis, baſi barbatis.

COR. Gluma biualuis, breuior, obtuſiuſcula. Ariſta dorſalis torta.

STAM. Ut antea germen oblongum. Styli duo pennati. Stigmata plumoſa caetera.

537. TRIANTHEMA.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: foliolis oblongis, intus coloratis, ſub apice mucronatis, perſiſtentibus.

COR. nulla, niſi *Calycem* dicas quaſi ex corolla et calyce connatum.

STAM. *Filamenta* decem (quibusdam 5-12) capillaria, longitudine calycis. *Antherae* ſubrotundae,

PIST. *Germen* ſubſuperum, oblongiuſculum, retuſum. *Stylus* 1 ſ. 2, filiformes, longitudine ſtaminum, hinc hiſpidi. *Stigmata* ſimplicia.

PER. *Capſula* oblonga, truncato-retuſa, circumſciſſa: Loculis duobus ſuperioribus, duobusque inferioribus.

SEM. ſolitariis ſ. bina, ſubouata.

OBS. *Numerus Staminum Stylorumque in diſtinctis ſpeciebus numero diuerſus.*

1203. CHARA. *Schreber.* Monœcia Monandria.

♀. *Femineus flos.*
CAL. *Perianthium* tetraphyllum: foliolis ſubulatis, erectis, perſiſtentibus: oppoſitis 2 exterioribus longioribus.
COR. nulla.
PIST. *Germen* turbinatum. *Stylus* nullus. *Stigma* quinquefidum, oblongum, deciduum.
PER. *Cruſta* ouata, vnilocularis, adhaerens.
SEM. vnicum, ouatum, ſpiraliter ſtriatum.
♂. *Maſculus* ad baſin germinis, extra calycem.
CAL. vt in Maſculo.
COR. nulla.
STAM. *Filamentum* nullum. *Anthera* globoſa, antice germini, extra calycem, ſubiecta.

273. HARTOGIA.

♂ *Maſculi* flores.
CAL. *Perianthium* pentaphyllum, erectum: foliolis oblongis, acutiuſculis, perſiſtentibus.
COR. *Petala* quinque, obouata, parua: vnguibus filiformibus, calyce duplo longioribus.
STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, longitudine petalorum. *Antherae* ouatae, incumbentes.
♀ *Feminei* flores Maſculis intermixti.
CAL. vt in Maſculis.
COR. vt in Maſculis.
STAM. *Filamenta* vt in Maſculis. *Antherae* ſteriles, oblongae, erectae. *Filamenta* quinque alia, longitudine petalorum, caſtrata.
PIST. *Germen* turbinatum, triquetrum, terminatum ſuperne angulis totidem mucronibus filiformibus, erectis, longitudine calycis. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* capitatum.
PER. *Capſulae* tres, connexae, oblongae, compreſſae.
SEM. ſolitaria. *Arillo* elaſtico.
OBS. Affinis *Dioſmatis.*

SPECIES.

II. DIANDRIA.

MONOGYNIA.

americana. 3. OLEA foliis lanceolato-ellipticis.
Liguſtrum lauri folio, fructu violaceo, baccis purpureis. *Catesb. 1. p. 61. t. 61.*
Habitat in Carolina. *D. Guarden.* ♄.
Folia *oppoſita, lanceolata, ſemperuirentia, integerrima, petiolata, nitida.* Racemi *breues, axillares, brachiati, pedicellis oppoſitis.* Corollae *laciniae reuolutae.* Stylus *breuiſſimus et fere nullus.* Stigma *bifidum.* Drupa *globoſa, laeuis, ſpecioſa.* Nux *obouata, ſubſtriata, baſi perforata.* Flores *Maſculi et Feminei in eadem planta cum hermaphroditis.*

indum. 1. DIALIVM.
Habitat in India ♄.
Arboris Folia *alterna, pinnata: foliolis ſeptem, ouato-oblongis, acuminatis, petiolatis, laeuibus, palmaribus.* Flores *paniculati, nutantes.*

pectinata. 35. VERONICA racemis lateralibus foliatis, foliis oblongis pectinato-ſerratis, caulibus proſtratis.
Veronica Conſtantinopolitana incana, chamaedryos folio.
Tournef. cor. 7. Buxb. cent. 1. p. 25. t. 39.
Habitat Conſtantinopoli. 2.
Caules *proſtrati, baſi ſuffruticoſi, palmares, pubeſcentes.* Folia *Chamaedryos; elliptico-oblonga, profundiſſime aequaliterque ſerrata pectinis inſtar, ſubpetiolata, oppoſita, pubeſcentia.* Scapus *lateralis, palmaris foliis 5 ſ. 6 ſimilibus, ſed alternis, ſeſſilibus; terminatus* Corymbo *in racemum elongato.*

pinnata. 36. VERONICA ſpica terminali, foliis linearibus dentato-pinnatis.
Habitat in Sibiria. *Laxman.* 2
Caules *palmares, diffuſi, erecti.* Folia *oppoſita, confertiuſcula, linearia dentibus vtrinque ſaepius tribus, linearibus, elongatis; glabra.* Racemus *terminalis, longitudine caulis.* Flores *caerulei.* Stylus *capillaris, perſiſtens.* Capſulae *ouales* H. U.

SAL-

ſerotina. SALVIA foliis cordatis ſerratis mollibus, floribus racemoſo-ſpicatis, corollis vix calycem excedentibus.

Saluia foliis cordato-ouatis ſerratis rugoſis, bracteis ſub verticilliis ſenis, calycibus tridentatis, *Ard. ſpec. 1. p. 10. t. 2.*

Habitat in Chio? *Arduini.* ♂. ♄.

Radix *biennis.* Caulis *ſuffruticoſus, ſeſquipedalis, brachiatus, tetragonus, vix tomentoſus Ramis inferioribus cauleſcentibus.* Folia *cordata, margine undulato tenuiſſime ſerrata, vix tomentoſa, molliſſima ſubtus pallidiora.* Spicae *vix pedunculatae, verticillares.* Calyx *cylindricus, anguſtus, ſtriatus, ore trifido: inferiore latiore.* Corolla *minuta, ziziphorae magnitudine, vixque calycis ore maior.* Odor *Nepetae, ingratus, validus.* Calyces *pedunculati bracteis minutis, vt vix conſpicuis.*

paniculata. 34. SALVIA foliis obouato-cuneiformibus denticulatis nudis, caule fruteſcente.

Habitat in Africa. *D. Royen.* ♄.

Caulis *fruteſcens, erectus, teres, purpuraſcens, ſcaber.* Folia *parua, cuneiformia, argute denticulata, venoſa, laeuia, ſubpetiolata.* Panicula *brachiata, decompoſita,* Calyces *trifidi, vix piloſi: laciniis 2 inferioribus acutis.* Corollae *galea labio vix longior.* Stylus *corolla longior.*

acetabuloſa. 35. SALVIA foliis obouatis dentatis, calycibus campanulatis patentibus piloſis, caule fruticoſo.

Saluia foliis ouatis, calyce turbinato limbo ampliſſimo. *Gron. or. 10.*

Saluia ſyriaca, ciſti feminae foliis, acetabulis moluccae. *Moriſ. hiſt. 3. p. 399.*

Habitat in Oriente. ♄.

Fruticulus *Ramis brachiatis, anguſtis, laeuibus.* Folia *petiolata, obouata, baſin verſus dentata, ſubtus tomentoſa.* Racemi *e diuaricatione caulis, elongati, remote verticillati.* Flores *vtrinque 3, pedicellati.* Bracteae *ouatae, integerrimae, acuminatae, glabrae, ciliatae, calyce fere minores.* Calyx *campanulatus, patens morae Mollucellae ſ. Marrubii Pſeudodictamni, margine quinquelobo: Lobis 2 ſuperioribus latioribus, extus piloſis.* Corolla *albida, calyce maior: Labio ſuperiore bifido patulo (non falcato ſ. elongato) L. inferiore*

riore trifido: media maiore. Stamina *longitudine corollae.* Stylus *corolla duplo longior.*

cerato-phylloides. SALVIA foliis pinnatifidis rugosis villosis, caule paniculato ramosissimo.
Saluia. *Arduin. suec. 2. p. 12. t. 2.*
Habitat in Sicilia Aegypto. *Forskähl.*
Media inter S. clandestinam et ceratophyllam. H. U.

aegyptiaca. 36. SALVIA foliis oblongis repandis, calycibus spinosis, bracteis cordatis mucronatis concauis.
Horminum syriacum. *Bauh. pin. 238. prod. 114. Morif. hist. 3. p. 392. s. 11. t. 16. f. 2.*
Habitat in Aegypto. *Forskähl.* ♂.
Caulis *pedalis, obsolete quadrangulus, hirsutus, brachiatus.* Folia *petiolata, subcordata s. ouata, rugosa, obtusiuscula, repanda, subtus magis pilosa; Suprema sessilia, acuminata, serrato-crenata.* Practeae *cordatae, concauae, neruosae, supra glabrae, integerrimae, aritatae.* Verticilli *vtrinque triflori, sessiles.* Calyx *tubulosus, sulcatus, aristatus, subaequalis: dentibus 3 superioribus confertioribus; inferioribus. 2.* Corolla *alba; Galea erecta, subfalcata, longitudine tantum labii inferioris. Labium trifidum: media maiore, concaua, biloba.* Stamina *alba, galea longiora.* Antherae *flauae.* Stylus *purpureus.* Calyx fructus *aridus, compressus, striatus, longitudine bracteearum, dentibus subulatis, vt in Hyoscyamo pungentes, intra Bracteas ad verticillos.* Inuolucella *diphylla, breuia, acuta.* H. U.

Forskaehlei. 37. SALVIA. caule subaphyllo, foliis lyrato-auriculatis, corollis galea semibifida.
Habitat in Oriente. *Forskähl.* 2.
Caulis *secundi anni florens, erectus, sesquipedalis, aphyllus, vltra dimidium verticillis florens.* Rami 2 *oppositi, infra verticillum infimum.* Folia *radicalia ouata, lyrata vtrinque lobo baseos minore, repando-crenata, obtusa, villosa, viridia.* Bracteae *calyce breuiores, cordatae, acutae, integerrimae.* Verticilli *vtrinque floribus 3 s. 5, breuiter pedunculatis.* Calyces *adspersi pilis viscidis.* Corolla *caerulea, calyce triplo maior: Galea falcata, semibifida lobis incumbentibus. Labium trilobum intermedia biloba, maiore, crenata; basi punctis caeruleis reticulatum.* Stylus *corolla duplo longior.* Facies *S. nutantis.* H. U.

III. TRI-

III. TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

supina. 19. VALERIANA floribus tetrandris, inuolucris hexaphyllis trifloris, foliis integris.

Valeriana *supina*, floribus tetrandris, caule repente, foliis radicalibus cuneiformibus emarginatis ciliatis. *Ard. spec. 2. p. 13. t. 3.*

Valeriana alpina, foliis integris, radice repente, inodora. *Raj. hist. 15.*

Valeriana montana minor italica, foliis integris, radice repente, *Barr. rar. 15. t. 868. sed maior.*

Habitat in Alpibus Italicis: Carinthiae. *Arduini.* 4.

Planta *pollicaris vix Bellide maior, licet culta* Folia *Radicalia obouata, petiolata, integerrima. Caulina lanceolata, sessilia.* Corymbus *terminalis e Pedunculis oppositis, terminatis* inuolucro *hexaphyllo, lineari, trifloro.*

hirsuta. 10. IXIA hirsutissima, vmbella bifida racemosa.

Habitat ad Cap. b. spei. 4.

Planta *tota cana, villosissima exceptis floribus interne.* Caulis *subcompressus.* Folia *alterna, lanceolata, amplexicaulia, breuia,* Vmbella *fastigiata, regularis.* Inuolucrum *vniuersale, hexaphyllum, lanceolatum, breue:* Radii *pedunculares circiter sex, bipartiti:* Brachio *vtroque racemoso:* Floribus *alternis, adscendentibus, pedicellatis.* Corollae *intus sulglabrae, atropurpureae, petalis oualibus connexae.* Stamina *tria, longitudine petalorum.* Antherae *luteae.* Stigma *styli simplex, trigonum.* Fructus *inferus, etiam villosus.*

vniflora. 11. IXIA scapo vnifloro foliis ensiformibus, spatha lacera. Ixia foliis gladiatis glabris, caule vnifloro. *Mill. dict 158. t. 137. f. 3.*

Habitat ad Cap. b. spei. *D. de Royen.*

Spatha *striata, lacera.* Corolla *violacea tubo breuissimo.*

vndulatus. 7. GLADIOLVS foliis ensiformibus, petalis lanceolatis vndulatis subaequalibus.

Habitat in Aethiopia. 4.

Statura *Gladioli communis.* Culmus *sesquipedalis.* Folia *ensiformia, striata.* Flores *disticke alterni.* Spathae

thae *propriae diphyllae: valuula interiore minore.* Corollae *Tubus longus, filiformis. Limbus ſexpartitus, ſubaequalis: Petala lanceolata, in formam Lilii digeſta: alternis imprimis vndulatis.*
Media Ixias inter & Gladiolos.

recuruus. 8. GLADIOLVS foliis enſiformibus, petalis ſubaequalibus lanceolatis recuruatis.
Gladiolus foliis linearibus ſulcatis, floribus vno verſu diſpoſitis, tubo floris longiore. *Mill. ic. 157. t. 235. f. 2.*
Habitat ad Cap. b. ſpei. 24.
Differt a G. vndulato *Petalis non vndulatis, minusque: acuminatis, et tubo corollae non filiformi, laxo aut pendulo; caeterum valde affinis.*

iridioides. MORAEA foliis gladiatis.
Moraea ſpatha vniflora, foliis gladiatis, radice fibroſa. *Mill. ic. 159. t. 239. f. 1.*
Iris orientalis pumila ſemperuirens, gramineo acuto rigido folio, flore luteo et caeruleo mixto inodoro. *Till. piſ. 89. t. 33.*
Habitat in Oriente: Conſtantinopoli. 24.
Caulis *ſpithamaeus, teretiuſculus, longitudine foliorum.* Folia *diſticha, enſiformia, baſi interiore anguſtata.* Flores *ex alis ſupremis foliorum tres:* Spatha *propria biualuis.* Germen *pedicellatum, ſubtrigonum, ſtriatum.* Corolla *hexapetala: Petala 3 exteriora obouata, oblonga, patula, barbata, patentia, macula lutea in medio. Petala 3 interiora alba, immaculata, facie exteriorum, patentia.* Stylus *breuis, craſſus.* Stigmata 3, *petaloidea, minora, patentia, caerulescentia, bifida vt in Iride.* Stamina 3, *albida, ſub ſtigmate.* Capſula *exſerta, truncata. Differt vix ab* Iride, *niſi petalis interioribus patentibus.*

alternifolius. CYPERVS culmo triquetro nudo apice alternatim folioſo, pedunculis lateralibus proliferis.
Gramen fluuiatile geniculatum, panicula foliacea, virginianum. *Moriſ. hiſt. 3. p. 183. ſ. 7. t. 3. f. 17.*
Habitat in Virginia. 24.
Culmi *pedales, triquetri, nudi, apice.* Foliis *alternis, confertis, enſiformibus, ſemipedalibus, laeuibus, margine ſcabriuſculis.* Bractea *ſubulata, parua, e ſingulis alis.* Pedunculus *e ſingula folii ala, filiformis,*
folio

folio quadruplo breuior, terminatus ſpina *ouata.* Pedicelli *aliquot e baſi ſpicae, apice ferentes* ſpicam *ſimilem.* Vmbella *adeoque nulla.*

triquetr. 28. SCIRPVS culmo triquetro nudo, ſpiculis ſeſſilibus pedunculatisque mucronem aequantibus.

Scirpo-Cyperus paluſtris, caule molli, panicula ſparſa minore, capitulis ſubrotundis plurimis ſimul junctis ſubfuſcis. *Mich. gen. 47.*

Juncus acutus maritimus, caule triquetro molli, procerior. *Pluk. alm. 200. t. 40. f. 2. Raj. ſuppl. 629.*

Habitat in Europa *auſtrali.* 24.

Culmus triqueter angulis planis, nec excauatis.

DIGYNIA.

atopecuroides. CORNVCOPIAE ſpica ariſtata cucullo hemiſphaerico recepta.

Habitat in Italia. *Arduini.*

Simillimum Gr. Alopecuro pratenſi. Culmi *adſcendentes, laeues.* Folia *laeuia.* Spica *terminalis, ouata, laxa, floſculis breuiſſime pedicellatis.* Calycis *gluma biualuis, aequalis, ouata, acuta.* Corollae *Gluma vniualuis, longitudine calycis, cui oppoſita eſt Ariſta patens, flore duplo longior.* Vagina *ſupremi folii ventricoſa, vt in Phalaride.* Singularis *nota eſt vrceolus hemiſphaericus, integerrimus, conſiſtentia folii, qui inſtar calycis communis cingit baſin Spicae.*

ſcrobriculatum. 5. PASPALVM ſpicis alternis, rachi membranacea, floribus alternis, calycibus multineruiis extus ſcrobiculatis.

Habitat in India *orientali.* 24.

Culmi *erecti, baſi hirſuti, pedales et vltra.* Vaginae *foliorum purpuraſcentes, margine ciliatae et baſi geniculo veſtientes, hirſutae.* Folia *laeuia, ſupra linea albida longitudinali.* Spicae *alternae, ſaepe reflexae.* Rachis *late membranacea.* Calyces *ſubrotundi, ouati, glabri, multineruii, obtuſi, gibbi: valvula planiore baſi intruſa, et in medio pari ſcrobiculorum impreſſo.*

ramoſum. 29. PANICVM paniculae ramis ſimplicibus, floribus ſubternis: inferiore ſubſeſſili, culmo ramoſo.

Habitat in Indiis.

Culmi *pedales, erecti, ramoſi, laeues: Articulis baſi craſſiuſculis, geninculatis.* Folia *vaginis laeuibus, ſtriatis,*

tis, margine fauceque ciliata. Panicula *ramis fimplicibus, triqueſtris, hinc canaliculatis; ad ſingulos dentes flores* 2 *ſ.* 3, *pedicello vno alteroue pilo.* Calycis *exterior valuula breuis, membranacea, perfoliata, reliquae ouatae. H. U.*

coloratum. 30. PANICVM panicula patente, culmo ramoſo, ſtaminibus piſtillisque coloratis.

Habitat Cairi. *Forſkahl.* 24.

Culmi *bipedales, valde ramoſi, laeues, vaginis foliorum piloſis demum ſcabris.* Panicula *patentiſſima, laxiuſcula ramis filiformibus.* Glumae *vniflorae, muticae, ouatae, viridi-purpuraſcentes, ocheoſulcatae.* Antherae *croceae* et Piſtilla *ſaturate violacea, quibus a P. capillari reliquisque mox dignoſcitur.* Folia *laeuia, linearia, laxa, margine verſus baſin denticulato callis, interdum pilo inſtructis, interdum eo deſtitutis; valuula extima calycis breuior lata, amplexicaulis. H. U.*

bromoides. 16. AGROSTIS panicula ſimplici anguſtata, corolla pubeſcente: ariſta recta calyce longiore.

Habitat Monſpelii. *D. Gunan.*

Culmi *ſeſquipedales, rigidi, laeues. erecti.* Folia *laeuia, anguſtiſſima, ſubfiliformia, canaliculata.* Panicula ſ. Racemis *erectus, oblongus, anguſtus, ſimplex; ad rachis ſingulos dentes vel pedicelli duo biflori: flore altero ſubſeſſili, vel tantum Flores duo: altero ſeſſili.* Calyx *oblongus, ſtriatus, lanceolatus: foliolis ſubaequalibus.* Corolla *ſemen veſtiens, ſubpubeſcens;* ariſta *recta, ſcabra, calyce duplo triploue longior, vt in Bromis.*

auſtralis. 17. AGROSTIS panicula ſubſpicata, ſeminibus ouatis pubeſcentibus: ariſta longitudine calycis.

Habitat in Luſitania. *Vandelli.*

Culmi *tripedales, articulati, folioſi, laeues. Simillima A.* arundinaceae, *ſed* panicula *magis ſpicata.* Semina *non baſi hirſuta, ſed vndique pubeſcentia.* Calyces *apice fere ſetacei.* Folia *latiora, planiora.* Culmina *pluribus geniculis.*

ſerotina. 18. AGROSTis floſculis oblongis mucronatis, culmo obtecto, foliis breuiſſimis.

Feſtuca ſerotina. *Sp. pl.* 111.

Gra-

Gramen loliaceum ſerotinum, panicula diſpanſa. *Sequ. ver. 3. p. 146. t. 3. f. 2.*

Habitat Veronae. *Seguier.*

Culmi *pedales, vaginis foliorum obtecti, adſcendentes.* Folia *breuia, vix articulis longiora, patentia.* Paniculae *rami alterni, ſubramoſi.* Flores *plerique ſeſſiles.* Gluma calycina *membranacea, breuis.* Gluma petaloidea *lanceolata, arundinacea, vtraque valuula acumine mucronata, vti altera laeuiter apice ariſtata.* Piſtilla *purpurea.*

pumila. 19. AGROSTIS panicula mutica ſubſecunda, culmis faſciculatis erectis.

Gramen minimum ſpaluſtre, panicula ſpadicea delicata, tenuifolium. *Scheuch. gramm. 131.*

Habitat in Suecia, Islandia, Heluetia. 2.

Radix *multiplex.* Culmi *numeroſo-faſciculati, laeues, altitudine pollicum 2, veſtiti* Foliis, *radicalibus ſimilibus, vagina ſtriata, diſco ſubinuoluta.* Panicula *patentiſſima, ſubſecunda.* Flores *colorati, mutici, acuminati.* Semina *maiuſcula.*

Differt ab A. ſtolonifera, *cum qua promiſcue creſcit, quod dimidio minor; panicula minus erecta parumque ſecunda; magis caeſpitoſa. Pedicelli minime vndulati horſum vorſum tamen flexi.*

mexicana. 20. AGROSTIS panicula oblonga congeſta, calycibus corollisque acuminatis ſubaequalibus muticis.

Habitat in America *calidiore. D. Jacquin.* ♂.

Culmi *numeroſi, pedales, laeues, erecti.* Ramis *indiuiſis.* Folia *laeuiuſcula ligula truncata.* Panicula *viridis, oblonga, non patens, ſed congeſta coaceruatis numeroſiſſimis viridibus floribus.* Flores *ſcabri.* Calyces *apice ſubulati, ſubaequales, parum ſcabri.* Corollae *longitudine calycis, apice ſimiliter acuminatae, baſi piloſae.* Ariſtae *nullae.* Stigmata *atropurpurea, ramoſa.* Stamina *alba. Difficillime hoc Gramen determinatur. Altero anno floret.* Faices *Cinnae.* H. U.

papilionacea. 4. MELICA calycibus valuula inferiore maxima colorata, petalo exteriore ſubciliato.

Melicca *braſiliana* petalo exteriore amplo vexillato. *Ard. ſpec. 2. p. 17. t. 6. f. 1, 2.*

Habitat in Braſilia. *D. Arduinus.*

Statu-

Statura *M. altiſſimae.* Panicula *virgata*, *Pedunculis tenuibus*, *flore longioribus*, *imprimis inferne ramoſis.* Calyx *cualuis*: *Valuula inferiore obouata*, *obtuſa*, *maxima*, *colorata*. *V. Superiore ſexies minore*, *ſpatio remota ab inferiore*, *apice ſcarioſo-colorata.* Floſculi 2, *alterni*, *praeter tertium rudimentum.* Petalum *ſingulis externus oblongum*, *ſtriatum neruis* 16, *mediis muricatis*, *lateralibus ciliatis ſetis plurimis*; *at apex petali ſcarioſus membrana tenui*, *laeui*, *obtuſa*, *colorata*. *P. Interius ſimplex.* Tertii *rudimentum oblongum.*

minuta. 5. MELICA culmo ramoſo, foliis ſetaceis.
Habitat in Italia. *D. Scopoli.*
Culmi *filiformes*, *anguſtiſſimi*, *ſemipedales*, *ramoſiſſimi*, *obtecti foliorum Vaginis.* Folia *ſetacea*, *anguſtiſſima*, *inuoluta*, *filiformia*, *baſi patula.* Racemi *terminales*, *ſimplices*, *capitulares*, *pauciflori.* Calycis *Gluma biualuis*, *biflora*, *ouata*, *floſculis dimidio breuior.* Floſculi *oblongi*, *mutici*: *intermedio pedicellato*, *truncato*, *ſterili.*

ſpicata. 22. POA panicula ſpicata, floribus ſubulatis: floſculis remotis.
Habitat in Luſitania. *Vandelli.*
Culmi *plures*, *e baſi adſcendentes*, *palmares*, *veſtiti vndique foliorum vaginis.* Folia *linearia*, *anguſta*, *laeuia vaginis craſſioribus. Florum racemus coarctatus in ſpicam. longitudine fere culmi*, *inaequalem.* Calycis *valuula exterior brevis*, *ouata*; *interior duplo longior.* Floſculi *diſtantes valuula exteriore oblonga*, *acuminata.* Antherae *flauae*, *vtrinque bifidae.* Styli *plumoſi*, *albi.* Habitus *Feſtucae.*

diſtans. POA paniculae ramulis ſubdiuiſis, floribus quinquefloris: floſculis diſtantibus obtuſis.
Habitat in Auſtria. *D. Jacquin.*
Statura *reliquarum Poae ſpecierum.* Culmi *adſcendentes*, *laeues*, *vti Folia.* Panicula *ſcabriuſcula.* Floſculi 4*ſ.* 5. *obtuſi*, *ab apice ad medium corollae alti*, *et adeo diſtantes*, *vt facile aſſumeretur pro Agroſtidis ſpecie*, *niſi* calyx *inquiratur*; *qua nota primo intuitu dignoſcitur.*

3. DA-

lagopoides. 3. DACTYLIS ſpicis ſubrotundis pubeſcentibus, culmo proſtrato ramoſo.
Bur. ind. t. 10. f. 1.
Habitat in India. *Burmannus.*
Culmi *laeues, proſtrati, ad genicula Ramis pluribus, ſpiciferis.* Folia *laeuia, breuia: vagina ſtriata, absque ligula.* Pedunculi *ſubtomentoſi.* Spicae *facie capituli Pſyllii, ſecundae, ſubrotundae, muticae.* Calyces *pubeſcentes, octoflori.* Floſculi *pubeſcentes.* Media *inter Cynoſuros, Dactyles, Poasque.*

phoenicoides. 16. FESTVCA racemo indiuiſo, ſpiculis alternis ſubſeſſilibus teretibus, foliis inuolutis mucronato-pungentibus.
Ger. prou. 95. t. 2. f. 2. †
Gramen phœnicoides, foliis conuolutis iunceis pungentibus. *Bauh. hiſt. 2. p. 477.*
Habitat in Galloprouinciae *maritimis arenoſis.* 4.
Glumae mucronatae ſunt. Folia *glauca.* Culmi *bipedales.*

ringens. 18. BROMVS panicula ſpicata, ſpiculis ſubſeſſilibus erectis pubeſcentibus ſubquadrifloris.
Habitat in Luſitania. *Vandelii.*
Culmi *ſpithamei, foliis veſtiti.* Folia *neruoſa, ſupra leuiter piloſa: Vaginis totum culmum tegentibus.* Spica *breuiter pedunculata. erecta rigidula: Spiculis ſparſis, ſubſeſſilibus, tenacibus, parum pubeſcentibus, erectis: Floſculis 4. f. 5; ariſta infra apicem exeunte, erecta vel parum patula, longitudine ſpiculae.*

geniculatus. 19. BROMVS panicula erecta, floſculis diſtantibus, pedunculis angulatis, culmo genu procumbente.
Habitat in Luſitania. *Vandelli.*
Culmi *vix palmares, decumbentes ad vltimum vſque genu, fuſcum; dein erecti, adſcendentes.* Folia *graminea, laeuia, vaginis culmos veſtientibus.* Pedunculus *panicula breuior.* Panicula *erecta, patula pedicellis minime attenuatis; ſed compreſſis, ancipitibus, ſubtriquetris, ſcabris.* Flores *oblongi, quadriflori:* floſculis *ſcabris, vix pubeſcentibus, maxime omnium diſtantibus,* ariſta *longitudine floſculi, recta.*

ramoſus. 20. BROMVS culmo indiuiſo, ſpiculis ſeſſilibus, caule ramoſiſſimo, foliis inuoluto-ſubulatis.
Gramen iunceum corniculatum velut fruteſcens glabrum orientale. *Scheuch. gram. 38.*
Habitat in Oriente. *D. Schreber.* 2.
Culmi *alternatim ramoſiſſimi*, *filiformes*, *procumbentes*, *laeues.* Folia *ſetacea lateribus inuolutis*, *culmo fere anguſtiora.* Scapus *erectus*, *filiformis*, *vnico geniculo.* Spicae *ſaepius tres*, *alternae*, *facie omnino Bromi pinnati:* Calyce *multifloro acuto*: Glumis *mucronatis*, *ſubciliatis.*

ſpinifex. 8. STIPA capitulorum bracteis faſciculatis maximis inuolutis mucronatis, floſculis muticis.
Cyperus littoreus. *Rumph. amb. 6. p. 6. t. 2. f. 2.*
Ily-mullu. *Rheed. mal. 12. l. 75.*
Habitat in Indiae *arenoſis maritimis.* 2.
Capitula *maxima*, *confecta e* Bracteis *canaliculato-inuolutis*, *mucronatis*, *validis*, *longis*, *ſtrictis*, *intra quas* Calyces *ſeſſiles*, *vniflori*, *mutici*, *bracteis multoties minores.* Habitus *Arundinis maioris. Capitulum abſciſſum ventus in littore agitat ac ſi Diabolus illud proſequeretur. Rumph.*

ſeſquiter-tia. 15. AVENA paniculata, calycibus ſubtrifloris: floſculis omnibus ariſtatis, receptaculis barbatis.
Gramen pratenſe villoſum, panicula denſa ex argenteo dilute ſpadicea ſ. fuſca. *Scheuch. gram. 220.*
Habitat in Heluetia, Auſtria. *Jacquin.*
Panicula *oblonga.* Flores *piloſi videntur*, *ſed pili omnes inſident pedicellis ſ. receptaculis intra calycem*, *inter floſculos.* Floſculus tertius *imperfectus in rudimento haerens*, *etiam ariſta parua inſtructus.*

ſtipifor-mis. 15. AVENA paniculata, calycibus bifloris, ariſtis ſemine duplo longioribus, culmo ramoſo.
Habitat ad Cap. b. ſpei.
Culmi *pedales*, *ſaepe reclinati*, *laeues*, *geniculis fuſcis.* Ramus *breuis*, *etiam florifer*, *ex ſingulis foliorum alis.* Panicula *auenacea*, *parua.* Calycis *Gluma biualuis*: *valuula altera lanceolata*, *altera ouata.* Floſculi 2 *ſeſſiles.* Corollae *Gluma biualuis*, *laeuis*; *exterior baſi hirta*: Ariſta *terminali ſcabra*, *ſeſquilongiore.*

9. ELY-

europaeus. 9. ELYMVS ſpica erecta, ſpiculis biflоris, inuolucro aequali.

Gramen hordeaceum montanum, ſpica ſtrigoſiore, breuius ariſtata. *Scheuch. gram. 16. prod. t. 1. f. 1.*

Gramen hordeaceum montanum ſ. maius. *Bauh. pin. 9. thentr. 135. Rai. angl. 3. p. 393. hiſt. 1258.*

Habitat in Germania. 2.

Simillimum *Elymo virginico*, *huic* inuolucri *folia non ſtriata*, *vt illi.* Floſculi *inuolucro ſunt cum ariſta longiores.* Floſculi *ſunt huic* 2, *illi* 3. H. U.

vnilaterale. 11. TRITICVM calycibus vnilateralibus alternis muticis.

Gramen minimum. *Bauh. hiſt. 2. p. 469.*

Gramen exile duriuſculum maritimum. *Rai. hiſt.* 1287. *Pluk. phyt. 32. f. 7. Scheuch. gramm. 272.*

Gramen puſillum vnciale, panicula foliacea. *Bocc. muſ. 2. t. 57.*

Habitat in maritimis Italiae, Galliae *auſtralis.*

Flores *facie Poae*, *in ſpica vnilaterali.* Synonymon *Scheuchzeri excludatur*, *Feſtucae maritimae additum*, *cum flores muticos ſiſtat author.*

TRIGYNIA.

Islandica. 1. KOENIGIA.

Habitat in Islandia *detecta* 1765. *a Jo. Ger König*, *qui Islandiam adiit Hiſtoriam naturalem eius deſcripturus.* ☉.

Herba *facie Polycarpi.* Caulis *digitalis*, *ſubſucculentus;* Ramis *pauciſſimis. oppoſitifoliis*, *patentiſſimis.* Folia *alterna*, *ſubpetiolata*, *obouata*, *integerrima*, *obtuſa*, *ſubſucculenta*, *longitudine internodiorum caulis.* Stipulae *ſolitariae*, *vaginales* (*more Perſicariae*), *intrafoliaceae*, *campanulatae*, *perſiſtentes.* Folia *terminalia quaterna.* Flores *terminales plurimi*, *ſubfaſciculati*, *ſubpedunculati*, *bracteis membranaceis diſtincti. Variat Stigmatibus* 2 *et* 3.

IV. TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

speciosum. 15. LEVCADENDRON foliis lanceolatis integris, calycibus tomentosis apice penicillatis.

Lepidocarpodendrum folio oblongo viridi limbo rubro ornato, squamarum apice et margine lanuginosis. *Boerh. lugdb. 2. p. 185. t. 185.*

Clus. exot. 39. f. 15.

Habitat ad Cap. b. spei. ♄.

Rami *laeues.* Folia *alterna, sessilia, lanceolata, laeuia.* Flos *terminalis, sessilis.* Calyx (*strobiliformis, cinaroides*) *imbricatus squamis sericeo-tomentosis: infimis minutis, mediis lanceolatis apice villosis; summis s. intimis longis, canaliculatis, magis sericeis, erectis, apice ciliatis lana ferruginea penicilliformi, singulari.* Flosculi *calyce breuiores ex staminibus 2 apice connexis in cylindrum: altero breuiore.* Germina *pilosa.* Calyx *stupendum artificium conditoris. Obs.* Flosculi *dipetali, longi, lutei.* Petalum maius *erectum, subulatum, basi angulatum, limbo subdiuiso, erecto, acuto.* Petalum minus *eiusdem longitudinis, lineare, angustissimum, erectum.* Filamenta *ad basin limbi, linearia, limbo dimidio breuiora.* Antherae *erectae, breuissimae.* Stamina *in maiori petalo tria, in minori vnicum.*

pinifolium, 16. LEVCADENDRON foliis linearibus, flosculis disiunctis racemosis spicatis.

Pini foliis planta africana, cyperi capitulis. *Burm. afr. 193. t. 70. f. 3.*

Habitat ad Cap. b. spei. *D. Royen.* ♄.

Arbuscula *Ramis lignosis, flexuosis, rubro-fuscis, subdichotomis, apice foliosis floriferis.* Folia *conferta, sparsa, linearia, acuta, laeuia, longa,* Racemi *subspicati, terminales, solitarii, erecti, sessiles, ouati Bracteis linearibus, longitudine pedicellorum,* Calyx *nullus, nisi apex pedunculi coronula quadripartita.* Petala *4-lineari-lanceolata, patentia cruciatim.* Filamenta 4, *breuissima, singula ex singuli petali medio enata.* Antherae *lineares.* Germen *superum, minutum, tetragonum, villosum.* Stylus *longitudine staminum, sensim latescens.* Stigma *simplex. Royen.*

25. SCA-

palaeſtina. 25. SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus: laciniis omnibus trifidis, foliis indiuiſis ſubſerratis; ſummis baſi pinnatifidis.

Habitat in Palaeſtina. *Haſſelquiſt.*

Caulis *pedalis*, *teres*. Folia *latius lanceolata*, *aliquot inciſuris inciſa*, *pubeſcentia*; *ſumma lineari-lanceolata*, *baſi infima pinnatifida*. Pedunculi *longiſſimi*. Flores *albi*, *radiati*, *longitudine calycis*. Corollulae *radio ſpecioſiſſimo*, *quod laciniae eius omnes*, *tam 2 ſuperiores minores*, *quam 3 exteriores*, *ſubdiuiſae in tres lacinias*. Fructus *omnino S. ſtellatae*.

iſetenſis. 26. SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus calyce longioribus, foliis bipinnatis linearibus.

Scabioſa corollis quinquefidis, foliis duplicato-pinnatis ſetaceis. *Gemel. ſiber. 2. p. 214. t. 88. f. 1.*

Habitat in Sibiriae Iſetenſis *rupibus*.

Caules *pedales*, *adſcendentes*, *ſubtomentoſi*. Folia *linearia*, *bipinnata*, *pilis rigidulis adſperſa*: *ſumma ſimpliciter pinnata*. Rami *rariſſimi*, *ſaepe nulli*. Flos *albus*, *calyce non breuior*. Calyx *polyphyllus*, *patens*. Semina *vt in S. ſtellata*.

triflora. 1. SCABRITA

Habitat in India. ♄.

Frutex *Ramis tetragonis*, *ſcabris*. Folia *oppoſita*, *petiolata*, *ouata*, *oblonga*, *integerrima*, *articulis rameis longiora*, *vtrinque ſcabra*. Pedunculi *axillares*, *oppoſiti*, *ſolitarii*, *tetragoni*, *folio dimidio breuiores*, *apice diphylli Pedicellis trifloris*. Inuolucrum *partiale tetraphyllum? Foliolis obouatis*, *longitudine calycum*, *obtuſis*; *continens floſculos tres*, *ſeſſiles*.

craſſifolia. 7. ASPERVLA foliis quaternis oblongis lateribus revolutis obtuſiuſculis pubeſcentibus.

Habitat in Creta, Oriente ♄.

Caulis *alterne ramoſus*, *diffuſus*, *ſubpubeſcens*. Folia caulina *quaterna*, *longitudine articulorum*, *oblonga ſ. oualia*, *lateribus reuoluta*, *ſupra gibba vti Sedum*, *pubeſcentia*. Ramea *remotiora*, *anguſto-lanceolata*, *lateribus reuoluta*, *inaequalia*. Rami *floriferi erecti*, *alternatim ramoſi*. Folia vltima *bina*. Flores *faſciculati*, *terminales*, *pauci*. Corollae *extus pubeſcentes*.

laeuigata. 8. ASPERVLA foliis quaternis ellipticis laeuiuſculis, pedunculis trichotomis, ſeminibus laeuibus.
Cruciata minor glabra, flore molluginis albo. *Barr. ic. 323.*
Cruciata luſitanica latifolia glabra, flore albo. *Tournef. inſt. 115.*
Habitat in Barbaria, Luſitania. 2.
Caules *primum erecti, ſemipedales, laeues, dein diffuſi.* Folia *ouata ſ. oualia, laeuia, eneruia, margine ſcabriuſcula, ſubpetiolata, obtuſiuſcula.* Pedunculi *ex apice caulis ramorumque ſolitarii, filiformes, folio longiores, terminati* Bracteis 2 *lanceolatis, paruis; et* Pedicellis *tribus trifloris, excepto tertio iterum trichotomo.* Flores *albi, infundibuliformes.* Semina *laeuia, matura nigra, rugoſa, non hiſpida.* H. U.

maritimum. 24. GALIVM foliis quaternis hiſpidis, pedunculis vnifloris, fructibus villoſis.
Aparine maritima incana, flore purpureo. *Tournef. icon. 4.*
Habitat in Oriente. *D. Schreber.*
Caulis *brachiatus, hirtus, ramoſiſſimus:* Ramis *vltimis dichotomis.* Folia *quaterna, rarius quina; ſumma floralia ſaepe bina: ſingula lanceolato-ouata, vtrinque hirta, ſuprema ſubpetiolata.* Pedunculi *capillares, foliis breuiores, ſaepius vniflori, rarius bifidi.* Flores *parui.*

graecum. 25. GALIVM hirtum, foliis ſubſenis lineari-lanceolatis, caulibus lignoſis.
Gallium montanum creticum. *Alp. exot. 167. t. 166.*
Aparine graeca ſaxatilis incana tenuifolia. *Tournef. cor. 4.*
Habitat in Inſulis Archipelagi. *D. Schreber.* ♄.
Caules *varie flexi, tortuoſi, lignoſi, ſ. ſuffruticantes.* Rami *recti, ſtricti, herbacei, villis albis hirti, vti* Folia, *Pedunculi, Germina* Folia *ſubſena, lineari-lanceolata, ſeſſilia, ſtricta, erecta, longitudine internodiorum, parcius piloſa, viridia.* Pedunculi *foliis longiores, ſubdiuiſi, ſubumbellati, pauciflori, capillares.*

aegyptiaca. 6. CRVCIANELLA foliis quaternis ſublinearibus, floribus ſubſpicatis quinquefidis.
Habitat in Aegypto. *Forſtkähl.* ☉.

Caules

Caules *palmares*, *erecto-patuli*, *ad radicem diffusi f. proſtrati*. Folia *quaterna*, *lateribus reuoluta*, *pagina ſuperiore margineque ſcabra*; *infima ouata*, *inferiora lanceolata*, *reliqua linearia*. Spicae *terminales*, *ſolitariae*, *laxiores*. Bracteae *lanceolatae*, *non carinatae*. Flores *minuti*, *bracteis longiores*, *flaueſcente-albidi*, *quinquefidi ariſtatique*, *vt Cr. maritimae*. Radix *annua*, *caulis minime lignoſus*. H U.

anguſtifolia. 3. RVBIA fol. perrennantibus linearibus ſupra ſcabris.
Habitat in Minorca. *Richard.*
Caules *diffuſi*, *ſcaberrimi*, *tetragoni*. Folia *quaterna*, *f. ſena*, *lineari-acuta*, *perennia*, *carina et margine-ciliata aculeolis et inſuper coſta longitudinali paginae ſuperioris ſcabra*. Flores *lutei*, *plani*, *5-fidi*. H. U.

ſuratten-ſis. 1. COMETES. *Burm. ind. t. 15. f. 5.*
Habitat in Suratte. ☉.
Caulis *herbaceus*. Folia *oppoſita*, *ſeſſilia*, *obouata*, *acuminata*, *integerrima*, *glabra*. Pedunculi *axillares*, *alterni* (*alterius alae*), *ſolitarii*, *vniflori*, *patuli*, *longitudine foliorum*.

puſilla. 2. BLAERIA floribus ſparſis.
Habitat ad Cap. b, ſpei. *D. Schreber.* ♄.
Statura *Ericae minoris*. Rami *pubeſcentes*. Folia *quaterna*, *linearia*, *ſcabra*, *petiolata*, *ſubtus linea exarata*. Flores *minuti*, *ſparſi*, *foliis breuiores*. Caute *ab Ericis diſtinguenda*.

quadrangulus. 6. CISSVS foliis cordatis ſubcarnoſis ſerrato-dentatis, caule tetragono tumido.
Funis quadrangularis. *Rumph. amb. 5. p. 83. t. 44. f. 2.*
Planta baccifera ſcandens epidendros. *Pluk. phyt. 310. f. 6.*
Habitat in Arabia, India. †,
Caulis *ſcandens*, *tetragonus*, *incraſſatus*, *carnoſus geniculis*, *contractus*, *laeuis*, *perennis*. Folia *alterna*, *petiolata*, *ſubcarnoſa*, *cordata*, *ſubhaſtata*: *vtrinque glabra*, *argute remoteque ſerrata*. Petioli *angulati*. Cirrhi *oppoſitifolii*. Radix *tuberoſa*. H. U.

alba. 6. CORNVS arborea, ramis recuruatis, cymis nudis.
Cornus ſylueſtris, fructu albo. *Amm. ruth. 277.*
Habitat in Sibiria, Canada. ♄.
Corno ſanguineae *tam ſimilis ac ouum ouo; diſtinguitur tantum* Ramis *recuruatis et* Baccis *albis; multi ſtolones iuxta radicem ennati procumbunt.* H. U.

octandra. 4. FAGARA foliolis tomentoſis. †.
Elaphrium tomentoſum. *Jacq. amer. 105. t. 71. f. 1-3.*
Habitat in Curacao *duris.* ♄.

erigata. 3. LVDVIGIA foliis oppoſitis lanceolatis, caule erecto.
Habitat in India. ☉.
Caulis *herbaceus, pedalis, erectus, brachiatus, laeuis.* Folia *oppoſita, petiolata, lanceolata, integerrima, laeuia.* Pedunculi *terminales, ſubterni, vniflori, rarius axillares.* Germina *tetragono-alata.* Calyces *minuti.* Corolla *vix conſpicua.* Capſula *quadrilocularis angulis quatuor carinatis, ſubcubica.*

verticillata. 6. OLDENLANDIA floribus verticillatis ſeſſilibus, ſtipulis ſetigeris.
Crateogonum amboinicum. *Rumph. amb. 6. p. 25. t. 10.*
Habitat in Amboinae, Jauae *collibus apricis.*
Caules *ſubpedales, ſimplices, articulati, laeues, teretes. vtrinque ſulco exarati.* Folia *oppoſita, ſeſſilia, anguſto-lanceolata, coſta exarata, acuminata, ſcabra.* Flores *ſeſſiles, verticillati, congeſti.* Stipula *membranacea in ſetas diuiſa, more Spermacoces, quarum nonnullae ſetae capillares, floribus longiores.* Capſula *ſubrotunda, bilocularis, polyſperma connata Calycis foliolis quatuor, acuminatis.* H. U.

repens. 7. OLDENLANDIA capſulis ſubſeſſilibus hiſpidis, foliis lanceolatis. *Burm. ind. t. 15. f. 4.*
Cruſta ollae minima. *Rumph. amb. 6. p. 460. t. 170. f. 4.*
Pluk. phyt. 356. f. 5. ſec. Burm.
Habitat in India
Caulis *repens, filiformis, ramoſus, articulatus, ad ſingula genicula radicatus, laeuis.* Folia *oppoſita, ſubpetiolata, lanceolata, integerrima, laeuia, parua.* Flores *axillares, ſolitarii, alterni, ſubſeſſiles.* Capſula

pſula *ſubgloboſa*, *hiſpida*, *vndique pilis obtuſis cauis pellucidis*, *bilocularis*, *polyſperma*. Corollam *non vidi*.

orientalis. 4. ELAEAGNVS foliis ouatis oblongis opacis.
Elaeagnus orientalis latifolius, fructu maximo. *Tournef. cor.* 33?
Habitat in Oriente. *DD. Royen.*
Facies E. anguſtifolii, *ſed* Folia *duplo latiora*, *ouato-oblongiuſcula*, *vtrinque tactu mollia*, *iuſtus pallida*, *ſed neutra pagina nitentia aut argentea*. Flores *non vidi*.

laeuis. 4. RIVINA racemis ſimplicibus, floribus tetrandris, foliis glabris.
Piercea foliis ouato-lanceolatis glabris. *Mill. dict.*
Solanoides americana, circaea foliis glabris. *Tournef. act.* 1706.
Habitat in America. ♄.
Simillima R. caneſcenti, *ſed glabra tota*. *Folia margine purpuraſcente*.

virgata, 1. STRVTHIOLA pubeſcens.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.
Caulis *prolifer*. Ramis *ſimplicibus*, *virgatis*, *ſubuilloſis*. Folia *oppoſita*, *lanceolata*, *acuminata*, *glabra*, *ſtriata*, *canaliculata*. Flores *axillares*, *ſolitarii*, *ſeſſiles*, *longitudine folii*, *extus purpuraſcentes*.

erecta. STRVTHIOLA glabra.
Paſſerina dodecandra. *Sp. pl.* 513. *excluſo ſynonymo*.
Habitat ad Cap. b. ſpei.
Folia *lanceolato-ſubulata*, *glabra*, *vti caulis et flores*.

Pteranthus. 4. CAMPHOROSMA ramoſiſſima, pedunculis enſiformibus dilatatis, bracteis criſtatis.
Habitat in Arabia. ☉.
Radix *fibroſa*. Caulis *herbaceus*, *articulatus*, *palmaris*, *dichotomus ſ. trichotomus*, *vnde ramoſiſſimus*. Folia *linearia*, *ſubramoſa teretiuſcula*, *verticillata*: *duobus inferioribus paulo maioribus*. Flores *ſubſeſſiles*, *virides*, *parui*, *cincti membrana bifida breuiſſima*, *e qua vtrinque* Bracteae *imbricatae* 3, *foliaceae* (*quaſi foliorum rudimenta*). Capſula *globoſa*, *veſtita calyce patulo bicorni at* 2 *ariſtis exterioribus calycis foliolis*.

Pedunculus *membranaceus*, *dilatatus*, *maxime compreſſus*. H. U.

V. PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

violaceum. 9. ECHIVM coroliis ſtamina aequantibus: tuba calycibus breuiore.

Echium ſylueſtre hirſutum maculatum. *Bauh. pin. 254.*

Echium rubro flore. *Cluſ. hiſt. 2. p. 164.*

Habitat in Auſtria. ☉.

Simillimum E. vulgari, *ſed* Corollae *violaceae.* Caulis *magis diffuſus.* Stamina *corolla non longiora, purpurea, tamen ſtylo albo piloſo; Corollae tubus longitudine fere calycis;* facies *diſtincta.* H. U.

capitatum. 8. ECHIVM floribus capitato-corymboſis aequalibus, ſtaminibus corolla longioribus, caule piloſo, foliis hiſpidis.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.

Caulis *lignoſus*, *ramoſus*, *piloſus.* Folia *lanceolata*, *adſperſa ſetis patulis*, *pellucidis*, *baſi bulboſis.* Flores *denſe in capitula terminalia congeſti.* Corollae *regulares*, *infundibuliformes*, *vix Lycopſidis maiores.* Stamina *corollis et* ſtylus *ſtaminibus duplo longior. D. Royen.*

Arguſia. 1. MESSERSMIDIA. *Hort. vpſ. 36. Act. petrop. 1761. p. 315.*

Tournefortia ſibirica. *Sp. pl. 202.*

Arguzia montana. *Ammam. ruth. 38.*

Habitat in Dauriae *apricis*, *glareoſis*, *aridis.* 2. H. U.

viſcoſa. 1. NIGRINA.

Vaſculifera viſcoſa, calyce maiore. *Pet. muſ. 496. an?*

Habitat ad Cap. b. ſpei. *Burmannus.* 2.

Caules *herbacei*, *erecti*, *ſeſquipedales*, *teretes*, *ſcabri*, *non articulati.* Folia *oppoſita*, *ſeſſilia*, *lanceolata*, *ſcabra*, *dente vtrinque vnico validiore verſus baſin; ſuperiora ſenſim minora.* Flores *axillares*, *ſolitarii*, *penduli*, *pedunculati*, *pedunculo longitudine floris.* Bracteae *in medio pedunculi*, *duae*, *oppoſitae*, *lanceolatae*, *flore breuiores.*

Obſ.

Obſ. *Calyx Cucubali bacciferi. Corolla Lycopſidis pullae. Herba Lythri. Planta tota exſiccatione atra.*

longifolius. 1. LISIANTHVS foliis lanceolatis.
Liſianthus erectus, foliis lanceolatis, floribus ſingularibus terminalibus. *Brown. iam. 137. t. 9. f. 1.*
Rapunculus fruticoſus linifolius, flore luteo ſpecioſo, foliis ex aduerſo ſitis. *Sloan. iam. 58. hiſt. 1. p. 157. t. 101. f. 1.*
Habitat in Jamaicae *ſyluis.* ♄.

cordifolius. 2. LISIANTHVS foliis cordatis.
Liſianthus foliis cordatis, acuminatis, petiolis breuibus, floribus terminalibus quandoque geminis. *Brown. iam. 137.*
Habitat in Jamaica. ♄.
Antecedentis nimis affinis.

Jalapa. 45. CONVOLVULVS caule volubili, foliis difformibus cordatis angulatis oblongis lanceolatisque, pedunculis vnifloris. †
Conuoluulus foliis variis, pedunculis vnifloris, radice tuberoſa. *Mill, dict. n. 32.*
Conuoluulus americanus Jalapium dictus. *Rai. hiſt. 742.*
Bryonia Mechochana nigricans. *Bauh. pin. 298. prod. 137. Bauh. hiſt. 151.*
Jalapium, Mechoacanna nigra. *Dal. pharm. 201.*
Habitat in Mexico, Vera cruce. 2.
Semina *hirſuta ſunt. Haec vera* Jalapa *officinarum teſte Millero, qui huius radices ab Houſtono accepit, et Pharmacoeis Londinenſibus vendidit.*

ſericeus. 46. CONVOLVULVS foliis lanceolato-ellipticis ſubtus tomentoſo-ſericeis, pedunculis ſubumbellatis, calycibus piloſis, caule volubili. *Burm. ind. t. 17. f. 1.*
Habitat in India. ♄
Caulis *volubilis, fruteſcens, laeuiuſculus.* Folia *alterna, petiolata, lato-lanceolata, ſupra nuda, ſubtus tomentoſo-ſericea nitidaque, lineata, acuta.* Pedunculi *axillares, longitudine petiolorum, vmbelluliferi floribus ſaepius 5, inuolucro ouato ſericeo.* Calyces *maxime piloſi.*

anceps. 44. CONVOLVULVS foliis cordatis, caule volubili vtrinque carinato.

Habi-

Habitat in Zeylona, Jaua.

Caulis *uolubilis*, *anceps vtrinque carinatus*, *a folio ad folium.* Folia *ouata cordata oblonga laeuia. Mihi non floruit.* H. U-

muricatus. 47. CONVOLVULVS foliis cordatis, pedunculis incraſſatis calycibusque laeuibus, caule muricato.

Habitat in Surate. *Braad.*

Simillimus C. purpureo, *ſed* caulis *laeuis*, *adſperſus aculeis inermibus.* Folia *indiuiſa.* Pedunculi *ſaepius biflori*, *incraſſati.* Corolla *purpurea*, *infundibuliformis*, *magis quam C. purpurei. Diuerſus ab Ipomoea bona nox.* H U.

martinicenſis. CONVOLVULVS foliis elipticis glabris, pedunculis vnifloris folio longioribus, caule repente. *Jacq. amer. 26. t. 17.*

Conuoluulus floribus axillaribus ſolitariis, foliis oblongis obtuſis. *Loeſl. it. 231.*

Habitat in Martinicae *vmbroſis*, *inundatis.*

erinoides. 43. CAMPANVLA caulibus diffuſis, foliis lanceolatis ſubſerratis, decurrentibus linea ſcabra, floribus pedunculatis ſolitariis.

Campanula minor africana, erini facie, flore violaceo, caulibus erectis. *Herm. lugdb. 100. t. 111?*

Habitat in Africa.

Similis *Lobeliae erinoidi.* Caules *ramoſiſſimi.* Folia *alterna*, *lanceolata*, *vix manifeſte ſerrata*, *decurrentia vtrinque : margine minimo*, *aculeis ciliato.* Flores *ramulos terminant ſolitarii*, *pedunculati*, *erecti.* Germen *laeue.* Stylus *trifidus.*

tridentata. 42. CAMPANVLA capſula quinqueloculari obtecta, caule vnifloro, foliis radicalibus tridentatis. *Schreb. dec. 3. t. 2.*

Campanula orientalis pumila repens, flore magno. *Tournef. cor. 3.*

Habitat in Oriente.

Folia *Radicalia Statices reticulata*, *lanceolata*, *cuneiformia*, *apice ſaepe ſubtridentata.* Caulis *foliis duplo longior*, *foliis aliquot linearibus.* Flos *erectus*, *maiuſculus*, *ſolitarius.* Calyx *ſinubus*, *reflexis germen tegentibus.*

3. MVS-

spinosa. 3. MVSSAENDA spinosa, floribus sessilibus aggregatis. *Jacq. amer. 70. t. 49.* †.
Habitat in Martinicae, Carthagenae *sylvis.* ♄.
Ramuli vltimi Spinis *quaternis, cruciatim positis.* Flores *terminales, quatuor, conferti.*

formosa. 2. MVSSAENDA inermis, floribus solitariis sessilibus. *Jacq. amer. 70. t. 48.* †.
Habitat in Carthagenae *sylvaticis.* ♄.
Folia *opposita.* Corollae *tubus longissimus, hirsutus.*

hexandra. 2. PORTLANDIA floribus hexandris. *Jacq. amer. 63. t. 182. f. 20.*
Habitat in Carthagenae *sylvis.* ♄.
Folia huius basi aequalia; P. grandiflorae vero inaequalia.

boerhaui. 13. VERBASCVM foliis sublyratis, floribus sessilibus.
Verbascum foliis radicalibus ouatis petiolatis, caulinis oblongis sessilibus subtus tomentosis serratis. *Mill. ic. t. 273.*
Verbascum, blattariae foliis, nigrum, amplioribus floribus luteis, apicibus purpurascentibus. *Boerh. lugdb. 1. p. 228.*
Habitat in Europa *australi.*
Folia *sessilia, minime decurrentia, spatulata, basi angustiore, sinuata, vix tamen lyrata, supra nudiuscula, subtus subtomentosa.* Spica *similis V. Thapsi, floribus sessilibus, non confertissimis, sed ad bracteas singulas pluribus maioribusque.* Corollae *luteae genitalibus purpureis. H. U.*

muticus. 6. HYOSCYAMVS foliis petiolatis ouatis acutangulis, calycibus muticis, bracteis indiuisis.
Hyoscyamus albus aegyptius. *Alp. exot. 193. t. 192?*
Habitat in Aegypto, Arabia. ☿.
Caulis *pedalis, crassitie digiti, erectus, teretiusculus, subpubescens:* Ramis *axillaribus, breuioribus.* Folia *alterna, petiolata, ouata, obtuse sinuata, acutius vtrinque biangulata, acuta, laeuia, integerrima, pallescentia:* Petiolis *pubescentibus.* Floralia *folia subpetiolata, ouata s. ouato-oblonga, integra, alternis floribus bina, alternis solitaria.* Racemus *secundus apice incuruato.* Calyx *campanulato-infundibuliformis, quinquefidus: laciniis latiusculis, minimeque spinosis.* Co-

rolla

rolla *calyce paulo longior, non vero latior, ſubcampanulata, quinquefida: laciniis 3 ſuperioribus latioribus; inferioribus 2 minoribus, profunde ſeparatis; color corollae primum extus viridis, demum albidus; intus atropurpureus, laciniis infimis 2 albidis; vltimo corolla tota alba immaculata euadit.* Stamina 5 *declinata, purpurea, corolla paulo longiora.* Piſtillum *longius, declinatum.* H. U.

Scopolia. 7. HYOSCYAMVS foliis ouatis integris, calycibus inflatis campanulatis.

Atropa caule herbaceo foliis ouatis integris, calycibus erectis, fructu capſulari. *Scop. carn. 288.*

Scopola carniolica. *Jacq. ſpec. t. 20.*

Habitat circa Idr am *in ſyluis. Wilke.* 24.

Simillimus Atropae Belladonnae, *ſed* Caulis *vix vltra pedalis, dichotomus.* Folia *alterna, paſſim oppoſita, petiolata, lanceolato ouata, nuda, integra.* Pedunculi *axillares, filiformes, vniflori.* Flores *pendulati.* Calyx *quinque fidus laeuis muticus.* Corolla *campanulata.* Filamenta *hirta, recta.* Piſtillum *ſtaminibus longius.* Capſula *globoſa, circumſciſſa bilocularis.* H. U.

inſanum. 30. SOLANVM caule aculeato herbaceo, foliis ouatis tomentoſis, pedunculo pendulo apice incraſſato, calycibus aculeatis.

Solanum calycibus aculeatis, foliis ouatis integerrimis tomentoſis. *Hort. clif. 61. Hort. vpſ. 49. Fl. zeyl. 93.*

Solanum foliis multifidis ſegmentis oppoſitis, caule foliis & fructu aculeatis. *Gron. orient. 62.*

Solanum ſpinoſum, fructu rotundo. *Bauh. pin. 167.*

Solanum pomiferum magno fructu ex albo et atropurpureo nitente, foliis et calyce ſpinoſis. *Pluk. alm. 550. t. 226. f. 3. Moriſ. hiſt. 3. p. 524. ſ. 13. t. 2. f. 2.*

Habitat in Indiis. ☉.

Simillimum *Melongenae; Caule vix ramoſo, tomento ſtellato, foliis ſubſinuatis; Pedunculis ſolitariis vniflo-ris pendulis incraſſatis; Pomis magnis.*

Differt *Caule aculeis ſparſis; Foliis vtrinque aculeis raris rectis; Calyce multum aculeato.*

lycioides. 34. SOLANVM caule ſpinoſo fruticoſo. fol. ellipticis.

Habitat in Peru ? ♄.

Fru-

Frutex *facie Lycii.* Caulis *inermis ramis omnibus in ſpinam deſinentibus.* Folia *parua, lanceolato-ouata, ſ. lato-lanceolata, minus acuta, vtrinque laeuia, petiolata.* Corollae *rotatae, leuiter quinquefidae, absque tubo.* Calyx *dentibus quinque, acuminatis.* Antherae *corolla breuiores, luteae, erectae, apice dehiſcentes.* Stigma *adſcendens.* Flores *laterales, ſolitarii.*

hauanenſe. 32. SOLANVM caule inermi fruteſcente, foliis lanceolatis nitidis integerrimis, pedunculis ſubbifloris. *Jacq. amer. 49. t. 35.*
Habitat in Martinicae *ſyluis vmbroſis, maritimis.* ♄.
Flores et Baccae caeruleae,

racemoſum. 33. SOLANVM caule inermi fruteſcente, foliis lanceolatis repandis vndulatis, racemis longis rectis. *Jacq. amer. 50. t. 36.*
Habitat in Martinica. ♄.
Simillimum S. bahamenſi. *Flores albi. Baccae rubrae.*

baccatum. 3. CAPSICVM caule fruticoſo laeui, pedunculis geminis.
Capſici fruteſcentis *β huc amandanda.*
Habitat in Indiis. ♄.
Differt parum a C. fruticoſo: *Caule teneriore, magis fruteſcente, nec ſcabriuſculo. Baccis minimis, ouatis, magnitudine Ribeos; nec magnitudine Ceraſi. Ramis diuaricatis; nec angulo recto exeuntibus.* Calycibus *dentibus ſubulatis patulis: nec obſoletis.*

groſſum. 4. CAPSICVM caule ſuffruteſcente, fructibus incraſſatis variis.
Capſicum fructu longo, ventre tumido; per ſummum tetragono. *Tournef. inſt. 152.*
β. Capſicum fructu bifido. *Tournef. inſt. 152.*
Habitat in India. 24 - ♄.
Simillimum *C. annuo; ſed* Caulis *perennasn, ſpithamaeus, ſubramoſus.* Fructus *relatione ad plantam maximus, Mali fere magnitudine, varia in variis individuis forma, ſolitarius, erectus. H. U.*

europaeum. 3. LYCIVM foliis obliquis, ramulis flexuoſis teretibus.
Lycium foliis cuneiformibus. *Vir. cliff. 14. Sp. plant. 1. p. 192.*
Iaſminoides aculeatum, ſalicis folio, flore paruo ex albo purpuraſcente. *Mich. gen. 224. t. 105. f. 1.*
Rhamnus ſpinis oblongis, flore candicante. *Bauh. pin. 177.* *Habi-*

Habitat in Europa *auſtrali.* ♄.

Differt a L. barbaro, *quod per ſe recta ſtare valet; quod folia, etſi lanceolata, non plana, ſed obliqua ſ. flexuoſa; quod ramuli flexuoſi, minime angulati vlla linea a petiolo decurrente; ſuperficie non glabra, ſed ſubtomentoſa; et quod ſpinae ex omni gemma,* A. L. afro *foliis lanceolatis, ramulis flexuoſis, teretibus omnino differt.* H. U.

Melanophleos. 4. SIDEROXYLON inerme, fol. perennantibus lanceolatis, pedunculis angulatis.

Padus foliis oblongis, fructu ſolitario. *Burm. afric. 238. t. 84. f. 2.*

Laurifolia africana. *Comm. hort. 1. p. 195. t. 109.*

Habitat ad Cap. b. ſpei. *David. de Royen.* ♄.

Simillima *arbor S. inermi* Ramis *craſſis* (*ſed non ſtriatis aut punctis verrucoſis*). Foliis *perennantibus*, Pedunculis *breuiſſimis* (*ſed non teretibus*). *Burmanni* figura *hanc potius, quam S. inerme refert.* Dentes *inter Stamina nulli.*

decandrum. 5. SIDEROXYLON ſpinoſum, foliis deciduis ellipticis.

Habitat in America ſeptentrionali. *Munchauſen, Lib. Bar.*

Arbor. Spinae *axillares, ſolitariae.* Folia *alterna.* Pedunculi *axillares, vniflori, plurimi, petiolis paulo longiores.* Calyx *5-fidus, obtuſus.* Corolla *infundibuliformis, 5-fida, obtuſa. Laciniis concauis vix explicatis.* Nectarium *5-phyllum, ſerratum, breue, ad ſingulam corollae laciniam ſingulo lobo adnato.* Stamina 10. *ſubulata, longitudine nectarii.* Antherae *ſagittatae.* Germen *globoſum.* Stylus *filiformis.* Stigma *minimum.* Bacca *nigra, globoſa, 3 ſ. 5-locularis, abortiens plerumque. Simile eſt S. lycioidi, ſed ab eo aut ſpecie aut cultura nimis varians.*

tenax. 6. SIDEROXYLON inerme, foliis deciduis lanceolatis ſubtus tomentoſis, pedunculis filiformibus.

Habitat in Carolinae *ſiccioribus. D. Garden.*

Arbor 20 *pedum, cortice albicante, ramis tenaciſſimis.* Gemmae *alternae, e ſingulis* Pedunculi *pollicares, numeroſi, vniflori.* Folia *intra ſ. inter pedunculos 5. ſ. 6, petiolata, oblonga, obtuſiuſcula, integerrima, ſubtus*

ſubtus ſubtomentoſa, digiti longitudine et latitudine, conſiſtentia, annua. Flores *parui.* Calyx *ouatus: foliolis 5, ouatis, obtuſis, exterioribus latioribus, conniuentibus.* Coroliae *tubus longitudine calycis.* Limbus *5-partitus, laciniis ouatis, calyce breuioribus.* Nectarium *in fauce corollae, corolla paulo minus, quinquepartitum: foliolis triſidis: media fere longiore.* Stamina *longitudine corollae.* Germen *pentagonum.* Stylus *et* Stigma *ſimplex.* Drupa *oualis.* Nux *ouata, nitida, baſi foraminibus duobus, ſepto arcuato diſtinctis.* Statura *Chryſophylli ſ. Achras:* variat *ſpinis breuiſſimis, hinc inde in ramulis.*

fœtidiſſimum. 7. SIDEROXYLON inerme, foliis ſuboppoſitis, floribus patentiſſimis. *Jacq. amer. 55.* †.

Habitat in Domingo. †.

Folia *ſubalterna, lanceolato-oblonga, obtuſa, nitida.* Pedunculi *axillares, vniflori, copioſi.*

infectorius. 21. RHAMNVS ſpinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, caulibus procumbentibus. *Ger. prou. 462.* *

Rhamnus catharticus minor. *Bauh. pin. 478.*

Lycium gallicum. *Bauh. pin. 478. Bauh. hiſt. 1. p. 58.*

Spina infectoria pumila I. *Cluſ. hiſt. 1. p. 111.*

Habitat in Hiſpania, Gallia, Italia. ♄.

Frutex procumbens. Styli ſtigmata 2, reflexa. Differt a R. cathartico, corollae laciniis longitudine tubi, nec longioribus. Gerard.

pumilus. 22. RHAMNVS inermis repens, flor. hermaphroditis, fol. ſerratis. *Turr. diar. ital. 120.*

Frangula montana pumila ſaxatilis, fol. ſubrotundo. *Tournef. inſt. 612. Segu. veron. 2. p. 296.*

Frangula minima rupeſtris pruno ſylueſtri affinis americae foliis. *Rai, dendr. 65.*

Habitat in Mont. Baldo. ♄.

Differt a Frangula *Caulibus ſaxis adhaerentibus, foliis ſerratis; a* R. alpino *fl. hermaphroditis.*

lucidus. 6. CELASTRVS foliis ouatis nitidis integerrimis marginatis.

Euonymus aethiopicus, alaterni foliis rotundioribus duris et non crenatis. *Pluk. alm. 139. t. 280. f. 3.*

Habitat ad Cap. b. ſpei. *DD. Royen.* ♄.
Frutex *erectus: Ramis fuſcis, duris.* Folia *alterna, ouata ſ. obouata, obtuſiuſcula, venoſa, lucida, breuiſſime petiolata, margine integerrimo reflexo.* Pedunculi *axillares, conferti, ſimplices, folio breuiores.* Petala *concaua.* Stamina *corolla breuiora.* Stylus *craſſus.* Stigmata *tria, diuergentia.*

cupreſſina. 10. DIOSMA foliis ouatis triquetris imbricatis, floribus terminalibus ſolitariis ſeſſilibus.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.
Rami *filiformes, erecti, alterni, tecti* Foliis *imbricatis, alternis, ouatis, minutis* (*Ericae.*), *exacte triquetris, ſubſcabris, ſeſſilibus, erectis, apice calloſo colorato terminatis.* Flos *terminalis, ſeſſilis.* Calyx *membranaceus, lanceolatus, erectus.* Petala (*ſaepe* 4) *quinque, obouata, calyce duplo longiora, ſenſim in vngues deſinentia.* Stamina 5, *erecta, longitudine calycis.*

racemiflora. 1. CYRILLA.
Habitat in Carolinae *pinetis humentibus. D. Garden.* ♄.
Frutex *orgialis: Caule Ramisque compoſitis, ſ. ex apicibus annotinis tantum ramoſis.* Folia *alterna, petiolata, exſtipulata, lanceolata* (*Liguſtri*), *integerrima, glabra, ſupra ſubtiliſſime venoſa.* Racemi *plures, terminales, rami praecedentis anni, penduli, ſpithamaei,* bracteis *ſetaceis, longitudine pedicellorum.* Flores *albi.* Petala *diſco longitudinali villoſa.*

brachiata. 8. ACHYRANTHES caule herbaceo erecto brachiato, foliis oppoſitis glabris lanceolato-ouatis, ſpicis tomentoſis lateralibus.
Habitat in Suratte. ♄.
Caulis *pedalis, herbaceus, laeuis, erectus, Ramis brachiatis.* Folia *Achyranth. ſiculae, oppoſita, glabra, petiolata, lato-lanceolata.* Spicae *paruae, albo tomentoſae, confertae, inaequales, ſimiles Achyr. lanatae, ſed minores.* H. U.

alternifolia. 9. ACHYRANTHES caule herbaceo, floribus ſpicatis remotis, calycibus ſquarroſo-patulis, foliis alternis.
Habitat in Aegypto, Arabia. ☉.
Planta *erecta, facie Celoſiae.* Folia *alterna, petiolata, ouata ſ. cordata, laeuia, petiolis ſubciliatis.* Pedunculi

culi *axillares*, *pentagoni*, *foliis longiores*. Spica *floribus distantibus*.

dichotoma. 10. ACHYRANTHES caulibus suffruticosis, fol. linearibus planis, floribus cyma dichotoma.
Habitat in Virginia.
Caules *suffruticosi*, *articulati*, *teretes*, *diffusi*. Folia *opposita*, *linearia*. *plana*, *acuta*, *margine scabra*, *articulis caulinis duplo longiora*, *stricta*, *patula*. Stipulae *oppositae*, *membranaceae*, *lanceolatae*, *foliis latiores*, *longitudine articulorum*, *persistentes*, *intra foliacea*. Cyma *una alteraue*, *terminalis*, *quadripartita*, *dichotoma*. Calyces *monophylli*, 5-*partiti*: *foliolis subulatis*, *striatis*, *rigidis*, *extra apices aristatis*. Corolla *nulla*. Stamina *intra singula foliola calycis singula*. Stylus *simplex*. Capsula *monosperma*. Similis *Achyranthi corymbosae*.

arabicum. 11. ILLECEBRVM floribus sparsis congestis bracteas nitidas aequantibus, caulibus procumbentibus.
Habitat in Arabia. *Forrskahl*.
Simillimum J. Paronychiae, *at* Flores *non in capitula terminalia*, *sed per totum caulem sparsa congestaque*, *bracteis non flore longioribus*. Stamina *basi connexa vrceolo quinquedentato*, *dentibus staminibus interpositis*. Styli *duo*. Folia *Paronychiae*, *sed angustiora*, *H. U.*

alsinifolium, 12. ILLECEBRVM floribus congestis bracteis nitidis, caulibus diffusis, foliis ouatis.
Paronychia hispanica supina alsinifolia, capitulis minoribus. *Tournef. hist. 508*.
Habitat in Hispania.

paniculatum. 7. THESIVM totum paniculatum.
Habitat ad Cap. b. spei.
Caulis *sublignosus*, *pedalis*, *totus quantus in paniculam floriferam effusus*, *more Galii*. Folia *minuta*, *linearia*, *alterna*, *supremaque subulata*. Flores *minuti*, *pedunculati*. Calyx *inferus*, 3 *s.* 4 *s.* 5-*fidus*, *sed spatio remotus*, *vnde non proprius*; Calyx superus *vt in congeneribus*. Fructus *facie Coriandri*. Multi *flores abortiunt*.

ventoſa. 1. PLECTRONIA.
Rhamnus foliis ſubrotundo-acuminatis, fructu racemoſo. *Burm. afr. 257. t. 94.*
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.
Arbor *Ramis tetragonis.* Folia *oppoſita, petiolata, lanceolato-ouata, integerrima, laeuia, internodiis longiora.* Corymbi *capillares, brachiati, foliis breuiores.*

hiſpinoſa. 2. ARDVINIA.
Lycium foliis cordato-ouatis oppoſitis ſeſſilibus perennantibus, ſpinis craſſis bigeminis, floribus confertis. *Mill. ic. t. 300.*
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.
Frutex *dichotomus.* Spinae 2, *bigeminae ſ. bis bifidae, erectae.* Folia *ſubſeſſilia, oppoſita, cordata, integerrima, perennia.* Flores *terminales, conferti ſ. faſciculati, albi.* Baccae *rubrae.* Facies *inter Randiam et Peneam media.*

Carandas. 1. CARISSA.
Carandas. *Rumph. amb. 7. p. 57. t. 25.* vide *Pluk. phyt. 305. f. 4.*
Habitat in India. ♄.
Arbor *Ramis dichotomis.* Folia *oppoſita, petiolata, obtuſa, laeuia, integerrima.* Spinae *axillares (non tamen ex omnibus alis), oppoſitae, foliis breuiores, patentes.* Pedunculi *ſubterminales, gemini, triflori pedicellis aequalibus.* Flores *Jaſmini facie.*

foetida. 1. PAEDERIA.
Conuoluulus foetidus. *Rumph. amb. 6. p. 436. t. 160.*
Habitat in Jndia. 4.
Caulis *volubilis, laeuis.* Folia *oppoſita, petiolata, cordata, oblonga, integerrima, laeuia.* Paniculae *axillares, brachiatae.*

caudata. 10. ECHITES corollis infundibuliformibus: apicibus linearibus longiſſimis. *Burm. ind. t. 24.*
Habitat in India. ♄.
Arbor. Folia *oppoſita, petiolata, lanceolato-elliptica, integerrima, nuda.* Flores *axillares, pedunculati, erecti, magnitudine Nerii, infundibuliformes:* Limbo *quinquefido, erecto, terminato apicibus linearibus, longiſſimis, coralla tota longioribus, quibus ab omnibus notis plantis differt.*

11. ECHI-

ſcholaris. 11. ECHITES foliis ſubuerticillatis oblongis, folliculis filiformibus longiſſimis, vmbellis compoſitis.
Lignum ſcholare. *Rumph. amb. 2. p. 246. t. 82.*
Habitat in India ♄.
Arbor *ramis ad genicula tantum foliatis.* Folia *verticillata, ad genicula 5 ſ. 7, ouali lanceolata, coriacea tranſuerſe ſtriata, integerrima, petiolata.* Pedunculi *aliquot inter folia enati, longitudine foliorum.* Vmbella *compoſita:* Flores *parui:* Folliculi *bini, ſeſquipedales, filiformes, foliis triplo longiores; adeoque longiores vllis folliculis notis.*

grandiflora. 5 TABERNAEM. foliis oppoſitis, caule dichotomo, calycibus inaequalibus laxiſſimis. *Jacq. amer. 40. t. 31.*
Habitat Carthagenae.
Folia *lanceolato-ouata,* Pedunculi *ſubtriflori.* Calycis *folia ſcarioſa, alba: exteriora 2 cordata; reliqua anguſta.*

cymoſa. 6. TABERNAEM. foliis oppoſitis, floribus cymoſis. *Jacq. amer. 39. t. 181. f. 14.*
Habitat Carthagenae.
Folia *ſemipedalia.* Cymae *denſae, connexae.* Folliculi *rubeſcentes pulpa aurantia.*

DIGYNIA.

glabra. 1. PERGVLARIA foliis ouatis glabris.
Flos pergulanus. *Rumph. amb. 5. p. 51. t. 29. f. 2.*
Habitat in India. ♃.
Caulis *volubilis, laeuis.* Folia *oppoſita, petiolata, ouata, acuta, integerrima, glabra.* Pedunculi *axillares, ſubdiuiſi, alterni.*

tomentoſa. 2. PERGVLARIA foliis cordatis tomentoſis.
Habitat in Arabia. *Forſtkahl.* ♄.
Caulis *volubilis, teres, tomentoſus.* Folia *oppoſita, petiolata, cordata, acuta, integerrima, glabra.* Vmbellulae *axillares, alternae, pedunculatae.* Corollae *figura Kalmiae. H. U.*

planiflorum. 6. CYNANCHVM caule volubili, foliis cordatis glabris ſubtus tomentoſis, pedunculis ſubracemoſis.
Jacq. amer. 82. t. 55.
Habitat Carthagenae. ♃.

racemosum. 7. CYNANCHVM caule volubili, foliis cordatis glabris acutis, racemis simplicibus. *Jacq. amer. 81 t. 54.*
Habitat Carthagenae. 4

maritimum. 8. CYNANCHVM caule volubili, foliis cordatis hirsutis subtus tomentosis, pedunculis aggregatis. *Jacq. amer. 86. t. 56.*
Habitat in Terra Bomba. 4.
Planta *hirsuta*. Pedunculi *plures*, *uniflori*, *congesti tanquam in umbellulam sessilem*. Corolla *atropurpurea*.

undulatum. 9. CYNANCHVM caule volubili, foliis lanceolato-ouatis glabris, umbellulis globosis. *Jacq. amer. 85. t. 58.*
Habitat Carthagenae. 4
Planta glabra.

polyclonos. 12. SALSOLA sublignosa diffusa, foliis oblongis, calycibus marginatis glomeratis coloratis.
Anthylloides rotundifolia ficula, euphrasiae floribus rubentibus. *Bocc. mus. 2. p. 34 t. 34.*
Pedicularis minima polyclonos humifusa. *Barr. rar. 214. t. 275.*
Habitat in Siciliae Hispaniae *maritimis.*
Caules *sublignosi*, *ramosissimi*, *diffusi.* Folia *oblonga*, *carnosa*, *mutica.* Flores *axillares terminalesque*, *glomerati*, *sessiles.* Calyx *infundibuliformis*, *quinquepartitus*, *membranaceus limbo plano*, *paruo*, *colorato.*

muricata. 13. SALSOLA fruteſcens ramulis hirsutis, calycibus spinosis,
Chenopodium maritimum, ramulis virgatis. *Buxb. cent. 3. p. 27. t. 49.*
Habitat in Europa *australi*, Aegypto. ♄.
Suffruteſcens, *patula planta*, *similis S. prostratae.* Caules *minus pubescentes.* Folia *linearia*, *mutica*, *hirsuta*, *albida.* Calyces *axillares*, *sessiles*, *parui*, *monophylli*, *glabri*, *cartilaginei: radiis* 5, *subulatis*, *mucronatis*, *pungentibus*; *in cuius fundo hirsuto latet* semen *nigrum.*

jauana. 1. STERIS.
Habitat in India. 4.

Plan-

Planta *herbacea*, *ſtatura Capſici.* Caulis *herbaceus*, *ramoſiſſimus*, *laeuis.* Folia *alterna*, *petiolata*, *ouali-oblonga*, *integerrima*, *acutiuſcula*, *laeuia.* Pedunculi *nunc oppoſitifolii*, *nunc axillares*, *nunc terminales*, *ſubdiuiſi aut vniflori.* Corollae *caeruleae*, *magnitudine Capſici.*

maritima. 30. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformibus, ſtylis geminis, caule dichotomo pauciflo-ro. *Ger. prou. 311.*

Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule ſimplici apice dichotomo, floribus pedunculatis. *Gouan. monſ. 35.*

Centaurium luteum puſillum non perfoliatum. *Bauh. pin. 278.*

Centaurium minus luteum latifolium et anguſtifolium non perfoliatum. *Bocc. muſ. 2. p. . . t. 76. Barr. ic. 468. 469.*

Centaurium luteum nouum. *Col. ecphr. 2. p. 78. t. 77.*

Habitat in Italiae, Galliae *auſtralis maritimis.* ☉.

Similis G. Centaurio, *ſed flores pedunculati*, *lutei. Folia vnineruia*, *nec trineruia.*

pyrenaica. 29. GENTIANA corolla infundibuliformi-decemfida aequali: laciniis exterioribus rudioribus.

Habitat in Pyrenaeis. 4.

Simillima *G. vernae*, *ſed* Corolla *non 5-fida*, *verum aequaliter* 10-*fida*, *laciniis obtuſis: alternis ſ. exterioribus ſubtus viridibus; omnibus intus caeruleis.* Folia *linearia ſ. lineari-lanceolata.* Caulis *perennis*, *procumbens ramis erectis*, *vnifloris*, *flore longitudine rami.*

peregrinum. 8. TORDYLIVM ſeminibus ſulcatis rugoſis plicatis, inuolucro vniuerſali monophyllo ſubtrifido.

Caucalis peregrina, ſemine rugoſo. *Bauh. pin. 153.*

Caucalis hiſpanica. *Cam. hort. 37. t. 11.*

Habitat in Oriente. *D. Arduini.*

Caulis *laeuis*, *ramoſus.* Folia *Cerefolii.* Vmbella vniuerſalis *radiis ſubtribus*; partialis *ſubſeptenis.* Inuolucrum *folio vnico lineari*; Inuolucella *foliolis 5*, *longitudine floſculorum.* Floſculi *omnes fertiles*, *floſculoſi*, *albi.* Semina *ouata*, *ſubcompreſſa*, *ſulcis 3 profundis*, *qui lateribus lameliato plicati-ſunt.*

copticum. 3. AMMI foliis ſupradecompoſitis linearibus, ſeminibus muricatis.

Habitat in Ægypto. *Forſtkahl.* ⊙.

Statura *Anethi, viridis.* Caulis *laeuis, ſtriatus.* Folia *tripinnata, oblonga, laeuia, linearia.* Vmbella vmbellulaeque *radiis* 10, *non magnae.* Inuolucrum *foliolis 5, linearibus, longitudine radiorum: variis trifidis.* Inuolucella *foliolis 7, acutis, linearibus, indiuiſis: interioribus 4 breuiſſimis; reliquis longitudine radiorum.* Corollae *albae, aequales, quinquangulae.* Fructus *quatus, vndique muricatus.* Semina *ſtriata, 5 torulis, vndique muricata, magis gibba quam lata, aromatica. H. U.*

rigens. 4. CONIVM ſeminibus ſubmuricatis, pedunculis ſulcatis, foliis canaliculatis obtuſis.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.

Similis C. africano, *ſed maius, erectum, rigens.* Caulis *purpuraſcens, ſtriatus, rigidus, erectus, diffuſus, ramoſus, ſtriatus.* Pedunculi *ſtriati (africani laeues).* Petioli *longitudinaliter canaliculati (africani teretes).* Folia *bipinnata, ſubcarnoſa, canaliculata, parua, obtuſiuſcula, coarctata, caeſia vt rutae; non ſemper oppoſitifolia.* Floſculi *omnes fertiles (africani multi ſteriles), albi.* Semina *rubicunda, muricata, ſimulque ſtriata (vt in C. europaeo): vix centrale ſeſſile (vti C. africani). H. U.*

ſibirica. 10. ATHAMANTA foliis pinnatis inciſo-angulatis.

Hort, Vpſ. 60. * *ſub Selino.*

Habitat in Sibiria. 2.

Simillima A. Ceruariae, *cum qua in ſpeciebus coniunxi; collatis vltimo vtrisque video eas nonnihil differre et diſtinctas eſſe. H. U.*

ſimplex. 10. LASERPITIVM ſcapo nudo aphyllo, foliis pinnatis multifidis linearibus acutis, vmbella ſemigloboſa.

Laſerpitium foliis multifidis lanceolatis, radiis vmbellae trifidis. *Hall. emend. III. n. 202.*

Habitat in Alpibus auſtriacis. *D. Jacquin.*

Folia *pinnata: pinnis multifidis, inciſis, anguſtis, acutis.*

6. HE-

anguſtifolium. 6. HERACLEVM foliis cruciato-pinnatis : foliolis linearibus, corollis vniformibus.

Sphondylium hirſutum, foliis anguſtioribus. *Bauh. pin. 157. prodr. 83. Riu. pent. 5.*

Sphondylium hirſutum minus, foliis tenuiter laciniatis. *Pluk. phyt. 63. f. 3.*

Habitat in Suecia, Anglia. ♃.

Olſ. Heracleum anguſtifolium. *Jacq. vind. 217. t. 2. f. 1, 2. vix diuerſum videtur.*

Statura H. Sphondyli, *ſed foliola anguſtiſſima, linearia, ad petiolum communem pinnata cruciatim, ſcilicet ad ſingula genicula quaterna: anteriore foliolo baſi lobato. Ob Corollas virides vniformes remoueo nunc hanc a Sphondylio.*

trichoſperma. 9. SCANDIX ſeminibus hirſutiſſimis : pilis ſemine duplo longioribus.

Habitat in Aegypto. *D. Ant. Turra.* ☉.

Caules *plures, obliqui, ſemipedales, ramoſi, flexuoſi, fere glabri.* Folia *bipinnata, glabra, ſubtus pallidiora:* Foliolis *ouato-lanceolatis, incifo-ſerratis, margine ſcabris:* petiolis *ſubpiloſis.* Pedunculi *oppoſitifolii.* Vmbella vniuerſalis *radiis 3 f. 4, inaequalibus;* partialis *10 f. 12, ſubaequalibus.* Inuolucella partialia *foliolis 7, ſubulatis, longitudine vmbellulae.* Flores *conformes, carnei, fertiles.* Semina *piloſiſſima, pilis ſemine duplo longioribus.*

coloratum. 8. CHAEROPHYLLVM caule aequali, foliis ſupradecompoſitis, inuolucellis coloratis.

Myrrhis perennis lutea daucoides. *Moriſ. hiſt. 3. p. 302. ſ. 9. t. 10. f. 6. Pluk. phyt. 100. f. 5. forte.*

Habitat in Illyria. *D. Arduini.*

Caulis *teres, hirſutus, imprimis inferne.* Folia *Selini Thyſſelini, adſperſa pilis raris.* Vmbella *Chaer. ſylueſtris.* Inuolucella *ouata, acuminata, luteo-colorata vt in Bupleuris, longitudine pedicellorum.* Floſculi *varii ſteriles.* Fructus *Ch. aurei, ſed tenuius ſtriati, a quo differt omnino foliolis pilisque diuerſis.*

garganica. 5. THAPSIA foliis pinnatis: foliolis pinnatifidis : laciniis lanceolatis.

Thapſia ſ. Turbith garganicum, ſemine latiſſimo. *Bauh. hiſt. 3. p. 50.*

Thapſia thalictri folio. *Magn. monſp. 287. t. 286.*

Habitat in Barbaria, Gargano *Apuliae. Gouan.* 24.
Folia *glabra*, *pinnata* : Foliola *ſeſſilia*, *ſubtus pallidiora*, *pinnatifida ſ. pinnato-partita* : Laciniis *lanceolatis*, *diſtantibus*, *parum refalcatis*, *integerrimis*, *exceptis infimis iterum tripartitis.*

lucida. 3. PASTINACA foliis ſimplicibus cordatis lobatis acute crenatis lucidis.
Paſtinaca folio quaſi libanotidis latifoliae. *Boerh. lugdb. 1. p. 67.*
Habitat in Europa *auſtrali.* 24.
Caulis *laeuis*, *ſeſquipedalis et vltra.* Folia *cordata*, *ſublobata*, *rigidula*, *rugoſa*, *lucida*, *margine acute crenulata ſ. ſerrata.* Petala *lutea*, *integra*, *acuta*, *inflexa.* *Semina compreſſa*, *orbiculata.* H. U.

dichotoma. 5. PIMPINELLA pedunculis oppoſitifoliis, foliis floriferis bitrifidis, petiolis alato-membranaceis.
Habitat in Hiſpania.
Planta *ſemipedalis*, *ramoſiſſima*, *dichotoma.* Folia *inferiora triternata*, *ſuperiora biternata*, *fere linearia*, *breuiora*, *acuta*: Petiolis *vtrinque auctis membrana latiore*, *quam in reliquis*, *plane membranacea*, *alba.* Pedunculi *oppoſitifolii*, *folio multo longiores*, *ex omnibus alis ſinguli*, *vnde copioſi.* Vmbellae vniuerſalis *radii* 5 *ſ.* 6. Petala *alba*, *incuruo-emarginata.* Fructus *ſubgloboſi*, *ſtriati.*

TRIGYNIA.

Sidoides. 4. TVRNERA pedunculis axillaribus biſetis, foliis obouato-cuneatis ſerratis.
Habitat in Braſilia. *D. Arduini.*
Caules *palmares*, *ſimplices*, *piloſi.* Folia *alterna*, *ſubſeſſilia*, *cuneato-obouata*, *profunde ſerrata*, *verſus baſin integerrima*, *vtrinque leuiſſime tomentoſa*, *ſubtus venis margineque piloſa.* Flores *axillares*, *ſolitarii*, *breuiſſime pedunculati.* Bracteae *in pedunculo binae*, *oppoſitae*, *lineares*, *hirtae*, *longitudine calycis.* Calyx *turbinatus*, *quinquefidus*, *piloſus.* Petala *obouata*, *calyci inſerta.* Stamina 5, *petalis dimidio breuiora.* Styli *tres.*
Conuenit cum Turn. ciſtoide *Caule piloſo: ſed illa caret Bracteis tomentoque foliorum.*

PEN-

PENTAGYNIA.

incana. 14. STATICE ſcapo paniculato, foliis lanceolatis trineruibus ſubundulatis, paniculae ramulis angulatis.
Habitat in Arabia *Forshahl.* 2.
Folia *radicalia*, *eliptico-lanceolata*, *trineruia*, *incana*, *ſubundulata*, *apice mucronata*. *Scapus teres* Ramis *triangularibus*. Flores *albi*. H. U.

minuta. 15. STATICE caule ſuffruticoſo folioſo, foliis confertis cuneatis glabris muticis, ſcapis paucifloris.
Limonium maritimum minimum. *Bauh. pin. 192. prodr. 99. Bocc. ſic. 26. t. 13. f. 3.*
Limonium fruticoſum minimum glabrum. *Pluk. alm. 221. t. 200. f. 5.*
Limonium ſiculum, folio cordato. *Bocc. ſic. 64. t. 34.*
Habitat ad Mare Mediterraneum. ♄.
Plantae *longitudo vix digiti*. Flores *pallide rubentes*.

purpurata. 16. STATICE caule ſubfolioſo, foliis obouato-cuneatis trineruibus mucronatis.
Habitat ad Cap. b. ſpei. 2.
Folia *radicalia*, *obouato-lanceolata*, *laeuia*, *petiolata*, *obtuſa*, *mucrone terminali*; *caulina pauca*. Scapus *ſubnudus*, *ramoſus*. Calyces *purpuraſcentes radiis* 5 *ſanguineis*. Corollae *purpuraſcentes*. *Simillima* S. Limonio, *ſed folia obtuſiora*. *Flores duplo maiores colorati*. Folia *in ſcapo ſupra radicem nonnulla*.

pruinoſa. 17. STATICE caule flexuoſo ramoſo furfuraceo.
Limonium galliferum, foliis cylindraceis. *Shaw. aſr. 369.*
Habitat in Palaeſtina.
Caulis *flexuoſus ramis alternis*, *caule breuiori lus*; *teres*, *furfuraceus*, *vt tota planta*. Stipula *ſub ſingulo ramo lanceolato-ſubulata*, *laeuior*. Rami *ſimiles caulis ramulis geminis obtuſis geniculatis*. *Folia radicalia non vidi*, *nec fructificationem* (*pulchre rubram Shaw*, *qui Ramulos pro foliis habuit*).

verticillata. 1. MAHERNIA.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.
Caulis *fruticoſus*, *diffuſus* Ramis *filiformibus*. Folia *verticillata*, *ſaepe* 8 *a* 10, *linearia*, *vix diuiſa aut pinnatifida*. Modus *fructificandi Hermanniae*, *terminalis*, *pedunculis ſaepius biſloris*. Flores *lutei*.

Obſ.

Obſ. Nectaria *demas petalis, eaque addas ſtaminibus, habebis Hermanniam, quamuis paradoxam foliis verticillatis. Mira metamorphoſis generica!*

flaua. 19. CRASSVLA foliis planis connato-perfoliatis laeuibus, floribus corymboſo-paniculatis.
Craſſula foliis teretibus, floribus in infimo caule luteis. *Burm. afr. 37. t. 23. f. 2.*
Sedum africanum vmbellatum, flore flaueſcente, glabrum *Pluk. alm. 340. t. 314. f. 2.*
Habitat ad Cap. b. ſpei, ♄.
Caulis *erectus*, *Craſſulae coccineae*, *perfoliatus foliis non ciliatis.* Flores *faſciculati*, *ſed ſinguli pedicellati.* Petalis *flauis*, *erectis*.

pruinoſa. 20. CRASSVLA caule fruticoſo dichotoma, foliis ſubulatis pruinoſo-ſcabris, floribus ſubcorymboſis.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.
Frutex *pedalis*, *dichotomus Ramulis teretibus*, *ſanguineis*, *adſperſis*, *vti tota planta*, *pruina cryſtallina.* Folia *oppoſita*, *linearia*, *carnoſa*, *ſupra plana*, *longitudine internodiorum*, *pruinoſa*, *obſolete connata.* Corymbi *terminales*. *inaequales*, *parui.* Petala *alba*, *lanceolata*, *patentia.*

glomerata. 21. CRASSVLA caule herbaceo dichotomo ſcabro, foliis lanceolatis, floribus vltimis ſubfaſciculatis, petalis calycibus minoribus.
Ficoides africana annua minima muſcoſa. *Herm. par. 170.*
Habitat ad Cap. b. ſpei. ☉.
Caulis *herbaceus palmaris*, *erectus*, *dichotomus*, *ſcaber*, *teres*, *purpuraſcens.* Folia *oppoſita*, *lanceolata*, *carnoſa*, *ſeſſilia*, *patentiſſima*, *acutiuſcula.* Flores *e dichotomia ſolitarii*, *ſubpedunculati*, *ſolitarii*, *magnitudine Polycarpi.* Flores terminales *ramulorum conferti in capitula*, *vt in Valer* : *Locuſta aut Scleranthо.* Calyx *monophyllus*, *quinquepartitus*; *foliolis ouatis*, *conuexis*, *acutis*, *erecto patulis.* Petala 5, *ouata*, *alba*, *calyce triplo minora adeoque minuta*, Stamina 5. *Petalis* ½ *minora*, antheris *luteis.* Piſtilla 5. Styli *vix vlli.* Stigmata *ſtaminibus breuiora.*
Folia *paſſim baſi ſubciliata.* *Planta adulta rufeſcens exceptis petiolis.* H. U.

21. CRAS.

obuallata. 21. CRASSVLA foliis oppositis sublanceolatis cultratis sessilibus approximatis.
Habitat ad Cap. b. spei. ♄.
Simillima est C. cultratae, *et crassioribus maxime affinis ob flores, cuius petala alba spatulata, apice aristata globo, vt in cultrata, nec vnquam explicanda, sed differt* Caule *palmari, breuiore patente.* Foliis *duplo longioribus maioribusque minime basi contractis, oppositioribus confertissimis nec spatio remotis, marginibus, imprimis recentiorum, tenuissime crenulatis, minime obliquis vt in illa.*

fruticulosa. 22. CRASSVLA foliis subulatis acutis patentibus subrecuruis.
Habitat ad Cap. b. spei. ♄.
Statura accedit ad Crassulam tetragonam, sed differt, quod Caulis *pedalis, nec 3 s. 4-pedalis; erectus, viridis, nec rufescens; ramis angustis fere filiformibus.* Folia *opposita, horizontalia, oblonga, teretia, acuminata, supra non depressa, potius subtus; et parum retrorsum arcuata, vt referat Salsolam fruticosam. Flores mihi non dedit.* H. U.

VI. HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

papilionacea. 4. TRADESCANTIA repens laeuis, spatulis cordatis triphyllis imbricatis.
Habitat in India. *Burmann.* ⊙.
Radix *fibrosa.* Caules *tripollicares, articulati, ad genicula radicantes.* Folia *lineari-lanceolata, erecta, sessilia, basi subciliata: Vagina latiuscula, breuissima.* Spatha *terminalis, cordata, deorsum complicata, margine subciliata; sub hac* Foliola 2, *lanceolato-lunata, superiori breuiore; inter quae flos;* carinae *loco, inter praedicta 2 foliola alia proditura spatha, etiamnum breuis, cum suis foliolis nondum conspicuis; sic refert Spatha florem papilionaceum. Filamenta 6, pilis articulatis, vt in Tr. virginica et stigma tubulosum, nec non Antherae omnes perfectae, adeoque omnino Tradescantiae genuina species. Corolla et filamenta caerulea. Antherae luteae.*

14. NAR-

orientalis. 14. NARCISSVS ſpatha ſubbiflora, nectario campanulato triplo breuiore trifido emarginato.
Narciſſus niueus, calyce flauo odoris fragrantiſſimi. *Rudb. elyſ. 2. p. 52. f. 2. Raus. pin. 50.*
Narciſſus latifolius ſimplex medio luteus. *Cluſ. hiſt. 1. p. 154.*
β. Narciſſus orientalis, calyce rotundo aureo-luteo. *Rudb. elyſ. 2. p. 54. f. 5. Bauh. pin. 50.*
Narciſſus orientalis medio croceus maior. *Besl. eyſt.*
γ. Narciſſus albus maior odoratus. *Rudh. elyſ. 2. p. 50. f. 1. Bauh. pin. 49.*
Narciſſus latifolius maior alter. *Cluſ. hiſt. 1. p. 155.*
Habitat in Oriente, 2|.
Species latifolia, facie Tazette. Corolla *alba.* Nectarium *erectum, dimidio vel triplo petalis breuius, trifidum, flauum lobis emarginatis.* H. U.

odorum. 38. Allium ſcapo nudo teretiuſculo, fol. linearibus canaliculatis ſubtus angulatis, vmbella faſtigiata.
Habitat in Europa *auſtrali.* 2|.
Folia *baſi connexa in calmum ſ. faſciculum ſtipitatum, linearia, longa, vix carnoſa, ſubtus ſtriata, ſupra canaliculata. minime hirſuta.*
Scapus *pedalis, teres, vel vnico obſcuro angulo, aphyllus, erectus, pedalis.* Spatha *breuis, cum rudimentis ſpathaceis ſ. membranaceis inter omnes pedunculos.* Pedunculi *plurimi, erecti, floribus longiores.* Corollae *albae, odoratae : petalis ouato-oblongis, acutiuſculis, erectiuſculo-patulis, carina ruſeſcente.* Stamina *ſubulata, ſimplicia, corollae ½ breuiora.* Germen *punctis excauatis, cinereum.* Stylus *albus.* H. U.

ſimplex. 2. GLORIOSA foliis acuminatis. †.
Glorioſa foliis ouato-lanceolatis acutis. *Mill. dict. 2.*
Habitat in Senegal.
Folia *non cirrhoſa.* Flores *caerulei.*

vniflorum. 12. ORNITHOGALVM ſcapo diphyllo, pedunculo vnifloro.
Habitat in Sibiriae *montis Sini Sopka ſummo apice. Eric. Laxman.*
Planta *refert omnino O. luteum, ſed* pedunculus *indiuiſus, vniflorus. Flos dimidio minor Tulipae ſylueſtris, ſed triplo maior Orn. lutei.* Petala *lanceolata, obtuſiuſcula,*

ſcula, lutea, ſubtus viridia. Filamenta *et* Antherae *luteae, petalis breuiores.* Germen *oblongum.* Stylus *longitudine ſtaminum.* Stigmata *tria, obtuſa, onia lutea.* Folia *caulis 2, altero ſuperiore, longitudine ambo floris ſ. plantae, ornith. lutei duplo latiora.* H. U.

enſifolia. 1. DRACAENA herbacea cauleſcens, foliis enſiformibus.
Gladiolus odoratus indicus. *Rumph. amb. 5. p. 145. t. 73.*
Habitat in India. 24.
Folia *enſiformi-lanceolata; eneruia, ſubtus carinata, petiolata.* Scapus *ſ. Caulis ramoſus, paniculatus, ad exortum ramorum Foliolis duobus, paruis, coloratis.*

aethiopicus. 11. ASPARAGVS aculeis ſolitariis reuerſis, ramis angulatis, foliis lanceolato-linearibus.
Aſparagus aculeatus africanus, corudae 3 cluſii ſimiliis. *Raj. ſuppl. 359. n. 5. et 2.*
Habitat ad Cap. b. ſpei. 24.
Similis *A. falcato, ſed* Folia *minora 7 circiter, nec 3.* Stipulae *emittunt ſpinam retro ſpectantem.* Rami *flexuoſi, angulati, quaſi fruticoſi, virides.* H. U.

Jacquini. 19. IVNCVS folio ſubulato, capitulo ſubquadrifloro terminali. *Jacq. vind. 237. t. 4. f. 2.* †.
Habitat in Schneberg Auſtriae, 24.
Caulis *folio vnico, ſaepius elongato.* Flores *in capitulum, fuſco-purpurei, 4-7, glumis communibus propriisque fuſcis excepti, ſextuplo maiores quam in* J. biglumi, *a quo diuerſiſſimus.*

pentandrus. 7. LORANTHVS foliis alternis petiolatis, racemis ſimplicibus, floribus quinquefidis.
Habitat in India. ♄.
Frutex *Ramis ad folia dilatatis.* Folia *alterna, petiolata, ſubeneruia, figura Lauri.* Racemi *axillares, ſolitarii ſ. bini, petiolis paulo longiores.* Corollae *ſemiquinquefidae.* Filamenta *quinque, e medio laciniarum corollae, antheris breuiora.* Antherae *erectae, longitudine corollae.*

ſpicatus. 8. LORANTHVS ſpicis quadrangularibus. *Jacq. amer. 97. t. 68.*

Ha-

Habitat Carthagenae. *parasiticus.* ♄.
Folia *opposita*, *obtusa*, *nervosa.*

TRIGYNIA.

luxurians. 28. RVMEX floribus .... foliis cordato-hastatis, caulibus decumbentibus angulatis.
Acetosa fagopyri folio. *Bocc. mus. 165. t. 126.*
Habitat in Alpibus Bononiensibus. 4.
Radix *Filipendulae*, *tuberosa.* Caules (*in horto*) *pedales sesquipedalesue*, *prostrati*, *copiosi*, *ramosi*, *pentagoni*, *striati.* Folia *ambitu cordata*, *hastata* (*figura Ari maculati*), *acidissima*, *margine purpurascenti*, *undulato*, *vix crenulato. Differt a* Rumice scutato *caule angulato*, *nec teretiusculo*; *foliis cordato-hastatis*, *nec lanceolato-sagittatis*; *mihi non floruit in* H. U.

VIII. OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

hybridum. 4. TROPAEOLVM foliis subpeltatis subcuneatis quinquelobis. *Berg. act. holm.* 1765. *p. 32. t. 1.*
Habitat nullibi, *enata Holmiae in* Horto Ehrenreich; *semine varius propaganda planta. Hortus Upsal.*
Statura *Tropaeolorum reliquorum magnitudine reliquisque.* Folia *differunt*, *quae non peltata*, *sed latius cuneata*, *nutantia*, *fere semi-5 loba*: *lobis acutiusculis*, *nuda*, *nervosa*, *venosa*, *petiolis triplo breuiora*, *margine omni adscendente*, *praeprimis laterali*, *qui cum opposita basi coadunatus*, *vt ibi fere*, *cucullatum euadat folium et omnium laeuissime peltatum.*

depressus. 1. ANTICHORVS.
Habitat in Arabia. ☉:
Caules *terrae appressi*, *teretes*, *palmares*, *alterne ramosi.* Folia *alterna*, *petiolata*, *oualia*, *grosse serrata*, *glabra*, *subplicata.* Stipulae *subulatae.* Flores *axillares*, *bini oppositi*, *breuissime pedunculati*, *lutei.* Pedunculi *crassiusculi.* Bracteis 2, *lateris superioris.* Fructus *cernui*, *arcte sub caule reflexi. Hort. Upsal.*

5. AMY-

gileaden- 5. AMYRIS foliis ternatis integerrimis, pedunculis
sis. vnifloris lateralibus.
Habitat in Arabia felici. *Forskahl.* ♄.
Vide Diff. noſtr. de Opobalſamo *declarato* 1764. *vbi Deſcriptio.*

Opobalſa- 6, AMYRIS foliis pinnatis: foliolis ſeſſilibus. †.
mum. Balſamum. *Bell. ic. 110. Alp. aegypt. 48. t. 60.*
Opobalſamum ſ. Balſamum judaicum. *Geoffr. mat. 2. p. 473.*
Habitat in Arabia. ♄.

Protium. 7. AMYRIS foliis pinnatis: foliolis petiolatis vndulatis.
Tingulong. *Rumph amb. 7. p. 54. t. 23. f. 1.*
Habitat in India orientali. ♄.
Folia *oppoſita*, *pinnata*: *Foliolis* 5 *ſ.* 7, *glabris*, *petiolatis*, *laminis*. Florum panicula *multiplex*. Calyx *ſubquadridentatus*, *obtuſus*, *perſiſtens*. Petala 4, *ſeſſilia*, *ouata*, *acuminata*. Nectarium e receptaculo marginato, *cingente* germen *intra ſtamina*. Antherae *oblongae*, *quaſi ex* 4 *connatae*. Filamenta 8, *ſubulata*, *petalis breuiora*. Germen *ouatum*. Stylus *cylindricus*, *longitudine ſtaminum*. Stigma *ſimplex*.

ramenta- 42. ERICA antheris bicornibus incluſis, corollis globoſis laeuibus, foliis quaternis ſetaceis laeuibus.
cea. *Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄.
Rami *ſiliformes*, *ramentacei*, *longi*, *ferruginei*. Folia *anguſtiſſima*, *quaterna*, *erecta*, *appreſſa*. Calyx *corolla breuior*, *viridis*. Corollae *globoſae*, *purpurzae*. Antherae *cornubus* 2, *ciliatis*, *introrſum mucronatae*, *lateribus ouato-dehiſcentes*. Stylus *purpureus*. Stigma *duplex*: *inferius ſubrotundum*; *ſuperius quadrifidum*.

nigrita. 43. ERICA antheris ſubincluſis atris conniuentibus, corollis campanulatis quadripartitis, foliis ternis.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.
Folia *terna*, *ſubtriquetra*, *glabra*, *breuia*, *patula*. Bracteae 3, *facie calycis*. Flores *terminales*, *albi*. Antherae *conuexae*, *obtuſae*.

articularis. 44. ERICA antheris bifidis incluſis, corollis campanulatis calyce colorato breuioribus, foliis ternis linearibus laeuibus appreſſis.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.

Frutex. Folia *linearia*, *adpreſſa*, *glabra*, *longitudine internodiorum.* Flores *racemoſi*, *pedunculati.* Bracteae *ſolitariae et binae*, *calycis facie et colore.* Calyx *ouatus*, *laeuis*, *incarnatus.* Corolla *campanulata*, *alba*: Stamina *corolla breuiora.* Antherae *fuſcae*, *bipartitae.* Stylus *atropurpureus.* Stigma *apice caeruleſcens.*

faſtigiata. 40. ERICA antheris ſubbifidis incluſis, corollis hypocrateriformibus faſciculatis, foliis quaternis linearibus ſcabris.

Habitat ad Cap. b. ſpei.

Fruticulus *Ramis laeuibus*, *quadrifariam ſtria exaratis.* Folia *quaterna*, *linearia*, *acuminata*, *triquetra*, *laeuia*, *margine ſcabra*, *erecta*, *longitudine internodiorum*, *at ſumma longiora.* Flores *faſciculati*, *faſtigiati*, *terminales.* Calyx *foliis ſimilis.* Corolla *tubo cylindrico*, *patulo*, *foliis paulo longiore.* Limbus *quadripartitus*, *planus*, *ſubtus*, *ruber*, *ſupra albus*: *laciniis ſubcordatis.* Stamina *capillaria*, *corolla breuiora.* Antherae *vix emarginatae.*

abſinthoides. 41. ERICA antheris bifidis incluſis, corollis ſubrotundis, foliis ternis linearibus ſubpubeſcentibus. *Pluk. phyt. 47. f. 14.*

Habitat ad Cap. b. ſpei.

Frutex *ſtatura Abſinthii*, *paniculatus*, *Caule rufo*; *Ramis ternis.* Folia *terna*, *linearia*, *extus gibba*, *ſubhirſuta.* Flores *terminales ramulorum.* Corollae *pallidae.* Antherae *atropurpureae*, *bifidae*, *intra os corollae.* Stigma *eminens*, *purpureum*, *quadrifidum.*

oleoides. 12. DAPHNE floribus geminis terminalibus ſeſſilibus, foliis elliptico-lanceolatis glabris. *Schreb. deb.* 13. *t. 7.*

Habitat in Oriente. ♄.

Caulis *fruticuloſus*, *compoſitus.*

pubeſcens. 13. DAPHNE floribus ſeſſilibus lateralibus aggregatis, foliis lanceolato-linearibus, caule pubeſcente.

Habitat in Auſtria. *D. Jacquin.*

Caules *baſi fruteſcentes*, *ſimplices*, *pubeſcentes.* Folia *alterna*, *remota*, *lineari lanceolata*, *nudiuſcula*, *annuau ſubmucronata.* Flores *axillares*, *ſeſſiles*, *anguſti*, *quinque*, *vel*

vel pauciores, tubo filiformi pubescente, foliis breuioribus. Diuersa videtur a D. Thymelaea.

radiata. 4. GNIDIA folis subulatis triquetris acutis, capitulis terminalibus sessilibus radiatis, bracteis lanceolatis.
Habitat ad Cap. b. spei. ♄.
Frutex *scaber, prolifer.* Folia *sparsa, triquetra, mucronata glabra.* Capitula *terminantia ramos, radiata* Bracteis *lanceolatis, folio latioribus.* Flores *extus subuillosi.* Calycis *limbus intus glaber, longitudine tubi.* Petala 4, *calyce minora, pilosa.* Stamina 4 *exserta*, 4 *in fauce.*

simplex. 5. GNIDIA foliis omnibus linearibus acutis, floribus terminalibus sessilibus.
Habitat ad Cap. b. spei. ♄.
Caules *semipedales, inaequales, exasperati tuberculis* 4 *a casu foliorum.* Folia *sparsa, linearia, acuta, erecta, laeuia.* Flores *terminales, nudi, ex apice rami villoso, sessiles, lutei calyce, petalis, antheris.* Folia *floralia reliquis non latiora.* Petala *oblonga, acuminata.* Stamina 4 *in fauce;* 4 *supra faucem.*

DIGYNIA.

racemosa. 1. SCHMIDELIA.
Habitat in India orientali *sub Klinting biroe.* ♄.
Arbor *facie Rhois trifoliatae.* Folia *alterna, ternata: Foliolis petiolatis, ouato-oblongis, repandis, nudis.* Racemi *axillares, simplices: floribus ad singula puncta pluribus sparsis.*

X. DECANDRIA.

MONOGYNIA.

capensis. 9. SOPHORA foliis pinnatis: foliolis numerosis lanceolatis, caule fruticoso.
Habitat ad Cap. b. spei. ♄.
Frutex *tenellus pubescens, adultior spontaneus nudus, facie Amorphae.* Folia *alterna, pinnata cum impari: Foliolis 23, angusto lanceolatis, aequalibus, integerrimis, supra nitidis, subtus subtomentosis.* Racemus *terminalis* Floribus *albis, Crotalariae, recuruatis.* Filamenta

quaſi villis intertexta. Legumen *oblongum, compreſſum, tomentoſum.* Semina 3-6, *duriſſima.*

japonica. 10. SOPHORA foliis pinnatis: foliolis ouatis glabris, caule arboreo.
Habitat in Iaponia. *Kleinhoff.*
Arbor *foliis Robiniae Caraganae.* Folia *ſparſa, pinnata. Foliolis ouatis, tenuibus, vtrinque laeuibus*: 7-11: *inferioribus paulo minoribus.* Racemi *parui.* Flores *albi, magnitudine Indigoferae.*

atomaria. 31. CASSIA foliis quinqueiugis ouatis ſubtomentoſis, petiolis teretibus eglanduloſis.
Habitat in America. *D. Jacquin.*
Caulis *mihi humanae altitudinis, lignoſus, cinereus, ramoſiſſimus.* Ramuli *Petiolique vix manifeſte pubeſcentes.* Petioli *atomis ſubferrugineis adſperſi, non canaliculati.* Folia *vtrinque viridia, tactu tomentoſa, ouata; inferiora minora, obtuſiora, ſubemarginata, margine interiore baſeos non minore.* Stipulae *ſubulatae, ſaepe perſiſtentes a caſu foliorum praeſentis anni: nondum mihi floruit in H. Vpſalienſi.*

picigera. 1. Proſopis.
Habitat in India. ♄.
Arbor. Folia *alterna, coniugata: foliolis pinnatis, octoiugis ſine impari, tamarindi ſimilibus: pinnis oblongis, obtuſis.* Spicae *anguſtae, longae, terminales et axillares.* Flores *parui.*

paniculata. 1. CHALCAS.
Camunium. *Rumph. amb. 5. p. 26. t. 17.*
Habitat in India, *vbi colitur in hortis ob flores fragrantiſſimos.* ♄.
Frutex *laeuis.* Folia *alterna, petiolata, ſubopaca, obſolete crenata.* Flores *ſubpaniculati, terminales.*

ſimplex. 8. ZYGOPHYLLVM foliis ſimplicibus ſemicylindricis.
Habitat in Arabia. *Forskähl.*
Planta *tenera, ſucculenta, nata e Seminibus Forskählianis, non floruit.* Caulis *herbaceus, dichotomus, pollicaris, diuaricatus.* Folia *oppoſita, ſubſeſſilia, carnoſa, linearia, patentiſſima.* Flores *flaui. Forskähl.* H. U.

4. RV-

chalepenſis. 4. RVTA foliis ſupradecompoſitis, petalis ciliatis.
α. Ruta chalepenſis latifolia, petalis villis ſcatentibus. *Tournef. inſt. 257.*
β. Ruta chalepenſis anguſtifolia, petalis villis ſcatentibus. *Moriſ. hiſt. 2. p. 508. ſ. 5. t. 35. f. 8.*
Habitat in Africa. ♄.
Simillima R. graueolenti *eiuſque progenies. Primi flores 5 fidi, reliqui 4 fidi. Petala concaua, margineque vndulata, vt in R. graueol. ſed* Caulis *altior.* Petala *margine ciliata*, Capſulae *lobi acuti, obtuſi.*
β. *Differt* Petalorum *vnguibus longioribus*, capſulaeque *lobis approximatis. nec diſtantibus ex Hort. Vpſal.*

adſcendens. 6. IVSSIAEA adſcendens, floribus pentapetalis decandris, foliis obouato-oblongis glabris, pedunculis folio breuioribus.
Habitat in India.
Caules *herbacei, adſcendentes, ſimplices, laeues.* Folia *alterna, petiolata, obouato-oblonga, laeuia, obtuſa.* Pedunculi *axillares, ſolitarii, vniflori, folio breuiores, ſed ſtructus longitudine folii.*

octandra. 2. DAIS floribus quadrifidis octandris. *Burm. ind. t. 33. f. 2.*
Habitat in India. ♄.
Folia *oppoſita, elliptico-oblonga, acuminata, petiolata, laeuia.* Inuolucrum *vnum alterumue, terminale, pedunculatum, floribus breuius.* Flores *glabri.* Stamina 8, *ſupra tubum, corolla quadrifida longiora.*

monogyna. 1. TRIANTHEMA floribus monogynis.
Trianthema Portulacaſtrum. *Sp. pl. 325.*
Habitat in America *calidiore.* ☉.
Caules *depreſſi, ſubdichotomi, articulati, laeues, latere ſuperiore pubeſcentes.* Folia *oppoſita, petiolata, oualia, obtuſa, integerrima margine rubro: altero folio ſemper minore.* Petioli *bidentati, folio breuiores.* Flores *axillares, ſeſſiles.* Calyx *perianthium diphyllum: foliolis ſubulatis, perſiſtentibus vel potius bracteae.* Petala 5, *oualia, ſub apice mucronata, quaſi ex calyce et petalis ſimul nata.* Filamenta 6-10, *corolla breuiora.* Antherae *ouales, didymae.* Germen *ſemiinferum, retuſum, bicorne.* Stylus *filiformis, hinc hiſpidus, longitudine corollae.* Stigma *ſimplex.* Genus *vix aliud magis difforme, ideoque niſi Specia-*

lis character habeatur, facile confunduntur. Hort. Vpſal.

pentandra. 2. TRIANTHEMA floribus pentandris digynis.
Portulacae affinis polygonoides, bliti folio et facie maderaſpatenſis. *Pluk. alm. 304. t. 120. f. 3.*
Habitat in Arabia. ☉.
Caulis *pedalis, teres, erectus, ſcabriuſculus.* Folia *oppoſita, petiolata, elliptica, obtuſiuſcula, integerrima, erecto-patentia, oleracea.* Rami *alterni, breuiores.* Flores *axillares, alterni f. alterius alae, inter ramum et caulem: ſubſeſſiles, plures, congeſti; intus pallidi, extus vireſcentes.* Calyx *monophyllus, campanulatus, quinquepartitus, intus purpuraſcens: laciniis ſublanceolatis, ſub apice mucronatis, perſiſtens.* Corolla *nulla.* Filamenta 5, *ſetacea, erecta, diſtantia, longitudine corollae.* Germen *ſuperum, obtuſiſſimum, rubrum.* Styli 2, *longitudine germinum, recuruati, ſupra longitudinaliter pubeſcentes.* Stigma *ſimplex.* Fructus *vt in congeneribus.* H. U.

decandra. 3. TRIANTHEMA floribus ſubdecandris digynis.
Habitat in India. ☉.
Herba *ſtatura Glini.* Caulis *herbaceus, diffuſus, alternatim ramoſus.* Folia *oppoſita, petiolata, elliptica, integerrima, glabra.* Petioli *vtrinque membranacei.* Bracteae *membranaceae.* Flores *axillares, breuiter pedunculati.* Calyx *pentaphyllus, perſiſtens: foliolis ovalibus, margine membranaceis, intus alis exterioribus ſub apice mucronatis.* Corolla *nulla.* Filamenta 10, *rarius* 12, *capillaria, longitudine calycis.* Antherae *ſubrotundae.* Germen *ſuperum, retuſum.* Styli 2, *filiformes, patuli.* Stigmata *obtuſa.* Fructus *vt in congeneribus.*

DIGYNIA.

illyrica. 5. SAPONARIA calycibus ſubcylindricis, caule erecto viſcido-pubeſcente, ramis alternis, corollis punctatis.
Saponaria caule dichotomo hirſuto, floribus faſtigiatis, corollis patentibus, petalis integris tripunctatis. *Ard. ſpec. 2. p. 24. t. 9.*
Habitat in Illyria. *DD. Arduini.*

Plan-

Planta *erecta*, *ſpithamea*, *tenera*, *viſcoſo-pubeſcens*. Folia *lineari lanceolata*. *glabra*. Calyces *ſemiquinquefidi*, *margine membranacei*. Petala *integra*, *alba*: *punctis* 3 *purpureis*. Antherae *violaceae*.

TRIGYNIA.

saxifragus. 14. CVCVBALVS petalis bifidis, calycibus ſtriatis: terminalibus ſeſſilibus, lateralibus pedunculatis. *Schreb. dec. 9. t. 5.*

Lychnis orientalis minima, caryophylli folio, calyce purpuraſcente ſtriato. *Tournef. cor.* 24.

Habitat in Oriente. 24.

Caulis *palmaris*, *foliolis linearibus*. Flos *terminalis*, *ſeſſilis*. Flores laterales *oppoſiti*, *pedunculati*. Calyx *omnis inter duo foliola ſeſſilis*, *e quorum alis ſaepe noui petioli prodeunt*, *ideoque non ſquamis* 2 *more Dianthi*.

pumilio. 15. CVCVBALVS caulibus vnifloris flore breuioribus. Caryophyllus alpinus, calyce oblongo hirſuto. *Bauh. pin. 209.*

Caryophyllus ſylueſtris VII. *Cluſ. hiſt. 1. p. 285.*

Habitat in Alpibus Italiae, Morauiae. *Arduini.* 24.

Folia *radicalia in caeſpitem congeſta*, *linearia*, *obtuſa*, *laeuia*. Caules *ſimpli iſſimi*, *breuiſſimi*, *vniflori*, *ſaepe triarticulati*. Calyx *oblongus*, *campanulatus*, *patulus*, *obtuſus*, *pubeſcens*, *longitudine caulis*.

biflora. 17. ARENARIA foliis obouatis obtuſis, caulibus procumbentibus, pedunculis bifloris lateralibus.

Habitat in Europae *auſtralis Alpinis*.

Caules *procumbentes*. Folia (*Serpylli*) *ſubrotunda ſ. obouata*, *laeuia*, *obtuſa*. Pedunculi *laterales*, *foliis duplo longiores*, *bifidi et biflori*: Bracteis 2, *linearibus ad diuiſionem*, *vt et in altero pedicello*. Calyces *ouati*. Petala *alba*. Capſulae *ſubgloboſae*.

gypſophiloides. 18. ARENARIA foliis linearibus radicalibus ſetaceis, panicula ſubpubeſcente, petalis lanceolatis.

Alſine orientalis, caryophylli folio, flore paruo, albo. *Tournef. cor. 17.*

Habitat in Oriente. *DD. Schreber.* 24.

Statura *A. ſaxatilis*. Caulis *erectus*, *ſemipedalis*, *laeuis*, *articuli 7. ſ. 8*. Folia Radicalia *copioſa*, *tenuiſſi-*

nuiſſima ſ. ſetacea. Caulina *maiora, lineria, articulis longiora.* Panicula *terminalis, brachiata, dichotoma, ſubfaſtigiata, pedicellis vltimis ſubuilloſis.* Calyx *ouatus, duriuſculus, mucronatus.* Petala *lanceolata, alba, calyce triplo longiora.*

verna. 19. ARENARIA foliis ſubulatis, caulibus paniculatis, calycibus acuminatis ſtriatis.

Arenaria foliis linearibus erectis ſubtus ſtriatis, floribus faſtigiatis inaequaliter pedunculatis. *Ger. prou. 405. t. 15. f. 1.*

Alſine glabra, tenuiſſimis foliis, floribus albis. *Herm. parad. 12. t. 12. excludenda in ſaxatili.*

Alſine puſilla, pulchro flore, tenuiſſimo. *Raj. hiſt.* 1033.

Habitat in Alpibus Europae *aaſtralioris.* 4.

Differt ab A. ſaxatili caulibus *vix palmaribus, pilis raris adſperſis*; Pedunculis *piloſis*; Calycibus *acutis.*

juniperina. 20. ARENARIA foliis ſubulatis ſpinoſis, caulibus erectis, calycibus ſtriatis, capſulis oblongis.

Habitat . .

Facies *A. ſaxatilis.* Caules *ſemipedales, ſtricti, laeues.* Folia *ſubulata, rigida, ſtricta, mucronato-ſpinoſa.* Calyces *oblongi, acuti, quinqueneruii.* Petala *lanceolata, alba.* Capſulae *oblongae, calyce paulo longiores.* Panicula *dichotoma.*

PENTAGYNIA.

tenaciſſima. 1. FORSKOHLEA.

Chamaedryfolia tomentoſa maſcatenſis. *Pluk. alm. 97. t. 275. f. 6. Schaw. afr. 133.* (excludenda in Neurada).

Habitat in Arabia, Numidia. ⊙.

Caulis *bipedalis, paniculatus, teres, hiſpidus, ruber: Ramis alternis.* Folia *alterna, petiolata, ouata, lineata, ſerrata ſerraturis 5 ſ. 6, hiſpida hiſpiditate ſuperioris paginae hamata.* Petioli *teretes, foliis breuiores.* Flores *axillares, gemini, ſeſſiles, hirti, decidui maturo fructu.* H. U.

XI. DO-

XI. DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

semitrilo-ba. 3. TRIVMFETTA foliis semitrilobis, floribus completis. *Jacq. amer.* 147.

Triumfetta villosa, foliis inferioribus angulato-ouatis serrato-dentatis, floribus ternatis; fasciculis geminatis folio suboppositis. *Brow. jam.* 233.

Habitat in America *calidiore.* ♄.

Simillima T. Lappulae. sed Flores calyce instructi.

annua. 4. TRIVMFETTA foliis ouatis indiuisis rarius lobatis.

Triumfetta foliis oblongo-ouatis obtusis serratis, petiolis longissimis. *Mill. ic. 199. t. 298.*

Habitat in India orientali. ⊙.

quadrifida. 7. PORTVLACA bracteis quaternis, floribus quadrifidis, geniculis pilosis.

Portulaca lanuginosa procumbens, flore luteo. *Herm. par. 216.*

Sedum minus arabicum, flore luteo, foliis planis mucronatis. *Pluk. mant. 169.*

Habitat in Aegypto. ⊙.

Radix *fibrosa.* Caules *prostrati, numerosi, oleracei, teretes, laeues, alterni ramosi, semipedales. geniculis radicantibus pilosis.* Folia *opposita, patentia, distantia, ouato-lanceolata, carnosa, laeuia. sessilia, integerrima, subtus concaua, adspersa micis diaphanis.* Petioli *florentes terminales, adulti laterales facti, vniflori, superne incrassati, longitudine foliorum, terminati* Bracteis *quaternis s. cruciatis, patentibus, folio similibus.* Flos *sessilis, flauus, cinctus pilis albis, vt genicula.* Perianthium *biualue, membranaceum, ouatum.* Corolla 4 *partita, ouato-oblonga, marcescens.* Filamenta 8, *setacea, basi extrorsum curuata, longitudine corollae.* Antherae *subrotundae.* Pistillum: *Germen inferum, rotundatum. Stylus cylindricus, superne crassior, longitudine staminum. Stigmata 4, oblonga, obtusa, recurvata, pubescentia.*

Capsula *ouata, laeuiter tetragona, acutiuscula, vniocularis, circumscissa.* Semina *plurima, subrotunda, muricata.* H. U.

Simillima *P. pilosae, vt incauto eadem videatur.*

ericoides. 1. HVDSONIA.
Habitat in Virginia. ♄.
Frutex *facie et habitu Ericae.* Ramuli *filiformes, ſparſi, imbricati* Foliis *ſubulato-aceroſis, hirſutis; tenellis hirſutioribus incanis, vnde quaſi adſperſi gemmis foliaceis, quae vltimi ramuli.* Pedunculi *(e gemmis folioſis) ſolitarii, filiformes; foliis longiores.* Calyx *erectus, pubeſcens.*

graminea. 63. EVPHORBIA dichotoma erecta, foliis integerrimis lanceolatis ellipticis petiolatis, pedunculis dichotomis. *Jacq. amer. 151.*
Habitat in Carthagenae *graminoſis vdis.*
Corollae albae.

XII. ICOSANDRIA.

MONOGYNA.

anguſtifolia. 14. MYRTVS pedunculis vmbellatis, foliis linearilanceolatis ſubſeſſilibus,
Phillyrea foliis longis ſubtus flauis, fructu deciduo. *Burm. afr. 237. t. 83. f. 2,*
Habitat ad Cap. b. ſpei *DD. Schreber.* ♄.
Arbuſcula *Ramis teretibus, Ramulis tetragonis, glabris.* Folia *Phillyreae anguſtifoliae, ſubſeſſilia, longa, lineari-lanceolata, integerrima, glabra, internodiis multoties longiora.* Pedunculi *laterales, oppoſiti, breues, internodiis vix longiores, apice* vmbellula *ſimplici, rarius compoſita, parua, multiflora.* Petala *ſubrotunda.* Stamina *multa, erecta, ſetacea, petalis longiora.*

pumila. 4. AMYGDALVS foliis venoſo-rugoſis.
Perſica africana nana, flore incarnato pleno. *Tourref. inſt. 625.*
Amygdalus perſica nana flore carneo pleno. *Pluk. phyt. 11. t. 4.*
Habitat in Africa. ♄.
Rami *laeues, bipedales ſ. tripedales, atropurpurei.* Folia *lanceolata, petiolata, venoſa, rugoſo, ſerrulata.* Stipulae *lineares, laciniatae.* H. U.

14. PRV-

pumila. 14. PRVNVS foliis anguſto-lanceolatis ferrulatis.
Ceraſus foliis lanceolatis glabris integerrimis, ſubtus caeſiis, ramis patuliis. *Mill. ic. t. 89. f. 2.*
Ceraſus canadenſis pumila, oblongo anguſtoque folio, fructu paruo. *Hamel. arb. 149. n. 17.*
Habitat in Canada. ♄.
Frutex ſtatura Amygdali nanae. Pedunculi *proprii, vniflori, terni e gemmis lateralibus.* H. U.

PENTAGYNIA.

baccata. 5. PYRVS foliis ſerratis, pedunculis confertis, pomis baccatis.
Crataegus ceraſi foliis, floribus magnis. *Amm. ruth. 274. t. 31. Mill. ic. t. 269.*
Habitat in Sibiria, Dauria *ad Schilkam fluuium.* ♄.
Arbor *Ramis laeuibus.* Folia *Corni, ouata, argute ſerrata, vtrinque laeuia.* Petioli *longitudine folii, baſi annectentes* Stipulas 2, *lineari-lanceolatas.* Pedunculi 4, *filiformes, laeues, axillares, conferti, ſimpliciſſimi, vniflori, longitudine petiolorum.* Germen *inferum, globoſum, glabrum, paruum.* Petala 5, *ſeſſilia, oualia, concaua, alba, maiuſcula.* Stamina 20, *piſtillis breuiora. Antheris flauis.* Piſtilla 5, *corolla breuiora.* Bacca *ſubrotunda, quinqueloculari, rubra.* Semina *bina, calloſa.* Calyx *minutus deciduus.*
Obſ. *Ad* Meſpilum *referrem ob baccas, cum vero Semina in quouis loculo 2 ſint, nec ſolitaria,* Pyri *ſpecies erit, vel nulla diſtinctio inter Pyrum et Meſpilum.* Fructus figura, conſiſtentia, colore, ſapore Malî aciduli, ſed minutus. Sero matureſcit. H. U.
Milleri *figura bona, ſed fructus magnitudine ceraſorum. quae in mea tantum magnitudine Ribes nigri.*

POLYGYNIA.

jamaicenſis. 14. RVBVS foliis ternatis ſubtus tomentoſis, caule petiolis foliolisque ſubpubeſcentibus recuruoque aculeatis.
Rubus foliis longioribus ſubtus molli lanugine obductis et incanis, flore et fructu minoribus. *Sloan. iam. 2. p. 109. Raj. dendr. 76.*
β. Rubus flore albo pleno. *Magn. hort. 175.*
Habitat in Jamaica *proximisque.* ♄.

Dif-

Differt a Rubo paruifolio. Caule *non incano, ſed in iunioribus laeuiter pubeſcente, alias nudo. Caulis vt in R. fruticoſo.* Folia *ternata, ſupra laeuia, ſubtus albo-tomentoſa, inciſo-ſerrata,* Aculei *in caule, petiolis et coſta foliorum.*

penſylua-nica. 28. POTENTILLA foliis inferioribus pinnatis, ſuperioribus ternatis: foliolis inciſo-ſerratis, caule erecto pubeſcente.

Pentaphylloides canadenſe, foliis agrimoniae. *Boerh. lugdb. 1. p. 40.*

Habitat in Canada. ♃.

Folia Radicalia *pinnata: foliolis oblongis, obtuſiuſculis, ſerrato-dentatis, lineatis, mollibus, villoſis: extimis tribus coadunatis maioribus; interioribus minoribus alternis.* Caulina *ſubdigitata, ſeptena, vt P. recta, ſed pinnatifida.* Petala *vix calyce maiora.* Habitus *P. rectae.* H. U.

interme-dia. 29. POTENTILLA foliis radicalibus quinatis, caulinis ternatis, caule erectiuſculo-ramoſiſſimo.

Quinquefolium montanum luteum erectum hirſutum. *Bauh. pin. 325. prodr. 139. Raj. eur. 213. Hall. helu. 340.*

Habitat in Heluetia.

Media *inter* Potent. argenteam *et* noruegicam; *verbo, eſſet P.* noruegica, *ſi non radix eſſet perennis, et folia ſubradicalia quinata. Caeterum folia inferiora alterna, ſuperiora oppoſita. Foliola obouata, inciſo-ſerrata, non tomentoſa, ſerraturis nouem. Folia caulina ternata; paniculae oppoſita.* H. U.

XIII. POLYGYNIA.

MONOGYNIA.

racemo-ſus. 38. CISTVS fruticuloſus, foliis lanceolato-linearibus ſubtus tomentoſis.

Ciſtus, lauendulae folio, thyrſoidis. *Barr. ic. 293.*

Habitat in Hiſpania. ♄.

Caulis *ſtatura Roſmarini, vix tomentoſus.* Folia *linearia ſ. anguſto-lanceolata, ſubpetiolata, ſubtus laeuiſſime tomentoſa, longiuſcula.* Stipulae *lineares.* Racemi *longiſſimi, terminales, ſecundi.* Calyces *angulati, laeues.*

7. COR-

trilocularis. 7. CORCHORVS capſulis trilocularibus triualuibus triquetris angulis bifidis ſcabris, foliis oblongis: infimis ſerraturis ſetaceis.

Habitat in Arabia. *Forskähl.* ⊙.

Caules *erecti*, *pedales*, *teretes*, *ſubſcabri.* Folia *alterna*, *petiolata*, *ouato-oblonga*, *lineata*, *nuda*, *ſubtus ſcabra*, *ſerrata: ſerraturis muticis inferiorum*, *at ſuperiorum foliorum infima ſerratura ſetacea vtrinque.* Pedunculi *ſuboppoſitifolii*, *breues*, *bifidi ſ. biflori*; Calyces *angulati.* Petala *anguſta*, *lutea.* Siliqua *ſtriata*, *triquetra*, *angulis linea exaratis*, *ſcabra imprimis angulis*, *apice ſimplici*, *triualuis trilocularis.* H. U.

TRIGYNIA.

aconiti. 7. DELPHINIVM nectariis monophyllis antice quadridentatis, capſulis ſolitariis, ramulis vnifloris.

Delphinium orientale annuum, flore ſingulari. *Tournef. cor. 30.*

Habitat in Dardanella. *Forskähl.* ⊙.

Statura *Delphinii ſegetum ſ. peregrini*, *corollis Aconiti.* Caulis *pedalis*, *paniculatus*, *ramoſus*, *caneſcens*, *ſubpubeſcens.* Folia *pedato-multifida*, *linearia*, *caneſcentia: Summa tantum tripartita.* Flores *terminales*, *ſolitarii*, *pedunculati*, *parui*, *liuidi*, *intus purpuraſcente virideque varii.* Nectarium exterius, *tubuloſum*, *reliquis longius*, *apice obtuſiſſimum. baſi elongatum*, *vt labium anterius horizontale in medio collocetur.* Nectarium *interius baſi vtrinque lobo obtuſo amplectitur ſtamina*, *ſed antice et ſuperius ſpatio ab exteriore prominet dentibus quatuor ſubaequalibus*, *margine linea purpuraſcente inſcriptis: apex huius intra exteriorem*, *obtuſiſſimus*, *craſſiuſculus recuruatus collo coarctato.* Petala *inferiora quatuor ouato-lanceolata*, *aequalia*, *vireſcentia lateribus purpuraſcentibus.* Stamina *longitudine petalorum*, *purpureſcentia.* Germen *vnicum.* H. U.

PENTAGYNIA.

viſcoſa. 4. AQVILEGIA nectariis . . . caule ſubnudo ſubunifloro piloſo, foliolis ſubtrilobis. *Gouan. monſp. 267.*

Aquilegia viſcoſa. *Magn. monſ. 24. hort. 21.*

Aquilegia hirsuta, flore viscoso. *Tournef. inst. 428.*
Habitat Monspelii, *nec alibi etiamnum obseruata!*
Planta *tota pilis glutinosis, sesquipalmaris.* Folia Radicalia *tripartita, laciniis trilobis.* Caulina 1 *s.* 2 *ternata: foliolis lanceolatis.*

POLYGYNIA.

Tsiampacca. 2. MICHELIA fol. lanceolato-ouatis.
Sampacca syluestris. *Rumph. amb. 2. p. 202. t. 68.*
Habitat in India. ♄.
Flores *albicantes s. lutescentes, minus olentes.* Folia *latiora s. lanceolato-ouata, petiolata, et etiamnum tenella, more salicum, pube sericea.*

simplex. 15. THALICTRVM caule simpliciſſimo folioso angulato. *Fl. suec. 2. p. 490.*
Thalictrum alpinum minus saxatile rutae folio, staminibus luteis. *Segu. ver. 1. p. 174. t. 11?*
Habitat in Suecia. ♄.
Differt a Th. flauo: *Herba dimidio minore. Floribus nutantibus, nec erectis; Petalis viridibus, nec albis. Filamenti* 14 *purpurascentibus, nec* 17 *albis; Panicula rariore; Foliis angustioribus, minus Segueriana diuaricatis. Praeter stipulas, inter ramificationem primam foliolorum, squamae nullae, at in T. flauo squamula vtrinque lacera.* Thalictrum *Segu. Tab. II. huic proprius quam sibirico accedit.*

baldensis 22. ANEMONE foliis biternatis incisis. Turra. †.
Anemone alpina alba minor. *Bauh. pin. 176.*
Habitat in Baldo.
D. Turra *hanc distinguit ab* A. alpina *tanquam multum diuersa: planta quadruplo minore deliliore minusque hirsuta. Foliis radicalibus bis ternatis incisis minimeque decompositis. Burseriana planta Bauhini ab hac diuersa est.*

sulphurea 23. ANEMONE pedunculo inuolucrato, foliis triplicato-pinnatis pilosis planis acute incisis, seminibus caudatis. *Hall. emend. 62.* †.
Pulsatilla lutea, apii hortensis folio. *Bauh. pin. 177. Hall. helu. t. 6.*
Pulsatilla lutea. *Cam. epit. 393.*
Habitat in Heluetia. 2.
Differt a A. vernali petalis acutioribus, intus luteis.

14. ANE-

decapetala. 24. ANEMONE caule vnifloro, flore decapetalo, foliis ternatis lobatis radicalibus.

Anemone foliis ternatis: foliolis trilobis punctatis, pedunculo simplici, flore vnico decapetalo. *Ard. spec. 2. p. 27. t. 12.*

Habitat in Brasilia. 4.

Statura *A. virginicae, sed minuta.* Folia *radicalia, ternata, petiolata, petiolulata: foliolis subouatis, obtusis, trilobis s. incisis.* Caulis *simplicissimus, semipedalis.* Inuolucrum *vniflorum, tripartitum, multifidum lineare, acutum, laeue.* Pedunculus *longitudine inuolucri, hirtus.* Flos *paruus, albus,* 10-*petalus: petalis lanceolatis, persistentibus: interioribus paulo minoribus.* Stamina *corolla breuiora.* Germen *capitatum, conicum, villosum.* Stigmata *acuminata, laeuia.*

platanifolius. 39. RANVNCVLVS foliis palmatis laeuibus incisis, caule erecto, bracteis linearibus.

Ranunculus montanus, aconiti folio, albo flore, maiore. *Bauh. pin. 182*

Ranunculus albus, flore simplici. *Lob. ic. 668.*

Habitat in Germaniae *et* Italiae *alpinis.* 4.

Statura *Ranunc. aconitifolii, floribus itidem albis, sed* Folia *non composita, verum palmata, minus crassa, magis incisa:* Flores *maiores.* Synonyma *huius itaque rescindenda a* Ranunc. *aconitifolio.*

paruulus. 40. RANVNCVLVS hirtus, foliis trilobis incisis, caule erecto subunifloro.

Ranunculus foliis radicalibus et caulinis inferioribus trilobis crenatis, summis trifidis dentatis, caule bifloro erecto *Gouan. monsp. 270.* *

Ranunculus aruensis paruus, folio trifido. *Bauh. pin. 179.*

Ranunculus saxatilis minimus hirsutus. *Bauh. pin. 182. prodr. 96.*

Ranunculus minimus apulus. *Col. ecphr. 314. t. 316.*

Habitat Monspelii *inque* Italia.

Caulis *solitarius, hirtus, filiformis, longitudine digiti s. semipedalis.* Folia *pauca, petiolata, simplicia, trifida, dentata, hirta.* Flos *fere foliis maiori, luteus.* Calyx *membranaceus villosus.*

XIV. DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

alpina. 5. AIVGA caule ſimplici, foliis caulinis radicalia aequantibus.
Bugula foliis oblongo-ouatis, caulibus decumbentibus, verticillis diſtantibus. *Mill. dict. 2.*
Bugula folio maximo, flore pallide caeruleo. *Boerh. lugdb. 1. p. 184.*
Bugula alpina maxima. *Tournef. inſt. 209.*
Habitat in Alpibus Helueticis, Aſtriacis. *Jacquin. 24.*
Differt a A. pyramidali Foliis *radicalibus vix reliquis maioribus.* Floribus *vtrinque* 10, *nec* 5; *iisque ſaturate caeruleis, nec albis;* Bracteis *viridibus nec coloratis.*

cubenſe. 32. TEVCRIVM foliis ouatis inciſis glabris ſubcuneatis, floribus ſolitariis pedunculatis. *Jacq amer. 172.*
Habitat in Cubae *humidiuſculis.* ♂, 24.
Caulis erectus, glaber, inodorus. Flores albi.

aſiaticum, 33. TEVCRIVM foliis lanceolatis repando-ſerratis baſi rectangulis, floribus ſolitariis.
Habitat in India Orientali?
Caulis *erectus, rectus, pedalis, tetragonus, fuſceſcens, brachiatus, nudus.* Ramis *breuioribus.* Folia *prima lanceolata baſi angulo recto, petiolata, rugoſa, obtuſiuſcule ſerrata ſ. acute crenata, crenaturis angulo recto interſtinctis, mollia, patentia, ſupra ſubrugoſa, ſaturate viridia; ſubtus ſubtomentoſa, venoſo-reticulata, pallide viridia.* Flores *axillares, ſolitarii, vniflori; breuiter pedunculati, ſecundi.* Calyx *ocymi ſ. ſcutellariae labro ſuperiore cordato, margine recuruo, acuto; inferiore 4-dentato, aequali.* Corola *alba, vix incarnata: Labro ſuperiore omnino nullo.* Lab. *inferiore 3-fido; intermedia maiore recurua, emarginata, vix crenata.* Stamina *vix fauce longiora.* Filamenta *alba piloſa.* Antherae *fuſcae polline croceo.* Stigmata 2, *acuminata, vix ſtaminibus longiora.* H.U.

ſalicifolium. 34. TEVCRIVM foliis lanceolato-ellipticis obtuſiuſculis integerrimis, calycibus ſolitariis quadrifidis.
Chamaepithys orientalis ſalicis folio. *Tournef. cor. 14. Schreb. 17. t. 9.*

Habi-

Habitat in Oriente. *DD. Schreber.* 24.

Caules *palmares*, *diffuſi*, *teretiuſculi*, *pubeſcentes*, *baſi fere perennantes*. Folia *oppoſita*, *ouali-lanceolata*, *obtuſiuſcula*, *integerrima*, *nuda*, *non nitida*, *erecta*, *neruoſa*, *internodiis longiora*. Flores *oppoſiti*, *breuiſſime pedunculati*. Calyces *tubuloſi*, *ſemiquadrifidi*, *anguſti*. Corollae *foliis triplo breuiores*, *abſque labii ſuperioris rudimento*, *absque dentibus lateralibus baſeos*.

arduini. 35. TEVCRIVM foliis ouatis ſerratis, racemo ſpicato tereti ſeſſili terminali.

Teucrium ſpicis ouatis crenatis ſubhirſutis petiolatis, caulibus terminatis, ſpica flaueſcente piloſa. *Ard. ſpec. 1. p. 12. c. 3.*

Habitat . .

Caules *ſuffruticoſi*, *vt tota planta obſcure pubeſcentes*. Spica *terminalis*, *ſimilis T. hircanico*, *at breuior*, *flaueſcens*.

auricularia. 15. MENTHA ſpicis oblongis, ſtaminibus corolla longioribus, foliis oblongis piloſis.

Alopecuro-Veronica. *Fl. zeyl.* 411.

Veronica hirſuta latifolia zeylanica aquatica. *Burm. zeyl. 228.*

Maiorana foetida. *Rumph. amb. 6. p. 41. t. 16.*

Habitat in Indiae *aquoſis*.

Zeylonenſis deſcriptioni addendum: Calyx *quinquefidus*, Corolla *quadrifida*. Filamenta *piloſa*.

hirſuta. 16. MENTHA floribus capitatis, foliis ouatis ſerratis ſubſeſſilibus pubeſcentibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Hudſ. angl. 223. n. 10.*

Mentha aquatica hirſuta ſ. Siſymbrium hirſutius. *Bauh. hiſt. 3. p. 224. Moriſ. hiſt. 3. p. 370.*

Siſymbrium hirſutum. *Raj. angl. 3. p. 233.*

β. Mentha Siſymbrum hirſuta, glomeralis et foliis rotundioribus. *Raj. angl 3. p. 233. t. 10. f. 1.*

Habitat in Aquoſis Angliae; *in* Hollandia. *Osbeck.*

Differt a M. aquatica *Foliis magis ſeſſilibus hirſutis: conuenit ſtaminibus corolla longioribus, et tota facie. Piſtillum corolla longius. Corolla profunde 4-fida, fere regularis. Calyces ciliati,*

recta. 13. STACHYS verticillis ſubſpicatis, foliis cordato-ellipticis crenatis ſcabris, caulibus adſcendentibus.
Betonica foliis inter verticillos diſſitos breuibus in ariſtam terminatis integris. *Hall. helu.* 646.
Stachys vulgaris hirſuta erecta. *Bauh. pin.* 233. *Tetrahit Ger. prou.*
Habitat in Europa *auſtrali*, 24
Radix *perennis*. Caules *adſcendentes*, *rigidiuſculi*, *pilis raris adſperſi*. Folia *ſubpetiolata*, *cordata*, *elliptica*, *vel ſaepe lanceolata*, *profunde crenata*, *vtrinque pilis raris ſcabra*, *ſubrugoſa*. Spicae *terminales*, *in verticillos diſſitos excreſcentes*, *e verticillis decemfloris*. *Calices ſubſpinoſi*. Flores *lutei*,

maritima. 14. STACHYS foliis cordatis obtuſis tomentoſis crenatis, bracteis oblongis integerrimis.
Stachys verticillis ſexfloris, foliis radicalibus ouatibus crenatis: ſummis ouatis integerrimis, corollis calyce duplo longioribus. *Gouan. monſ.* 91.
Betonica heraclea latifolia dioſcoridis. *Donat. venet.* 84. *Bocc. muſ.* 2, *p.* 164. *t.* 127.
Sideritis ſaluiae folio, noſtras. *Magn. monſ.* 203.
Habitat in littoribus maris, Venetiis, Monſpeli, Orientis. *D. Jacquin.*
Folia *radicalia cordata*, *oblonga*, *obtuſa*, *venoſa*, *crenata*, *tomentoſa*. Caulis *ſuffruticoſus*, *ſpithameus*, *erectus*, *pubeſcens*. Spica *e verticillis interrupta*. Bracteae *longitudine florum*, *ouales*, *oblongae*, *integerrimae*. Verticilli *ſexflori*. Calyces *lanati*, *quinquedentati*, *acuti*, *vix ariſtati*. Corollae *luteae*.
Obſ. Sideritis heraclea. *Col. ecphr.* 1. *p.* 128. *t.* 131. *hanc refert*, *ſed flores purpurei*. H. U.

ethiopica. 15. STACHYS verticillis biſloris,
Sideritis erecta, teucrii pratenſis folio, aethiopica. *Pluk. alm.* 245. *t.* 315. *f.* 3.
Habitat ad Cap. b. ſpei. *DD. Royen*, 24.
Caulis *palmaris*, *erectus ſ. diffuſus*; Habitus *Lamii purpurei*, *ſubhiſpido-piloſus*. Folia *cordata*, *profunde obtuſeque ſerrata*, *rugoſa*, *lucida*, *ſubuilloſa*, *petiolis breuiora*. Spicae *terminales*, *interruptae e verticillis ſ. floribus oppoſitis ſ. vtrinque ſolitariis*. Calyx *ſubquinquefidus*, *ſubaequalis*, *ſubariſtatus*. Corollae *tubus curuus*. *Labium ſuperius erectum*, *fornicatum*, *breue*, *villoſum*; *L. inferius maximum*, *exporrectum*, *trifi-*

trifidum: intermedia latiſſima, plana, crenata: lateralibus reuolutis. Stamina *vix tubo longiora.* Antherae *bipartitae.* R.

heraclea. 4. BETONICA foliis lanceolatis ſubnudis, calycibus lanatis, dentibus filiformibus.

Habitat in Oriente,

Caulis *et* Folia *fere glabra.* Spica *maiuſcula, lanato-tomentoſa.* Inuolucra *filiformia, longitudine calycis.* Calycum *dentes filiformes, mites, longitudine tubi.* Corolle *luteae: Labio ſuperiore vix calyce longiore; L. inferiore trifido: intermedia rotundata maiore.* Stamina *longitudine fere labii ſuperioris.*

diſticha. 5. BALLOTA verticillis dimidiatis bipartitis ſemiſpicatis.

Monarda floribus verticillatis, foliis ſubcordatis, calycibus piloſis inuolucro longioribus. *Fl. zeyl. 24?*

Marrubium odoratiſſimum, betonicae folio. *Burm. zeyl. 153. t. 71. f. 1.*

Stachys indica procerior, betonicae folio *Rai. hiſt. 1872.*

Habitat in India.

Statura *Nepetae.* Caulis *quadrangulus, pubeſcens.* Folia *petiolata, ſubcordata, ſerrata, tomentoſa.* Verticilli *ſingulares utrinque: Singuli bipartiti f. ex ſpicis dualus, coniugatis, vnilateralibus, adſcendentibus more Aſperifoliarum ſpicarum.* Floribus *alternis, ſeſſilibus, adſcendentibus, inſidentibus rachi ſimplici flexuoſae.* Bractea *ſub ſingulo flore, ſubulata, calyce breuior.* Calyx *quinquefidus, ſubaequalis, muticus, pentagonus, obſolete decagonus.* Stamina *quatuor.* Semina *quatuor, ſubrotunda, nitida.*

leonotis. 12. PHLOMIS foliis ouatis obtuſis crenatis ſubtomentoſis, calycibus ſubſeptemdentatis ariſtatis, caule fruticoſo.

Leonurus minor Cap. b. ſpec. *Boerh. lugdb. 1. p. 180. Mill. dict. t. 162. f. 62.*

Stachys africana fruteſcens, meliſſae foliis, floribus breuioribus phoeniceis. *Morif. hiſt. 3. p. 383.*

Habitat ad Cap. b. ſpec. ♄.

Simillima Ph. Leonuro, ſed folia ouata nec lanceolata; magis tomentoſa; Calycibus ariſtatis a Leonuris differt maxime, cum P. nepetifolia conuenit, ſed ab hac differt Caule fruticoſo, foliis paruis, obtuſis, conſiſtentibus Calyciſque collo hirto. Corollae conueniunt in omnibus tribus.

Tragoriganum. 9. THYMVS caule ſuffruticoſo erecto, floribus verticillatis, foliis hiſpidis acuminatis. *Turr. farſet. 11.*
Tragoriganum creticum. *Bauh. pin. 223. Raj. hiſt. 1, p. 523.* *
Tragoriganum magnum. *Alp. exot. 79. t. 78,*
Tragoriganum 2 altera ſpecies. *Cluſ. hiſt. 1. p. 355.*
Habitat in Creta. ♄.
Planta *ſuaueolens.* Caules *hirſuti, pedales.* Folia *vtrinque acuminata, rigidiuſcula.*

thyrſiflorum. 8. OCYMVM floribus paniculato-faſciculatis, caule ramoſiſſimo.
Habitat in India, *diutius virens.*
Caulis *erectus, lignoſus, ſeſquipedalis, totus* Ramis *ſubdiuiſus, brachiatus ſ. paniculatus ramulis teretibus, vtrinque canaliculatis.* Folia *petiolata, elliptico-lanceolata, vtrinque viridia, nuda, laeuiter ſerrata, baſi integerrima, vix carina ſcabra, acuminata.* Paniculae *ramorum terminales, brachiatae, denſae ſ. confertae, foliis vix longiores, e ramulis verticillatis, purpuraſcentibus.* Bracteae *lanceolatae, purpuraſcentes labio ſuperiore ouato.* Corollae *purpuraſcentes, extus pallidae, labro inferiore albo.* Stamina *alba.* Piſtilla *purpuraſcentia. Odor foliorum Rutae. Differt a reliquis ſtatura ramoſiore fruticis,* foliis *magis virentibus diuturnioribus, odore Rutae,* Floribus *in thyrſum faſciculatis.* H. U.

ſcutellarioides. 8. OCYMVM corollis falcatis, pedicellis ramoſis.
Ocymum foliis lanceolato-ouatis ſerratis, racemis verticulatis. *Sp. pl. 834.*
Maiorana rubra. *Rumph. ambr. 5. p. 291, t. 101.*
Habitat in India.
Caulis *pubeſcens.* Folia *ouata, petiolata, obtuſe ſerrata:* Petiolis *adhuc tenellis valde tomentoſis.* Racemus *erectus, longus:* Bracteis *cordatis, ſeſſilibus, acuminatis, laeuibus.* Pedicelli *vtrinque gemini, ramoſi, multiflori.* Calyx *minutus. Labio ſuperiore cordato; L. inferiore 4-fido, acuto, tenui: intermediis 2 longioribus.* Corollae *tubus erectus; Limbus reflexus, fauce dilatata, Labio ſuperiore erecto, breuiſſimo. L. inferiore elongato, falcato, ſtamina et piſtillum obuoluente.* Differt *a congeneribus in flore, vt fere diſtincti generis.*

9. OCY-

monachorum. 9. OCYMVM ſtaminibus edentulis: alternis baſi barbatis.

Ocymum caryophyllatum monachorum. *Bauh. hiſt. 3. p. 260.*

Acinos dioſcoridis. *Colum. phyt. 98. t. 17.*

Habitat . . . ⊙.

Caulis *erectus*, *pedalis*, *teretiuſculus*, *ſubpilloſus*: Ramis *fere ſupra-axillaribus*, Folia *petiolata*, *ouata*, *obtuſiuſcula*, *nuda*, *ſerrata*, *vix ciliata*. Racemi *verticillis ſexfloris*. Calycis *labium ſuperius cordatum ſtriis tribus*. Bracteae *cordatae*, *caducae*. Corollae *minores*, *albidae labio inferiore purpuraſcente*. Filamenta *purpurea*, *longitudine corollae*, *absque dentibus ad baſin*, *at horum loco alterna ad baſin villoſa*. H. U.

ſanctum. 11. OCYMVM foliis ouatis ſerratis vndulatis, caule hirto. bracteis cordatis.

Habitat in India. ⊙.

Caulis *ſeſquipedalis*, *erectus*, *brachiatus*, *teretiuſculus*, *vtrinque ſubcanaliculatus*, *atropurpureus*, *muricatus*, *tuberculis pilo albo*. Folia *ouata ſ. oblongiuſcula*, *obtuſiuſcula*, *ſerrata*, *nudata*; *margine neruisque ſubtus piloſa*, *venis purpureis ſubtus*; *ſuperiora obſcuriora*. Petioli *hirti*, *atropurpurei*. Racemi *terminales*, *ſolitarii*, *erecti*, *atropurpurei*. Bracteis *petiolatis*, *cordatis*, *concauis*, *reflexis*, *deciduis*, *longitudine calycis*. Calyx *ſupra baſin gibboſam hirtus*. Corolla *laete purpurea*, *vix calyce maior*. Filamenta *albida*. Antherae *flaueſcentes*. Odor *vix vllus*. H. U.

album. 10. OCYMVM foliis ouatis obtuſis, verticillis racemorum approximatis, ante antheſin tetragonis, corollis crenatis.

Habitat in India, Jaua. ⊙.

Caulis *pedalis*, *albo-virens*, *baſi lignoſus*. Rami *pauci*. Folia *congeneribus latiora craſſioraque*, *ouata*, *concaua*, *obtuſe ſerrata*. Racemi Bracteae *lanceolatae*, *cordatae ſ. ouatae*, *acutae*, *ante antheſin flore longiores ſpicam tetragonam formantes*. Verticilli *approximati*. Corollae *magnae*, *albae*, *crenatae*: *labio ſuperiore quadrifido*, *ſed laciniis lateralibus magis diuaricati*. Stamina *alba*. H. U.

ANGIOSPERMIA.

viscosa. 7. EVPHRASIA foliis linearibus, calycibus glutinoso-hispidis. *Ger. prou. 285.*
Euphrasia linifolia *β. Sp. pl. 842.*
Pedunculares anoua lutea tenuifolia viscosa pomum redolens. *Gand. aix. 351. t. 78.*
Habitat in Galloprouinciae *glareosis sterilibus.* ⊙.
Differt ab E. lutea: foliis *lineari-lanceolatis, nec stricte linearibus.* Calycibus *villosis viscidis, nec glabris.* Corollis *clausis, nec flamine breuioribus.* Distinguenda *ab Euphrasia linifolia.*

folioſa. 15. PEDICVLARIS caule simplici, spica folioſa, corollis galea obtusissima integra, calycibus quinquedentatis *Jacq vind. 250.* *
Pedicularis foliis alternis: pinnis pinnatis, foliis ex spica florigera longe eminentibus. *Hall. helu. 623. t. 11. f. 2.*
Pedicularis alpina, filicis folio, major. *Bauh. pin. 163.*
Alectorolophus alpina prima. *Clus. hist. 2. p. 210.*
Habitat in Alpibus Heluetiae, Austriae 2.
Folia *bipinnatifida.* Calyces *angulis oreque pilosis.* Corolla *ochroleuca: Galea non rostrata, obtusissima, adunca.*

canadenſis. 16. PEDICVLARIS caule simplici, spica subfolioſa, corollis galea setaceo-bidentatis, calycibus deorsum truncatis.
Habitat in America *septentrionali.* Kalm. 2.
Caulis *erectus, spithameus, simplex, superne pubescens.* Folia *alterna, pinnatifida, incisa, crenata, obtusa, laeuia.* Spica *terminalis, sessilis, ouata, folioſa foliolis calyce paulo longioribus.* Calyces *pubescentes, oblique deorsum truncati.* Corollae *albae: Galea subfalcata, vix rostrata, sed apice fere truncata margine superiore vix dente manifesto; inferiore autem vtrinque dente setaceo, longe magis elongato quam in P. syluatica aut tuberosa. Labium inferius trifidum, obtusum.*

papilionaceum. 41. ANTIRRHINVM corollis ecaudatis, floribus axillaribus, calycibus papilionaceis, foliis carnosis.
Habitat in Persia. *D. Burmannus.*
Folia *alterna, breuiter petiolata, ouata aut obouata car-*

no-

nosa, integerrima, magnitudine Organi. Flores *axillares foliorum, solitarii, breuiter pedunculati, magnitudine foliorum.* Calyx *5-phyllus: folio supremo maiori, cordato, longitudine fere floris; reliquis sublanceolatis, corolla dimidio breuioribus.* Corolla *ecaudata: labio superiore bifido, marginibus lateralibus reflexis; L. inferiore latiori, trifido, subaequali-*

betonicifolia. 15. SCROPHVLARIA foliis cordatis oblongis dentatis: dentibus integerrimis.

Scrophularia betonicæ folio. *Tournef. inst. 166.*

Scrophularia aquatica montana mollior. *Barr. ic. 274. mala.*

Habitat in Lusitania. 4.

Caulis *bipedalis, erectus, tetragonus, subpubescens, basi purpurascens.* Folia *opposita, petiolata, subcordata, oblonga s. triplo longiora quam tota; rugosa, subtus subpubescentia, argute dentata dentibus acuminatis, integerrimis (adeoque Ebulli simillimis) ad basin profundioribus.* Petioli *foliis breuiores.* Panicula *terminalis, subfoliosa.* Corollae *triste purpurascentes labello virescente.* Antherae *flauissimae.* H. U.

crustacea. 4. CAPRARIA repens, foliis oppositis ouatis subpetiolatis crenatis.

Caranasi minus. *Rumph. amb. 5. p. 491. t. 170. f. 3.*

Habitat in Amboina; China.

Simillima Cap. gratioloidi, sed Folia magis ouata et petiolata.

ericoides. 7. SELAGO capitulis sessilibus terminalibus caulescentibus, foliis quaternis subimbricatis.

Habitat ad Cap. b. spei. ♄.

Similis *S. pinastri, sed omnibus partibus minor.* Folia *subimbricata, quaterna, ouato-oblonga, laeuia, acuta, parua.* Flores *in capitulum terminale, ouatum, quod deflorata planta excrescit et continuat ramum, vt fructus laterales euadant.* Stamina *corolla longiora.*

fruticosa. 10. SELAGO capitulis subrotundis terminalibus, foliis sparsis linearibus obtusis integerrimis, caule fruticoso.

Habitat ad Cap. b. spei. ♄.

Frutex *altus: ramis inaequalibus.* Folia *linearia, ob-*

obtusa, parua, inaequalia, integerrimâ, sparsa, conferta, nuda. Capitula *subrotunda, terminalia, sessilia.*

Cheiranthus. 1. MANVLEA.
Lobelia Cheiranthus. *Sp. pl.* 1319.
Habitat ad Cap. b. spei. ☉.
Herba *statura Euphrasiae.* Caulis *palmaris, a basi ad medium ramosus in plures Cauliculos, erectos, teretes, scabros.* Folia *alterna, obouato-oblonga, sessilia, serrata, in ramis superioribus parua.* Racemi *terminales, erecti, planta longiores.* Bracteae *lineares, calyce breuiores.* Pedunculi *calyce etiam breuiores.* Corollae *saturatae luteae.*

canadensis. 3. BVCHNERA foliis laciniatis, caule dichotomo.
Habitat in Virginia. 4.
Caulis *pedalis, quadrangulus, erectus, dichotomus.* Folia *opposita, petiolata, laciniata (Verbenae officinalis), incisa, dentata, supra laeuia.* Spica *ex alis dichotomis singula, pedunculata, e corymbo orta, elongata, inaequaliter sparsis floribus.* Calyces *longitudine dimidii tubi corollae.*

capensis. 4. BVCHNERA foliis dentatis linearibus alternis, calycibus pubescentibus.
Lychnidea villosa, foliis angustis dentibus, floribus vmbellatis. *Burm. afr. 191. t. 50. f. 2.*
Habitat ad Cap. b. spei. ☉.
Planta palmaris, superne ramosa. Flores in spicis terminalibus.

americana. 8. OROBANCHE caule foliis imbricato, corollis recuruatis, staminibus exsertis.
Habitat in Carolina *ad radices arborum et fruticum. Garden.* 4.
Caules *simplicissimi, crassitie vix digiti, spithamei, teretes, colorati, succulenti, toti imbricati* Foliis *ouato-lanceolatis, sessilibus, acuminatis, erectis, coloratis, marcescentibus,* Spica *sessilis, terminalis, longitudine caulis; imbricata fructificationibus.* Bracteae *solitariae, lanceolatae, longitudine fere corollae.* Flores *subsessiles.* Calyx *monophyllus. ventricosus, margine integro.* Corolla *tubulosa, incurua. Limbo angustiore ringente: Labio superiore longiore; inferiore*

re bipartito, erecto. Tota planta cum fructificatione lutea. Simillimam e Sibiria obtinui, vix aliter, quam foliis obtuſis diſtinguenda.

ouata. 3. LIPPIA capitulis ouatis, foliis linearibus integerrimis.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.
Frutex *pedalis, proſtratus, adſperſus paſſim nodulis piſiformibus:* Ramis *teretibus.* Folia *ſparſa, linearia, ſubſucculenta, laeuia; ex ſingulis alis foliola plura, minora; interdum ternata.* Strobili *terminales, ouati, imbricati:* Bracteis *ſcarioſis, ouatis, glabris, calyce ſuo longioribus, apice reflexis, intra ſingulos* Calyx *tubuloſus, quinquedentatus.* Corolla *infundibuliformis, quinquefida, atro-violacea.* Stamina *didyma intra tubum.* Germen *vnicum.* Stylus *filiformis.* Stigma *ſimplex.*
Videant autoptae certiora de genere, in viua planta.

diffuſa. 1. VANDELLIA.
Habitat in Inſula S. Thomae. *D. D. Browne.*
Caulis *herbaceus, tetragonus, brachiatus.* Folia *ouata, ſeſſilia, crenata, obtuſiuſcula.* Flores *axillares, oppoſiti, ſolitarii.* Habitus *Veronicae ſerpylifolliae.*

ciliaris. 12. RVELLIA foliis dentatis ciliatis, floribus oppoſitis.
Habitat in India.
Caulis *pubeſcens.* Folia *oppoſita, ſubſeſſilia, lanceolata, dentata dentibus vtrinque 2 ſ. 3, acuminatis, exſertis, ciliatis, vt in Melampyro aruenſi.* Flores *axillares, ſeſſiles, oppoſiti* Calyx *angulis ciliatis, dentibus breuibus:* Fructus *mihi ignotus.*

repens. 13. RVELLIA foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, floribus ſeſſilibus, bracteis petiolatis calyce longioribus, caule repente.
Habitat in India.
Caules *palmares, herbacei, repentes.* Folia *lanceolata, petiolata, acuminata, integerrima.* Flores *laterales, ſeſſiles, ſolitarii.* Bracteae *binae, ellipticae, petiolatae, calyce longiores.*

Hyſtrix. 7. BARLERIA ſpinis axillaribus geminis ſimplicibus, foliis integerrimis lanceolato-ouatis.
Lycium indicum, ſpinis quaternis ad foliorum ſingulorum exortum. *Seb. muſ. 1. p. 21. t. 13. f. 1.*

Melampyro cognata maderaspatana spinis horrida. *Pluk. alm. 243. t. 119. f. 5,*

Hystrix frutex. *Rumph. amb. 7. p. 22. t. 13.*

Habitat in India. *D. Dau. Royen.* ♄.

Cautius separanda a B. Prionitè, *obseruante Dau. Royen.* Caule *virgato; nec firmo.* Ramis *subtetragonis; nec teretibus.* Foliis *vtrinque glabris; nec subtus pubescentibus.* Spinis *axillaribus geminis, simplicibus, sessilibus, horizontalibus; nec erectis, composito-quaternatis, pedatis.*

ferrata. 3. VOLKAMERIA foliis lato-lanceolatis ferratis subsessilibus.

Habitat in India. ♄.

Rami *teretiusculi.* Folia *fere petiolata, lato-lanceolata, vtrinque nuda, ferrata.* Panicula *brachiata.* Baccae *e quatuor compositae.* Calyces *campanulati, indiuisi, vix dentati.*

calamitosum. 3. CLERODENDRVM foliis oualibus subdentatis nudis.

Habitat in Java. *D. Basler.* ♄.

Folia *opposita, petiolata, ouata s. oualia, ferrato subdentata, vtrinque nuda.* Panicula *brachiata.* Flores *congeneribus paulo minores.*

paniculata. 4. CLERODENDRVM foliis lobatis ferratis, panicula amplissima.

Habitat in India. ♄.

Caulis *quadrifariam sulcatus.* Folia *opposita, cordata, 5 s. 3-loba, ferrata.* Panicula *vastissima: ramis bis dichotomis, dein ramosis.*

longifolia. 2. COLVMNEA foliis lanceolatis longissimis subserratis glabris.

Babel-Tsiuli. *Rheed. mal. 9. p. 169. t. 87.*

Habitat in India.

Caulis *herbaceus.* Folia *opposita, sessilia, lanceolata, longissima, subserrata, vtrinque laeuia.* Racemi *terminales, elongati, recti Floribus oppositis.* Calyx *5-phyllus, ouatus, erectus, persistens.* Corolla *monopetala, irregularis: Labio superiore magis oblongo; L. inferiore trifido.* Stamina *didyma.* Antherae *basi bipartitae lobis diuaricatis, adnexae oppositae in crucem.* Germen *ouatum.* Stylus *longitudine staminum.* Stigma *crassiusculum, bifidum.* Capsula *subouata, bilo-*

bilocularis, *biualuis*. Receptaculum *ſeminum globoſum*, *cui immerſa*. Semina *plurima*.
Genere cum Achimene *Brown. conuenit; an* Columneae?

XV. TETRADYNAMIA.

SILICVLOSA.

aizoides. 7. DRABA ſcapo nudo ſimplici, foliis enſiformibus ciliatis carina laeui.
Alyſſum alpinum hirſutum luteum. *T. Mill. dict. t. 20. f. 2.*
Sedum alpinum hirſutum luteum. *Bauh. pin. 284.*
Leucoium luteum aizoides montanum. *Col. ecphr. 2. p. 62.*
Burſa paſtoris alpina roſea lutea. *Moriſ. hiſt. 2. p. 306. ſ. 3. t. 20. f. 6.*
Habitat in Alpibus Europae. ♃.
Similima D. alpinae *a qua differt*: Foliis *laeuibus*, *linearibus*, *carinatis*, *ciliatis*; *nec ouali-oblongis hirtis absque carina*. *Differt a* D. ciliari *Foliis in caeſpitem congeſtis radicalibus*, *carina laeui*; *nec Foliis alternis in ramis expanſis*, *carinaque ciliata*. Floribus *vt in D. alpina flauis*, *nec albis*.

ciliaris. 8. DRABA caule folioſo, foliis linearibus margine carinaque ciliatis. *Ger. prou. 344. t. 13. f. 1.**
Habitat in Alpibus Barcinonenſibus. ♃.
Folia *radicalia in caeſpitem congeſta*, *imbricata*, *conferta*, *laeuia*, *carinata*, *diſtincte ciliata*. Petala *obouata*, *integra*, *alba*. Stylus *ſtaminibus longior*.
Differt a Draba aizoide *foliis anguſtioribus glabris*, *petalis minime emarginatis*. Culta *ramos exſerit foliis remotis*.

ſuffruticoſum. 18. LEPIDIVM foliis lanceolato-linearibus tenuibus integerrimis, caulibus ſuffruticoſis.
Habitat in Hiſpania. ♄.
Caules *ſuffruticoſi*, *palmares*, *erecti*, *filiformes*, *virentes*. Folia *anguſto-lanceolata*, *integerrima*, *laeuia*, *tenuia nec carnoſa*, *viridia*, *patentia*, *ad gemmas ſaepe plura*. Corymbi *parui*, *albi*. Petala *vix calyce longiora*, *diſtantia*. Stamina 6 *antheris flauis*. Fructus *Naſturtii*.
Differt a L. graminifolio *quod eſt bipedale*, *foliis planis*:

nis: inferioribus ſerratis, calycibus rubris, Petalis latioribus obouatis.

didymum. 19. LEPIDIVM foliis pinnatifidis, caule erecto, fructibus didymis.
Habitat . . .
Caules *pedales, laeues.* Folia *pinnata: pinnis ſeſſilibus, alternis, lanceolatis, antice dentatis.* Racemi *axillares, longitudine foliorum.* Flores, *vt in Lepidiis quibusdam, minutiſſimi.* Capſulae *ſubrotundae, didymae, ſubrugoſae.* Media *inter Cochlearias et Lepidia.*

creticum. 15. ALYSSVM caule fruticoſo, foliis lanceolatis ſubdentatis tomentoſis, ſiliculis inflatis globoſis.
Alyſſoides fruticoſum creticum, leucoji folio incano. *Tournef. cor. 15.*
Leucoium luteum, vtriculato ſemine. *Alp. exot. 117. t. 118.*
Habitat in Hiſpania, Creta. ♄.

alpeſtre. 16. ALYSSVM caulibus ſuffruticuloſis diffuſis, foliis ſubrotundis incanis, calycibus coloratis. *Ger. prou. 352. t. 13. f. 2.*
Habitat in Alpibus Galloprouinciae *verſus Italiam.* ♃.
Folia *ſpatulata, obtuſiſſima.* Calyces *flaueſcentes, decidui.* Petala *lutea, integra.* Stamina *baſi appendiculata membranula.* Stylus *deciduus.* Siliqua *ouata, incana.*

gemonenſe. 17. ALYSSVM caule herbaceo, ramis diuaricatis, foliis radicalibus obouatis ſubtomentoſis, ſiliculis inflatis.
Alyſſum. *Ard. ſpec. 2. p. 30. t. 14.*
Habitat . . .
Differt ab A. cretico *ramis diuaricatis, Floribus ſaturate luteis minoribus.*

vtriculatum 18. ALYSSVM caule herbaceo erecto, foliis lanceotis laeuibus, ſiliculis inflatis.
Alyſſoides fruticoſum, leucoji folio viridi. *Tournef. inſt. 218.*
Habitat in Oriente.

tomentoſa. CLYPEOLA ſiliculis orbiculatis bilocularibus, foliis ſubtomentoſis.
Alyſſum *orientale* caulibus fruteſcentibus paniculatis, ſilicu-

filiculis obcordatis compreſſis diſpermis. *Ard. ſpec. 2. p. 32. t. 15, f. 1.*

Alyſſum creticum ſaxatile, ſerpilli folio candidiſſimo, capſulis orbiculatis. *Tournef. cor. 15.*

Habitat in Oriente. 24.

SILIQVOSA.

catholicum. 24. SISYMBRIVM filiquis filiformibus, laeuibus, foliis pinnatis denticulatis caulinis.

Habitat in Hiſpania, Luſitania.

Caules *palmares ſ. pedales, laeues.* Folia *radicalia et caulina pinnata, laeuia, fragilia:* Foliolis *oblongis, ſerratis ſ. dentatis, ad apicem petioli ſaepe confluentibus.* Racemus *oblongus.* Flores *longius pedunculati.* Petala *flaua, obouata, integra, magna.* Calyx *laeuis.* Siliquae *remotae.*

indicum. 26. SISYMBRIVM foliis lanceolato-ouatis ſerratis petiolatis laeuibus, filiquis ſubarcuatis.

Habitat in India. ☉.

Caulis *ſubpedalis, erectiuſculus, flexuoſus, angulatus, laeuis, inferius ſubramoſus.* Folia *lato-lanceolata ſ. lanceolato-ouata, nuda, multum acuminata, petiolata exceptis ſupremis.* Racemi *terminales et axillares, foliis longiores.* Flores *minuti, albi: Petalis vix calyce longioribus.* Siliquae *teretes, laeuiſſime arcuatae.*

alpinus. 14. CHEIRANTHVS foliis linearibus integris ſubtomentoſis.

Eryſimum foliis linearibus incanis integris. *Ger. prou. 363.*

Leucoium anguſtifolium alpinum, flore ſulphureo. *Alion. pedem. 44. t. 9. f. 3.*

Leucojum anguſtifolium alpinum, flore ſulphureo. *Tournef. inſt. 222.*

Habitat in alpinis montibus Italiae; *in rupe Victoriae* Galloprou. *D. Jacquin.* 24.

Simillimus Ch. eryſimoide, diſtinctus foliis incanis.

ſalinus. 15. CHEIRANTHVS foliis lanceolatis obtuſis integerrimis, caule erecto, antheris incluſis.

Habitat ad Sibiriae, Tatariae *ſalinas. DD. Lerche.* ♄.

Simillimus Ch. *incano, ſed octies minor. totus laeuiſſime tomentoſus.* Caules *erecti, durant aliquot annos.* Folia *minime dentata,* Corollae *purpureae fauce flaue-*

ueſcente. Stigma *obtuſum*, *craſſiuſculum*, *bifidum*, *minimeque tenue.* Odor *Ch. incani.* H. U.

fruticuloſus. 16. CHEIRANTHVS foliis lanceolatis acutis glabris ſubſerratis, caule fruticuloſo.

Leucoium luteum minus fruticans. *Barr. ic.* 1228.

Habitat in Hiſpania. *Cl. Alſtroemer.*

Simillimus Ch. Cheiri, *ſed palmaris.* Rami *anguſti.* Folia *lanceolata*, *ſubpetiolata*, *acuminata*, *laeuia*, *duriuſcula*, *ſerraturis inferiorum paucis argutis.* Flores *octies minores*, *lutei*, *minus fragrantes.* Petalis *ſubrotundis*, *obſolete emarginatis.* Antherae *ſubcaeruleſcentes.* H. U.

Farſetia. 17. CHEIRANTHVS fruticoſus erectus, foliis lineari-lanceolatis, ſiliquis oualibus.

Farſetia aegyptiaca, *Turrae farſetia venet.* 1765. *quart. p.* 1. *t.* 1.

Thlaſpi fruticoſum ramoſum, leucoji acutis foliis, argenteum. *Fluk. alm.* 365.

Habitat in Aegypto Arabia. ♄. *Forskähl.* ♄.

Caulis *pedalis*, *erectus*, *fruticuloſus*, *incanus*, *ſtrictus*, *ramoſus.* Folia *alterna*, *ſeſſilia*, *linearia*, *acuminata*, *integerrima*, *incana ſ. ſubargentea.* Racemi *ſublaterales*, *oppoſitifolii*, *ſtricti.* Calyx *oblongus*, *viridis: foliolis* 2 *oppoſitis gibboſioribus.* Petala 4, *triſtia*, *linearia*, *rotundata*, *integerrima*, *obliqua*, *purpuraſcenti-alba*, *obſolete ſaturatius reticulata.* Stamina *tetradynamia*, *unguibus breuiora.* Antherae *luteae.* Piſtillum *ſtaminibus breuius.* Siliqua *oualis*, *compreſſo-plana.* Herba *tota Conuoluuli Dorycnii.* Flos *Cheiranthi triſtis.* Fructus *fere Lunariae.* Flores *triſtes*, *noctu tantum ſuaueolentes.* *Habitu proxime accedit ad* Lunariam fruticoſam perennem incanam Leucoii folio. *Tourn. it.* 1. *p.* 92. *t.* 92. *ſed folia linearia. acuminata*, *laeuia*, *ſtricta.* H. U.

bellidifolia. 9. ARABIS foliis ſubdentatis: radicalibus obouatis cuneiformibus; caulinis lanceolatis *Jacq. obſ.* 22. *t.* 12.

Naſturtium alpinum, bellidis folio, maius. *Bauh. pin.* 105. *prodr.* 46. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 870.

Plantula cardamines aemula. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 129.

Turritis foliis omnibus glabris ouatis. *Hall. helu. emend.* 229.

Habitat in Alpibus Auſtriacis, Helueticis 24, *Simil-*

Simillima Arabi Alpinae, *ſed petala erecta anguſta.* Siliquae *approximata.*

aruenſis. 11. BRASSICA foliis caulinis cordatis amplexicaulibus, petalis patentibus, ſiliquis obtuſe tetragonis. *Ger. prou. 368.* *.
Braſſica campeſtris perfoliata, flore purpureo. *Bauh. pin. 112.*
Braſſica ſylueſtris, fabariae foliis. *Bocc. ſic. 49. t. 25. f. 3. 4.*
Habitat in Europae *auſtralis aruis humentibus.* 2.

alpina. 12. BRASSICA foliis caulinis cordato-ſagittatis amplexicaulibus, radicalibus ouatis, petalis erectis.
Braſſica alpina perennis. *Rupp. hall. 75.* *
Habitat in Germania . . . *D. Schreber.*
Differt a Br. aruenſi *caule anguſtiore, foliis tenerioribus longioribus, radicalibus longe petiolatis; imprimis* Petalis *erectiuſculis albis, et flore paruo Turritidis.*

pubeſcens. 11. SINAPIS ſiliquis pubeſcentibus erectis: roſtro compreſſo, foliis lyratis villoſis.
Sinapis hirſuta, caulibus fruteſcentibus, foliis inferioribus lyrato-pinnatis: ſuperioribus ſeſſilibus. *Ard. ſpec. 1. p. 21. t. 9.*
Habitat in Siciliae *monte Buſſambarenſi. Arduin.* ♄.
Caulis *perennans.* Folia *lyrata, obtuſa, villoſa, vt tota planta.* Flores *lutei Petalis integris.* Siliquae *erectae, villoſae.*

chinenſis. 12. SINAPIS ſiliquis laeuibus ſubarticulatis patulis, foliis lyrato-runcinatis ſubhirtis.
Sinapis ſiliquis glabris ſubarticulatis diuaricatis, foliis inferioribus lyrato pinnatis auriculatis, ſuperioribus lineari-lanceolatis. *Ard. ſpec. 1. p. 23. t. 10.*
Habitat in China? *Arduini.* ⊙.
Caulis *inferne hiſpidus.* Folia *lyrato-runcinata, dentata, margine coſtisque ſcabra.* Flores *alpi, parui.*

caudatus. 4. RAPHANVS ſiliquis tota planta longioribus.
Habitat in Final. 1764. *Braad.* ⊙.
Statura *et facies Raphani ſatiui, ſed folia acutiora et Caulis breuior, diffuſus, nec niſi iunior erectus, at laeuis, purpuraſcens rore glauco.* Flores *albidi.* Siliquae *bi ſ. tripedales, curuae, vniloculares, ſuturis*

qua-

quatuor obsoletis ; basi gibbis duobus ; dissepimento recipiente semen vnum post alterum. Longitudo *siliquarum negat caulem crescere erectum , cum decumbant supra terram, instar Serpentis.* H. U.

spinosa. 5. BVNIAS racemis spinescentibus.

Bunias siliculis ouatis acutis , ramis spinosis floriferis. *Turr. farset. 11.*

Brasica spinosa. *Alp. exot. 201. t. 200. Bauh. pin. 111. prodr. 54.*

Crambe spinosissima arabica , foliis longis angustis , floribus in foliorum alis. *Shaw. afr. 179.*

Habitat in Oriente. ⊙.

Caules *pedales , erecti , ramosi, subdiuisi, teretes, iuncei, laeuissimi, virides.* Folia *ouato oblonga. obtusa, subangulata, laeuia , petiolata.* Racemi *erecti, stricti, rigidique, ramulos terminantes, in Spinas compositas desinentes , ad quorum latera* Flores *sessiles, rari.* Calyx *oblongus, clausus.* Petala *lanceolata, exalbido-violacea.* Stamina *tetradynama.* Germen *cordatum.* Stylus *cylindricus, longitudine germinis, persistens.* Stigma *crassiusculum.* Silicula *cordata , didyma , s. potius* Drupa *suberosa, laeuis , acuta.* Nux *bilocularis, sexangularis : angulis duobus oppositis latioribus.* Semina *solitaria, subrotunda.* H. U.

Myagroides. 6. BVNIAS siliculis ancipitibus biarticulatis, superne torulosis, fol. pinnatis sinubus reflexis.

Habitat in Sibiria. *J. Folk.* ⊙.

Caulis *rectus, bipedalis, laeuis, paniculato-ramosus.* Folia *inferiora pinnata s. bipinnata, latiora, non carnosa, saturate viridia, laeuia laciniis s. pinnis oblongis dentatis; Summa simillima, sed angusta , linearia : omnia habent sinus ad egressum pinnarum deorsum reflexos.* Racemi *terminales , longi , recti.* Flores *subsessiles.* Calyx *oblongus, clausus.* Petala 4 , *obouata , integerrima, dilute purpurascentia.* Stamina 4 *dynama : antheris flauescentibus.* Stylus *ensiformis.* Stigma *capitatum purpurascens.* Siliqua *subcylindrica breuior.* Siliqua *pedunculata* Pedunculo *breui , rigida , rachi approximata , Myagri facie; haec Siliqua constat articulis duobus : inferiore cylindrico , biualui, monospermo vix 2-spermo : valuulis vnica stria exaratis :* Superior *articulus compressus , subanceps , monspermus ,*

ſpermus, vix diſpermus, obtuſus, vtrinque auricula protuberante notatus.

XVI. MONADELPHIA.

DECANDRIA,

hybridum. 58. GERANIVM calycibus monophyllis, foliis ſuborbiculatis glabris crenatis integris, caule fruticoſo.

Geranium africanum arboreſcens, maluae folio pingui: varietas. *Dill. elth. 152. t. 125. f. 152.*

Habitat ad Cap. b. ſpei. *Filia Ger. inquinantis ex Ger. acetoſo.* ♄.

Flores *ſimillimi Ger. inquinanti, ſed herba minor.* Folia *non tomentoſa, ſimillima Ger. acetoſo, at baſi nec cuneata, nec reniformia, minus acetoſa.*

pyrenaicum. GERANIVM pedunculis bifloris, petalis bilobis, calycibus apice glandulofis, antheris exterioribus ſterilibus. †.

Geranium pedunculis bifloris, foliis multifidis: laciniis obtuſis inaequalibus, petalis bifidis. *Burm. ger. 27. Gerard. prou. 434. t. 16. f. 2.* *

Geranium columbinum perenne pyrenaicum maximum. *Tournef. inſt. 268.*

Habitat in Pyrenaeis. 2.

Caules *villoſi.* Folia *quinquefida, inciſa, obtuſiuſcula, margine rubro.* Calycis *foliola apice glandula rubra.* Petala *calyce duplo longiora, purpuraſcentia.* Stamina *quinque exteriora breuiora antheris abortientibus. Gerard.*

fuſcum. 59. GERANIVM pedunculis bifloris geminis oppoſitifoliis, caule patulo, petalis integerrimis.

Geranium pedunculis bifloris, foliis quinquelobis inciſis, petalis reflexis. *Mill. dict. n. 7.*

Geranium phaeum ſ. fuſcum petalis reflexis. *Moriſ. hiſt. 2. p. 515.*

Geranium montanum fuſcum. *Bauh. pin. 318.*

Habitat in Auropa *Auſtrali.* 2.

Inuitus hanc ſeparo a Ger. phaeo, *cum quo conuenit multis, etiam Corolla tota expanſa atra: ſed differt* Foliis *rigidis,* Corolla *magis reflexa, minora: petalis ſuborbiculatis, mucronatis, integerrimis, pla-*

nis. Pedunculis *non ſolitariis bifloris, ſed 2 diſtinctis.* H. U.

ſpinoſum 60. GERANIVM pedunculis vnifloris, caule carnoſo noduloſo: ſpinis ſolitariis ſtrictis.

Geranium ſpinoſum et nodoſum, foliis reflexis. *Burm. afr. 18. t. 31.*

Geranium pedunculis ſimplicibus vnifloris, foliis cuneiformi-ſinuoſis, ramis nodoſis ſpiniferis. *Burm. ger. 16. n. 2.*

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.

Planta *ſucculenta.* Caulis *ſuffruticoſus, obuallatus, vndique tuberculis latis, inaequalibus, glabris.* Spina *e ſingulo tuberculo, ſubulata, lignoſa, pollicaris, apice ſaepe foliolum proferens.* Folia *ſubpetiolata, obouata, integerrima ſ. parce crenata, adſperſa punctis glanduloſis.* Calyx *pentaphyllus, ſub apice ariſtatus more G. europaeorum, absque tubo.* Stamina 10, *aequalia.* Stylusque *vt in europaeis.* Pedunculi *vniflori.*

POLYANDRIA.

Ludwigii. 4. ALTHAEA foliis palmatis quinquefidis vtrinque glabris, pedunculis pluribus vnifloris.

Alcea minor ſicula, flore minore. *Raj. hiſt. 605. an?*

Habitat in Sicilia. *D. Schreber.*

Herba *tota facie refert Foliis Maluam Alceam, vt ouum ouo.* Pedunculi *axillares*, 2-5, *vniflori, longitudine petiolorum.* Calyx exterior *8-phyllus foliolis lanceolatis,* Interior *fere breuior*, 5-*fidus*, *albis villis hirſutiſſimus*, *minor A. hirſutae.* Alcea hirſuta *differt ab hac* Foliis *minus diuiſis acutioribus.* Caule *Pedunculis Petiolisque piloſis.* Calycibus *ſtrigoſis* (*nec lanatis*), *quadruplo maioribus: interiore non hiſpido, nec lanato-albo.*

indica. 1. SARACA.

Habitat in India. *Kleynhoff.* ♄.

Arboris Folia *alterna. pinnata ſine impari, triiuga ſ. quadriiuga: Foliolis oblongis, petiolatis.* Panicula *racemis ſ. Spicis alternis:* Bracteis *ſubimbricatis, ouato-lanceolatis, oppoſitis binis binisque. Tomentacea planta.*

XVII. DIADELPHIA.

OCTANDRIA.

aſpalatha. 25. POLYGALA floribus criſtatis, foliis ſetaceis ſparſis, caulibus ſimpliciſſimis.
Habitat in Braſilia. *Arduini.*
Caules *ſimpliciſſimi, ſubpedales.* Folia *ſparſa, filiformia, acuminata, patentia, pollicaria: ſuperiora breuiora.* Flores *ſubcapitati, terminales: pedicellis longitudine florum* Bracteae *ſubiectae ſingulis lanceolato-ſubulatae, longitudine pedicelli, coloratae.* Corolla *alba, alis lanceolatis, carina penicillata.* Facies *Aſpalathi.*

braſilienſis. 26. POLYGALA floribus criſtatis ſubſpicatis, foliis lanceolatis ſparſis, caulibus ſimpliciſſimis.
Habitat in Braſilia.
Caules *ſimplices, palmares, filiformes, proſtrati:* Ramo *rarius laterali.* Spica *recta, terminalis, alba: Floribus breuiſſime pedicellatis, abſque bracteis. Alae ouatae, obtuſae, Carina penicillata.* Capſulae *ſeminibus ſolitaris.* Pedunculus *ſpicae elongatur deciduis inferioribus floribus, vnde rachis denticulata.*

DECANDRIA.

criſta-galli. 5. ERYTHRINA foliis ternatis, petiolis ſubaculeatis glanduloſis, caule arboreo inermi. *Vandelli mſſ*
Coral arbor non ſpinoſa trifolia. *Pet. muſ. 76. Raj. dendr. 100.*
Habitat in Braſilia. *D. Vandelli.*
Arbor *caudice inermi.* Rami *ſtricti.* Folia *ternata:* Foliolis *ouato oblongis, integerrimis.* Petiolis *elongatis, ſubtus aculeo ſaepe vnico alteroue recuruo; in hoc petiolo ad pedicellorum exortum vtrinque glandula, vt et glandulae binae in medio pedicelli intermedii.* Flores 2 ſ 3, *axillares, purpurei pedunculis propriis, reſupinati,* Calyx *campanulatus, bilabiatus; labio inferiore mucronatus.* Vexillum *ouato-cordatum, reflexum, emarginatum.* Alae *minimae, ſubouatae, calyce breuiores.* Carina *ſtricta, ſubfalcata, acuta, compreſſa, longitudine fere vexilli.* Stam. *diadelpha, inferiora 9 fere tota coalita, longitudine carinae.* An-

thaerae *oblongae*. Germen *oblongum*, *villosum*. Stylus *subulatus*, Stigma *puncto minuto*. H. U.

laeuigata. 7. BORBONIA foliis lanceolatis eneruibus glabris, inuolucris calycibusque hirtis.

Habitat ad Cap. b. spei. ♄.

Rami *teretes*, *superne subvillosi*. Folia *alterna*, *sessilia*, *lanceolata*, *eneruia*, *mucronata*, *glabra*. Vmbellulae *terminales*, *breuissime pedunculatae*. Inuolucrum *tetraphyllum*, *ouatum*, *concauum*, *erectum*, *pilosum*. Pedicelli *quaterni*, *inuolucris breuiores*. Calyx *campanulatus*, *basi planus*, *quinquefidus fissura superiore minore*, *acutus*, *pilosus*, *corolla breuior*. Corolla *lutea*. Stamina *diadelpha*. Germen *hirsutum*. *Intra calycem aliquot squamae nectareae*.

gerardi, 11. ANTHYLLIS herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, pedunculis lateralibus folio longioribus, capitulis aphyllis. *Ger. prou.* 490 *t.* 18. †

Habitat in Galloprouinciae *maritimis versus s. Tropes sub Pinubus*. ☉.

Caules *multi*, *prostrati*, *glabri*. Folia *alternato-pinnata*, *sublinearia*. Stipulae *magnitudine foliorum*.

semierectus. 14. PHASEOLVS caule semiuolubili, floribus spicatis, calycibus ebracteatis, alis vexillo triplo maioribus foliolis ouatis.

Phaseolus strumosa radice, flore purpureo, siliqua angustissima. *Plum. spec.* 8. *Amoen. acad.* 4. *p.* 247.

Phaseolus barbadensis erectior, siliqua angustissima, tinctorius. *Dill. elth.* 312. *t.* 233. *f.* 301.

Phaseolus subhirsutus americanus exitiosus, siliquis longis cauliculis insidentibus. *Pluk. alm.* 290. *t.* 214. *f.* 2.

Habitat in America *calidiore*. 2.

Caulis *erectus*, *tripedalis*, *demum superius volubilis*, *teres*, *substriatus*, *subpubescens*. Folia *ternata*, *ouata*. *nuda*, *obtusiuscula*, *submucronata*, *longitudine petioli*. Stipulae *subensiformes*. Pedunculi *longi*, *pedales*, *stricti*, *erecti*. Spica *rarior*, *floribus gemellis sessilibus*. Calyx *cylindricus* Corollae *vexillum et carina pallidiores*. *Alae triplo maiores*, *conuexae*, *rubrae*, *basi caerulescentes*, *conniuentes*. *Carina contorta*. H. U.

15. PHA-

Mungo. 15. PHASEOLVS caule flexuoſo ſubſcandente hiſpido tereti, leguminibus capitatis hirtis.

Phaſeolus hirſutus flexicaulis mungo affinis maderaſpat, caule tereti. *Pluk. alm. 290.*

Habitat in India orientali. ⊙.

Caulis *erectus*, *flexuoſus*, *parum ſcandens*, *vt tota planta piloſus hirſutie heluola.* Foliola *lateralia latere exteriore dimidiato-cordata*; *interiore lanceolata.* Stipulae *foliorum ouali-oblongae*, *medio adnatae*, *nudae*, *ciliatae*; *foliolorum vero lanceolatae*, *attenuatae in ſetam.* Pedunculi *longitudine foliorum*, *terminati* Receptaculo *ouato*, *glabro*, *ferente* capitulum *floribus ſeſſilibus luteis*: *Siliquae hirſutae.* H. U.

altiſſimus. 26. DOLICHOS volubilis, leguminibus racemoſis, hirtis aequalibus, ſeminibus hilo cinctis, foliis vtrinque glabris. *Jacq. amer. 203. t. 182.*

Habitat in Martinicae *ſylvis*, *altiſſimas arbores ſcandens.* *Flores violacei.*

trilobatus. 27. DOLICHOS volubilis piloſus, foliolis trifidis.

Phaſeolus maderaſpatanus, caulículis piloſis, ſcandens, paſſiflore modo trilobatus. *Pluk. alm. 292. t. 120. f. 3.*

Habitat in India. ⊙.

Sata, *multoties mihi enata*, *florere recuſauit*; *hinc etiamnum de* genere *minus tutus.* H. U.

mono- phyllum. 9. GLYCINE foliis ſimplicibus cordatis, caule pubeſcente triquetro.

Habitat ad Cap b. ſpei

Caules *bipedales*, *triquetri*, *ramoſi*, *craſſitie fili*, *proſtrati et decumbentes*, *piloſi.* Stipulae *binae.* Folia *cordata*, *integerrima*, *ſimplicia*, *vtrinque ſubpubeſcentia*. *petiolis triplo longiora*, *apice mucrone inermi.* Pedunculi *axillares*, *ſolitarii*, *vniflori*, *capillares*, *petiolis longiores.* Inuolucrum *tenellum*, *subtrifidum.* Corollae *violaceae.* Germen *oblongum*, *villoſum.* Fructum *non vidi.* *Carina corollae obtuſa* *Hedyſari.*

iiſpida. 7. ROBINIA ramis axillaribus, foliis impari pinnatis, caule inermi hiſpido.

Robinia racemis axillaribus, pedicellis vniflóris, fo-

liis impari pinnatis, caule inermi. *Jacq. amer. 211. t. 179. f. 101.*

Robinia foliis impari pinnatis: foliolis ouatis, ramis pedunculisque hiſpidis. *Mill. ic. 163. t. 244.*

Pſeudoacacia hiſpida, floribus roſeis. *Catesb. car. 3. p. 20. t. 20.*

Habitat in Carolina, Carthagena. ♄.

Simillima R. Pſeudoacaciae, *ſed* flores *maiores, roſei; ramuli, pedunculi calycesque hiſpidi.* Foliola *magis ouata et ouata.*

crinitum. 47. HEDYSARVM foliis pinnatis, racemis oblongis, leguminibus inflexis, caule fruticoſo. *Burm. ind. t. 53.*

Habitat in India.

Structura *fructificationis adeo ſimilis H.* lagopodioidi *et* barbato, *ac ouum ouo, et ſingularis quod quiuis* pedicellus *abſoluta floreſcentia inflectatur arcuatus* Calycis *laciniis* 3 *maioribus p.loſis reflexis; et ſic occultet* Legumen *laeue, complicatum, intra pedicellos, vt non conſpiciantur, perfecte vt in illis; at differt* Caule *alto, erecto, fruticoſo, ſereque arboreo,* Foliisque *pinnatis: foliolis* 5, *oblongis.*

proſtratum. 48. HEDYSARVM folis pinnatis, leguminibus cylindricis indiuiſis diſpermis, capitulis ſeſſilibus lateralibus, caulibus proſtratis. *Burm. ind. 54. t. 2.*

Colutea minima diſpermos. *Pluk. phyt. t. 165. f. 4.*

Habitat in India. ♄.

Caules *palmares, diffuſi, proſtrati, depreſſi, ramoſi, teretes,* Stipulae *membranaceae, patulae, bifidae.* Folia *minuta, pinnata: foliolis* 5 *ſ.* 7, *cuneatis, ſaepe retuſis, ſupra glabris, ſubtus pilis imbricatis tomentoſis cinereisue.* Capitula *axillaria, ſeſſilia.* Legumina *ouato-cylindrica, laeuia, aequalia, piſtillo recto mucronata.* Semina *duo.*

moniliferum. 49. HEDYSARVM foliis ſimplicibus orbiculatis, leguminibus moniliformibus: articulis globoſis *Burm. ind. t. 49. f. 3.*

Habitat in India. 24.

Caules *ſpithamaei, proſtrati, palmares.* Stipulae *bipartitae, ſtriatae, acutae, ſcarioſae.* Folia *orbiculata, parua, petiolata, laeuia, obtuſa.* Capitula *axillaria.* Legumina *ſubfaſcieulata, pedunculata, recta, articulis*

lis ſaepe quinque, globoſis, pubeſcentibus (lente viſis pube vncinata) maiuſculis.

retroflexum. 50. HEDYSARVM foliis ternatis lineatis, racemis erectis, leguminibus pendulis multi-articulatis.
Habitat in India. 4.
Frutex. Folia *ternata, ouata, ſubtus tomentoſo-ſericea.* Racemi *laterales terminalesque pedunculis pendulis, filiformibus.* Legumina *compreſſa, altero margine repanda, 4-7 articulis.*

ſinicus. 40. ASTRAGALVS cauleſcens, capitulis pedunculatis: leguminibus priſmaticis rectis triquetris apice ſubulatis. *Mill. act. angl. 1765. p. 138.*
Habitat in China.
Caules *proſtrati, ſpithamaei, teretes.* Folia *pinnata: foliolis 7 ſ. 9, ſuborbiculatis, laeuibus, tenuibus.* Pedunculi *adſcendentes, ſubangulati, foliis breuiores.* Flores *vmbellati, ſubſeſſiles, 9 ſ. 10: Vexillo emarginato, obcordato, lateribus reflexo, purpuraſcente; Alis albis; Carina purpurea.* Legumen *triquetrum, ſubtus planiuſculum apice ſtylo vncinato reflexo.* H. U.

auſtralis. 4. PHACA caule ramoſo proſtrato, foliolis lanceolatis, florum alis ſemibifidis. *Hall. emend. 223.* †.
Phaca cauleſcens diffuſa, pedunculis longiſſimis, leguminibus ſemi-ouatis. *Ger. prou. 519.* *
Aſtragaloides alpina ſupina glabra, foliis acutioribus. *Til. piſ. 19. t. 14. f. 1.*
Habitat in Apinis Heluetiae, Italiae, Galloprouinciae. 4.
Folia *ſexiuga circiter, cinerea, piloſa.* Flores *albido-flauicantes.* Alae *ſemibifidae, quod ſingulare.* Legumina *glabra.* Carina *corollae violacea, nec ad apicem 2 maculis violaceis, vt in Ph. alpina, a qua parum differt.*

veſicaria. 5. PHACA acaulis, calycibus fructiferis oualibus inflatis glabris. *Schreb. dec. 9. t. 7.*
Aſtragaloides orientalis veſicaria, foliis et fructibus glabris. *Tournef. cor. 27.*
Habitat in Oriente. 4.
Folia *radicalia pinnata 12-juga et vltra.* Foliola *lanceolata, glabra, acuminata, plurima.* Scapi *erecti, terminati racemo.* Calyces *ouales, inflati, alterni,*

breuiter pedunculati ac fructiferi quadruplo latiores, globosi, glabri, colorati. Legumen *paruum intra calycem oblongum.*

tetragonoloba. 15. PSORALEA foliis ternatis dentatis, caule flexuoso, leguminibuus strictis quadrangularibus.
Habitat in Arabia. *Forskahl*; *in* Surate. *Brad*
Caulis *herbaceus, erectus, flexuosus, angulatus, crassitie pennae.* Folia *magnitudine Meliloti, maiora, ternata: impari petiolato.* Foliola *ouata, acuminata, rarius profunde que serrata f. subdentata, vtrinque vix pubescentia* Stipulae *setaceae.* Racemi *axillares, erecti, pedunculati, longitudine foliorum.* Bracteae *setaceae, flore fere longiores.* Flores *alterni, breuissime pedicellati: indigoferae paulo maiores, carina acuta absque corniculis lateralibus indigoferae.* Legumina *magna, longitudine foliorum, compressa, futura vtr que vtrinque membranaceo-angulata, acuminata acumine elongato.* Semina 4 *f* 5. H. U.

graecus. 28. LOTVS capitulis subrotundis, caule erecto patulo, foliis quinatis, leguminibus ouatis.
Lotus graeca maritima, folio glauco et veluti argenteo. *Tournef. cor. 27.*
Habitat in Oriente: *in* Graecia. Arabia. 4.
Media inter Lot. hirsutum, *et* rectum, *vt cuinam propior vix dicendum.* Caulis *erectus, annuus, sed magis patule ramosus:* Flores *etiam albi; minores hirsuto, maiores recto.* Legumina *ouata.* Differt *ab omnibus foliis quinatis (praeter stipulas), nec ternatis.* Stipulae *oblongae vt in L. hirsuto; nec cordatae, vt in recto.* H. U.

arabicus. 29. LOTVS leguminibus cylindricis aristatis, caulibus prostratis, pedunculis trifloris, bracteis monophyllis.
Habitat in Arabia. *D. Forskahl.* 4.
Caules *plures, sesquipedales, prostrati, vix pubescentes.* Folia *ternata, petiolata.* Foliola *subpetiolata, obouata, obtusiuscula, subincana, fere glabra.* Stipulae *fere magnitudine figuraque foliorum.* Petioli *breuissimi.* Pedunculi *erecti, triflori f. 4-flori, foliis saepe longiores.* Flores *pedicellati, nutantes, pallide rufescentes: vexillo venis rubris; alis includentibus carinam.* Calycis *dentes subulati, distantes.* Bractea, *ad exortum Pedunculorum proprtorum, monophylla, erecta,*
folio-

foliolis ſimilis. Noctu dormit *floribus arcte Pedunculo communi approximatis, ſuper impoſita bractea, Foliolis Stipulisque conniuentibus.* Legumina *cylindrica, ariſtata.* H. U.

XVIII. POLYADELPHIA.

PENTANDRIA.

ſpecioſa. 1. MONSSONIA.

Geranium folio tenuiſſime diſſecto, flore ſingulari ampliſſimo. *Breyn. prodr. 3. app. 31. t. 21. f. 2.*

Habitat ad Cap. b ſpei, 24.

Folia *radicalia, petiolata, plurima, pinnata: Foliolis linearibus, pinnatis: pinnis ſublanceolatis.* Scapi 2 *f.* 3, *vniflori, ſpithamaei, foliis duplo longiores,* Inuolucro *cincti in medio, paruo, hexaphyllo; foliolis lanceolatis.* Flos *ſpecioſus.*

Diſtinguitur *a* Geranio *facie Anemones, Staminibus et Stylo diuerſis.*

POLYANDRIA.

Leucadendra. 1. MELALEVCA.

Myrtus Leucadendron. *Sp. pl. 2, p. 676.*

Arbor alba Cayputi. *Rumph. amb. 2. p. 72. t. 16, 17. f. 1.*

Habitat in India. ♄.

Arbor *trunco nigro, Ramis albis.* Folia *alterna. lanceolata, verſus alterum latus falcata, petiolata, integerrima, ſubauenia.* Fructificationes *ſeſſiles, adglutinatae, ſparſae, infra folia.* Fructus *ante maturitatem, capſula etiamnum calyce breuiore, vrceolata.*

tinctoria. 1. HOPEA. *Garden.*

Arbor lauri folio, floribus ex foliorum alis. *Catesb. car. 1. p. 54. t. 54. mala.*

Habitat in Carolina, *Florens odore gratiſſimo primo vere; Succus et folia in decocto tingunt lintea et ſerica laete lutea.* ♄.

Arbor. Folia *alterna, petiolata, ſimplicia, oblonga, lanceolato-ouata, ſubſerrata, nitida, enervia, dulcia.* Pedunculi *e Gemmis, ad ſummos ramulos erumpunt*

8 *ſ* 10: Pedicellis *breuiſſimis*, *vnifloris*, *veſtitis* Foliolis *paruis*, *concauis*, *villoſis*. Fructus *demum infra folia*, *ſubſeſſiles*, *in ſpicam breuiſſimam digeſti*.

calycinum. 30. HYPERICVM floribus pentagynis, caule tetragono fruticoſo, foliis ouato-oblongis coriaceis.
Habitat in America *ſeptentrionali?* ♄.
Caulis *ſemperuirens*, *ramoſus*, *ruber*, *tetragonus*. Folia *ouato-oblonga*, *palmaria*, *conſiſtentia*, *obtuſa*, *integerrima*, *ſubſeſſilia*, *internodiis* 3 *ſ.* 4 *longiora*. Flores *terminales*, *pedunculati*, *ſolitarii*, Calyx *membranaceus*; *foliis ouatis obtuſis longitudine germinis*, *duplo maior in fructu maturo*. Corolla *lutea*, *calyce duplo longior*. Stamina *flaua*, *corolla breuiora*. Germen *rubrum*. Habitus *Hyperici Androſaemi*.

prolificum. 31. HYPERICVM floribus trigynis, caule tetragono fruticoſo, foliis lanceolato-linearibus, floribus primordialibus ſeſſilibus.
Hypericum floribus ſemitrigynis, ſtaminibus corolla breuioribus, caule fruticoſo ſemperuirente. *Gruan. virg. 112.*
Habitat in America *ſeptentrionali*. ♄.
Caules *recti*, *purpuraſcentes*. Folia *ſaepius reuoluta*, *vnde anguſta Roſmarini*. Foliola *ramulorum primordia*, *ex alis plurima*. Panicula *parua*, *terminalis*. Flores *primae ſecundaeque dichotomiae ſeſſiles*; *reliqui terminales*, *pedunculati*, *numero rarius vltra* 7. Stamina *petalis non longiora*.

criſpum. 32. HYPERICVM foliis trigynis, foliis ſeſſilibus lanceolatis baſi vndulato-dentatis, caule tereti.
Hypericum triquetrifolium. *Turr. farſ. 12.*
Hypericum criſpum, triquetro et cuſpidato folio: *Bocc. muſ. 2. p. 31. t. 12.*
Hypericum folio breuiore. *Bauh. pin. 279.*
Hypericum foliis paruis criſpis ſ. ſinuatis ſiculum. *Rai. hiſt. 1019.*
Habitat in Calabria, Sicilia, Graecia. 4.
Folia *minutiſſima*, *ſemiamplexicaulia*, *baſi criſpa*.

XIX.

XIX. SYNGENESIA.

POLYGAMIA. AEQVALIS.

chondrilloides. 8. PRENANTHES floſculis denis, calycibus octofidis, fol. lanceolatis: radicalibus indiuiſis ſubdentatis. *Ard. ſpec. 2. p. 36. t. 17.*

Habitat in Europa *auſtrali.* 24.

Caulis *paniculatus.* Folia caulina *linearia, ad ramificationes tantum, minuta.* Radicalia *lanceolata, petiolata, nuda, minute dentata.*

japonica. 9. PRENANTHES floſculis ſubquindenis, foliis radicalibus lyratis, caule ſubnudo.

Habitat in Japonia. *Kleynhoff.*

Folia Radicalia *lyrata (Lapſanae communis), obtuſiuſcula, vix denticulata, nuda.* Caulis *paniculatus, vix baſi folioſus foliis lanceolatis.* Flores *numeroſiſſimi, minimi, lutei pedunculis capillaribus.* Calyces *calyculati*, Floſculi *circiter* 15. Pappus *ſimplex, calyce longior.*

dentatum. 9. LEONTODON foliis ouatis: petiolis dentatis, ſcapo nudo vnifloro.

Hieracium foliis ouato-lanceolatis dentatis petiolatis: petiolis dentatis. *Hall. emend 4 W. n. 254.*

Habitat in Heluetia. 24.

Folia *omnia radicalia, ouata, fere lyrata, integriuſcula, ſubincana. Petioli longitudine folii, dentati.* Scapi *ſimplices, vniflori, longitudine foliorum.* Calyx *erectus, cineraſcens.*

neglecta. 15. CREPIS fol. amplexicaulibus runcinatis ſubpiloſis, calycibus inermi-ſubſpinoſis, caule paniculato.

Habitat in Italia. ⊙.

Caulis *pedalis, ramoſus, ſubpiloſus, erectus.* Folia Radicalia *obouato-oblonga, dentata, ſubpiloſa.* Caulina *amplexicaulia, runcinata, ſubpiloſa dentibus elongatis etiam baſeos.* Summa *ſubhaſtata.* Rami *floriferi elongati, nudi, laeues, apice biflori ſ. bifidi.* Calyx exterior *breuiſſimus, acutus;* interior 8 *ſ.* 10 *foliolis, in medio vna alteraue ſpina inermi notatis; Conuenit cum* C. pulchra *magnitudine et paruis floribus; differt foliis, non integris ſubdentatis viſcoſis, ſed runcinatis,*

den-

dentatis, ſubpiloſis &c. Synonyma *inter vtramque diſpertienda.* H. U.

Rhagadioloides. 16. CREPIS foliis integris amplexicaulibus, calycibus interioribus hiſpidis toruloſo-ſectis.
Habitat . . . ⊙.
Caulis *ſemipedalis, erectus, ſtriatus, ſcaber, ramoſus.* Folia *oblonga, integra, amplexicaulia, laeuia.* Pedunculi *elongati, ſcabri, vniflori, nudi.* Calyx *calyculatus:* Exterior *foliolis plurimis, linearibus, obtuſis, calyce ½ breuioribus, inſertione inaequalibus.* Interior *toruloſus, ſeſtuſque in 12 partes parallelas, quarum quoduis foliolum cymbiforme, compreſſum, dorſo hiſpido aculeolis glochidibus.* Corolla *lutea, extus purpuraſcens.* Semina *omnia Pappo piloſo.* H. U.

lucida. 9. HYOSERIS ſcapis vnifloris nudis, foliis runcinatis ſubcarnoſis angulatis dentatis,
Dens leonis graecus, foliis eryſimi craſſis et ſuccolentis. *Tournef. cor. 35*
Habitat in Oriente. *Forskähl.* 24.
Simillima H. radiatae, *ſed* Folia *craſſiora, ſubcarnoſa, lucida, breuius lenata.* Scapi *purpuraſcentes, foliis longiores.* Calyx *angulatus.* Semina *marginalia vix pappoſa.* Floret *ante meridiem.* H. U.

* *

carduelis. 3. ARCTIVM foliis pinnatifidis aculeatis.
Habitat in Alpibus Carniolae *ſuperioris. D. Scopoli.*
Statura *Serratulae aruenſis.* Caulis *criſpus, aculeatus.* Folia *amplexicaulia, pinnatifida, laciniata, margine aculeata.* Calyces *terminales, pedunculati: ſquamis lineari-ſetaceis, patentibus, incuruis.*

carus. 27. CARDVVS foliis decurrentibus lanceolatis, dentatis ciliato-aculeatis, vtrinque arachnoideo villoſis.
Cirſium montanum maximum. *Raj. hiſt. 305.*
Cirſium tomentoſum radice bulboſa. *Bauh. hiſt. 3. p. 44.*
Carduus tuberoſus. *Jacq. vind. 280. ſecund. deſcript.*
Habitat in Auſtria. 24.
Radices *fuſiformes, aggregatae, carnoſae, albae, Siſari.* Caulis *quadripedalis, viridis, angulatus, arachnoideus.* Folia *lanceolata, ſubſinuato-dentata, ſpinulis albis vix pungentibus ciliata, vtrinque tomento arachnoideo*

deo cana, carinata, in totum decurrentia alis exſtantibus. Pedunculi *terminales, elongati, foliis paruis floralibus viridibus.* Flores *ſolitarii, purpurei.* Calyces *inermes ſquamis extus linea alba.* H. U.

polyanthemus. 28. CARDVVS foliis decurrentibus ſinuatis ciliatis ſubtus nudis, floribus pedunculatis congeſtis.

Carduus pycnocephalus paluſtris. *Triumf. obſ. 103. t. 103.*

Cirſium paluſtre lanceolatum, alato caule, polyanthemum. *Vaill. act. 160.*

Habitat Romae. ♂.

Simillimus Carduo *criſpo, vt ab eo difficile diſtinguatur, ſed neque petioli, neque folia ſubtus tomentoſa.* Caulis *C. criſpo-altior.* Folia *profunde runcinata, non rigida, obtuſiuſcula, ciliata ſpinis inermibus, excauato-venoſa, ſubtus pallidiora, non vero alba,* Caulina *ſuperiora lanceolata, eroſa, decurrentia totaliter, criſpa, parumque pungentia.* Pedunculi *criſpi, vix arachnoidei.* Flores *ſaepius* 3 *ſ.* 4 *ad apicem ſubſeſſiles.* Corollae *in Limbo purpureae, in diſco incarnatae.* Antherae *violaceae.* Styli *albi.* Stigmata *purpurea.* H. U.

ferox. 7. CNICVS foliis decurrentibus ligulatis dentato-ſpinoſis, caule ramoſo erecto. *Ger. prou. 181.**

Carduus lanceolatus validiſſimis aculeis. *Tournef. inſt. 450.*

Carduus lanceolatus ferocior. *Bauh. hiſt. 3. p. 58.*

Habitat in Europae *auſtralis montoſis, ſteritibus.* ♂.

* * *

ſuffruticoſa. 13. CACALIA caule ſuffruticoſo ramoſo, foliis linearibus planis ſparſis.

Cacalia foliis linearibus integerrimis, caulibus vnifloris. *Ard. ſpec. 2. p. 39. t. 19.*

Habitat in Braſilia. *Arduini.* ♄.

Caulis *ſuffruticoſus, palmaris, varie ramoſus, filiformis.* Folia *ſparſa, linearia, integerrima, minime carnoſa.* Pedunculi *terminales, ſolitarii, vniflori, erecti, longitudine caulis.* Calyx *ſimpliciſſimus, pentaphyllus: foliolis ouatis, obtuſis, erectis, lateribus occultatis membranaceis.* Floſculi *multi, purpurei.* Pappus *pilis hiſpidis.* *Flos omnino* Porophylli, *ſed herba diuerſa.*

14. CA-

repens. 14. CACALIA caule fruticoſo, foliis depreſſis carnoſis.

Habitat ad Cap. b ſpei. ♄.

Planta *tota ſtatura ſimillima C. Ficoides, etiam rore glauco obducta, ſed folia ſupra depreſſo-concaua, nec lateribus compreſſa. Mihi non floruit-* H. U.

Radix *repens huic, non illi.*

cuneifolia. CACALIA caule fruticoſo, foliis cuneiformibus carnoſis.

Habitat ad Cap. b ſpei. ♄.

Caulis *carnoſus, minus C. Ficoide et antecedentibus.* Folia *ſparſa, auenia, absque coſta, ſupra plana, ſubtus nonnihil conuexa, carnoſa. Cum folia non oppoſita, nequit eſſe Cotyledon. Mihi non floruit in* H. U.

tomentoſa. 3. ETHVLIA ſuffruticoſa, foliis linearibus integerrimis tomentoſis.

Habitat in China. ♄.

Fruticulus *caulibus ſtriatis, ramoſis.* Folia *alterna, ſeſſilia, lanceolato-linearia, integerrima, incana, ſ. tenuiſſime tomentoſa, facie Lauandulae.* Calyces *terminales, ſeſſiles, laxi, ſubfolioſi,*

diuaricata. 4. ETHVLIA foliis linearibus dentatis decurrentibus, pedunculis oppoſitifoliis vnifloris, caule diuaricato.

Artemiſia minima. *Sp. pl.* 1190. *n.* 22. *Burm. ind. t.* 56. *f.* 4.

Habitat in India. ⊙.

Herba *palmaris, diuaricato-patens, duriuſcula.* Folia *alterna, anguſto-lanceolata, denticulata, decurrentia, vnde Rami denticulati.* Pedunculi *oppoſitifolii, vniflori, longitudine folii.* Calyx *hemiſphaericus, imbricatus ſquamis acutiuſculis.* Receptaculum *et Semina nuda.*

bidentis. 5. ETHVLIA racemulis ſecundis, calycibus ſubquinquefloris, foliis lanceolatis oppoſitis.

Habitat in India. ⊙.

Caulis *herbaceus, erectus, hexagonus, brachiatus.* Folia *oppoſita, trineruia, ſubpetiolata, lanceolata, ſerrata, glabra.* Racemi 2 *ſ.* 4, *terminales caulis ramorumque, brachiati, cui a latere ſuperiori inſident* Flores *ſeſſiles, anguſti, lutei, ſubquinqueflori, alterni, ſubtus bractea ſubulata ſuffulti.* Semina *oblonga, laeuia aliquot ſtriis. Flores parui vt in Milleria, ſed anguſti.*

20. EV-

album. 20. EVPATORIVM foliis lanceolatis ſerratis, calycinis foliolis lanceolatis apice membranaceis coloratis.
Habitat in Penſyluania. *Barthram.*
Caulis *erectus*, *ſtriatus*, *vix pubeſcens.* Folia *oppoſita*, *ſubſeſſilia*, *lato-lanceolata*, *ſerrata*, *ſubnuda.* Corymbus *terminalis e ramulis alternis*, *ramoſis*; *faſtigiatus*, *albus.* Calyces *imbricati*: *foliolis lanceolatis*, *apice membranaceis albisque.* Floſculi 5. Pappus *ſimplex.*

arboreſcens. 3. STAEHELINA foliis oualibus. *Schreb. dec. 1. t. 1.*
Centaurea calycibus ſquamoſis, foliis ouatis ſubtus tomentoſis. *Ger. prod. 187.*
Raponticoides fruteſcens, ſtyracis folio. *Vaill. act. 179.*
Jacea arboreſcens, ſtyracis folio. *Tourneſ. inſt. 445.*
Cyanus arboreſcens altera, ſtyracis folio. *Alp. exot. 33. t. 32.*
Frutex rotundo argenteo folio, cyani flore. *Bauh. pin. 452.*
Habitat in Creta, *inſula Stoechadum*; in *rupe Victoriae* Galloprouinciae. ♄.
Calyx *imbricatus ſquamis muticis.* Paleae *multipartitae.* Pappus *ramoſus et plumoſus.* Antherae *vt in Inula. baſi dentatae.* Floſculi *nudi neutri. D. Schreber.* Folia *petiolata*, *oualia*, *integerrima*, *ſubtus ſericeo-argentea.*

POLYGAMIA SVPERFLVA.

monanthos. 9. TANACETVM caulibus ſimpliciſſimis vnifloris.
Tanacetum monanthemum, chamaemeli folio et facie. *Vaill. act. 337.*
Habitat in Oriente. *Forskäh.* ☉.
Folia *bipinnata*, *radicalia*, *plurima*, *digiti longitudine*, *facie Achilleae Millefolii.* Caules *nonnulli*, *erecti*, *ſimpliciſſimi*, *rigiduli*, *ſubuilloſi*, *pollicares.* Folia Caulina *pauca*, *petiolata*, *dentato-pinnata.* Flos *terminalis*, *vnicus*, *pedunculatus.* Calyx *oblongus*, *imbricatus*, *pubeſcens.* Corolla *lutea.* Semina *nuda.* Receptaculum *nudum.* *E radice dein* Caules *alii* decumbentes *adſcendentes*, *longiores*, *diffuſi*, *terminati pedunculo vnifloro.* H. U.

judaica. 24. ARTEMISIA foliis caulinis minutis obouatis palmatis obtuſis planis tomentoſis. *Syſt. nat. 10. p. 1208.*

Arte-

Artemisia tota cinerea. *Gron orient. 259.*
Absinthium halepense tenuifolium grati odoris, coma delicatiore. *Pluk. alm. 4. t. 73. f. 2.*
Absinthium Santonicum iudaicum. *Bauh. pin. 139.*
Santonicum. *Mat. med. 511. haec erit*
Habitat in Judaea, Arabia, Numidia. 24.

crassifolium. 42. GNAPHALIVM fruticosum, foliis lato-lanceolatis subpetiolatis coriaceis tomentosis, corymbo composito, caule proliferro.
Habitat ad Cap. b. spei. ♄.
Caulis *pedalis, prolifero ramosus, perennans excepto ramo florifero.* Folia *petiolata, lanceolata, superne latiora, obtusa, densissime tomentosa, rigidiuscula, versus flores sensim angustiora.* Flores *corymbo terminali composito, numerosi. Calyces pallide lutei; Corol. lae saturatius luteae.* Floseuli *ante anthesin albi apparent.* H. U.

glutinosum. 17. ERIGERON foliis lanceolato-linearibus integerrimis piloso-viscidis, pedunculis vnifloris. *Ger. prou. 205.* †
Conyza montana, foliis glutinosis pilosis. *Bauh. pin. 265. Rai. hist. 265.*
Conyza montana saxatilis, hyssopi folio villoso et glutinoso, hispanica. *Barr. ic. 158.*
Conyza montana Myconis, *Dalech. hist. 1200.*
Habitat in Hispaniae, Galliae *australis montosis maritimis.* 24.
Pedunculi *alterni, vniflori, pauciores.* H. U.

aegyptiacum. 18. ERIGERON foliis semiamplexicaulibus spatulatis dentatis, floribus globosis.
Conyza capitata s. globosa. *Bocc. ic 13. t. 7. f. B. Morif. hist. 3. p. 114. s. 7. t. 20. f. 14.*
Jacobaea aegyptiaca, folio glauco coronopi. *Boerh.* perperam.
Habitat in Sicilia, Aegypto. ☉.
Caulis *erectus, sesquipedalis, subsimplex, virens, pubescenti-subuiscidus.* Folia *alterna, sessilia, vix semiamplexicaulia, spatulata s. oblongo lanceolata, obtusiuscula, subpubescentia, subdentata dentibus fere 5, basi vero integra.* Rami *ex supremis alis.* Flores *terminales, 4 s. 5, pedunculati, subrotundi, pedunculis purpurascentibus.* Calyx *subrotundus squamis subulatis:*

inti-

intimis vix apice ſanguinolentis. Corollae *luteae: floſculis minutis: Radiis nudis, copioſiſſimis; piſtillis luteis, mox euaneſcentibus, annulo pappoſo lato diſcum quaſi cingentibus.* H. U.

pubigera. 20. CONYZA foliis oblongis ſubdentatis ſubpetiolatis pedunculis lanatis ſubbifloris.

Sonchus volubilis. *Rumph. amb. 5. p. 299. t. 103. f. 2.*

Habitat in India.

Rami *raris villis adſperſi, herbacei.* Folia *oblonga, alterna, baſi cuneata, ſubpetiolata, vtrinque viridia, rarisque pilis adſperſa, ſerraturis 3 ſ. 4 vtrinque ar gutis fere dentata, non ſcabra.* Pedunculi *axillares ſupernae ex alis foliorum, lanati* 2, 3, *ſ.* 4 *floribus, calyce ante explicationem lanat.* H. U.

ſcabra. 21. CONYZA foliis oblongis ſubdentatis ſeſſilibus ſcabris, pedunculis vnifloris elongatis.

Habitat in India.

Folia *vtrinque ſcabra, dentibus vtrinque* 4 *ſ.* 5. Pedunculi *axillares, verſus apicem ramorum, vniflori, demum foliis ſextuplo longiores.*

rupeſtris. 22. CONYZA foliis ſpatulatis ſubdentatis cauleque fruticuloſo tomentoſis, pedunculis elongatis vnifloris.

Conyza tomentoſa polii foliis crenatis. *Shaw. afr. 176. t. 176. mala.*

Habitat in Arabia. *Forskahl.* ♄. 24.

Simillima C. ſaxatili, *ſed* Caules *florentes faſcieulis axillaribus foliorum minorum.* Folia *latiora, breuiora, obtuſiora, vtrinque albo tomentoſa exceptis infimis.* Calycis *ſquamae non acutae patulae, ſed obtuſiuſculae, arcte imbricatae.* Corollae *luteae floſculis numeroſiſſimis.* Odor *grauis.* H. U.

japonica. 10. TVSSILAGO ſcapo floribus alternis radiatis.

Habitat in Japonia. *Kleynhoff.* 24.

Folia *radicalia, cordata, ſubrotunda, obſolete denticulata, ſubtus tomentoſa, magnitudine Calthae.* Scapus *pedalis, villoſus, nudo-aphyllus.* Flores *alterni, pedunculati, lutei, magnitudine Arnicae: bractea lanceolata ſub pedicello, eoque breuior.* Calyx *poly hyllus, baſi ſubimbricatus.* Pedicelli *longitudine floris.*

arabicus. 41. SENECIO corollis nudis, foliis ſubpinnatifidis petiolatis, calycibus intactis.
Habitat in Aegypto. ♂.
Statura *S. vulgaris ſ. Jacobeae.* Caulis *ſeſquipedalis, laeuis.* Folia *Siſymbrii amphibii ſ, ſenecionis triflori, laeuia, pinnatifida ſ, ſinuata; dentata, petiolata, tenuia,* Pedunculi *multiflori Pedicellis lateralibus ſubdiuiſis.* Flores *floſculoſi vt in S. vulgari, lutei, calycibus non ſphacelatis.* H. U.

hyſſopifolius. 37. ASTER pedunculis ſubfolioſis, foliis linearibus acutis obliquatis margine ſcabris integerrimis.
Habitat in America *ſeptentrionali.* 4.
Caulis *pedalis, ramoſus, rigidulus.* Folia *lineari-lanceolata, vtrinque acuta, integerrima, viridia, pollicaria, verticali-inflexa.* Panicula *corymboſa: pedunculis terminalibus: foliis 2 ſ. 3 linearibus.* Calyces *ouati, arcte imbricati.* Corollae *Radius octopetalus, violaceus; Diſcus eleuatus, virens.* Stamina *teſtacea.* Piſtillum *luteum.* H. U.

lanceolata. 13. SOLIDAGO corymbis terminalibus, foliis lineari-lanceolatis integerrimis trineruibus.
Habitat in America *ſeptentrionali? Dau. Royen,*
Caulis *5-pedum.* Folia *longa, margine imprimis ſcabra.* Calyces *parui, obouati, ſubſquarroſi.* Radius *corollae paruus,*

bicolor. 14. SOLIDAGO racemis ſpicatis, foliis ſubſerratis, florum radio dicolore.
Aſter americanus, virgae aureae facie, flore minimo albido vix radiato. *Vaill. act. 584.*
Virga aurea, flore albo ſpicato. *Pluk. alm. 389. t. 114. f. 8.*
Habitat in America *ſeptentrionali. Dau. Royen.*
Diſtincta Racemis denſis, floribus luteis radio albo.

arabica. 23. INVLA foliis oblongis ſeſſilibus, pedunculis filiformibus, calycibus cylindricis.
Helenium ramoſum, caulibus ſparſis, calthae aruenſis folio. *Vaill. act. 575.*
Aſter conyzoides ind. orientalis ramoſus, caulibus ſparſis. *Pluk. alm. 57. t. 149. f. 4.*
Habitat in Arabia. *Forskahl; in* India. ☉.
Simillima J. Pulicariae, *a qua caute diſtinguenda.* Folia *ſub-*

ſubſpatulata, minime amplexicaulia aut vndulata. Calyces *cylindrici, nec globoſi; Squamis approximatis, nec ſquarroſis;* Pedunculi *longiores, ſaepe gemini.* Corollae *radius longior, diſcus anguſtior.* H. U.

vndulata. 24. INVLA foliis cordato-lanceolatis amplexicaulibus vndulatis.

Helenium aegyptiacum tomentoſum et incanum, polii folio. Lippi. *Vaill. act. 575.*

Habitat in Aegypto.

Caulis *pedalis. teres, erectus, ſubtomentoſus:* Ramis *alternis, ſtrictioribus, virgatis, apice ſubdiuiſis.* Folia *alterna, ſeſſilia, amplexicaulia lobis baſeos deorſum adnatis, cordato-lanceolata, vndulata abſque ſerraturis manifeſtis, ſubtus incana.* Pedunculi *terminales, vniflori, adſperſi aliquot foliolis.* Calyx *foliolis ſubulatis, imbricatus apicibus incuruis.* Corolla *lutea: Radius corollae breuior, petalis linearibus, numeroſis, 3 ſ. 5-dentatus; Diſcus valde conuexus. Flores magnitudine Matricariae.* H. U.

braſilienſe. 3. PERDICIVM floribus ſubradiatis: calyce aequali. caule herbaceo.

Habitat in Braſilia. *Arduini.* 24.

Folia Radicalia *lanceolato ouata, repando dentata, ſubpubeſcentia, viſcida.* Caulina *alterna, ſeſſilia, lanceolata, anguſta, ſubdentata.* Flores *in ſummitate caulis, nudi. plures, Arnicae montanae facie, pedunculis propriis elongatis ſubmonophyllis.* Calyx 12-16 *phyllus, foliolis lanceolatis, obtuſis, aequalibus.* Corolla *lutea. Floſculi et in diſco et radio bilabiati hermaphroditi,*

capenſis. 6. MATRICARIA foliis ſimpliciter pinnatis ſubcarnoſis teretiuſculis: infimis ſubbipinnatis.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ⊙.

Facies *Chamomillae.* Caules *plurimi, ramoſiſſimi, diffuſi, ſpithamaei, teretes, laeuiuſculi.* Folia *ſimpliciter pinnata, carnoſa fere, nuda, impunctata, coſta vix complanata: dentibus cylindricis apice purpuraſcentibus ſ. fuſceſcentibus.* Folia infima *dentibus lateralibus pinnatifidis.* Pedunculi *terminales, longiuſculi, vniflori, ſtriati.* Calyx *imbricatus, parum ſcarioſus.* Corollae *radius Petalis* 10 *ſ.* 12, *albis, ouatis. diſtin-*

ctis. - *Discus conuexus luteus.* Receptaculum *semiouatum.* H. U.

Asteroides. 7. MATRICARIA foliis lanceolatis integris glabris obliquis.

Matricaria foliis simplicibus lineari-lanceolatis sessilibus, pedunculis vniformibus. *Mill. act. angl.* 1765. *p.* 94

Aster americanus; flore albo : folio lactucae purpureae. *Rai. suppl.* 160.

Habitat in Pensyluania. *Barthram.* 4.

Planta *Asteris annui*, *foliis Lactucae Scariolae.* Caulis *erectus*, *bipedalis*, *strictus*, *laeuis*, *vix angulatus*, *substriatus.* Folia *alterna*, *remota*, *sessilia*, *lanceolata*, *laeuia*, *basi deflexa*, *margine scabra*, *disco verticalia.* Panicula *rarior*, *rigidiuscula*, *pedunculis vnifloris.* Calyx *planiusculus*, *imbricatus squamis subaequalibus*, *subulatis*, *longitudine disci.* Corollae *discus hemisphaericus*, *luteus.* Radius *linearis*, *integer*, *incarnato-albus.* Semina *compressa*, *coronata margine quinquedentato.* Receptaculum *nudum*, *hemisphaericum.* H. U.

italicum. 20. CHRYSANTHEMVM foliis bipinnatis serratis, florum radiis disci longitudine, caule procumbente.

Partheniun foliis tenuissimis achilleae caesuris. *Mich. gen. 34. t. 29.*

Habitat in Italia. *Arduini.*

Simillimum Chr. millefolio. sed Caulis magis ramosus, *multiflorus*, *erectior Florum radius albidus*, *longitudine disci.*

Spilanthus. 8. COTVLA foliis oppositis lanceolatis integerrimis trineruiis.

Spilanthes *vrens* foliis integerrimis. *Jacq. amer. 214. t. 120. f. 1.*

Santolina, pyrethri sapore, humifusa. *Plum. spec. 10.*

Ceratocephalus foliis lanceolatis serratis sapore feruido. *Vaill. act. 600. n. 5.*

Habitat Carthagenae *in Arenosis maritimis.*

pyrethraria. 9. COTVLA foliis oppositis ouatis crenatis petiolatis.

Habitat in America.

Caulis *herbaceus*, *dichotomus.* Folia *opposita*, *crenata*, *ouata*, *obtusiuscula*, *tenuia.* Pedunculi *terminales e dichotomia caulis*, *foliis longiores*, *vniflori.* Flos

oua-

ouatus exacte, albus : corollulis quadrifidis. Paleae *longitudine floſculorum.*

ſpecioſiſſimum. 11. BVPHTHALMVM caule vnifloro, foliis alternis amplexicaulibus nudis ſerratis ſubciliatis.

Buphthalmum caule erecto vnifloro, foliis amplexicaulibus dentatis : inferioribus ouatis obtuſis; ſuperioribus lanceolatis acutis. *Ard. ſpec. 1. p. 26. t. 12.*

Aſteroides orientale, petaſidis folio, flore maximo. *Tournef. cor. 51.*

Habitat in montibus Brixienſibus. 24.

Folia alterna, ſemipedalia, palmum lata. Planta in Schreberi cent. t. 6. videtur maxime affinis, ſed folia huic magis profunde ſerrata.

POLYGAMIA FRVSTRANEA.

indicus. 13. HELIANTHVS foliis omnibus cordatis trineruatis, pedunculis aequalibus, calycibus foliosis.

Corona ſolis minor III. *Tabern. hiſt.* 1147.

Habitat culta in Aegypto. ☉.

Varietas *forte ſola Hel. annui, verum conſtans; ſed* Folia *ſupra diſco conuexa, magis obſcure viridia.* Pedunculi *ſuperne minus incraſſati, ſed aequali craſſitie, vnde* Flores *minus cernui.* Calycis *ſquamae excepto intimo ordine, enatae in foliola petiolata pendula.* H. U.

Leptaurea. 1. ZOEGAEA.

Habitat in Aegypto? *ex Horto Haffnienſi.* D. *Zoega.*

Caulis *diffuſus, ſcabriuſculus, ramoſus, palmaris.* Folia *alterna, lanceolata, remota, ſeſſilia, integerrima, ſcabra.* Pedunculi *elongati, nudi, vniflori.* *Flos* Centaureae *calyce ciliato, ciliis teſtaceis.* *Corolla* Calendulae *fulua, centaureae moſchatae.*

linifolia. 62. CENTAVREA calycibus recuruato-piloſis, foliis linearibus ſparſis.

Jacea hiſpanica pumila, lineariae folio. *Tournef. inſt. 445. Barr. ic. 162.*

Habitat in Hiſpania, Italia. 24.

Caulis *breuis, ſaepe decumbens.* Folia *linearia, integra, ſcabra, in ramis valde conferta.* Calyx *omnino C. phrygiae.*

vniflora. 63. CENTAVREA calycibus recurvato-plumoſis, foliis lanceolatis ſubdentatis tomentoſis. *Ger. prou. 785.*

Cyanus alpinus, capitulo reticulato. *Bocc. muſ. 2. p. 20. t. . . .*

Habitat in Alpibus Europae *auſtralis.* 24.

Affinis C. phrygiae, *eiusque progenies, alienata.* Folia *lanceolata, ſubdentata.* Flos *vnicus ſeſſilis.*

aegyptia. 64. CENTAVREA calycibus duplicato-ſpinoſis ſublanatis, foliis lanceolatis ſeſſilibus integris dentatisque, caule prolifero.

Habitat in Aegypto. *Turra.* ⊙.

Caulis *pedalis, diffuſus, prolifero-ramoſus, patens.* Rami *ex ſuperiorum foliorum alis, alterni, terminati flore.* Folia *alterna, ſeſſilia vel ſemiamplexicaulia, ſubſcabra: infima pinnatifida; media lyrata; ſuperiora lanceolata.* Flores *ſubſeſſiles, mediocres.* Calyx *ouatus, villis raris ſublanatus: ſquamis ſpina purpuraſcente, tenui, baſi vtrinque ſpinulis 2 ſetaceis inſtructa.* Corolla *alba.* Corollulae *radii minores, quadrifidi.* Antherae *flauae, apice rubeſcentes.* H. U.

POLYGAMIA NECESSARIA.

Wedelia. 3. POLYMNIA foliis lanceolatis ſerratis, caule fruticoſo.

Wedelia fruteſcens. *Jacq. amer. 217. t. 130.*

Habitat in Carthagenae *ſyluis,* ♄.

Planta *fruticoſa, ſcandens; proxima Tetragonotheeae. quamuis* feminum corona *calyculo complanato* 10-*dentato.*

craſſifolia. 8. OTHONNA foliis lanceolatis integerrimis, caule erecto. *Hort. cliff. 419. Raj. lugd. 179. Mill. ic. 163. t. 245. f. 2.*

Jacobaea africana fruteſcens, craſſis et ſucculentis foliis. *Comm. hort. 2. p. 147. t. 74. Raj. ſuppl. 174.*

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.

Similis O. cheirifoliae, ſed erecta, quadripedalis.

tenuiſſima. 9. OTHONNA caule fruticoſo, foliis filiformibus carnoſis. *Pluk. phyt. 319. f. 5.*

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.

Plan-

Planta *non floruit, licet eam diu aluerim.* Caulis *pedalis ſ. bipedalis et vltra, laeuis.* Folia *alterna, filiformia, carnoſa, laeuia, patentia, parum declinata, baſi anguſtiora. Ex villo ad baſin foliorum, vt in Othonna fruticoſa, judico ad hoc genus pertinere, neque dum certiora innoteſcant.* H. U.

POLYGAMIA SEGREGATA.

ſpinoſus. 4. ECHINOPS capitulis adſperſis ſpinis longis.
Echinops capitulis globoſis aculeatis, foliis vndique tomentoſis. *Turr. farſ. 13.*
Carduus ſphaerocephalus, capite longis ſpinis armato. *Bauh. pin. 382.*
Carduus ſphaerocephalus acutus. *Dod. pempt. 722. bene.*
Habitat in Aegypto, Arabia. 2. ♄.
Planta *ſtatura E. ſphaerocephali, ſed caulis et folia teneriora.* Caulis (*in hybernaculo*) *ſuffruticans absque pilis glanduloſis.* Capitula *inſtar ſphaerocephali, ſed* Floſculi *albi, maiores laciniis reflexo-vncinatis. Inter floſculos paſſim prodeunt* Spinae *e calyculis non explicatis factae, floſculis quadruplo longiores, quae demum in duas finduntur, inter quos floſculus prodit ſpina multo breuior.* H. U.

chinenſis. 3. SPHAERANTHVS foliis ſeſſilibus pinnatifidis.
Habitat in India.
Planta *S. indico longe minor.* Folia *pinnato-ſinuata.* Pedunculi *alis decurrentibus criſpi, vt in S. indico.*

africanus. 2. SPHAERANTHVS foliis decurrentibus ouatis ſerratis, pedunculis teretibus. *Burm. ind. t. 58. f. 1.*
Sphaeranthus folio oblongo, minor. *Vaill. act. 347.*
Senecio minor, allato caule, maderaſpatana. *Pluk. alm. 335. t. 108. f. 7. Rai. ſuppl. 235.*
Habitat in Aſia, Africa. ☉.
Differt a S. indico imprimis pedunculis teretibus absque alis decurrentibus.

corymbiferrum. 4. SERIPHIVM floribus faſciculatis.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.
Caules *fruticoſi, proliferi, virgati, ſeſquipedales: Ramis filiformibus, tectis foliis appreſſis.* Folia *ouato-lanceolata, ſeſſilia, ciliata, extus nuda, intus tomentoſa, erecta, ramisque arcte appreſſa.* Capitula *ter-*

minalia, hemiſphaerica, alba, e multis calycibus congeſta. Flores *ſeſſiles, faſciculati.* Calyces *imbricacati, glabri, albi, ſquamis lanceolato-ſubulatis absque radio.* Corollula *vnica alba.* Stamina *alba.* Semen *coronatum ſetis ſex, plumoſis.* Habitus *Xeranthemi capenſis.*

MONOGAMIA.

ſcabrum. 2. CORYMBIVM caule ſcabro.
Corymbium foliis ad radicem longiſſimis lyratis. *Burm. afr. 189. t. 70. f. 1.*
Bupleurifolia ſemine pappoſo valerianoides vmbellata, caniculo ſcabro. *Pluk. alm. 73. t. 270. f. 5.*
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃.
Bulbus *ſubgloboſus e foliorum radicibus emarcidis.* Caulis *purpuraſcens, ſcaber.* Folia *radicalia: filiformiiuncea ſ. ſetacea, nec latiuſcula ſ. canaliculata.*
Obſ. Synonyma *data excludenda in corymbio africano.*

triquetra. 27. LOBELIA caule erecto, foliis lanceolatis dentatis, racemo terminali aphyllo.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ☉.
Caules *herbacei, pedales.* Folia *alterna, ſeſſilia, anguſto lanceolata, dentata, et quaſi baſi adglutinata: ſuperiora minus remota.* Racemus *terminalis pedunculatus, erectus, pedunculo obſolete trigono in plerisque* Flores *caerulei.*

tenella. 28. LOBELIA caulibus fruticuloſis filiformibus proſtratis, foliis ouato lanceolatis glabris, vtrinque bidentatis.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.
Caules *perennantes: Ramis filiformibus, proſtratis, facie Oxycocci.* Folia *alterna, ſubſeſſilia, ouato-lanceolata, minuta, reflexa, glabra vtrinque ſerraturis duabus: altera ad baſin, altera in medio.* Pedunculi *filiformes, ad apices ramorum, vnus alterue, longitudine folii.* Calyx *quinquefidus, ſubulatus. laeuis.* Germen *ſuperum inferumque ſimul.* Fructus *apice triualuis.*

grandiflora. 25. VIOLA caule triquetro erecto, foliis oblongiuſculis, ſtipulis pinnatifidis.
Viola montana tricolor odoratiſſima. *Bauh. pin. 109.*

Vio-

Viola montana lutea grandiflora. *Bauh. pin. 200. Barr. ic. 691. 692.*

Habitat in Alpibus Helueticis, Pyrenaicis. 24.

Caulis *altus, ramosus, foliosus, stipulatus. omnino V. tricoloris, sed* Flos *maximus, flauus*, Petalis *ouatis, longitudine foliorum;* Calcari *calyce duplo longiore, sed petalis breuiore. Separanda a V. calcarata, cui tamen nimis affinis; ambae enim sunt progenies. V. tricoloris.*

XX. GYNANDRIA.

DIANDRIA.

hyperborea. 33. ORCHIS bulbis fasciculatis, nectarii cornu longitudine germinis: labio lineari integerrimo truncato. *König.*

Habitat in Islandia. *König.*

Caulis *palmaris cum spica.* Folia *alterna, lanceolata, longitudine caulis:* Spica *ouata:* Bracteis *lineari-lanceolatis, longitudine florum.* Corollae *viridi-lutescentes: Petalum supremum latius, ouatum; Lateralia 2 superiora lanceolata, ad primum conniuentia; Lateralia 2 inferiora oblonga. Labium vix petalo longius.*

atrata. 19. OPHRYS bulbis . . . florum cucullo staminifero bicorni.

Habitat ad Cap. b. spei. *Schreber.* 24.

Caulis *palmaris, simplex.* Folia *sparsa, semiamplexicaulia, numerosa, versus basin latiora, versus apicem longe subulata s. linearia.* Spica *terminalis.* Flores *sessiles, remoti, sub singulis* Bractea *setacea longitudine floris.* Corolla *pentapetala: Petalis ouatis s. lanceolatis, obtusis.* Staminum *fornix longitudine petalorum, terminatus corniculis duobus, erectis, linearibus, parallelis.* Planta *tota exsiccatione euadit atra.*

perpensa. 1. GVNNERA.

Petasites africanus, calthae palustris folio. *Herm. lugdb. 488.*

Petasitidis folio, bliti fructu. *Rai. hist. app.*

Blitum africanum, calthae palustris folio, caule nudo cubitali spicam pedalem sustinente. *Pluk. alm. 68. t. 18. f. 12.*

Habitat ad Cap. b. ſpei. 2.

Folia *radicalia*, *cordata*, *obtuſa*, *laeuia*, *venoſa*, *repanda*, *denato-crenata*, Petiolis *vix pubeſcentibus*. Scapus *nudus*, *bipedalis*. Amentum *terminale*, *longum*, *compoſitum*: *Partialibus ſparſis*, *ſimplicibus*, *diſtinctis*: *bracteis lanceolatis*, *breuibus*. Floſculi *nudi*.

TRIANDRIA.

palmifolium. 2. SISYRINCHIVM foliis enſiformibus neruoſis.

Bermudiana palmae folio, radice bulboſa. *Plum. ic. 15. t. 46?*

Habitat in Braſilia. *D. Arduini.*

Similima *S. Bermudianae*, *ſed* Caulis *bipedalis*, *etiam acceps.* Folia *duplo latiora neruis 5 a 6 exſtantibus*, *complicata.* Glumae Floresque *numeroſi in faſciculum terminalem*, *vix maiores Bermudianae.* Stylus *vltra medium trifidus.*

Bunius. 1 STILAGO.

Bunius fatiuus. *Rumph. amb. 3. p. 204. t. 131.*

Habitat in India. ♄.

Arbor. Folia *alterna*, *petiolata*, *ſimplicia*, *ouato-oblonga*, *integerrima*, *glabra.* Spicae *alternae*, *nudae*, *longiſſimae.* Flores *parui*, *ſparſi*, *ſeſſiles.*

DECANDRIA.

baruenſis. 5. HELICTERES foliis cordatis ſerratis, floribus decandris, fructu contorto apicibus rectis. *Jacq. amer. 236. t. 149.* *

Helicteres arbor indiae orientalis, ſiliqua varicoſa et funiculi in modum contortuplicata. *Pluk. alm. 181. t. 245. f. 2.*

Habitat in Indiis. ♄.

POLYANDRIA.

aſiatica. 3. GREWIA foliis cordatis.

Habitat in Suratte. *Braad.* ♄.

Arbor *Ramis vix tomentoſis.* Stipulae *lanceolatae.* Folia *alterna*, *petiolata*, *cordata*, *ſubrotunda*, *acutiuſcula*, *quinqueneruia*, *vix lobata*, *ſubtus tomentoſa*, *magnitudine Mali.* Petioli *teretes*, *tomentoſi*, *foliis*

quan-

quintuplo breuiores. Pedunculi *axillares, saepius quaterni, trifidi, trisflori, foliis dimidio breuiores.* Petala *calyce non maiora.* Baccae *paruae, rubrae, acidae.*

oceanica. 2. ZOSTERA pericarpiis pedunculatis oliuiformibus. *Ger. prou. 121.* †
Alga angustifolia vitriariorum. *Bauh. pin. 364.*
Alga marina. *Lob. ic. 251.*
Alcyonium XIV. *Bauh. pin. 368. radix est.*
Habitat in Oceano. 24.
Differt a Z. marina Fructibus pedunculatis, Radicibus in pilum complicatis.

XXI. MONOECIA.

MONANDRIA.

trifoliatum. 2. ELATERIVM foliis ternatis incisis.
Sicyos foliis ternatis. *Gron. virg. 2. p. 191.*
Habitat in Virginia.
Capsula reniformis, hirta, biualuis, elastice dissiliens. Clayton; adeoque huius generis virginiana est.

TRIANDRIA.

tomentosa. 38. CAREX spicis femineis subpedunculatis erectis, capsulis subglobosis tomentosis.
Cyperoides angustifolium montanum, folliculis seminum villosis. *Scheuch. gram. 423.*
Habitat in Austria. *D. Jacquin.* 24.
Facies *C. paniceae, figura Mich. gen. t. 132. f. 13. hanc potius, quam C. pallescentem repraesentat; differt a Scheuchzeriana Bracteis spica longioribus.* Culmus *triqueter.* Folia *angusta.* Spica Mascula *terminalis, oblonga, pallescenti ferruginea.* S. Femineae 2, *alternae, oblongae, erectae, breuiter pedunculatae.* Bracteae *longitudine culmi superioris.* Folliculi *f. Capsulae subglobosae s. subouatae, vix acuminatae, notabile tomentosae, pilis breuissimis mollibus quasi muricatae.* Semina *glabra, subglobosa cum laeui protuberantia apicis.*

TE-

TETRANDRIA.

pumila. 6. BETVLA foliis obouatis crenatis.
Betula nana. *Kalm. it. 2. p. 263.*
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♄.
Similis *Betulae nanae, ſed videtur diſtincta* Foliis *non orbiculatis, ſed obouatis, profundius crenatis, ſubtus laeuiter pubeſcentibus.* Amenta *feminea facie diuerſa e ſquamis rugoſis.*

repens. 1. SERPICVLA.
Habitat ad Cap. b. ſpei.
Herba *facie Veronicae ſerpyllifoliae, ſed minor.* Folia *ſaepius alterna, linearia, rarius ſerrata.*

diſticha. 1. CICCA.
Habitat in India. ♄.
Frutex. Folia *alterna, petiolata, diſticha, ouata, acuminata, laeuia.* Racemi *ſimplices, floſculis ad ſingula puncta congeſtis, mixtisque, pedicellatis, magnitudine vix Clutiae, cui affinis.*

PENTANDRIA.

imbricata. 2. HARTOGIA foliis ouatis mucronatis imbricatis.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.
Similis H. ciliari, ſed Petala *ſubrotunda vnguibus calyce triplo longioribus, nec oblonga vnguibus calyce breuioribus.* Folia *ſubimbricata, carinata.* Flores *purpurei.*

aequata. 1. LEEA caule tereti pubeſcente.
Caioe toca. *Indis.*
Habitat in India Orientali. *Kleynhoff.* 24.
Caulis *teres, pubeſcens.* Folia *alterna, pinnata: Foliolis petiolulatis, quinis, lanceolatis, acuminatis, ſerratis, ſpithamaeis, latitudine 2 pollicum, laeuibus, at etiamnum tenellis ſubtus pubeſcentibus.* Corymbi *trichotomi.*

criſpa. 2. LEEA caule angulato fimbricato.
Habitat ad Cap. b. ſpei. *Dau. v. Royen.* 24.
Radix *tuberoſa.* Caulis *ſublignoſus, annus, articulatus, tripedalis, angulatus angulis membranaceis criſpis.* Folia *alterna, pinnata, rachi marginata: folio-*

liolis petiolulatis, 3 *ſ.* 5, *ouali-oblongis*, *lineatis*, *glabris*, *argute ſerratis*, *neruis tranſuerſis*, *intertextis ſtriis transuerſis parallelis.* Stipulae *ſolitariae*, *ſub folia*, *ſeminulares*, *carina ciliatae.* Pedunculus *corymboſus.* Flores *niuei*, *exigui.* Utriusque *Speciei Neruii oppoſiti ſunt.*

lappacea. 1. NEPHELIVM.

Habitat in India. ♄.

Folia *alterna*, *pinnata*, *biiuga ſine impari*: *foliolis obouatis*: *exterioribus maioribus.* Racemus *ſpiculis aliquot*, *erectus*, *foliis breuior.*

ADELPHIA.

cupreſſoides. 4. THVIA ſtrobilis tetragono-globoſis.

? Cupreſſus fructu quadriualui, foliis equiſeti inſtar articulatis. *Shaw. afr. 188. t. 188. vix.*

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.

Facies *omnino Cupreſſi meta coarctata.* Folia *oppoſita*, *appreſſa vt in Sabina*, *nec patula.* Fructus *omnino externe Cupreſſi magnitudine et facie*, *ſubgloboſi*, *vix tetragoni*, *ſed longitudinaliter dehiſcentes in lobos* 4: *valuulis craſſis*, *introrſum carinatis*, *extus tuberculis ſparſis*, *apice acutis.* Semina *plurima*, *compreſſa*, *terminata ala membranacea obouata. Ramuli minime articulati more Equiſeti.*

Gnemon. 1. GNETVM.

Gnemon domeſtica. *Rumph. amb. 1. p. 181. t. 71.*

Habitat in India. ♄.

Rami *ſtricti*, *geniculati*, *ſub geniculis latiores.* Folia *oppoſita*, *petiolata*, *lanceolato-ouata*, *integerrima*, *laeuia.* Amenta *axillaria*, *pedunculata*, *bina e ſingulis axillis*, *verticillata verticillis paruis*, *e bractea orbiculari*, *perfoliata*, *integerima*, *ſupra calloſa*, *cui Floſculi immerſi. Feminei ſuperius ſ. verſus rachin*, *ſaepius* 6 *ſ.* 7, *maſculi verſus marginem ſ. inferius.*

balſamiferum 22. CROTON foliis ouato-lanceolatis integerrimis ſcabris ſubtus tomentoſis.

Croton foliis lanceolatis acuminatis integris vtrinque tomentoſis, ramis tomentoſis. *Jacq. amer. 255.*

Habitat in Martinica, Curacao, Jamaica.

Rami *tomentoſi.* Folia *alterna, petiolata, ouato-lanceolata, acuminata, ſubtus tomentoſa. Planta ſimillima* C. humili, *ſed folia non cordata.*

ſyluatica. 1. STILLINGIA.
Habitat in Carolinae *pinetis. D. Garden.* ♄.
Frutex *caulibus pluribus, erectis, teretibus, tripedalibus, lacteſcentibus, terminatis ſpica.* Rami *duo ſaepius, ad baſin ſpicae enaſcuntur:* Folia *alterna, petiolata, remota, elliptica, ſerrulata, nitida, patentia.* Spica *ſ. Amentum terminale, ſeſſile.* Flores *parui, flaui. In Siphilitide ſpecifica habetur. Benj. Stillingfleet acutiſſimus apud Anglos naturae conſultus.*

Janipha. 8. JATROPHA foliis palmatis: lobis integerrimis: intermediis ſinu lobatis. *Jacq. amer. 256. t. 162. f. 1.*
Janipha fruteſcens. *Loeſl. is. 309.*
Habitat in America *cellidiore.* ♄.
Affinis ninium J. Manihot.

SYNGENESIA.

ouifera. 6. CVCVRBITA foliis lobatis, pomis obouatis, cirrhis digitato-ſeptenis.
Cucurbita, aſpero folio, amara turbinata flaua candicantibus lineis inſcripta parua. *Bauh. hiſt. 2. p. 229. an?*
Habitat ad Aſtrachan. *DD. Lerche.*
Herba *et Flores ſimillimi C. Peponi, ſed minus ſcabra.* Folia *neque multifida, neque fructus amari.* Cirrhi *recti, apice terminati cirrhulis minoribus ſpiralibus, ſaepius ſeptenis.* Fructus *obouati, laeues, magnitudine et figura oui gallinacei, cortice duro, vix cultr conſcindendo, picto lineis longitudinalibus* 10 *lacteis, ac ſi filia hybrida Bryoniae laciniоſae.* H. U.

grandis. 7. BRYONIA foliis cordatis angulatis glandulis ſub baſi.
Bryonia foliis ſubrotundis angulоſis, momordicae facie. *Burm. zeyl. 49. t. 19. f. 2.*
Vitis alba indica. *Rumph. amb. 5. p. 447. t. 166. f. 1. excludenda in Br. cordifolia.*
Habitat in India.
Caulis *laeuis.* Folia *cordata, angulata, vix denticulata, non lobata, obtuſa, laeuiuſcula:* Glandulae *ali. quot concauae ſub ipſa baſi et una alterave remotior.* Flores *magni.* Fructus *oblongus.*

XXII.

XXII. DIOECIA

TRIANDRIA.

spiciflora. 1. CATVRVS spicis axillaribus solitariis pendulis.
Burm. ind. t. 59. f. 1.
Cauda felis agrestis alba. *Rumph. amb. 4, p. 84. t, 37. f. 2.*
Habitat in India *orient.* ♄.

ramiflora. 1. CATVRVS floribus sessilibus congestis lateralibus. †
Boehmeria ramiflora. *Jacq. amer. 246. t. 157.*
Habitat in Martinica *ad ripas.* ♄.
Planta facie Caturi meaei, sed calyx nullus et Pistillum simplex D. Jacquinio; adeoque dubius, vtrum spiciflora sit eiusdem generis cum Jacquiniana aut diuersi.

PENTANDRIA.

commune. 1. CANARIVM.
Canarium. *Rumph. amb. 2. p. 145. t. 47.*
Habitat in India. ♄.
Folia *alterna, pinnata cum impari*: Petiolis *communibus striatis.* Foliola *nouena, petiolulata, ouato-oblonga, longius acuminata, laeuia.* Paniculae *ramis diuaricatis, rigidis;* Flores *sessiles.*

ADELPHIA.

chinensis. 10. JVNIPERVS foliis patentibus confertis: caulinis ternis, rameis quaternis.
Habitat in China. ♄.
Folia *patula, vtrinque viridia, magis quam in reliquis conferta; basi adnata, vix pungentia, distinctissima densitate foliorum.* H. U.

GYNANDRIA.

stipularis. 6. CLVTIA foliis oualibus, subtus tomentosis.
Habitat in India *Kattuko-kelang. Kleinhoff.* ♄.
Rami *flexuosi, tomentosi.* Folia *ouata s. oualia, maiuscula, integerrima, subtus tomentosa, breuius petiolata.* Stipulae *ouatae, acutae, longitudine petiolorum.* Flores *axillares, subsessiles, stipulis non longiores, atro-*

atropurpurei vt videtur. Cal. *monophyllus, basi campanulatus, quinquepartitus, acutus, persistens.* Petala 5, *subrotunda, breuissima, sinubus calycis inserta.* Stylus *columnaris, apice vix trifidus, cui in medio insident* Filamenta 5 *antherifera, horizontalia.* Feminam *non vidi.*

androgyna. 7. CLVTIA foliis ellipticis, ramis androgynis.
Habitat in India. ♄.
Rami *laeues, flexiles.* Folia *ouali-oblonga, breuius petiolata, integerrima, laeuia, non fragilia, longiora quam in tenella,* Flores *axillares foliorum, pedunculati, bini quasi e gemma minuta strobiliformi.* Flores *Alii masculi calyce monophyllo, orbiculato, plano, obtuso, parum quinquefido. Alii in eadem planta feminei, quinquepartiti.*

XXIII. POLYGAMIA.

MONOECIA.

indica. 7. PARIETARIA foliis lanceolatis, caule erecto.
Crataeogonum. *Rumph. amb. t. 10. f. 1.*
Habitat in India.
Similis P. officinali, *sed magis nuda.* Folia *lanceolata, longius multo acuminata, trineruia, nuda.* Florum *glomeres minores excepti bracteis subulatis, nec ouatis,* Styli *longiores.* Fructus *sessiles, sulcati.*

Catappa, 1. TERMINALIA.
Catappa. *Rumph. amb. 1. p. 174. t. 68.*
Adamaram. *Reed. mal. 4. p. t. 5. Raj. hist. 1650.*
Habitat in India. ♄.
Arbor *ramis pubescentibus.* Folia *alterna, breuissime petiolata, obouata, maxima, integerrima petiolis tomentosis.* Racemi *axillares, filiformes, simplices.*

sempervirens. 11. ACER foliis ouatis integerrimis sempervirentibus.
Mill. dict. †
Habitat in Oriente. ♄.

reticulata. 49. MIMOSA foliis coniugatis aculeo terminatis, ſpinis ſtipularibus,

Arbor folio acaciae, ſiliqua longa lata articulata externe eleganter reticulata, ſemine ouato plano. *Boerh. lugd. 2. p. 168. an?*

Acacia africana, abruae foliis aculeata, ſpinis longiſſimis horrida. *Pluk. alm. 3. t. 123. f. 2.*

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.

Arbor *ramis rigidis flexuoſis a gemma ad gemmam.* Spinae *ſtipulares ſub ſingula gemma binae horizontales, albicantes, longitudine foliorum.* Folia *petiolata, coniugata ſ. monoiuga: foliolis pinnatis ſexiugis.* Petiolus *communis terminatus ſupra glandula, ſubtus aculeo.* Foliola *oblongo-linearia, obtuſa paribus diſtantibus infimis minoribus.* Fructus *oualis, palmaris, latitudine ſemipalmaris, compreſſus, ſeminibus ſparſis magnis.* H. U.

TRIOECIA.

retuſa. 9. FICVS foliis oblongis obouatis obtuſiſſimis, fructibus ſeſſilibus.

Habitat in India. ♄.

Rami *angulati.* Folia *petiolata, cuneiformi obouata, oblonga, baſi angustiora: coriacea, laeuia, integerrima.* Fructus *ramorum, ſeſſiles, ſparſi, Calyce triphyllo, approximato.*

beniamina. 10. FICVS foliis ouatis acuminatis transuerſe ſtriatis margine. laeui.

Itty-alu. *Rheed. mal. 1. p. 45. t. 26.*

Varinga paruiflora. *Rumph. amb. 3. p. 159. t. 90.*

Habitat in India. ♄.

Rami *tenues.* Folia *petiolata. exacte ouata, acuminata, ſubtransuerſe tenerrime ſtriata margine diſtincto laeui, perennia, facie Pyri.*

XXIV. CRYPTOGAMIA.

FILICES.

cretica. 20. PTERIS frondibus pinnatis: pinnis oppoſitis lanceolatis ſerrulatis baſi anguſtatis: infimis ſubtripartitis.

Hemionitis multifida. *Bauh. pin. 364.*

Phyllitis ramoſa. *Alp. exot. 67. t. 66.*

Lingua Ceruina foliis coſtae innaſcentibus, *Tournef. inſt. 544. t. 321.*

Filix cretica minor non ramoſa. *Moris. hiſt. 3. p. 573. ſ. 14. t. 1. f. 16.*

Habitat in Creta, Ilva *Inſula.*

Frons *pinnata: pinnis lanceolatis ſ. enſiformibus, baſi anguſtatis: ſupremis connato-ſubdecurrentibus; infimis petiolatis, ſaepeque bi-ſ. trifidis.*

auſtrale. 3. BLECHNVM frondibus pinnatis: pinnis ſeſſilibus cordato-lanceolatis integerrimis: inferioribus oppoſitis.

Habitat ad Cap. b. ſpei.

Stipites *pedales, virides.* Frondes *pinnatae, integerrimae, margine ſcabrae.* Steriles *pinnis latioribus, baſi ſubtruncatis.* Fertiles *pinnis lanceolatis, baſi cordatis.* Lineae fructificantes *binae tantum, longitudinales et a margine et coſta diſtantes.*

monanthes. 20. ASPLENIVM frondibus pinnatis: pinnis trapeziis obtuſis ſuperne crenatis, linea fructificationis vnica.

Habitat ad Cap. b. ſpei.

Facies *A. Trichomanis, ſed maius.* Pinnae *alternae, trapetziae, crenatae, ſupra rotundatae.* Linea fructificans *iuxta marginem inferiorem, vnica, ipſa pinna breuior, inferne ſuffulta margine membranaceo,*

pteroides. 20. ADIANTVM fronde ſupradecompoſita: pinnis ouatis integris crenulatis, ſtipite laeui.

Habitat ad Cap. b. ſpei.

Stipes *ſpithamaeus, purpureus, laeuis.* Pinnae *ouatae, integrae, crenulatae ſtriis exaratis. Margo his ſubtus tectus Squamulis albis totidem, quot crenulae, fructificationes operientes.*

MV-

MVSCI.

rugoſum. 43. HYPNVM furculis vagis erectiuſculis, foliis ſecundis recuruatis baſi rugoſis.
Hypnum luteſcens criſpum, lycopodii facie. *Dill. muſc. 289. t. 37. f. 24.*
Habitat in Haſſia, Hollandia. *Osbeck.*
Muſcus *rarius ramoſus.* Folia *ad alterum latus flexa recuruataque, baſi dilatata et valde rugoſa, ſed vix ſine oculo armato manifeſta. Rami inter folia rubri.* Pedunculi *atropurpurei, in ſicco contorti.* Capſulae *obouatae, breues absque ciliis.*

ALGAE.

pertuſus. 82. LICHEN leproſus: verrucis ſubteſſellatis laeuigatis pertuſis poro vno alteroue cylindrico.
Lichen cruſtaceus cinereus, ſcutellis vireſcentibus, *Hudſ. angl. 445.*
Lichenoides verrucoſum et rugoſum cinereum glabrum. *Dill. muſc. 128. t. 18. f. 9.*
Lichenoides cruſtaceum arb. tenuiſſimum cinereo-rufum, capſulis exiguis crebris. *Mich. gen. 106. t. 52. f. 2.*
Habitat in Saxis et arboribus Europae. *D. Fagraeus.*
Cruſta *leproſa, alba, tenuis; vbi vero floret craſſa, fiſſa in* verrucas *angulatas, laeues, poro vno alteroue pertuſas.*

corallinus. 83. LICHEN leproſus ramoſus teres faſciculatus faſtigiatus confertiſſimus albus.
Habitat in Sueciae *rupibus. Zoega.*
Similis L. calcareo. Cruſta *craſſiſſima, quae fracta conſpicitur conſtare* Filis *teretibus, ramoſis, confertiſſimis, figura corallii, faſtigiatis apicibus rotundatis absque tuberculis.*

Vſnea. 84. LICHEN filamentoſus pendulus compreſſus ramoſus laeuis.
Vſnea ceratoides candicans glabra odorata. *Dill. muſc. 71. t. 14. f. 31. et t. 54. f. 10.*

Habitat in arboribus Indiae Or. *Inf.* Helenae, Madagaſcar, Martinicae. *Jacqu.*
Filiformis, ramoſus, inaequalis, pedalis, axillis obtuſis, angulis, in lamellas 2 ſeparabilis; recens albidus, ambroſiacus.

rupicola. 85. LICHEN leproſus albidus, tuberculis pallidis albo marginatis.
Habitat ſupra rupes planiuſculas nudas apricas in ſyluis. Zoega.
Cruſta *paruiſſima.* Tubercula *interdum ſunt vireſcentia, ſubconuexa absque margine, vnde diuerſa apparet.*

lacteus. 86. LICHEN leproſus albus, tuberculis concoloribus hemiſphaericis.
Habitat vbique in rupibus, ſaxis. Zoega.
Tubercula *maiuſcula ſunt.*

cinereus. 87. LICHEN leproſus, tuberculis nigris albo marginatis.
Habitat vbique in rupibus, ſaxis.
Similis *L. fuſco-atro, ſed tuberculis minoribus.* Margo *Lichenis niger eſt.*

horizontalis. 88. LICHEN foliaceus repens planus ſubtus auenius, peltis marginalibus horizontalibus.
Lichenoides ſubfuſcum, peltis horizontalibus planis. *Dill. muſc. 205. t. 28. f. 104.*
Lichen pulmonarius minor inferne obſcurus. *Mich. gen. 85. t. 44. f. 1. 6.*
Habitat in Suecia. *Zoega.*
Madidus dum eſt, Pelta horizontalis vndique marginata.

Parellus. 89. LICHEN cruſtaceus albus, peltis concauis obtuſis pallidis.
Lichenoides leproſum tinctorium, ſcutelis lapidum cancri figura. *Dill. muſc. 130. t. 18. f. 10.*
Paralle d'Auvergne. *Tournef. it. 1. p. 233.*
Habitat in Muris.

90. LI-

Byssoides. 90. LICHEN leproso-farinaceus, peltis stipitatis subglobosis,
Coralloides fungiforme ex vngula equina, liuide rubescens. *Dill. musc. 78. t. 14. f. 5.*
Fungi parui globosi ex vngue equino putrescente. *Rai. angl. 3. p. 13. t. f.*
Habitat in Europae *glareosis.*
Crusta Farinosa, viridi-cinerea. Fungi pro ratione magni.

gelidus. 91. LICHEN crustaceus albicans, peltis tuberculosis rugosis testaceis.
Habitat in Islandiae *saxis. König.*
Crusta *foliacea, orbicularis, tam arcte saxis adnata, vt separari nequeat, albida, longitudinaliter rugosa. Florum* peltae *discum occupant, rufo-testaceae, conuexae, multum eleuatae, radiato-plicatae, absque vllo margine.* Figura *Dill. musc. t. 18. f. 18. a, c. hanc exprimit, modo peltae duplo maiores conuexae, nec marginatae essent.*

globiferus. 92. LICHEN fruticulosus solidus laeuis, tuberculis globosis cauis terminalibus.
Lichen fruticulosus coralloides non tubulosus cinereus ramosissimus, receptaculis sphaericis concoloribus. *Mich. gen. 105. t. 39. f. 6.*
Coralloides cupressiforme, capitulis globosis. *Dill. musc. 117. t. 17. f. 35.*
Habitat in Tingitana. *Pluk. in* Anglia. *Dill. Stenbrohult* Smolandiae *Filius.*
Similis Lich. pascali, *sed laeuior, aphyllus, ramis terminatis* globis *concauis ore paruo, sphaerice hiantibus, intus nigris.*

fascicularis. 93. LICHEN foliaceus gelatinosus, tuberculis turbinatis fasciculatis fronde maioribus.
Lichenoides gelatinosum palmatum, tuberculis conglomeratis. *Dill. musc. 141. t. 19. f. 27.*
Habitat in Susexia Angliae. Dill. *ad* Stenbrohult Smolandiae. *Filius.*
Folia *radicalia, minuta, vti totus gelatinosa, hyalina Tremellae instar* Tubercula *ratione folii admodum magna.*

magna, numerosa, subpetiolata, turbinata, fasciculata, extimo truncata, limbo obtuso cincta.

hirsutus. 35. FVCVS filiformis ramosissimus subdichotomus, vndique hirsutissimus.
Habitat in Pelago. *D. Gunnerus.*
Caules *pedales, crassitie fili grossi, ramosissimi, ramis obtusis, teretibus, vndique vestitis vellere densissimo, breuissimo, quasi ceruino; Proxime acedit ad Fucum ericoidem.*

selaginoides. 36. FVCVS ramosissimus filiformis, foliis imbricatis subulatis basi vesicularibus.
Habitat in Oceano Nouergico.
Caulis *filiformis, flexuosus, ramosissimus. Rami imbricati.* Foliis *subulatis, breuissimis, basi vesiculoso-ouatis.*

plumosus. 37. FVCVS caule filiformi subcompresso ramoso, frondibus lanceolatis bipinnatis plumosis coloratis. *Hudf. angl. 473. n. 35.*
Fucoides purpureum eleganter plumosum. *Rai. angl. 37.*
Habitat in O. Atlantico, *König.*
Affinis Fuco cartillagineo.

crispus. 38. FVCVS frondibus dichotomis submembranaceis: laciniis dilatatis crispis.
Fucus s. Alga membranacea candida, segmentis plurimum laciniatis. *Morif. hist. 3. p. 646. s. 15. t. 8. f. 6.*
Habitat in Oceano Atlantico. *König.*
Laciniae lacerae purpurascentes aut albidae.

digitatus. 39. FVCVS caule tereti, fronde palmata: foliolis ensiformibus. *Hudf. angl. 474. n. 41.*
Fucus *hyperboreus* fronde simplici palmata, caule longissimo. *Gunnr. flor. 61. t. 3.*
Fucus scoparius. *Ström. sond. 93.*
Fucus arboreus polyschides edulis. *Bauh. pin. 64 Raj. ang. 46.*

Fu-

Fucus membranaceus polyphyllus maior. *Rai. angl. 46.*
Habitat in Oceano Atlantico.
Caulis craſſitie baculi ambulatorii.

esculentus. 40. FVCVS fronde ſimplici indiuiſa enſiformi, petiolo pinnato folium percurrente.
Fucus folio plano enſiformi, caule pinnato. *Flor. lapp. 461.*
Fucus longiſſimo latiſſimo tenuique folio. *Bauh. pin. 364. prodr. 154.*
Habitat in Mari Atlantico. *Equis et hominibus eſculentus. D. Gunnerus, König.*
Frons *maxima per quam longitudinaliter ab vtraque pagina tranſit* petiolus *craſſus, quadrangularis, latus, cui infra folium vtrinque inſident* pinnulae *enſiformes, planae; differt a* F. ſaccharino *neruo folii et pinnulis.*

dentatus. 41. FVCVS frondibus membranaceis eneruiis alternatim pinnatifidis: laciniis apice eroſis.
Fucus membranaceus rubens, foliis latiuſculis ad extrema dentatis. *Moriſ. hiſt. 3. p. 646. ſ. 15. t, 8 f. 5.*
Habitat in Oceano Atlantico.
Frons *rubra, diaphana, laciniarum ſinubus obtuſis: laciniis apice dentatis.*

alatus. 42. FVCVS frondibus membranaceis ſubdichotomis neruoſis: laciniis alternis decurrentibus bifidis. *Hudſ. angl. 472. n. 33.*
Fucus dichotomus paruus coſtatus membranaceus. *Rai. angl. 44.*
Fucus purpureus tenuiter diuiſus non geniculatus. *Moriſ. hiſt. 3. p. 646.*
Habitat in Oceano ſeptentrionali. *König.*
Frondes *ramoſi, purpurei, diaphani, lineares, neruo medio craſſiore, apicibus ſubdentatis.*

ciliatus. 43. FVCVS frondibus membranaceis lanceolatis proliferis ciliatis. *Hudſ. angl. 472. n. 31.*
Fucus membranaceus rubens anguſtifolius, marginibus ligulis armatis. *Rai. angl. 47.*
Fucus humilis membranaceus acaulos elegantiſſimus ruber, capillis longis fimbriatus. *Moriſ. hiſt. 3. p. 646.*
ß. Fucus membranaceus purpureus latifolius pinnatus. *Rai. angl. 47.*
Habitat in Oceano Atlantico.

ſanguineus. 44. FVCVS frondibus membranaceis ouato-oblongis integerrimis petiolatis, caule tereti ramoſo. *Hudſ. angl. 475. n. 43.*
Fucus ſ. Alga folio membranaceo purpureo lapathi ſanguinei figura et magnitudine. *Moriſ. hiſt. 3. p. 645. ſ. 15. t. 8. f. 6. Rai. angl. 47.*
Habitat in Oceano Atlantico. *Konig.*

granulata. 11. VLVA globoſa farcta viridis.
Habitat ad ripas paludum fontiumque Sueciae. *Rejicitur ad littora paludum natans viridis, magnitudine ſeminis Cannabis, copioſiſſima, farcta pulpa ſubuiſcoſa.*

A P-

APPENDIX.

PALMAE.

guineenſis. 2. COCOS aculeata tota, frondibus diſtantibus, radice repente.

Bactris *minor* fructibus ſubrotundis. *Jacq. amer. 279 t. 171. f. 1.*

Palma frondibus pinnatis, caudice tereti aculeato, fructu minore. *Mill. dict. 6.*

Palma ſpinoſa minor, caudice gracili, fructu pruniformi luteo oleoſo. *Sloan. iam. hiſt.*

Palma americana ſpinoſa. *Bauh. pin. 507. Pluk. alm. 276. t. 103. f. 1.*

Habitat in America meridionali.

Culmus *craſſitie pollicis vndique aculeatus.* Stipites, *ſub foliolis, aculeis ſolitariis.* Foliola *margine ſaepe aculeata.* Drupa *ſucculenta.*

guineenſis. 1. ELAEIS frondibus pinnatis: ſtipitibus dentato-ſpinoſis diuertibus: denticulis ſupremis recuruatis.

Elaeis guineenſis. *Jacq. amer. 180. t 171.*

Palma frondibus pinnatis vbique aculeatis nigricantibus, fructu maiore. *Mill. dict. 3.*

Palma tota ſpinoſa maior, fructu pruniformi. *Sloan. iam. hiſt.*

Habitat in Guinea; *Hoſpitatur in* America.

Frondes *foliolis replicatis.* Stipite *a baſi ad foliola dentato-ſpinoſa: quarum infimae erectae, mediae patentes, ſupremae vncinatae.*

capenſis. BRABYLA.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.

Brabeio *adeo ſimilis arbor, vt eandem dicerem, niſi fructificatio diuerſiſſima.*

Rami *rigidi, purpuraſcentes, ſtriati, ſubuilloſi.* Folia *verticillata, ſeptena, petiolata, lanceolati, rigida, remote ſerrato-ſubdentata, palmaria, ſupra glabra, ſub-*

tus reticulata: Petiolis *erectis*, *pubescentibus*. Amenta *oblonga*, *cylindrica*, *petiolata*, *teretia*, *erecta*, *lateralia*, *intra singulum folium saepe bina*, Foliis *breuiora*, *rigidula*, *bipollicaria*, *imbricata*. Squamis *ouatis*, *acutis*, *pubescentibus*, *multifloris*. *Flosculi* Corollula *infundibuliformis*, *quinquefida*. Stamina 5, Stylus 1.

EX.

EXPOLITIONES GENERVM PLANTARVM EDITIONIS VI.

7. KAEMPFERIA	COR. ouatis	*adde* suprema bifida.
	ANTH. linearis	— geminata.
	STIGM. obtusum	*lege* billamelatum, subrotundum.
10. SALICORNIA	FILAM. vnicum	*exclude* signum dubitationis.
	ANTH.	vnica, oblonga, didyma, erecta.
132. PAVETTA	STAM.	Antherae subulatae, supra faucem corollae.
	SEM.	bina (*Rumph.*) hinc conuexa.
157. TRAPA.	CAL. persistens	*adde* basi germinis adnatum: foliolis 2 lateralibus et 2 angulos germinis.
173. COLDENIA.	SEM. quatuor	*lege* duo, muricata, biloculatia.
198. CORTVSA.	CAL. obtusis.	*lege* lanceolatis, tridentatis.
	COR. subrotundis	— ouatis, acutis. *Faux* annulo elevato.
	PIST. staminibus	— corolla longior, persistens. *Stigma* subcapitatum.
	PER.	— *Capsula* oualis, acuminata, semiquinquevalvis.
	SEM.	— numerosa, compressa, angulata.
128. CINCHONA.	CAL. quinquefidum	*lege* campanulatum, quindentatum.
	COR. quinquefid. acut.	— quinquepartitus: laciniis oblongis, tubo breuioribus, apice latis.
	PER. subrotunda	— oblonga dehiscens in 2 partes interius cohiscentes, dissepimento parallelo.

238. ERITHALIS Cor. laciniis *lege* tubo breuiſſimo, lanceolatis longis recuruis.

Pist. filiformis *adde* ſuperne compreſſus.

279. CVPANIA Flores Monoici Adelphi.

♂. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 5, coalita.

♀. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Piſt.* 3-partitum.

287. CLAYTONIA Cor. ouato-oblonga &c. *lege* obcordata, vnguiculata.

Stam. ſingula *adde* vnguibus petalorum inſerta.

329. ECHINOPH. Cal. floſculis &c. *lege* pluribus: centrali ſeſſili.

Cor. floſculi *adde* *Maſculi* abortiui. *Femineo* centrali vmbellae.

Pist. intra inuolucr. *lege* inuolucello veſtitum.

Sem. vnicum, ouato, oblongum.

409. CRINVM Pist. *lege* *Germen* inferum. *Stylus* filiformis, longit. floris. *Stigma.*

478. MIMVSOPS Cor. Pet. octo *lege* ſedecim; praeterea ſunt *Filamenta* ſubulata et *Germen* rotundum.

481. MEMECYLON Cal. perſiſtens *adde* fundo vrceolari ſtriato.

Stam. *Filamenta* erecta, apice dilatata truncata.

Antherae lateribus apicis filamenti inſertae.

519. CYNOMETRA Cal. 4-part. obtuſ. *lege* tetraphyllum, oblongum, reflexum, longitudine corollae.

Stam. — *Antherae* ouales, apice bifidae.

Pist. ſimplex — filiformis, longitud. ſtaminum. *Stigma* ſimplex.

542. COPAIFERA	PER.		*Legumen* ouatum, biualue ſtyli parte mucronatum.
	SEM.		Semen vnicum, ouatum, Arillo, baccato inuolutum.
557. HYDRANGEA	PER. foramine	*lege*	circumſciſſa.
641. RHEEDIA.	STAM. plurima	*adde*	filiformia, corolla longiora. *Antherae* oblongae.
	PIST.		*Stylus* cylindricus, longitudine ſtaminum. *Stigma* infundibuliforme.
659. CALOPHYLL.	CAL. nullum	*lege*	tetraphyllum : foliolis ouatis, concauis, coloratis, deciduis : exterioribus duobus breuioribus.
	COR. ſubrotunda	—	oblonga.
	PIST. nullum	—	filiformes longitudine ſtaminum.
665. MESVA-	CAL. paruis	*lege*	concauis, obtuſis.
	COR. magna	—	retuſa, vndulata.
	STAM. corollae	*adde*	connata baſi in vrceolum. *Antherae* ouatae.
	PIST. capitatum	*lege*	craſſiuſculum, concauum.
	PER. capſula	—	Nux et notata *dele ſequentia*,
	SEM. pauca	—	vnicum, ſubrotundum.
691. MICHELIA	CAL. nullum	*lege*	triphyllum : foliolis petaliformibus, oblongis.
	PIST. octodecim	—	concauis deciduis-
		—	quindecim.
693. ANNONA	STAM. lateri	*lege*	receptaculo.
	PIST. obtuſa	*adde*	numeroſa. totum germen obſidentia.
715. ORVALAE	Genus Micheli totum deleatur.		
761. HALLERIA	PER. bilocularis	*adde*	infera. *Fabric.*
	SEM. ſaepe ſolitaria	*lege*	parua, plana, ſubrotunda, margine alata. *Fabr.*

764. PETREA
CAL. basi *lege* fauce clausa.
COR. patentissimus *adde* media maiore diuersi colore.
STAM. recondita — adscendentia.
PER. *lege* vniloculare membrana tenui.
SEM. — vnicum, carnosum.

770. HEBENSTR.
CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulosum; membraceaceum, emarginatum subtus longitudinaliter dehiscens.
COR. monopetala, vnilabiata: *Tubus* cylindricus, calyce longior, latere inferiore ad dimidium dehiscens *Limbus* vnilabiatus, adscendens, planiusculus, quadrifidus, subaequalis.
STAM. *Filamenta* 4; horum 2 priora sub fauce margini corollae inserta, exstantia; 2 seriora interiora inferiora, reflexa ad latera. *Antherae* lunares, compressae, extrorsum truncatae.
PIST. *Germen* minimum. *Stylus* filiformis, flexuosus, per fissuram corollae reflexus. *Stigma* simplex.

831. HVGONIA
PER. globosa *adde* vniloculatis.
SEM. striata — globosa.

904. GEROPOGON
REC. nudum *lege* paleis setaceis.

978. AMELLVS
SEM. *adde Femineis* similis Hermaphroditis.

1096. NAIAS
PER. ouata *adde* vniloculatis.

1097. VALLISNER
COR. petalis impos. *lege* stigmatibus suppositis.
PIST. longioribus *adde* patentibus, supra pubescentibus.

1232. CYTINVS
STAM. octo *lege* sedecim.

1235. GRIELVM
STAM. quinque *lege* decem.

INDEX MANTISSAE.

Acer 128.
Achyranthes 50.
Adiantum 130.
Agroſtis 30.
Ajuga 80.
Allium 62.
Althaea 98.
Alyſſum 92.
Ammi 56.
Amygdalus 74.
Amyris 65,
Anemone 78.
Antichorus 64.
Anthyllis 100.
Antirrhinum 86.
Aquilegia 77.
Arabis 94.
Arctium 108.
Arduina 53.
Arenaria 71.
Artemiſia 111.
Aſparagus 63.
Aſplenium 130.
Aſperula 37.
Aſter 114.
Aſtralagus 103.
Athamanta 56.
Auena 34.
Betula 124.
Blechnum 130,
Brabyla 137.
Braſſica 94
Bryonia 126,
Buchnera 88.
Bunias 94.
Buphthalm. 117.
Cacalia 109.
Campanula 44.
Camphoroſma 41.
Canarium 127.
Capraria 87.
Capſicum 47.
Carduus 108.
Carex 123.
Cariſſa 52.
Caſſia 68.
Caturus 127.
Celaſtrus 49.
Centaurea 117.
Chaerophyllum 57.
Chaicas 68.
Cheiranthus 93.
Chryſanthem. 116.
Cicca 124.
Ciſſus 39.
Ciſtus 76.
Clerodendr. 90.
Clutia 127.
Clypeola 91.
Cnicus 109.
Cocos 137.
Columnea 90.
Cometes 39.
Conium 56.
Conuoluulus 43.
Conyza 113.
Corchorus 77.
Cornucopiae 29.
Cornus 40.
Corymbium 120.
Cotula 116.
Craſſula 60,
Crepis 107.
Croton 125.
Crucianella 38.
Cucubalus 71.
Cucurbita 126.
Cynanchum 53.
Cyperus 28.
Cyrilla 50.
Dactylis 33.
Days 69.
Daphne 66.
Delphinium 77.
Dialium 24.
Dioſma 50.
Dolichos 102.
Draba 91.
Dracena 63.
Echinops 119.
Echites 52.
Echium 43.
Elaphrium 40.
Elaeagnus 41.
Elaeis 137.
Elaterium 123.
Elymus 35.
Erica 65.
Erigeron 112.
Erythrina 99.
Ethulia 110.
Eupatorium 111.
Euphraſia 86.
Euphorbia 74.
Fagara 40.
Feſtuca 33.
Ficus 129.
Forsköhlea 72.
Fucus 132.
Gallium 32.
Gentiana 55.
Geranium 97.
Gladiolus 27.
Glorioſa 62.
Glycine 101.
Gnaphalium 112.
Gnetum 125.
Gnidium 67.
Grewia 122.
Gunnera 111.
Hartogia 124.
Hedyſarum 102.
Helicteres 122.
Helianthus 117.
Heracleum 57.
Hopaea 105.
Horminum 26.
Hudſonia 74.
Hyoſcyamus 45.
Hyoſeris 108.
Hypericum 106.
Hypnum 131.

Iatro-

Iatropha 126.
Illecebrum 51.
Inulla 114.
Juncus 63.
Juniperus 127.
Juſſiaea 69.
Ixia 27.

Koenigia 35.

Laſerpitium 56.
Leea 124.
Leontodon 107.
Lepidium 92.
Leucadendr. 36.
Lichen 131.
Liguſticum 24.
Lippia 89.
Liſianthus 43.
Lobelia 120.
Loranthus 63.
Lotus 104.
Ludwigia 40.
Lycium 47.

Mahernia 59.
Manulea 88.
Matricaria 115.
Melaleuca 105.
Melica 31.
Mentha 81.
Meſcherſmid. 42.
Michelia 78.
Monſonia 105.
Moraea 28.
Mimoſa 129.
Muſſaenda 45.
Myrtus 74.

Narciſſus 62.
Nephelium 125.
Nigrina 42.

Ocymum 84.
Odenlandia 40.
Olea 24.
Ophrys 121.
Orchys 121.
Ornithogalum 62.
Orbanche 88.
Othonna 118.

Paederia 52,
Panicum. 29.
Parietaria 128.
Paſpalum 29.
Paſſerina 40.
Paſtinaca 58.
Pedicularis 86,
Pergularia 53.
Perdicium 115.
Phaca 103.
Phaſeolus 102.
Phlomis 83.
Pimpinella 58.
Plectronia 52.
Poa 32.
Polymnia 118.
Portlandia 45.
Portulaca 73,
Polygala 99.
Potentilla 76.
Prenanthes 107.
Proſopis 68.
Prunus 75.
Pſoralea 104.
Pteris 130.
Pyrus 75.

Ranunculus 79.
Raphanus 94.
Rhamnus 49.
Riuina 41.
Robinia 101.
Rubia 39.
Rubus 75.
Ruellia 89.
Rumex 63.
Ruta 75.

Salſola 54.
Saluia 25.
Saponaria 70.
Saraca 93.
Scabioſa 37.
Scabrita 37.
Scandix 57.
Schmidelia 67.
Scirpus 29.
Scopolia 46.
Scrophularia. 87.
Selago 87.
Senecio 114.
Seriphium 119.
Serpula 114.
Sideroxylon 48.
Sinapis 94.
Siſymbrium 93.
Siſyrinchium 122.
Solanum 46.
Solidago. 114.
Sophora 67.
Sphaeranthus 119.
Statice 59.
Stachys 82.
Steris 54.
Stilago 122.
Stillingia 126.
Stipa 34.
Strutiola 41.

Tabernaemont. 53.
Tanacetum 111.
Terminalia 128.
Teucrium 80.
Thalictrum 78.
Theſium 51.
Thapſia 57.
Thya 125.
Thymus 84.
Tordylium 55.
Tradeſcantia 61.
Trianthema 69.
Triticum 35.
Triumfetta 79.
Tropaeolum 64.
Turnera 58.
Tuſſilago 113.

Ulua 136.

Vandellia 89.
Valleriana 27.
Verbaſcum 45.
Veronica 24.
Viola 120.
Volkameria 90.

Zoegea 117.
Zoſtera 123.
Zygophyllum 68.

* * *

New York Botanical Garden Library
QK91 .S9 1767 t.2 gen
Linne, Carl von/Systema naturae, per reg
3 5185 00090 8275